



EN195





ΧΗΜΕΙΑ,

ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ

ΠΑΡΑ

ΞΑΥΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ,

Δ. Φ. Ἀρχιφαρμακοποιῦ τῆς Α. Μ. τακτ. Καθηγητοῦ τῆς χημείας,
Μέλους τοῦ Ἱατροσυμβουλίου, Ἰππότη τοῦ ἀργυροῦ σταυροῦ τοῦ Σω-
τῆρος, Μέλους ἐπιτίμου καὶ ἀντεπιστέλλοντος διαφόρων
ἐπιστημονικῶν ἐταιριῶν, κ.τ.λ.

ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ.

ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ.

1842.



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ.

Ἡ μεγάλη πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καὶ αἱ ἀνέλπιστοι ἀνακαλύψεις ἐπὶ τῆς Ὁργανικῆς Χημείας κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, δι' ὧν τὰ προηγουμένως ἀξιώματα ἀνετράπησαν, πλῆθος νέων ὑλῶν ἀνεκαλύφθησαν, καὶ σώματα διαφορετικὰ νομιζόμενα ἀπεδείχθησαν ἀλλοιώσεις μόνον ἄλλων σωμάτων, ἐπέφεραν ἀναβολὴν ὀχμικράν εἰς τὴν ἐκδοσιν τῆς Ὁργανικῆς Χημείας, διότι ἤναγκάσθη νὰ ἐπεξεργασθῶ ἐκ νέου πάλιν τὸ πρότινον ἐπὶ συγγεγραμμένον τοῦτο μέρος.

Αἱ δυσχέρειαι, τὰς ὁποίας ἀπαντᾷ ὁ θέλων νὰ μεταφέρῃ εἰς γλῶσσαν ἀριστῶστατον τὰς ἑννοίας τόσον ἐκτεταμένης ἐπιστήμης ἤθελαν ἀναμφιδόλως μὲ ἀποτρέψει ἀπὸ τὸ ἐπίμοχθον τοῦτο ἔργον, ἂν δὲν μ' ἐνίσχυεν ὁ μόνος στοχασμὸς ὅτι ἤθελεν ἴσως παρέξει ὠφέλειάν τινα εἰς τοὺς τὴν χημείαν ἀκρουομένους.

Ἐπροτίμησα ὡς πρὸς τὴν ὀνοματοθεσίαν νὰ δεχθῶ τὰς εἰς τὰς ἄλλας γλώσσας καθιερωθείσας λέξεις, ἀφῆσας εἰς τοὺς σπουδάζοντας τὴν ἐπιστήμην ταύτην Ἕλληνας τὴν τιμὴν τῆς δημιουργίας νέων λέξεων προσφυῶν, ἐπειδὴ εἰς ἐμὲ τοῦτο ἦτο δύσκολον.


Ἐπικαλούμενος δὲ τὴν συγγνώμην ὑμῶν διὰ τὰς ἐν τῷ συγγράμματι ἀνεξαστήτους τῆς βουλήσειός μου ἐλλείψεις καὶ τὰ πολλὰ τυπογραφικὰ παρροράματα, εὐχαρίστως θέλω δεχθῆ τὰς παρατηρήσεις, ὅσας ἠθέλατε εὐαρεστηθῆ νὰ κάμῃτε ὅσον ἐπὶ τοῦ πραγματικοῦ καθὼς καὶ ἐπὶ τοῦ ὑλικοῦ.

Ἐρῶσθε.

Ἀθήνησι τῇ 20 Μαΐου 1842.

(Ξ. Λάρδερερ).





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΝ ΧΗΜΕΙΑΝ.

Τὰ ὀργανικὰ σώματα διαφέρουν τῶν ἀνοργάνων, καθότι ἐκεῖνα μὲν ἔχουν ἐπαισθητὴν τινα ἀρχήν, ἀναπτύσσονται, αὐξάνουν, φθείρονται καὶ ἀποθνήσκουν, ἐνῶ τὰ ἀνόργανα ὑπῆρξαν πρότερον ἡμῶν, ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχωσιν εἰς ὁποιοδήποτε προσβολὴν καὶ ἂν ὑπεβλήθησαν καὶ τέλος ἡ οὐσία των δὲν δύναται νὰ φθαρῇ ὅλως διόλου· ὁμοίως τὰ ἀνόργανα στοιχεῖα τῶν ὀργανικῶν σωμάτων δὲν δύνανται νὰ φθαρῶσιν ὀλοτελῶς, ἂν καὶ ἡ οὐσία αὐτῶν διὰ παντὸς φθείρεται. Τὸ δὲ ὀργανικὸν σῶμα ἀποθνήσκον μεταδίδει τὰ στοιχεῖά του εἰς τὴν ἀνόργανον φύσιν χωρὶς νὰ ἀναγεννᾶται.

Εἰς ὅλα τὰ ὀργανικὰ σώματα ὑπάρχει ἰδιαιτέρα τις δύναμις, ἥτις ὀνομάζεται *ζωϊκὴ δύναμις*· διὰ τῆς συνδρομῆς ταύτης προάγονται καὶ αὐξάνουν τὰ ὀργανικὰ σώματα, καὶ διατηροῦνται ἐνὸς εὐρίσκεται ἐντὸς αὐτῶν.

Μεταξὺ τῶσων ἀνοργάνων σωμάτων ὀλίγα μόνον ἔχουσι τὸ ἰδίωμα τῆς ἐξομοιώσεως, τουτέστι δύνανται νὰ χρησιμεύωσιν ὡς ὕλη τῆς ζωϊκῆς δυνάμεως· τοιαῦτα ἰδίως εἶναι ὁ ἄνθραξ, τὸ ὕδρογόνον καὶ τὸ ὀξυγόνον, εἰς δὲ τὰ σώματα τῶν ζώων καὶ τὸ νιτρογόνον. Ἐκτὸς ὅμως τούτων εὐρίσκονται εἰς τὰ ὀργανικὰ σώματα καὶ ἔχνη θείου, φωσφόρου, χλωρίου, μαγνησίας, τιτάνου, καλίου, νάτρου, σιδήρου, μαγγανησίου, χαλκοῦ καὶ νικελίου. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα ἐπιμένουν εἰς μικρὰν ἢ μεγάλαν ποσότητα, ὅταν τὰ ὀργανικὰ σώματα καῶσιν· τὸ μετὰ τὴν καῦσιν τῶν ὀργανικῶν σωμάτων ἐπιμένον λέγεται τέφρα.

Ἐὰν τὰ τέσσαρα προϋρρήθέντα στοιχεῖα ἀπὸ περιστάσεις τινὰς ἐνωθῶσιν, τὰ ὑπὲρ αὐτῶν προαχθέντα καλοῦνται τετραπλαῖ ἐνώσεις, τὰ δὲ σχηματισθέντα ἐκ τῆς ἐνώσεως τριῶν ἢ δύο ὀνομάζονται τριπλαῖ καὶ διπλαῖ ἐνώσεις. Τὸ ὀξυλικὸν ὀξὺ π.χ. ὡς συγκείμενον ἐξ ὀξυγόνου καὶ ἄνθρακος, τὸ ἑλκιν τῶν ῥόδων, τῶν κίτρων, ὡς συγκείμενον ἐξ ἄνθρακος καὶ ὕδρογόνου

κ. τ. λ. ὀνομάζονται διπλαῖ ἐνώσεις· τὸ δὲ οἰνόπνευμα συγκείμενον ἐξ ἄνθρακος, ὑδρογόνου καὶ ὀξυγόνου καλεῖται τριπλῇ ἔνωσης.

Ὅλα τὰ ὀργανικὰ σώματα συνίστανται ἀπὸ τρία στοιχεῖα, καὶ δὲν διαφέρουν μεταξὺ τῶν, εἰμὴ κατὰ τὸ διάφορον ποσὸν τῶν αὐτῶν στοιχείων. Οὕτω διὰ τῆς ἐνώσεως 6 ἂτ. ὑδρογόνου, 44 ἄνθρακος καὶ 49 ὀξυγόνου προάγεται ζάχαρις. Ἐκ τῆς ἐνώσεως 6 ὑδρογόνου, 41 ἄνθρακος καὶ 51 ὀξυγόνου σχηματίζεται κόμμι. Ἐκ 4 ἂτ. ἄνθρακος, 2 ὑδρογόνου καὶ 4 ὀξυγόνου νιτρικὸν ὀξύ. Ἐκ 4 ἂτ. ἄνθρακος, 4 ὑδρογόνου καὶ 4 ὀξυγόνου μηλικὸν ὀξύ· ἐκ 2 ἂτ. ἄνθρακος, 2 ὑδρογόνου καὶ 3 ὀξυγόνου τὸ μυρμηκικὸν ὀξύ.

Τὰ ὀργανικὰ σώματα δύνανται νὰ μεταβληθοῦν εἰς ἄλλα πάλιν ὀργανικὰ· διὰ τὴν μεταβολὴν ὅμως ταύτην ἀπαιτοῦνται ἀνόργανά τινα σώματα, τὰ ὁποῖα ἀφαιροῦν ἢ καὶ προσθέτουν ποσότητά τινα ἀτόμων. Οὕτω π. χ. διὰ τῆς ζέσεως τοῦ φυτικῷ ἄνθρακος μὲ νιτρικὸν ὀξύ προάγεται ἡ τεχνητὴ σκυτοδεψικὴ ὕλη· διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ χλωρίου, βρωμίου, ἰώδους, τῶν ἀκράτων ὀξέων, μεταβάλλεται τὸ οἰνόπνευμα εἰς αἰθυλοξείδιον ἢ αἰθέρα· ἡ ἐπιρροὴ τοῦ χλωρίου ἐπὶ τοῦ αἰθερίου ἐλαίου τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων σχηματίζει τὸ βενζοϊκὸν καὶ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ· ζάχαρις διαλυθεῖσα μεταβάλλεται διὰ τοῦ χλωρίου εἰς ζαχαρικὸν καὶ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ· καὶ τὸ ἄμυλον ζεόμενον μετὰ θειικοῦ ὀξέος εἰς ζάχαριν.

Τὴν ἐναλλαγὴν ταύτην τῶν ὀργανικῶν σωμάτων πρέπει ν' ἀποδώσωμεν κατὰ μέγα μέρος ἐπὶ τῆς χημικῆς σχέσεως καὶ τῆς τάσεως, τὴν ὁποῖαν ἔχουν τὰ στοιχεῖα νὰ ἐνωθῶσιν κατ' ἄλλας ἀναλογίας, ἀφοῦ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀνοργάνων σωμάτων διεγερθῇ ἡ τάσις αὕτη.

Ἄλλη δύναμις, δι' ἧς τὰ στοιχεῖα τῶν ὀργανικῶν σωμάτων ἐνοῦνται πρὸς προαγωγὴν ἄλλων, εἶναι ἡ καλουμένη καταλυτικὴ δύναμις, τὸ δὲ δι' αὐτῆς ἀποτέλεσμα κατάλυσις. Συνίσταται δὲ ἡ δύναμις αὕτη εἰς τὸ ὅτι δύναται σῶμά τι νὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἀποσύνθεσιν ὀργανικοῦ σώματος ὅχι διὰ τῆς χημικῆς συγγενείας του, ἀλλὰ μόνον διὰ τῆς παρουσίας του. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην τὰ στοιχεῖα συνθέτου τινὸς σώματος συντίθενται εἰς τοιαύτην ἀναλογίαν, ὥστε νὰ προαχθῇ δι' αὐτῶν ἡλεκτροχημικὴ οὐδετέρωσις· τοιαύτην κατάλυσιν παρατηροῦμεν εἰς τὴν αὐτόματον ἀποσύνθεσιν τῶν φυτῶν καὶ ζῶων μετὰ τὴν παῦσιν τῆς ζωικῆς δυνάμεως, καθότι τότε τὸ ὀργανικὸν σῶμα μεταφέρεται κατ' ὀλίγον εἰς ἀνόργανον.

Τὰ ὀργανικὰ σώματα διαιροῦνται κυρίως εἰς δύο κλάσεις εἰς φυτὰ καὶ

ζῶα. Ἐνταῦθα θέλομεν πραγματευθῆ καὶ περὶ τῶν δύο κάμνοντες ἀρχὴν ἀπὸ τὰς φυτικὰς οὐσίας.

Ἡ βλάστησις χημικῶς θεωρουμένη.

ὑπὸ τὸ ὄνομα βλάστησις (Germinatio) ἐννοοῦμεν τὴν πράξιν ἐκείνην, δι' ἧς ὁ διυγραίνόμενος σπόρος ἀναπτύσσεται παρέχων εἰς τὸ νέον φυτὸν τὴν ὑπαρξίν· δὲν δύναται νὰ προαχθῇ νέον φυτὸν, εἰμὴ διὰ τῆς βλαστήσεως.

Ὁ σπόρος, ὡς καὶ τὸ ὄν, ἔχει μικράν τινα κηλίδα δυναμένην τρόπον τινὰ νὰ θεωρηθῇ ὡς κέντρον τῆς ζωϊκῆς δυνάμεως, ἐξ ἧς λαμβάνουσιν ἀρχὴν ἅπαντα τὰ φαινόμενα τῆς βλαστήσεως ἢ τῆς ζωῆς. Τὸ κέντρον τοῦτο καλεῖται Ὀμφαλός (umbilicus), ὅστις ἔχει δύο ἄκρα, ἐξ ὧν τὸ μὲν ἐπροςδιορίσθη πρὸς σχηματισμὸν τῆς ῥίζης (radicula), τὸ δὲ πρὸς σχηματισμὸν τοῦ καυλοῦ (plumula). Τὰ φαινόμενα ταῦτα εὐκόλως δύνανται νὰ παρατηρηθῶσιν εἰς τὰ μεγάλα φυτὰ καὶ εἰς τὰ ὄσπρια.

Πρὸς βλάστησιν τῶν φυτῶν ἀπαιτοῦνται.

α) Θερμότης $10^{\circ} - 30^{\circ}$ P. καὶ μεγαλητέρα μὲν θερμότης ἐμποδίζει τὴν ἀρχομένην αὐτῶν ζωὴν, καὶ διαφθείρει τὴν πρὸς τὸ βλαστάνειν τάσιν των. Εἰς θερμοκρασίαν δὲ κατωτέραν τοῦ πεπηγότος ὕδατος οὐδ' ἔχονος βλαστήσεως δύναται νὰ παρατηρηθῇ· ξηρὸς σπόρος καὶ πολὺν χρόνον ἐκτεθεὶς εἰς σημαντικὸν ψυχρὸς διατηρεῖ τὴν πρὸς τὸ βλαστάνειν δυνάμιν του καὶ βλαστάνει ἅμα ἐπιτύχῃ καταλλήλους περιστάσεις.

β) Ὑδωρ, τὸ ὁποῖον εἶναι πολὺ ἀναγκαῖον πρὸς βλάστησιν· διότι τοῦτο εἰσερχόμενον ἐντὸς τοῦ σπόρου μαλακῶνει τὸ ἐμπεριεχόμενον φυτικὸν λεύκιμα καὶ ἐξοιδαίνει τοὺς κοτυληδόνας. Μεγάλη ποσότης ὕδατος ἐμποδίζει τὴν βλάστησιν τῶν φυτῶν, καὶ ἔνεκ τούτου ἐν καιρῷ πλημύρας δὲν δύναται νὰ βλαστήσωσιν οἱ σπόροι· μόνον τὰ ὑδατώδη φυτὰ ἔχουσι τὸ ἰδίωμα νὰ βλαστάνωσιν ὑπὸ τὸ ὕδωρ. Ἄδηλον εἶναι εἰσέτι, ἂν διὰ τῆς βλαστήσεως ἀποσυντίθεται εἰς τὰ στοιχεῖά του τὸ ὕδωρ, ἢ ἂν μόνον συντείνῃ πρὸς μαλάκωσιν τῶν σπόρων.

γ) Ὁ αἰτμοσφαιρικὸς ἀήρ ἢ τὸ ὀξυγόρον, ἄνευ τῆς ἐπιδόξης τοῦ ὁποίου βλάστησις δὲν δύναται νὰ γίνῃ· διὰ τοῦτο σπόρος βραχεὶς μὲ ὕδωρ καὶ ἔχων τὴν ἀπαιτουμένην θερμοκρασίαν, οὐδόλως βλαστάνει ἐκτεθεὶς εἰς ἀερόκενον τόπον, ἢ εἰς ἀεροειδὲς ὑδρογόνον, νιτρογόνον, ἀνθρακικὸν ὀξὺ ἢ εἰς ἄλλο ἀέριον μὴ μεμιγμένον μὲ ὀξυγόρον. Σπόροι εὐρισκόμενοι εἰς ἀρκετὸν βάθος ἢ εἰς πολλὰ σκληρὸν καὶ στερεὸν χῶμα δὲν δύναται νὰ

ελαστήσωσιν, ἐπειδὴ οὕτως ἐμποδίζεται ἡ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπιρροή.

Εἰς ὕδωρ, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει πολὺν ἀτμοσφαιρικὸν αἶρα, ἢ εἰς τὸ ὁποῖον ἐδιαλύθη ὀλίγον χλώριον, ἐπιταχύνεται ἡ βλάστησις. Ἐὰν οἱ σπόροι ἐκτεθῶσιν εἰς τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, δὲν βλαστάνωσιν τόσον εὐκόλα, καθὼς ἐὰν φυλαχθῶσιν εἰς σῦσκιον τόπον.

Τὸ ἔδαφος καθ' ἑαυτὸ δὲν ἔχει ἐπὶ τῆς βλαστήσεως ἐπιρροήν, ἀλλ' ἐκτελεῖται ἡ βλάστησις ἀδιαφόρως ἐπὶ ὑγροῦ σπόγγου, ἐπὶ λειοτετριμμένου θείου, κ. τ. λ. καθὼς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, φθάνει μόνον νὰ ὑπάρχῃ τὸ ἀναγκαῖον ὕδωρ, θερμότης καὶ ὀξυγόνον. Ἄν καὶ τὰ πλεόστερα ὀρυκτὰ, ὅσα δηλαδὴ ἔχουν δηλητηριώδη ἐνέργειαν ἐπὶ τῶν ζώων, ἐμποδίζουν τὴν βλάστησιν, ὑπάρχουν ὅμως καὶ τινες ἐξαιρέσεις· πασίδηλον π. χ. εἶναι, ὅτι δὲν βλαστάνωσιν οἱ σπόροι διόλου εἰς τὴν ἀνθρακικὴν βαρεῖαν, τὸν ἀρσενώδη μόλυβδον, τὸν ἀνθρακικὸν χαλκόν, τὸ πράσινον ὀξειδίου τοῦ χρωμίου, ἐνῶ εἰς τὸν ὀξειδωμένον ὑδράργυρον καὶ τὸ αὐτοσύστατον ἐνθεῖον στίμμι προάγεται ἡ βλάστησις. Μὲ ἐπιτυχίαν βλαστάνουν οἱ σπόροι εἰς τὸ κιννάβαρι, τὸν λιθάργυρον, τὸ ἄμμιον, τὸν φωσφορικὸν μόλυβδον καὶ τὸν ἀλικὸν ὑδράργυρον ἥπιον.

Ἐνῶ ὁ βεβρεγμένος σπόρος ἀρχεται νὰ βλαστάνῃ δύνανται νὰ παρατηρηθῶσι τὰ ἐξῆς φαινόμενα. Ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας ἀπορροφᾶται ὀξυγόνον, ἀντ' αὐτοῦ δὲ σχηματίζεται, καθὼς καὶ εἰς τὴν ἐκπνοήν, ἵσος ὄγκος ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐνοῦται τὸ ὀξυγόνον τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος μετὰ τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης τοῦ λευκώματος καὶ διὰ τῆς μεταβολῆς ταύτης σχηματίζεται ζαχαρώδης ὕλη χρησιμεύουσα μέχρι τινὸς πρὸς τροφήν τοῦ νέου φυτοῦ. Ὅτι διὰ τῆς βλαστήσεως τῆς κριθῆς σχηματίζεται ζάχαρις, τοῦτο ἀποδεικνύεται διὰ τῆς κατασκευῆς τῆς βύνης (Maltum Hordei).

Τροφή καὶ αὔξεις τῶν φυτῶν.

Εἰς τὰ ζῶα ἡ ζωϊκὴ δύναμις ἔχει τὴν ἑδραν τῆς εἰς τὴν καρδίαν καὶ εἰς τὸν ἐγκέφαλον, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων τῶν ὀργάνων ἐξαρτᾶται ἡ ζωὴ ἐκάστου μέρους τῶν ζώων· διὰ τοῦτο ὄργανον ἀποχωρισθὲν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ ἀπὸ τὴν καρδίαν στερεῖται ζωῆς. Τοιοῦτον ὅμως κεντρικὸν ὄργανον δὲν εὐρίσκεται εἰς τὰ φυτὰ, ἀλλ' ἕκαστον ὄργανον καὶ μέρος τοῦ φυτοῦ εἶναι ἐφοδιασμένον μετὰ τῶν ἀναγκαίων πρὸς διατή-

ρησιν τῆς ζωῆς· ἡ ρίζα ἐκφύει νέον κλόνον, καὶ ὁ ἀποτμηθεὶς κλόνος δύναται νὰ ριζώσῃ καὶ σχηματίσῃ νέον ὅμοιον φυτόν.

Ἐὰν μετὰ τὴν βλάστησιν τοῦ σπόρου οἱ κοτηλυδόνες ξηρανθῶσι καὶ πέσωσι, δὲν δύναται πλέον νὰ διανεμηθῇ τροφή εἰς τὰ φυτὰ διὰ τῶν ὀργάνων τούτων. Ἡ ρίζα ἐκτεννομένη σχηματίζει ριζάρια, ὁ μικρὸς κορμὸς ὑψοῦται καὶ ἄρχεται νὰ καλύπτεται μετὰ φύλλων. Ἀλλὰ διὰ τὴν αὐξησιν ταύτην τὸ νέον φυτόν ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ ἄλλην τροφήν, τὴν ὁποίαν δὲν δύναται νὰ λάβῃ, εἰμὴ ἐκ τοῦ ἀέρος, ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ἐκ τῆς γῆς. Καὶ ἐπειδὴ ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ συνίσταται, καθὼς γνωρίζομεν, ἀπὸ ὀξυγόνου, νιτρογόνου καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξυῦ, θέλομεν πρῶτον ἐκθέσει ὁποῖαν ἐπιρροὴν ἔχουν τὰ τρία ταῦτα ἐπὶ τῆς βλαστήσεως.

Ἐπιρροὴ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος.

Ἄπαντα τὰ πράσινα χρώμα ἔχοντα ὄργανα τῶν φυτῶν ἀποσυνθέτουσι τὸ ἀνθρακικὸν ὀξυῦ, ἀλλὰ μόνον ἐὰν ἐκτεθῶσιν εἰς τὴν ἄμεσον ἐπιρροὴν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων, ἢ τοῦλάχιστον ἐὰν προσβληθῶσι παρὰ τοῦ φωτός τῆς ἡμέρας· τότε ἡ πρασίνη χρωματιστικὴ ὕλη τῶν φυτῶν (τὸ χλωρόφυλλον) ἐνοῦται μετὰ τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος, τὸ ὁποῖον ἐνυπάρχει εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, καὶ οὕτως ἐκτυλίσσεται τὸ ὀξυγόνον τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς ἀεροειδῆ κατὰστασιν.

Ἐπιρροὴ τοῦ ὀξυγόνου.

Ἐὰν φύλλα νεαρὰ τεθῶσιν τὸ ἔαρ ὑπὸ κώδωνα πλήρη ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἀπορρόφῶσι μέρος ὀξυγόνου, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ μέρος μεταβάλλουν εἰς ἀνθρακικὸν ὀξυῦ. Ὁ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος σχηματισμὸς συμβαίνει πρὸ πάντων τὴν νύκτα καὶ γενικῶς εἰς τὸ σκότος· διὰ τοῦτο ἐπιταχύνεται ἡ βλάστησις εἰς τὰς μακρὰς νύκτας. Τὸ ἀνθρακικὸν ὀξυῦ τὸ σχηματιζόμενον εἰς τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς, ἀποσυντίθεται τὴν ἡμέραν, καὶ τοιοῦτοτρόπως τὸ φυτόν δύναται νὰ ζήσῃ κάμποσον καιρὸν. Ἐὰν δὲ ὑπὸ τὸν κώδωνα τεθῇ τιτάνιον ὕδωρ, ἐπειδὴ ἀπορροφᾶται τότε τὸ ἀνθρακικὸν ὀξυῦ, φθείρεται ταχέως τὸ φυτόν.

Τὰ πολύοπα φύλλα ἀπορρόφῶσιν ὀξυγόνον χωρὶς νὰ σχηματίζωσιν αὐτ' αὐτοῦ ἀνθρακικὸν ὀξυῦ, καὶ ἂν μετὰ ταῦτα ἐκτεθῶσιν εἰς τὴν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ἐπιρροὴν, ἐκτυλίσσεται ὅλον τὸ ὀξυγόνον τὸ ὑπ' αὐτῶν ἀπορροφηθέν.

Τὰ ἴδια φύλλα, ἐὰν ἔχωσιν ἀρκετὴν ζωϊκὴν δύναμιν, δύνανται νὰ χρησιμεύσωσι πολλάκις διὰ τὰς δοκιμὰς ταύτας· ἐὰν δηλαδή ἀφελῶσι πολλάς ἡμέρας ὑπὸ κώδωνα, ὀλιγοστεύουσι μὲν τὸν ἐν αὐτῷ ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα τὴν νύκτα, αὐξάνουσι δὲ αὐτὸν κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν περίπου εἰς τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας· τοῦτο τὸ φαινόμενον λέγεται εἰσπνοὴ (inspiratio) καὶ ἐκπνοὴ (expiratio) τῶν φυτῶν.

Τὰ ζῶντα καὶ πράσινα ὁπωρικὰ ἀποσυνθέτουσι τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ καθὼς καὶ τὰ πράσινα φύλλα. Τὸ ἀπορροφᾶν καὶ ἐκτυλίσσειν τὸ ὀξυγόνον καθὼς καὶ τὸ ἀποσυνθέτειν τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ ἀνήκει μόνον εἰς τὰ πράσινα ὅργανα τῶν φυτῶν· ἡ δὲ ῥίζα, τὸ ξύλον καὶ τὰ ἄνθη δὲν ἔχουσι τὸ ἰδίωμα τοῦτο· ἐὰν ὅμως ταῦτα τὰ τελευταῖα συναφθῶσι μετὰ τοῦ ὀξυγόνου ἀποδίδουσιν εἰς αὐτὸ μέρος ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ οὕτω σχηματίζεται ἀνθρακικὸν ὀξύ διαλυόμενον ἐν μέρει εἰς τοὺς χυλοὺς των. Ἡ σύναψις τοῦ ὀξυγόνου μετὰ τῶν ῥιζῶν τῶν ζώντων φυτῶν ἔχει μεγάλην ἐπιρροὴν ἐπὶ τῆς βλαστήσεως.

Ἐπιρροὴ τοῦ Νιτρογόνου.

Τὸ Νιτρογόνον εἴτε καθαρὸν εἴτε καὶ μὲ ἄλλα ἀέρικα μεμιγμένον δὲν συντείνει εἰς τὴν ὑπαρξίν των φυτῶν, ἀλλ' ὑδατώδη μόνον φυτὰ τινα ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων δύνανται νὰ ζήσωσιν εἰς τὸ νιτρογόνον, καὶ τότε σχηματίζεται μέγα ποσὸν ἀνθρακικοῦ ὀξέος, τὸ ὅποιον ἀλληλοδιαδόχως συντίθεται καὶ ἀποσυντίθεται· τοιαῦτα φυτὰ εἶναι *Lythrum salicaria*, *Inula disenterica*, *Epilobium molle*.

Ἐπιρροὴ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

Ἐκ τῶν εἰρημένων καταλαμβάνομεν, ὅτι ἡ ἐπιρροὴ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπὶ τῆς βλαστήσεως τῶν φυτῶν πρέπει νὰ ἦναι σημαντικωτάτη. Τὰ φυτὰ εὐρίσκουσιν εἰς τὸν ἀέρα τὸ διὰ τὴν ὑπαρξίν των ἀπαιτούμενον ὀξυγόνον, τὸ ὅποιον ἀπορροφᾶσι μὲν τὴν νύκτα, ἐκτυλίσσουσι δὲ πάλιν εἰς τὸν ἥλιον ἐκτεθέντα. Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ διέρχεται μέχρι τῆς ῥίζης τῶν φυτῶν καὶ συναπτόμενος μετ' αὐτῆς ἐπιταχύνει τὴν αὕξησίν των.

Τὰ φυτὰ ἀποσυνθέτουσι τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ τῆς ἀτμοσφαίρας, ἀπορροφῶσι τὴν ἀνθρακικὴν ὕλην καὶ ἐκτυλίσσουσι μέρος ὀξυγόνου. Ἡ ἀποσύνθεσις αὕτη, διὰ τῆς ὁποίας τὰ φυτὰ λαμβάνουσι τὴν ἀναγκαίαν τροφήν, ἀναπληροῖ συγχρόνως καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν ζώων ἀναλίσκόμενον

ὀξυγόνον, ἐκτὸς τούτου τὰ φυτὰ λαμβάνουσι διὰ τῶν φύλλων τῶν τὴν ὑγρασίαν τῆς ἀτμοσφαίρας.

Ἐπιρροή τοῦ ὕδατος ἐπὶ τῶν φυτῶν.

Εἶναι γνωστὸν καὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, ὅτι τὸ ὕδωρ εἶναι ἀναγκαιὸν εἰς τὴν βλάστησιν τόσοι διὰ τὴν διαλυτικότητά του, καθὼς καὶ διὰ τὰ στοιχεῖά του· ἐὰν φυτὰ βλαστήσουν καὶ αὐξάνουν διὰ τῆς συνδρομῆς καθαροῦ ὕδατος εἰς ἀτμοσφαιρικὴν ἀέρα μὴ ἐμπεριέχοντα ἀνθρακικὸν ὀξύ, δὲν μεταβάλλουσι τὸν ἀέρα μῆτε ὡς πρὸς τὴν καθαριότητα, μῆτε ὡς πρὸς τὸν ὄγκον· μετὰ τινι δὲ καιρὸν ἐμπεριέχουσι πλεοντέρας ὀργανικὰς ὕλας παρὰ τὰς ὁποίας εἶχον προτῆτερά· ἀποτέλεσμα, τὸ ὅποιον πρέπει ν' ἀποδοθῇ εἰς τὴν ἀπορρόφησιν τῶν στοιχείων τοῦ ὕδατος.

Ἰδιαιτέραν ἐνέργειαν ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔχει τὸ θερμὸν ὕδωρ δι' αὐτοῦ δύνανται νὰ ζωογονηθῶσι φυτὰ, τὰ ὁποῖα ἤδη ἐμαράνθησαν. Εἰάν, θέσωμεν π.χ. εἰς θερμὸν ὕδωρ ἥδη μαραμμένα φυτὰ, παρατηροῦμεν, ὅτι μετ' ὀλίγον ἀνοίγουν τὰ ἄνθη, τὰ φύλλα ἐξαπλώνονται, ἀναλαμβάνουν ζωερὸν πράσινον χρῶμα καὶ δύνανται νὰ διατηρηθῶσιν εἰς χλωρὰν κατάστασιν· τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν ἔχει καὶ τὸ θερμὸν ἀπεσταγμένον ὕδωρ, ζωογονεῖ τὰ μαρανθέντα φυτὰ μετ' ἀρκετῆς ταχύτητος.

Παραλείποντες τὰς λεπτομερεῖς ἐξηγήσεις ἐπὶ τοῦ φαινομένου τούτου, παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ κατ' ὀλίγον ἀποψυχαινόμενον ὕδωρ ἐμβαίνει εἰς τοὺς πόρους τοῦ φυτοῦ, ὑψοῦται διὰ τῶν τριχοειδῶν σωλήνων καὶ οὕτω δύνανται ν' ἀναλάβωσι τὰ ἄνθη καθὼς καὶ τὰ φύλλα τὴν πρώτην τῶν ζωηρότητα ὕστερον ἀπὸ ὀλίγας ἡμέρας.

Ὅτι ἡ θερμότης καὶ ἡ δι' αὐτῆς προξενηθεῖσα ἔκτασις τῶν τοῦ φυτοῦ ἀγγείων ἐπιφέρει ἐνεργητικὴν τινα δύναμιν, τοῦτο δυνάμεθα νὰ τὸ παρατηρήσωμεν ἂν καύσωμεν τὸ ἄκρον τοῦ μίσχου ἀνθίζοντός τινος φυτοῦ καὶ θέσωμεν αὐτὸν εἰς ψυχρὸν ὕδωρ· ἀναφέρεται προσέτι ὅτι οἱ ἀποικοι τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς καλῆς Ἑλπίδος, ἐνῶ πολὺν καιρὸν κατεγίνοντο εἰς τὴν φύττεισιν τῆς ἀμπέλου, δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἐπιτύχωσι Γερμανὸς δέ τις ἀνθρακώσας τὰ ἄκρα τοῦ μίσχου ἐπέτυχε μὲ θαυμασμὸν ὄλων. Περὶεργον εἶναι καὶ ἡ ἐπὶ πολὺ διατήρησις τῶν σταφυλῶν, ἐὰν ἡ ἄκρα τοῦ μίσχου ἀνθρακωθῇ.

Ἐπιρροή τῆς κόπρου.

Ἡ κόπρος συντείνει πρὸς αὐξήσιν τῶν φυτῶν ὅχι μόνον διὰ τὸ ἀνθρα-

κιόν οξύ, τὸ ὁποῖον ἐξ αὐτῆς ἐκτυλίσσεται, ἀλλὰ καὶ διότι παρουσιάζει εἰς αὐτὰ χυλοὺς καταλλήλους καὶ οἵτινες ἄλλως δὲν ἐδύναντο νὰ εἰσέλθωσιν εἰς γῆν στερημένην κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον τροφίμων ὑλῶν. Παρατηρητέον ὅμως, ὅτι τὰ φυτὰ λαμβάνουσι τὸ πλεῖστον μέρος τῶν στοιχείων τῶν ὄχι ἐκ τῆς κόπρου, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος τῆς ἀτμοσφαιρας. Τα ἐν τῇ γῇ σεσηπότεν λείψανα τῶν φυτῶν σχηματίζουνε κόπρον, ἥτις χρησιμεύει πρὸς τροφὴν αὐτῶν.

Ἐπιρροή τῆς γῆς ἐπὶ τῶν φυτῶν.

Ἡ ἐπὶ τῶν φυτῶν ἐπιρροή τῆς γῆς δὲν συνίσταται μόνον εἰς τὸ ὕδωρ, τὴν θερμότητα καὶ τὴν κόπρον, ἅτινα εἰς αὐτὴν ἐμπεριέχονται, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἐν αὐτῇ ἄλατα καὶ λοιπὰς ὀργανικὰς οὐσίας· τὰ διάφορα ἄλατα ἀπορρόφῶνται ὑπὸ τῶν φυτῶν καὶ ὑποῦνται ἐν αὐτοῖς· φυτὰ τινα ἀπαιτοῦσι πρὸς αὐξησίαν τῶν ἄλατα ἰδιαίτερας φύσεως καὶ εἰς διάφορον ποσότητα· οὕτω τὰ θαλάσσια φυτὰ φύουσι πολλὰ ἀσθενῶς εἰς γῆν, ἥτις περιέχει ὀλίγον ἄλας, ἐνῶ ἐξ ἐναντίας τὸ ποσὸν τοῦ ἁλτος, δι' οὗ τὰ θαλάσσια φυτὰ αὐξάνουσι καλῶς, εἶναι ἐπιβλαβὲς εἰς τοὺς δημητριακοὺς καρπούς· οὕτω *Parietaria* καὶ *Boragineae* ἐπιτυχαίνουσι εἰς γῆν ἐμπεριέχουσαν νιτρικὴν τίτανον καὶ νιτρικὴν πότασσαν· ὁ γύψος εἶναι πολλὰ κατάλληλος εἰς τὴν αὐξήσιν τριφύλλων φυτῶν, καθὼς τῆς μηδικῆς, ἐπὶ ἄλλων δὲ φυτῶν δὲν δεικνύει κάμμίαν ἐνέργειαν.

Τὰ φυτὰ ἀπορρόφῶσι καὶ τινὰς εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιαλύτους ὕλας καθὼς τὸ θεῖον, γαίης τινὰς καὶ μεταλλοξείδια. Ἐπειδὴ τὰ φυτὰ ἀπορρόφῶσιν ἄλατα ἐμπεριέχοντα πότασσαν ἡνωμένην μετὰ τοῦ ὀξαλικοῦ, ὀξικοῦ, καὶ νιτρικοῦ ὀξέος, διὰ τοῦτο ἢ μετὰ τὴν καύσιν εἰς τὴν τέφραν ὑπάρχουσα πότασσα ἀποδίδεται εἰς τὴν διαφθοράν ἐκείνων τῶν ἀλάτων. Ὀργανικὰ τινα δηλητήρια ἐνεργοῦσιν ὡς τοιαῦτα καὶ ἐπὶ τῆς βλαστήσεως τῶν φυτῶν, ὡς τὸ ὑδροκυανικόν, τὸ ἐνθειον ὑδροκυανικόν οξύ, ἡ στρυχνίνη καὶ τὸ οἰνόπνευμα. Βλάπτει ὡσαύτως τὴν φυτείαν τὸ θειῶδες οξύ καὶ εἰς σμικροτάτην ποσότητα $\frac{1}{1000}$ π. χ. ἡνωμένον μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Τὸ ἀερῶδες ὑδροχλωρικόν οξύ ὡς καὶ τὸ κυάνιον ἀέριον εἶναι δηλητηριώδη εἰς τὰ φυτὰ.

*Περὶ τῆς ἐπιρροῆς διαφόρων σωμάτων ἐπὶ τῶν φυτικῶν ὑλῶν
γενικῶς θεωρουμένων.*

Ἐπιρροή τῆς θερμότητος

Μεταξὺ τῶν φυτικῶν οὐσιῶν εὐρίσκονται καὶ τινες πτητικαί, αἵτινες

δύνανται νὰ θράσωσιν διὰ μετρίας θερμότητος, καθὼς τὸ οἰνόπνευμα, τὰ πτητικὰ ἔλαια, οἱ αἰθέρες· ἄλλαι δὲ ἐξατμίζονται καὶ ἐξαχνίζονται ἐντελῶς, καθὼς τὸ κηκιδιόν, τὸ βενζοϊκόν ὀξύ, ἡ καφουρά κ. τ. λ. Ἐὰν τὰ σώματα ταῦτα τεθῶσιν ἐπὶ σιδηροῦ καὶ πεπυρωμένου ἐλάσματος, ἀποσυντίθενται, ἐπιμένοντος μόνον τοῦ ἀνθρακος· ἐὰν δὲ θερμανθῶσι διὰ μετρίου πυρὸς εἰς ἀποστατικὸν σκεῦος, σχηματίζεται ἐξ αὐτῶν ἀνθρακικόν ὀξύ, ὀξειδίου τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης, ὑδρογόνον ἀνθρακοῦχον ἀέριον, ὕδωρ, ὀξικόν ὀξύ καὶ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον.

Κάνεν ὀργανικὸν σῶμα ἐν γένει δὲν ἀντέχει εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῆς θερμότητος. Ἐὰν τὰ ὀργανικὰ σώματα ἐμπεριέχουσιν ἐκτὸς τῶν συνήθων ὑλῶν καὶ νιτρογόνον, σχηματίζεται καὶ ὑδροκυανικόν ὀξύ καὶ ἀμμωνία.

Ἐπιρροὴ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

Τὰ πλείοτερα φυτικὰ καὶ ξηρὰ σώματα δύνανται εἰς θερμοκρασίαν τινα ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τῆς ἀτμοσφαίρας ν' ἀναφλεχθῶσι. Τὰ πλέον εὐανάφλεκτα ἐξ αὐτῶν εἶναι τὰ πτητικὰ ἔλαια, καθὼς αἱ ῥητῖναι, αἵτινες ἐμπεριέχουσι μέγα ὑδρογόνου μέρος· καιομένων τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἐνοῦται τὸ ὀξυγόνον τῆς ἀτμοσφαίρας μετὰ τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ μετὰ τοῦ ὑδρογόνου καὶ σχηματίζεται ἀνθρακικόν ὀξύ καὶ ὕδωρ. Ἐὰν τὸ ξύλον ἐδύνατο νὰ μένῃ πάντοτε εἰς πεπυρωμένην κατάστασιν, δὲν ἔθελε σχηματισθῇ ἄλλο, εἰμὴ ἀνθρακικόν ὀξύ καὶ ὕδωρ· ἐπεὶ δὲ ὅμως τοῦτο δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ, ἡ καυσίς ἐκτελεῖται ἀτελῶς, καὶ διὰ τοῦτο ἀποτίθεται εἰς τοὺς σίφωνας κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον αἰθάλη καὶ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον.

Ἐπιρροὴ τῶν ἀνοργάνων ἐπὶ τῶν φυτικῶν ὑλῶν.

Τόσον τὸ θείον καθὼς καὶ ὁ φώσφορος ἔχουσι τὸ ἰδίωμα ν' ἀποσυνθέτωσιν ὕλας τινὰς φυτικὰς, συναπτόμενα μετ' αὐτῶν. Ἐὰν τμημα φωσφόρου τεθῇ εἰς φιάλην πλήρη ζαχαρώους καὶ φυλαχθῇ εἰς σκοτεινὸν μέρος, μετὰ τινος μῆνης μεταβάλλεται ἡ ζάχαρις εἰς ὑγραινομένην καὶ ἀνθρακώδη μάζαν, ἥτις ἐκτὸς τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης ἐμπεριέχει καὶ μέρος φωσφορικοῦ ὀξέος· τὰ αὐτὰ παρατηροῦνται, ἐὰν ὁ φώσφορος περιβληθῇ μὲ λειοτετριμμένον ξύλον ἢ μὲ σπέρμα λυκοποδίου καὶ φυλαχθῇ εἰς μικρὰς ὕλους.

Τὸ ἰώδες εἰς συνήθῃ θερμοκρασίᾳ ἀποσυνθέτει πολλὰς ὀργανικὰς οὐσίας

ενούμενον μόνον μετ' αὐτῶν· ἐὰν ἐνωθῇ με' ὑδρογόνον μεταβάλλεται εἰς ὑδριωδικὸν ὀξύ.

Ἄπασαι σχεδὸν αἱ ὀργανικαὶ ὕλαι, ἐξαιρουμένων μόνον ὀξέων τινῶν, φθείρονται παρὰ τοῦ χλωρίου, τὸ ὁποῖον παρομοίως ἐνούμενον μετὰ τοῦ ὑδρογόνου μεταβάλλεται εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ. Εἰς τοῦτο στηρίζεται καὶ ἡ διακθορὰ τῶν ὀργανικῶν μiasμάτων καθὼς καὶ ἡ διὰ τοῦ χλωρίου λεύκανσις.

Τὸ ποτάσιον καὶ σόδιον ἀποσυνθέτουσι πολλὰς ὀργανικὰς ὕλας, ἐνούμενα δὲ μετὰ τοῦ ὀξυγόνου τῶν ἀποχωρίζουσι μέρος τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης, καὶ ἡ ἀποσύνθεσις αὕτη συμβαίνει πολλάκις με' ἐκλυσιν φωτός.

Ἐνέργεια τῶν ὀξέων.

Ἀκρατὰ τινὰ ὀξέα ἐκ τῶν ὀρυκτῶν ἐνοῦνται μετὰ διαφόρων ὀργανικῶν ὑλῶν καὶ προξενοῦσι ἀποσύνθεσιν τινὰ, ἥτις ἀποτελεῖται ἐνεκα τῆς πρὸς τὸ ὕδωρ μεγάλης σχέσεώς των· τὸ ὕδωρ τοῦτο σχηματίζεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῶν στοιχείων του, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχονται εἰς ὕλη τὰ ὀργανικὰ σώματα.

Τὸ θειικὸν ὀξύ ἀποσυνθῆται τὰ ὀργανικὰ σώματα διὰ τὴν πρὸς τὸ ὕδωρ μεγάλην σχέσιν του· ἄλλοτε ἀποσυντίθεται τὸ ὀξύ, καὶ ἐξ αὐτοῦ σχηματίζεται ὑποθειώδες ὀξύ· οὕτως ἐὰν ξύλον λειοτετριμμένον ἢ ὕψασμα ἐνωθῶσι κατὰ μικρὸν με' θειικὸν ὀξύ μετὰ ὕδατος κεκαρμένον, μεταβάλλεται εἰς συνήθη θερμοκρασίαν εἰς κόμμι· ἐὰν δὲ θερμανθῇ τὸ εἰρημένον φύραμα, ἀνθρακοῦται τὸ ξύλον, καὶ τὸ θειικὸν ὀξύ μεταβάλλεται εἰς θειώδες καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ· ἐὰν τέλος τὸ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ὀξέος ἀποτελούμενον κόμμι ἀναζέεται, μεταβάλλεται καὶ εἰς ζάχαριν, περὶ τῆς ὁποίας ἐπομένως θέλομεν διαλέγει.

Τὸ νιτρικὸν ὀξύ ἀποσυνθῆται τὰς πλείους ὀργανικὰς οὐσίας· ὑπὸ τῆς θερμότητος ἀποσυντίθεται καὶ αὐτὸ, καὶ τὸ μὲν ὀξυγόνον του ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὑδρογόνου καὶ τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης πρὸς ὕδωρ καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἡ δὲ ὀργανικὴ ὕλη μεταβάλλεται συγχρόνως εἰς μηλικὸν, ὀξικὸν καὶ ὀξαλικὸν ὀξύ, ἐὰν ἀφαιρεθῇ ὅλον τὸ ποσὸν τοῦ ὑδρογόνου. Διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος σχηματίζεται νιτρογόνον καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὀξειδιον τοῦ νιτρογόνου. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν σχηματίζονται ἐνίοτε καὶ ἔχνη ὑδροκινικοῦ ὀξέος, τὸ δὲ ὀξαλικὸν ὀξύ ἐνούμενον μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ.

Ἐπιρροή τῶν ἀλκαλίων.

Αἱ βάσεις, καθὼς εἶδομεν, ἐνοῦνται μὲ τὰς ὀξυνὰς φυτικὰς ὕλας, ἡ ἐπιρροή των ὅμως ἐπὶ τῶν οὐδετέρων ὀργανικῶν ὑλῶν μέχρι τοῦδε ὀλίγον μόνον γνωρίζεται. Ἀπὸ τὰς διαλύσεις τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων ἀποσυντίθενται καὶ φθείρονται κατὰ μέρος μέγα αἱ φυτικαὶ οὐσίαι· δὲν εἶναι πολὺς καιρὸς ἀφοῦ ἀνεκαλύφθη, ὅτι ὀργανικαὶ τινες ὕλαι μεταβάλλονται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀλκαλίων εἰς ὀξυλικὸν καὶ εὐρωτικὸν ὀξύ· ἐὰν αἱ ἀλκαλικάι βάσεις ἐνεργῶσιν ἐπὶ λιπαρῶν οὐσιῶν, σχηματίζεται ταυτοχρόνως ὀξύκον ὀξύ, διάφορα λιπώδη ὀξέα καὶ ὕλη ἔχουσα ἰδιαιτέραν γλυκύτητα.

Ἄπαντα τὰ ὀργανικὰ σώματα διαίρουνται εἰς δύο.

α) Εἰς ὀργανικὰ ὀξέα. καὶ

β) Εἰς ὀργανικὰ ὀξειδία.

Περὶ τῶν ὀργανικῶν ὀξέων.

Ἄπαντα τὰ σώματα τὰ συνιστάμενα ἐξ ἀνθρακικῆς ὕλης, ὑδρογόνου καὶ ὀξυγόνου, καὶ ἔχοντα ἰδίωμα νὰ ἐρυθρῶσι τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου, καὶ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον νὰ ἐξουδετερόνωσι τὰς βάσεις καλοῦνται ὀξέα· πολλὰ ἐξ αὐτῶν εὐρίσκονται ἤδη εἰς τὰ φυτὰ σχηματισμένα διὰ φυτικῆς δυνάμεως, ἕτερα δὲ κατασκευάζονται διὰ τῆς συνδρομῆς ἄλλων ὀξέων, καθὼς π. χ. τὸ καφουρικόν, τὸ στεατικόν καὶ τὸ ἐλαιϊκόν ὀξύ· ἄλλα τέλος σχηματίζονται διὰ τῆς θερμότητος, καθὼς τὸ πυροτρυγικόν ὀξύ.

Πολλὰ ὀργανικὰ ὀξέα ἀπαντῶμενα συχνάκις αὐτοσυστάτα καθὼς τὸ ὀξικόν ὀξύ, τὸ κιτρικόν ὀξύ, μηλικόν ὀξύ, πρέπει νὰ θεωρηθῶσιν ὡς δυνατὰ ὀξέα ἔχοντα πρὸς τούτοις μεγάλην ἐξουδετερώσεως ἐπιδεκτικότητα· ὀξέα τινὰ εὐρίσκονται εἰς καθαρὰν κατάστασιν εἰς τὰς ὀπώρας καὶ τὰ φύλλα, ἄλλα δὲ ἀπαντῶνται ἠνωμένα μετὰ τῶν βάσεων καὶ γαιῶν.

Τὰ ὀνόματα τῶν ὀξέων παράγονται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπὸ τὰς ὕλας ἐκ τῶν ὁποίων ἐξάγονται καθὼς π. χ. κιτρικόν ὀξύ ἐκ τῶν κίτρων, κηκιδικόν ὀξύ ἐκ τῶν κηκίδων, βενζοϊκόν ὀξύ ἐκ τῆς βενζόης.

Ἄπαντα τὰ ὀξέα εἶναι ἄχρσα καὶ εἰς τὴν ὅσον ἔνεστι λεῖψυδρον κατάστασιν των εἶναι στερεά· τὰ πλεονέτερα ὀξέα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, ἐξαίρουμένων τοῦ στεατίνου καὶ ἐλαιίνου ὀξέος.

Εἰς τοὺς ἀρχαιότερους χρόνους ἐνομιζέτο τὸ ὀξικόν ὀξύ ὡς τὸ μόνον εἰς

τὴν τῶν φυτῶν βασιλείαν· ὁ δὲ Scheele ἀνεκάλυψεν ἕτερα 6 ὀξέα, καὶ τὴν σήμερον γνωρίζονται περίπου τῶν 30 μετὰ τῶν χαρακτηριστικῶν των.

Μηδικὸν ἢ Κιτρικὸν ὀξύ.

(*Acidum citricum*)

Τοῦτο τὸ ὀξύ ἀνεκαλύφθη τῷ 1784 παρὰ τοῦ Scheele· ἀπαντᾷται εἰς καθαρὰν κατάστασιν, καὶ σχεδὸν ἄνευ τοῦ μηλικοῦ ὀξέος εἰς τὸν ὀπὸν τῶν κίτρων ἢ Μηδικῶν μῆλων, τῶν πορτογαλίων κ. τ. λ.

Τὸ κιτρικὸν ὀξύ εὐρίσκεται μετὰ τοῦ μηλικοῦ ὀξέος ἠνωμένον εἰς διαφόρους καρπούς, μετὰ τοῦ τρυγικοῦ δὲ ὀξέος εἰς τὴν τοῦ ὀξυφοίνικος σάρκα καὶ μετὰ τῆς τιτάνου εἰς τὰ γαιόμηλα καὶ τοὺς τῆς σκύλλης βολβούς.

Ἐπειδὴ τὸ κιτρικὸν ὀξύ εὐρίσκεται καὶ εἰς μεγάλην ποσότητα καὶ εἰς τὴν καθαρωτέραν κατάστασιν εἰς τὸν χυλὸν τῶν λεμονίων, ἕνεκα τούτου μεταχειρίζονται ταῦτα πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ ἐμπεριεχομένου κιτρικοῦ ὀξέος. Πρὸς κατασκευὴν τούτου τοῦ ὀξέος ἐκ τῶν λεμονίων προσθέτομεν εἰς τὸν ἐκθλιβόμενον χυλὸν λειοτριβημένην ἀνθρακικὴν τίτανον, ἕως τοῦ παύσῃ ἡ ἀνάβρασις. Τοιοῦτοτρόπως τὸ ἐν τῷ χυλῷ ὑπάρχον ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τῆς τιτάνου ἀποτελεῖν ἀδιάλυτον ἄλκας, τὸ ὅποιον ἀφοῦ καλῶς ἀποπλυθῇ, ξηραίνεται· ἡ κιτρικὴ τίτανος συμμιχθεῖσα ἀκολούθως μὲ ὀλίγον ὕδωρ ἐπιχύνεται μὲ ἥμισυ μέρος θειικοῦ ὀξέος συγκρασθέντος πρότερον μὲ ἕξ ἕως ὀκτὼ μέρη ὕδατος· τὸ μίγμα τοῦτο ἀφίεται νὰ κατεργασθῇ εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον διὰ τινὰς ἡμέρας, τὸ δὲ ἐπιπολῶζον ῥευστὸν διύλισθὲν καθαρῶς ἐξατμίζεται διὰ πρᾶου πυρὸς μέχρι συστάσεως σερπίου ἀραιοῦ. μετὰ δὲ τὴν ἐξάτμισιν τίθεται τὸ ῥευστὸν εἰς ψυχρὸν μέρος διὰ νὰ συμπηχθῶσι κρύσταλλοι.

Τὸ κιτρικὸν ὀξύ κρυσταλλοῦται εἰς τετραγωνικὰ πρίσματα, ἔχοντα ὀξεῖαν γεῦσιν· εἶναι ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα, ἐὰν δὲ θερμανθῇ εἰς κλεισμένα ἀγγεῖα, τήκεται, οἰδαίνεται καὶ μεταβάλλεται εἰς πυροκιτρικὸν ὀξύ.

Ἡ δι' ὕδατος διάλυσις τοῦ κιτρικοῦ ὀξέος ἀρχίζει νὰ σήπεται, ὡς καὶ ἅπασαι αἱ ὑδατώδεις διαλύσεις τῶν ὀργανικῶν ὀξέων καὶ ὀξειδίων.

Τὸ κιτρικὸν ὀξύ ὑπὸ μὲν τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς ὀξαλικὸν ὀξύ ὑπὸ δὲ τοῦ θειικοῦ ὀξέος εἰς ὀξικὸν ὀξύ.

Συνίσταται δὲ ἐξ

Ἀνθρακος	4 ατ. =	24 —	41,38
Ἰδρογόνου	2 ατ. =	2 —	3,45
Ὄξυγόνου,	4 ατ. =	32 —	55,17

58 — 100,00

Ἐάν τὸ κιτρικὸν ὀξύ καθυποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν σχηματίζεται τὸ παρὰ τοῦ Lassaigue ἀνακαλυφθὲν πυροκιτρικὸν ὀξύ· δύναται δὲ τοῦτο νὰ ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὰς συγχρόνως ἀποσταχθείσας ἄλλας ἑτερογενεῖς ὕλας, ἐάν τὸ ἀποτελούμενον μελανωπὸν ῥευστὸν κορεσθῇ μὲ πτότασσαν καὶ ἐπομένως καθαρισθῇ διὰ τῆς ζέσεως μετὰ ζωτικῷ ἄνθρακος.

Τὸ οὕτως ἀποτελούμενον πυροκιτρικὸν κάλιον ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, τὸ δὲ ἀποπλυθὲν καὶ ἀποξηρανθὲν ἵζημα ἀποσυντίθεται ἀκολουθῶς διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, καὶ τὸ διῦλισθὲν ῥευστὸν ἐξατμιζόμενον σχηματίζει μικρὰς ἀγγίδας. Τὸ πυροκιτρικὸν ὀξύ διακρίνεται ἀπὸ τὸ κιτρικὸν ὀξύ, καθότι τοῦτο σχηματίζει μετὰ τῶν πλειοτέρων θάσεων εὐδιάλυτα ἄλατα, καὶ καταβυθίζει τὰ διαλύματα τῶν διὰ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου καὶ μολύβδου ἀλάτων.

Τὸ κιτρικὸν ὀξύ εἶναι χρήσιμον εἰς τινὰ βιομηχανικὰ καταστήματα, διὰ τὴν τύπωσιν ὑφασμάτων καὶ ἀντ' αὐτοῦ ὁ χυλὸς τῶν λεμονίων· μετὰ τῆς ζαχάρους πρὸς λεμονάδαν· ἐπίσης χρησιμεύει πρὸς ἐκτύλιξιν τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος, ἀφοῦ προηγουμένως κατεπίαμεν ἀνθρακικὴν πτότασσαν ἢ σόδαν, καὶ τὸ ἱματικὸν τοῦτο μέσον καλεῖται *Potio Riverii*.

Ἄλατα διὰ κιτρικοῦ ὀξέος.

Αἱ τοῦ κιτρικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν γαιῶν, ἀλκαλίων καὶ μεταλλοξειδίων ἐνώσεις ἀποσυνθέτονται, θερμανθεῖσαι μέχρι πυρακτώσεως. ἐκ τοῦ ἀποσυνθετομένου ὀργανικοῦ ὀξέος σχηματίζεται ὕδωρ, ἀνθρακικὸν ὀξύ, ὀξειδίων τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ ὑδρογόνον ἀνθρακοῦχον ἀέριον, ἡ δὲ θάσις ἐνομένη μετὰ πλειοτέρου ἢ ὀλιγοτέρου ἄνθρακος ἐπιμένει. Τὰ διὰ κιτρικοῦ ὀξέος ἄλατα τῶν ὁποίων ἡ θάσις εἶναι ἀλκάλιον τι ἢ τὸ ὀξειδίων τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ σιδήρου εὐκόλως διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ, τῶν δὲ λοιπῶν τινὰ μὲν εἶναι διαλύσιμα, τινὰ δὲ ἀδιάλυτα. Ἄπαντα τὰ κιτρικὰ ἄλατα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς ὑπερτεροῦν ποσὸν κιτρικοῦ ὀξέος. Ἡ ὅσον ἔνεστι ἄκρατος διάλυσις τῆς κιτρικῆς πτότασσης διαφέρει ἀπὸ τὴν τῆς τρυγικῆς πτότασσης, καθότι αὕτη διὰ τῆς προσθήκης τοῦ κιτρικοῦ ἢ καὶ ἐτέρων ὀξέων δὲν ἀποτελεῖ δυσδιάλυτον ἄλας.

Ἡ κιτρικὴ πτότασσα εἶναι εὐδιάλυτον ἄλας εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ κρυσταλλοῦνται ἐκ τῆς διαλύσεώς της ἄμορφοι καὶ διῦγραινόμενοι κρύσταλλοι. Ἡ κιτρικὴ πτότασσα εἶναι ἐν χρήσει εἰς τὴν ἱατρικὴν. Ἡ κιτρικὴ σόδα κρυσταλλοῦται εἰς ἐξαγωνικὰ πρίσματα ἀσθενῶς διαπυρούμενα εἰς τὸν ἀέρα· ἔχει ἀλατώδη γεῦσιν καὶ διαλύεται εἰς $1 \frac{1}{2}$ ψυχροῦ ὕδατος.

Ἡ *κιτρικὴ ἀμμωνία* κρυσταλλοῦται εἰς σχῆμα ἐπιμήκων πρισμα-
των, τὰ ὅποια εἰς μὲν τὸν ἀέρα διυγραίνονται εἰς δὲ τὸ ὕδωρ διαλύονται.

Ἡ *κιτρικὴ βαρεῖα* καθὼς καὶ ἡ *κιτρικὴ στροντιανή* εἶναι εἰς τὸ
ὕδωρ ἀδιάλυτα καταβυθίσματα, ἀλλ' ἀμφότερα διαλύονται εἰς ὑπερτεροῦ-
σαν ποσότητα *κιτρικοῦ ὀξέος*.

Τὰ πλείωτερα διὰ *κιτρικοῦ ὀξέος* μεταλλικὰ ἄλατα εἶναι ἀδιάλυτα
εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ δύνανται νὰ σχηματισθῶσιν, ἐὰν τὰ διὰ *κιτρικοῦ ὀξέος*
ἄλατα διὰ διαλύσεως διαφόρων μεταλλικῶν ἀλάτων ἀποσυντεθῶσιν.

Ὁ *κιτρικὸς μολύβδος* ἀποτελεῖται, ἐὰν διάλυσιν *κιτρικῆς ποτάσης*
ἀποσυντεθῇ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου. Συνίσταται ἐξ

Ὄξειδίου τοῦ μολύβδου 65,88

Κιτρικοῦ ὀξέος 34,12

Ὁ *κιτρικὸς ψευδάργυρος* κατασκευάζεται διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ
μεταλλικοῦ ψευδαργύρου εἰς ὑδατώδη διάλυσιν τοῦ *κιτρικοῦ ὀξέος*.

Ὁ *κιτρικὸς χαλκὸς* εἶναι διαλύσιμος εἰς ζέον ὕδωρ καὶ κρυσταλλοῦ-
ται διὰ τῆς ἀποψύξεως τοῦ διαλύματος εἰς πρασίνοὺς κρυστάλλους.

Κιτρικὸς σίδηρος ὑποξειδωμένος. Ὁ σίδηρος διαλύεται εἰς τὸ *κιτρι-
κὸν ὀξύ*, ἐκλυομένου ὑδρογονικοῦ ἀέρος. Ἐὰν τὸ εἰς τὸν ὀπὸν τῶν λεμονίων
διάλυμα ἐξατμισθῇ μέχρι συστάσεως ἐκχυλίσματος, εἶναι χρήσιμον εἰς
τὴν ἱατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα *extractum ferri citratum*.

Ὁ *κιτρικὸς ὑδράργυρος* ὑποξειδωμένος καὶ ὀξειδωμένος εἶναι εἰς τὸ
ὕδωρ ἀδιάλυτα λευκὰ καταβυθίσματα.

Τρυγικὸν ὀξύ.

(*Acidum tartaricum*)

Τὸ *τρυγικὸν ὀξύ* εὐρίσκεται εἰς τὰς σταφυλὰς, εἰς τὴν σάρκα τοῦ ὄξυ-
φοίνικος, εἰς πλείωτον ὅμως ποσὸν καὶ μετὰ τῆς ποτάσης ἐνωμένον
εἰς τὴν τρύγα, ἐξ ἧς δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον.

Διαλύομεν *τρυγὸς* κεκαθαρμένης μέρος ἐν εἰς ὕδατος μέρη εἴκοσι ἐντὸς
ἀγγείου χαλκόν· ἀνακινοῦντες δὲ ἀδικοπῶς τὸ ὑγρὸν, προσθέτομεν κατὰ
μικρὸν *κριτίδος* (ἀνθρακικῆς τιτάνου λείας), ὅσον ἀρκεῖ πρὸς κόρον τοῦ
τρυγικοῦ ὀξέος· ἐπομένως ἀποσυρόμενον τὸ ἀγγεῖον ἐκ τοῦ πυρὸς ἀφίεται
νὰ κατασταλαχθῇ ἡ *τρυγικὴ τίτανος*, ἥτις ξηρανθεῖσα ἐνοῦται μὲ ἐξα-
πλοῦν θερμοῦ ὕδατος, εἰς τὸ ὁποῖον προστίθενται ἑπτὰ μέρη *θειικοῦ ὀξέος*
ἀκράτου, ἀφοῦ συγκερασθῶσι πρότερον μὲ τρία μέρη ὕδατος· τὸ μίγμα τοῦτο
ἀφίεται εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον ἡμέρας τινὰς ὑπὸ συνεχῆ ἀνακίνησιν· τὸ φύ-

ραμα ἐγκλείεται εἰς λίνον καὶ ἐκθλίβεται ἰσχυρῶς· τὰ ποριζόμενα ρευστὰ ἐξατμίζονται διὰ μαλακοῦ πυρὸς μέχρι συστάσεως σερραπίου, ἐξ οὗ ἐπομένως συμπηγνύονται κρύσταλλοι.

Χαρακτηριστικά. Σχηματίζει κρυστάλλους συνεχομένους εἰς εἶδος πλακῶς, οἵτινες εἶναι λευκοί, ὀξύτατοι τὴν γεῦσιν καὶ εἰς δύο μέρη ὕδατος διαλυτοί· τηκόμενοι εἰς ἀνοικτὰ ἀγγεῖα ἀναθυμιῶσιν ὁσμήν κεκαυμένης ζαχάρεως, ἀναφλεγόμενοι δὲ μεταβάλλονται εἰς ὕδωρ καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ.

Ἐάν τὸ τρυγικὸν ὀξύ προσεκτικῶς θερμανθῇ μέχρι 200° P μεταβάλλεται ἐν μέρει εἰς ἄλλα ὀξέα καλούμενα *acidum tartrelicum* ἢ *tartrelicum* καὶ *paratartrelicum*· τὰ διὰ τῶν ῥηθέντων ὀξέων ποριζόμενα ἄλατα εἶναι κομμώδη καὶ μὴ κρυσταλλώσιμα· τὸ δὲ περιεργότερον εἶναι, ὅτι διαλυθέντα εἰς ὕδωρ, ὀλίγον κατ' ὀλίγον μεταβαίνουν εἰς τρυγικά ἄλατα· θερμανθὲν μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς μηλικὸν, ὀξालικὸν καὶ ὀξικὸν ὀξύ· διὰ τοῦθεικοῦ ὀξέος εἰς ὀξικὸν καὶ διὰ συνεχοῦς θερμάνσεως μὲ κεκραμένονθεικὸν ὀξύ καὶ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου μεταβάλλεται εἰς μυρμηκικὸν ὀξύ.

Τὸ τρυγικὸν ὀξύ σύγκειται ἐξ.

Ἀνθρακος	4. ατ.	24 —	36,36
Ἵδρογόνου	2. ατ.	2 —	3,03
Ὄξυγόνου	5. ατ.	40 —	60,61
		66 —	100,00

Ἐάν οἱ κρύσταλλοι τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος ᾖναι ἐλεύθεροι ἀπὸθεικὸν ὀξύ, πρῶτον δὲν ὑγραίνονται εἰς τὸν ἀέρα, καὶ τὸ ὑγρὸν, ὀξικοῦ μολύβδου προσιθεμένου, προάγει κατακρήμνισμα εὐδιάλυτον εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ.

Τὸ τρυγικὸν ὀξύ χρησιμεύει ὡς ἱαματικὸν μέσον, ἀναπληρόνει τὸ κίτρικὸν ὀξύ πρὸς κατασκευὴν δροισιτικῶν ποτῶν καὶ ὡς δοκιμαστήριον πρὸς ἐξίχνευσιν τῶν διὰ τοῦ καλίου ἀλάτων.

Ἐάν μίγμα ἐξ 8 μερῶν τρυγικοῦ ὀξέος ξηροῦ καὶ 28 τριτοξειδίου τοῦ μολύβδου φαιοῦ εἰς θερμοκρασίαν 16° P συντριφθῇ, συμβαίνει διάκασις ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ ὁσμῆς ὁμοίας τῆς τοῦ μυρμηκικοῦ ὀξέος.

Τρυγικά ἄλατα. Tartrates.

Ἡ σχέσις τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος πρὸς τὰς βάσεις εἶναι ἰσχυρά. Ἐάν θερμανθῶσιν εἰς τὸν ἀέρα ἐκλύουσιν ὁσμήν κεκαυμένης ζαχάρεως, δι'

ίσχυροτέρου δὲ πυρὸς σχηματίζεται ὀξύ τι καλούμενον πυροτρυγικὸν ὀξύ, ἔλαιον τι μέλαν, ἀνθρακικόν, καὶ ὑδρογονοανθρακοῦχον ἀέριον, ἡ δὲ βάσις ἀναμεμιγμένη μετ' ἀνθρακος ἐπιμένει. Μέχρι τοῦδε ἐξιχνεύθησαν εἰς τὴν φύσιν μόνον δύο τρυγικὰ ἄλατα ἡ τρυγικὴ πότασσα καὶ ἡ τρυγικὴ τίταρος.

Ἡ τρυγικὴ πότασσα εἰς οὐδετέραν κατάστασιν *Tartarus tartarisatus sal vegetabile* καλουμένη, δύναται νὰ κατασκευασθῇ, ἀμέσως ἐκ τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος καὶ τῆς ἀνθρακικῆς ποτάσσης, ἡ διὰ τοῦ κόρου τοῦ ὑπερτεροῦντος τρυγικοῦ ὀξέος τῆς τρυγὸς διὰ τῆς ἀνθρακικῆς ποτάσσης. Πρὸς ἐκτέλεσιν τούτου πράττονται τὰ ἀκόλουθα. Ἀφοῦ διαλυθῶσιν ὑπανθρακικῆς ποτάσσης εἰς ἀπεσταγμένον ὕδωρ μέρη 6, προστίθεται κεκαθαρμένης τρυγὸς, ὅσον ἀρκεῖ, διὰ νὰ κορεσθῇ ἐντελῶς ἡ πότασσα· ἐξατμισθεῖσα δὲ ἕως νὰ μείνῃ ἡ ἡμίσεια ἐκτίθεται 24 ὥρας εἰς ψυχρὸν μέρος· τὸ διυλιζόμενον ρευστὸν ἐξατμίζεται διὰ μαλακοῦ πυρὸς μέχρι ξηροῦ. Ἡ οὐδετέρα τρυγικὴ πότασσα εἶναι κόνις λευκὴ, εἰς τὸν ἀέρα ὀλίγον ὑγραινομένη, εἰς 4 μέρη ὕδατος διαλυτὴ, παρὰ τῶν πλειοτέρων ὀξέων ἀποσυντίθεται καὶ ἐξ αὐτοῦ σχηματίζεται δυσδιάλυτος τρυξ *tartarus regeneratus*.

Crystalli tartari. Cremor-tartari

Τρυξ ὀξύνη· τρυγικὴ πότασσα.

Εὑρίσκεται εἰς τὰς σταφυλὰς καὶ κατακρημνίζεται διὰ τῆς οἰνώδους ζυμώσεως ἐκ τοῦ λευκοῦ ἢ ἐρυθροῦ οἴνου εἰς τὰς πλευρὰς τῶν κλεισμένων καδίων, εἰς τοὺς ὁποίους φυλάττεται· ἐπειδὴ ὅμως ἡ τρυξ, ἥτις κατακάθεται ἐκ τῶν διαφόρων εἰδῶν τοῦ οἴνου, ἐμπεριέχει τρυγικὴν τίτανον, ζύμην, χρωματιστικὴν ὕλην κ. τ. λ. καθυποβάλλεται εἰς κάθαρσιν, ἥτις γίνεται, ἐὰν διαλυθῇ εἰς τὸ ὕδωρ ἐντὸς χαλκίνου ἀγγείου, προστεθείσης ἀργίλλου, καὶ ἐὰν ἐπομένως διυλισθῇ.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι κρύσταλλοι λευκοὶ, σκληροὶ, διαφανεῖς, ἀμετάβλητοι εἰς τὸν ἀέρα, ὅξεῖς τὴν γεῦσιν, διαλύσιμοι εἰς 96 μέρη ψυχροῦ καὶ 18 ζέοντος ὕδατος. Ἐὰν ἐνωθῇ ἡ τρυξ μετὰ τοῦ νίτρου εἰς διαφόρους ἀναλογίας καὶ ἀναφλεχθῇ, ἀποτελεῖ κρότον, καὶ τὸ ὑπόλειμμα λέγεται *sal tartari*. Ἐὰν δὲ ἐνωθῇ μετὰ τοῦ βόρακος ἢ ἄλλων οὐδετέρων βορικῶν ἀλάτων, μεταβάλλεται εἰς εὐδιάλυτον ἄλας καλούμενον τρυξ ἐμβώραξ *tartarus boraxatus*, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ κατασκευασθῇ

διὰ τῆς διαλύσεως 3 μερῶν τρυγὸς καὶ ἑνὸς θόρακος. Τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ἀποτελούμενον ἄλας εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, ἀδιάλυτον δὲ εἰς τὸ οἶνόπνευμα.

Ἡ *Τρυγικὴ σόδα* κατασκευάζεται διὰ τῆς ἀμέσου οὐδετερώσεως τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος διὰ τῆς σόδας. Τὸ ἄλας τοῦτο κρυσταλλοῦται εἰς σχῆμα πρισμαίων, εἶναι ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα, διαλύσιμον εἰς 3 μέρη ψυχροῦ ὕδατος, ἀδιάλυτον ὅμως εἰς τὸ οἶνόπνευμα. Ἡ τρυγικὴ σόδα μεθ' ὑπερτεροῦντος ὀξέος ἀποτελεῖται, ἐὰν εἰς διάλυσιν τρυγικῆς σόδας οὐδετέρως προστεθῇ διάλυσις τρυγικοῦ ὀξέος. Διὰ τῆς ἐξατμίσεως καὶ ἀποψύξεως κρυσταλλοῦται τὸ ἄλας εἰς εἶδος ἐξαγωνικῶν πρισμαίων, ἔχει ὀξείαν καὶ ἀλατώδη γεῦσιν, διαλύεται εἰς 2 μέρη ζέοντος ὕδατος, εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ οἶνόπνευμα. Συνίσταται ἐκ

Σόδας	1 ατ.	— 31, 3	— 16,45
Τρυγικοῦ ὀξέος	2 ατ.	— 132	— 69,36
Ὑδατος	3 ατ.	— 27	— 14,19
		190, 3	— 100,

Sal polychrestum Seignette

Ἄλας πολύχρηστον τοῦ Σεϊγνέτου λέγεται ἔνωσις τρυγὸς μετὰ νάτρου, τὸ ὁποῖον κατασκευάζεται διὰ τῆς οὐδετερώσεως τοῦ ὑπερτεροῦντος τρυγικοῦ ὀξέος τῆς τρυγὸς διὰ τῆς ἀνθρακικῆς σόδας. Τὸ ἄλας τοῦτο σχηματίζει κρυστάλλους μεγάλους, ἀχρόους, διαφανεῖς, ἀλμυροὺς καὶ ἀηδεῖς τὴν γεῦσιν, εἰς 4 μέρη ὕδατος διαλυτοὺς, εἰς δὲ τὸ οἶνόπνευμα ἀδιάλυτους. Συνίσταται ἐκ

Ποτάσεως	1 ατ.	47, 2	— 15,71
Νάτρου	2 ατ.	31, 3	— 10,41
Τρυγικοῦ ὀξέος	1 ατ.	132	— 43,93
Ὑδατος	10 ατ.	90	— 29,95
		300, 5	— 100,

Ἡ *τρυγικὴ ἀμμωνία* κρυσταλλοῦται εἰς πολύγωνα πρίσματα, εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, διαχεόμενα εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐκπέμποντα μέρος τῆς ἀμμωνίας.

Τρυγική άμμωρία μετά ποτάσεως.

Tartarus amoniatus tartarus solubilis.

Κατασκευάζεται διά τοῦ κόρου τῆς τρυγὸς διά τῆς ἀνθρακικῆς άμμωνίας, εἶναι ἄλλας εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, ἀποβάλλει μέρος τῆς άμμωνίας ἐάν ἐκτεθῇ εἰς τὸν αἶρα καὶ ἀποκαθίσταται, ἐνῶ σχηματίζεται τρυξ διά διαλύσεως εἰς τὸ ὕδωρ.

Ἡ τρυγική ἄργιλλος, βαρεῖα, τίτανος, μαγνησία, στροντιανή ἀποτελοῦνται διά τοῦ άμέσου κόρου τῶν εἰρημένων θάσεων μετά τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος.

Τὰ πλείοτερα διά τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος σχηματιζόμενα μεταλλικά ἄλλατα εἶναι ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ δύνανται νὰ κατασκευασθῶσι διά τῆς διπλῆς συγγενείας, ἡγουν διά τῆς ἀποσυνθέσεως μεταλλικοῦ τινος ἁλατος. Ἐκ τῆς τρυγικῆς ποτάσεως εἰς εἶδος λευκῶν κατακρημνισμάτων καταβυθίζονται

Ὁ τρυγικὸς ὑδράργυρος.

Τὸ τρυγικὸν ὀξειδίον τοῦ μαγνησίου

- » βισμουθιον
- » ἄργυρος
- » ψευδάργυρος
- » κασσίτερος

Ἐάν ψήγματα ψευδαργύρου ἢ κασσιτέρου, ἢ τὰ ὀξειδια αὐτῶν τῶν μετάλλων ζέωνται μετά τρυγὸς, σχηματίζονται εὐδιάλυτα ἄλλατα, ἅτινα δυσκόλως κρυσταλλοῦνται, ἄλλα παρασταίνουσιν μάζαν ὑγραινομένην.

Ὁ τρυγικὸς μολυβδος εἶναι κόνις λευκή, κρυσταλλώσιμος, ἀποτελομένη διά τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ νιτρικοῦ ἢ ὀξικοῦ μολύβδου διά τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος, ἢ τῆς τρυγικῆς ποτάσεως. Συνίσταται ἐξ

Ὄξειδίου τοῦ μολύβδου 1 ατ. 112 — 62,92

Τρυγικοῦ ὀξέος 1 ατ. 66 — 37,08

178 — 100,

Ὁ τρυγικὸς χαλκὸς κατασκευάζεται διά τῆς διαλύσεως τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ διά τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος. Ἐάν ἐξατμισθῇ τὸ ρευστὸν, σχηματίζει κυανοπράσινους κρυστάλλους συνισταμένους ἐκ τρυγικοῦ χαλκοῦ οὐδετέρου καὶ εὐδιάλυτους εἰς τὸ ὕδωρ. διά τῆς ζέσεως τῆς τρυγὸς μετά τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ, ἢ τοῦ ἰοῦ τοῦ χαλκοῦ ἀποτελεῖται διπλοῦν ἄλλας εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ κρυσταλλούμενον εἰς σχῆμα κυανοχλώ-

ρων κρυστάλλων. Ἡ διάλυσις τοῦ εἰρημένου ἄλματος μεταχειρίζεται εἰς τὸν χρωματισμὸν τῶν χαρτίων.

Τρυγικὸς ὑποξειδωμένος σίδηρος. Κατασκευάζεται εἰς εἶδος λευκῆς κόνεως, ἐὰν ξύσματα σιδήρου κατεργασθῶσι μετὰ τρυγικοῦ ὀξέος διαλελυμένου εἰς ὕδωρ, καθὼς καὶ ἐὰν ἡ διάλυσις τοῦ θεϊκοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου ἐνωθῇ μετὰ τρυγικοῦ ὀξέος διαλελυμένου εἰς ὕδωρ· τὸ εἰρημένον ἄλλας κρυσταλλοῦται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν εἰς φυλλοειδεῖς κρυστάλλους.

Ὁ τρυγικὸς ὀξειδωμένος σίδηρος κατασκευάζεται, ἐὰν τὸ ὀξειδίον τοῦ σιδήρου τὸ ὑδρομιγῆς διαλυθῇ διὰ τρυγικοῦ ὀξέος. Μετὰ τὴν ἐξάτμισιν ἐπιμένει μίγμα πηκτώδες, εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ μὴ κρυσταλλώσιμον.

Ἡ τρὺξ ἐνσίδηρος, *Tartarus chalybeatus aut ferruginosus* ἀποτελεῖται διὰ τῆς διαλύσεως ψηγμάτων σιδήρου, ἢ ὀξειδωμένου σιδήρου διὰ κεκαθαρμένης τρυγὸς εἰς τὸ ἀρκούν ποσὸν ὕδατος. Ἐὰν τὸ ἄλλας τοῦτο ἐξάτμισθῇ μέχρι ξηροῦ καὶ πλασθῇ δι' ὀλίγου ὕδατος εἰς σχῆμα σφαιριδίων, τότε καλεῖται *globuli martiales*, σφαιρίδια ἐνσίδηρα, μεταχειριζόμενα εἰς τὴν ἱατρικὴν πρὸς κατασκευὴν τῶν τεχνητῶν σιδηρούχων λουτρῶν.

Τὸ τρυγικὸν στίμμι κατασκευάζεται διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ ὀξειδίου τοῦ στίμμεως διὰ τρυγικοῦ ὀξέος. Τὸ ἄλλας κρυσταλλοῦται, εἰς σχῆμα πρισμάτων εὐδιάλυτων εἰς τὸ ὕδωρ καὶ νοτίζομένων διὰ τῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ὑγρασίας.

Τρὺξ ἐνστήμιος, *Tartarus stibiatus seu emeticus*. Τὸ διπλοῦν τοῦτο ἄλλας, ἀνακλυφθὲν τὸ 1681 ἔτος, κατασκευάζετο πρότερον εἰς μεγάλης ποσότητις διὰ τῆς διαλύσεως τῆς ὑέλου τοῦ στίμμεως διὰ κεκαθαρμένης τρυγὸς· εἰς δὲ τοὺς νεωτέρους χρόνους κατασκευάζεται διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ λειοτριβημένου μεταλλικοῦ στίμμεως εἰς τὴν τρύγα. Ἐὰν τὸ μίγμα τοῦτο ἐπιχυθῇ με ὕδωρ θερμὸν, ἀποσυντίθεται αὐτὸ, τὸ ὀξυγόνον τοῦ ὕδατος ὀξειδώνει τὸ στίμμι καὶ πάραυτα διαλύεται παρὰ τῆς τρυγός.

Χαρακτηριστικά. Ἡ τρὺξ ἐνστήμιος κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος λευκῶν διαφανῶν ὀκταέδρων ἢ τετραέδρων, τὰ ὅποια κοκκινίζουν τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου καὶ διασκορπίζονται ἀσθενῶς εἰς τὸν ἀέρα, διαλύονται εἰς δεκαπέντε μέρη ψυχροῦ καὶ εἰς δύο θραστοῦ ὕδατος. Τὸ διάλυμα τῆς ἐνστήμιου τρυγὸς ἀποσυντίθεται διὰ τῶν ἀνθρακικῶν καὶ τῶν καθαρῶν ἀλκαλίων καὶ τὸ κατακρημνιζόμενον ὑποξείδιον τοῦ στίμμεως διαλύεται εἰς ὑπερτεροῦν ποσὸν ἀλκαλίων.

Τὰ ἀφεψήματα τοῦ φλοιοῦ τῆς κίνας, τῶν κηκίδων καὶ ἄλλων φυτῶν θυροσδεψικὴν ὕλην ἐμπεριεχόντων, ἀποσυνθέτουσιν τὸ διάλυμα τῆς ἐνστιμμίου τρυγός, καὶ τὸ ἀποτελούμενον κατακρήμνισμα σύγκειται ἐκ τοῦ ὀξειδίου τοῦ στιμμίου καὶ θυροσδεψικῆς ὕλης. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἀφεψήμα τῆς κίνας καὶ τῶν θυπτικῶν ὑλῶν ἀποσυνθέτει τὴν ἐνστήμιον τρύγα, δὲν πρέπει νὰ ἐνοῦνται τοιαῦτα ἀφεψήματα μετὰ τοῦ διαλύματος τῆς ἐνστιμμίου τρυγός· καὶ διὰ τοῦτο μεταχειρίζονται τὸ τῆς κίνας καὶ τοιαῦτα ἀφεψήματα ὡς ἀντίδοτα κατὰ τῆς ὑπερεμέσεως τῆς προερχομένης ἀπὸ μεγαλητέραν τοῦ δόντος δόσιν τρυγός ἐνστιμμίου.

Κατὰ τὰς δοκιμὰς τῶν χημικῶν ἀποχωρίζεται τὸ στίμι ἐκ τοῦ διαλύματος τῆς ἐνστιμμίου τρυγός, ἐὰν ἐμβραπτισθῇ εἰς αὐτὸ σίδηρος μεταλλικὸς προσεθέντος ὀλίγου ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον δύνανται νὰ ἐξιχνευθῶσι τὰ συστατικὰ μέρη τοῦ ἁλτος τοῦτου μετ' ἀρκετῆς ἀκριβείας.

Παρομοίως δύνανται νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἀνάλυσις τοῦ ἁλτος διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου. Συνίσταται ἐξ

Ὄξειδιόν τοῦ στίμμεως	2 ατ.	153	—	42,59
Ποτάσσης	1 ατ.	47,2	—	13,14
Τρυγικοῦ ὀξέος	1 ατ.	132	—	36,75
Ἰδατος	3 ατ.	27	—	7,52
				359,2 — 100,

Τρυξ ἐνστήμιος πυρωθεῖσα εἰς κλεισμένην χύτραν μετὰ 2 μερῶν ἀνθρακος λείου σχηματίζει πυροφόρον, ὅστις ἀναφλέγεται μετ' ἐκπυρσοκροτήσεως, ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιφθόρην ὑγρᾶς ἀτμοσφαίρας.

Χρῆσις τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος καὶ τῶν ἐνώσεών του.

Ἐκτὸς τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος εἶναι καὶ μερικὰ τρυγικὰ ἅλατα χρήσιμα εἰς τὴν ἱατρικὴν ἥγουν· τὸ τρυγικὸν κάλιον,

τρυγικὸν κάλιον μετὰ νάτρου,

τρυξ ἐμβόραξ,

τρυξ ἐναμμώνιος,

τρυξ ἐνσίδηρος,

τρυξ ἐνστήμιος,

τρυξ κεκαθαρμένη.

Τὰ τέσσαρα πρῶτα ἔχουν ἐκκοπωτικὴν καὶ διαλυτικὴν ἐνέργειαν, τὸ πέμπτον εἶναι δυναμωτικὸν καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς εἶδος

λουτρῶν, τὸ ἕκτον μεταχειρίζεται ὡς ἐμετικόν, ἐξωτερικῶς δὲ ὡς ἐρεθιστικόν μέσον.

Ἡ κεκαθαρμένη τρυῆ καθαρά, καθὼς καὶ μετὰ βόρακος καὶ βορικοῦ ὀξέος ἠνωμένη εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν ἱατρικὴν, πρὸς τούτοις καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν ὄλων τῶν προεκτεθέντων τρυγικῶν ἀλάτων. Χρησιμεύει εἰς τὴν κατασκευὴν καθαρᾶς ὑπανθρακικῆς ποτάσης. ἥτις ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς πυρώσεως φυράματος συγκειμένου ἐκ δύο μερῶν τρυγὸς καὶ ἐνὸς μέρους νίτρου.

Ἡ τρυῆ μεταχειρίζεται καὶ διὰ τὴν χρύσωσιν, καὶ ἐνῷ τὰ χρυσωθυσόμενα ὀρειχάλκινα σκεύη ζέονται μετὰ τρυγὸς, προστίθεται φύραμα συνιστάμενον ἐκ χρυσοῦ, ψευδαργύρου καὶ ὑδραργύρου· ἐξόχως μεταχειρίζεται ἡ τρυῆ εἰς τὴν βαφικὴν ὡς πρόστυμμα τοῦ μαλλίου, καὶ ἰδίως εἰς τὸν ἐρυθρὸν χρωματισμόν. Ἡ τρυγικὴ τίτανος, καθὼς καὶ ὁ τρυγικὸς μόλυβδος δύνανται νὰ μεταχειρισθῶσι πρὸς κατασκευὴν τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος. Ἡ τρυῆ ἔγχυαλκος χρησιμεύει διὰ τὴν χρωμάτισιν τῶν χάρτων.

Πυροτρυγικὸν ὀξύ.

Ἐάν τὸ τρυγικὸν ὀξύ ἢ ἡ κεκαθαρμένη τρυῆ ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, σχηματίζεται, ἐκτὸς ἐμπυρευματικοῦ τινος μέλανος ἐλαίου, γνωστοῦ ὑπὸ τὸ ὄνομα *℞ellaior tρυγὸς δυσῶδες oleum tartari foetidum*, ὀξυνωπὸν καὶ κίτρινον ῥευστὸν μεταχειριζόμενον ἐνίοτε ὡς ἱατρικόν καὶ ἐπονομαζόμενον *spiritus tartari*. Τὸ ῥευστὸν τοῦτο ἐνομιζέτο ὡς ὀξικὸν ὀξύ ἠνωμένον μετ' ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου, ἀκολούθως ἐξιχνιάσθη, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐνυπάρχει ἰδιαιτέρον ὀξύ τὸ πυροτρυγικόν, τὸ ὁποῖον κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον δύνανται νὰ ἀποχωρισθῇ.

Τὸ διὰ τῆς προειρημένης ἀποστάξεως ληφθὲν ῥευστὸν *spiritus tartari* ἐξορυδετεροῦται διὰ ποτάσης, καὶ ἀφοῦ ζεσθῇ δι' ἀνθρακος καὶ διύλησθῇ διὰ χάρτου, ἐξατμίζεται μέχρι ῥευστοῦ· τὸ ἐπιμένον ὑπόλειμμα ἀποστάζεται μετὰ θειικοῦ ὀξέος δι' ὕδατος κεκραμένου. Κατ' ἀρχὰς ἀποστάζεται τὸ εἰς τὸ ὕδωρ διαλυόμενον πυροτρυγικόν ὀξύ καὶ ἀκολούθως ἐξαχνίζεται εἰς εἶδος λευκῶν βελονῶν.

Χαρακτηριστικά. Τὸ ὀξύ τοῦτο ἔχει ὀξείαν γεῦσιν, τήκεται διὰ μαλακοῦ πυρὸς καὶ ἐξαχνίζεται χωρὶς νὰ ἀφήσῃ τὸ παραμικρὸν ὑπόλειμμα· εἶναι διαλύσιμον εἰς 4 μέρη ὕδατος ψυχροῦ, ἔχει ἀρκετὴν σχέσιν μετὰ

τῶν θάσεων, καὶ τὰ διὰ τοῦ πυροτρυγικοῦ ὀξέος σχηματιζόμενα ἄλατα ἐπι-
χυθέντα διὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἐξαχνίζουσι τὸ πυροτρυγικὸν ὀξύ εἰς εἶδος λευ-
κῶν κρυστάλλων.

Τὰ πυροτρυγικά ἄλατα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ ὡς ἡ πυροτρυγι-
κὴ πότασσα. Ὁ ὀξικός μόνυδρος ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ πυροτρυγικοῦ
ὀξέος. Τὸ ὀξύ σύγκειται ἐξ.

Ἄνθρακος	5 ατ.	30	—	46,16
Ἵδρογόνου	3 ατ.	3	—	4,62
Ὄξυγόνου	4 ατ.	32	—	49,22
		65 — 100,		

Σταφυλικὸν ὀξύ.

Acidum unicum.

Τὸ ὀξύ τοῦτο ἐμπεριέχεται εἰς τὰς ὀξύνες σταφυλάς, καὶ πρὸς κατα-
σκευὴν του κορέννεται ἡ τριψ' ἐκ τοιούτων σταφυλῶν μετ' ἀνθρακικῆς σόδας.
Ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦτο ἐκτεθῇ εἰς κρυστάλλωσιν, κρυσταλλοῦται τὸ
διπλοῦν τρυγικὸν ἄλας, τὸ δὲ διπλοῦν σταφυλικὸν ἄλας ὡς μὴ κρυσταλ-
λώσιμον ἐπιμένει εἰς τὸ ῥευστόν· ἀναμιγνύεται ἔπειτα μετὰ ζωάνθρακος
πρὸς ἐντελῇ ἀποχρωματισμὸν καὶ ἐπομένως ἀποσυντίθεται διὰ τινος διὰ
τιτάνου ἢ μολύβδου ἄλατος, καὶ τὸ οὕτω ποριζόμενον καταθύσιμα ἀπο-
συντίθεται ἢ διὰ θεϊκοῦ, ἢ διὰ ὑδροθεϊκοῦ ὀξέος. Τὸ διάλυμα, τὸ ὅποιον
ἐν μέρει μὲν ἐμπεριέχει τρυγικὸν, ἐν μέρει δὲ σταφυλικὸν ὀξύ, ἐκτίθεται
πρὸς κρυστάλλωσιν, δι' ἧς ἀποτίθεται πρῶτον τὸ σταφυλικὸν, καὶ ἐξα-
τμιζομένου τοῦ ῥευστοῦ, καὶ τὸ τρυγικὸν ὀξύ.

Τὸ σταφυλικὸν ὀξύ σχηματίζει διαφανῆ ῥομβοειδῆ πρίσματα, ἔχει
γεῦσιν ὀξεῖαν, εἶναι ἄσπρον, εὐτήκτον καὶ θερμαινόμενον ὠχροῦται, ὑπο-
βληθὲν εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν παρέχει τὰ ἴδια ἀποτελέσματα, τὰ ὅποια
καὶ τὸ τρυγικὸν ὀξύ, μεταξὺ δὲ τούτων εὐρίσκεται καὶ ἰδιαίτερον ὀξύ
καλούμενον πυροσταφυλικὸν ὀξύ, περὶ οὗ ἐκθέτομεν ἐπομένως τὰ δέοντα.

Εἶναι περιέργον, ὅτι τὸ σταφυλικὸν ὀξύ ἔχει τὴν αὐτὴν ὡς πρὸς τὴν
σύνθεσίν του ἀναλογίαν, ἃν καὶ διαφέρει κατὰ τὰ λοιπὰ χαρακτηριστικά.

Σύγκειται δὲ ἐξ

Ὄξυγόνου	60,19
Ἵδρογόνου	3,00
Ἄνθρακος	36,81
100,	

Τὰ διὰ τοῦ σταφυλικοῦ ὀξέος ποριζόμενα ἄλαττα ὁμοιάζουν ὡς πρὸς τὴν γεῦσιν μὲ τὰ τρυγικά, διαφέρουσι δὲ ὡς πρὸς τὸ σχῆμα τῶν κρυστάλλων.

Πυροσταφυλικὸν ὀξύ.

Acidum pyrouvicum.

Τοῦτο τὸ ὀξύ γεννᾶται, ἐὰν τὸ σταφυλικὸν ὀξύ ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν· πρὸς τοῦτο τίθεται τὸ ὀξύ εἰς ὑέλινον ἀποστακτικὸν κέρας ἀμμοχωμένον, εἰς τὸ ὁποῖον προσαρμόζεται δοχεῖον. Τὸ κέρας κατ' ἀρχὰς θερμαίνεται προσεκτικῶς, τὸ ὀξύ τήκεται, ἐξοιδούται καὶ λαμβάνει φαιὸν, κίτρινον καὶ τέλος μέλαν χρῶμα. Ἡ θερμοκρασία δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίῃ τὸν 200 βαθμὸν τοῦλάχιστον εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐγχειρίσεως. Τὸ εἰς τὸ κέρας τηκόμενον ὀξύ ἐξοιδούται συνεχῶς, ἀλλ' ἐμποδίζεται ἢ μετὰβασίς του, ἐὰν ἀνοίγῃται συχνάκις τὸ τοῦ ἀποστακτικοῦ σκεῦος στόμιον καὶ ἀνακινῇται τὸ φύραμα διὰ τινος ἐκ χαλκοῦ ἢ λευκοχρόσου σύρματος· διὰ τῆς πράξεως ταύτης τὸ ἐξοιδωθὲν φύραμα κατακρημνίζεται καὶ οὕτω δύναται νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ ἀπόσταξις. Ἐὰν δὲ δὲν ἐκτελεσθῇ τοῦτο, εὐρίσκεται ὁ τοῦ ἀποστακτικοῦ σκεῦος πυθμὴν πάντῃ κενός, καθότι τὸ φύραμα ἐπροσκολλήθη εἰς τὸ ἄνω μέρος του. Τὸ διὰ τῆς ἀποστάξεως ποριζόμενον ῥευστὸν εἶναι διόλου ἄχρουν, καὶ ἔχει ἰδιαιτέραν ὀξείαν ὁμοίαν τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος ὁσμὴν. Συγχρόνως ἐκλύεται μέγα ποσὸν ἀνθρακικοῦ ὀξέος, δι' οὗ ἐξατμίζεται ὀξικὸν καθὼς καὶ μέρος πυροσταφυλικοῦ ὀξέος, ἐπομένως γίνεται τὸ ἀποστάλαγμα ὑποκίτρινον, καὶ ἐνίοτε φαιὸν, ἐὰν ἡ θερμοκρασία δὲν ὑπερβῇ τὸν 220 βαθμὸν· τὸ εἰς τὸ ἀποστακτικὸν σκεῦος ἐπιμένον εἶναι καταμέλαν καὶ ἄμα ἀποβάλλῃ τὴν γλισχρότητα του, τότε ἡ ἀπόσταξις εἶναι τελεία.

Ὁξαλικὸν ὀξύ.

Acidum Oxalicum.

Τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ κατεσκευάσθη εἰς καθαρὰν κατὰστασιν ἐκ τοῦ πρὸ πολλοῦ ἤδη γνωστοῦ ὀξελικοῦ ἁλατος Oxalium ἀπὸ τὸν Scheele κατὰ τὸ 1784 ἔτος.

Τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ εὐρίσκεται εἰς τὴν φύσιν ἠνωμένον μετὰ τῆς τιτάνου ἢ μετὰ τῆς ποτάσης. Ἡ ὀξαλικὴ τίτανος εὐρίσκεται εἰς πολλὰς ρίζας καὶ φλοιούς, ὡς καὶ εἰς τινὰς συμπτῆεις τῆς οὐροδόχου κύστεως· εἰς ἀρ-

κετόν πατόν εἰς τινὰς λειχήνας, καὶ εἰς τινὰ σιδηροῦχα ὀρυκτά· μετὰ τῆς ποτάσεως ἠνωμένον ἀπαντᾶται εἰς μεγίστην ποσότητα εἰς τὴν ὀξαλίδα, *oxalis acetosella*, *Rumex acetosella*, εἰς τὰ φύλλα τῆς εὐθαλείας καὶ εἰς τὰς ρίζας τῆς ῥᾶς, τέλος δὲ ἠνωμένον μετὰ τοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου, εὑρίσκεται εἰς ὀρυκτὸν καλούμενον *Humboldine*, τὸ ὁποῖον ἀπαντᾶται εἰς βαλτώδεις τόπους ὡς καὶ εἰς τινὰ στρώματα γαιανθράκων. Τὸ ὀρυκτὸν τοῦτο ἐμπεριέχει 46 τοῖς ἑκατὸν ὀξαλικοῦ ὀξέος.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος διαλύομεν ὀξαλικοῦ καλίου μέρος ἓν εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον διὰ 12 μερῶν ἀπεσταγμένου βραστοῦ ὕδατος, καὶ ἀφοῦ πρῶτον κορεσθῇ τὸ διάλυμα μὲ ὑπανθρακικὸν κάλιον ὑγρὸν, ἐνστάζεται ὀξικοῦ μολύβδου κεκαθαρμένου ὑγροῦ ὅσον ἀρκεῖ διὰ νὰ καταβυθισθῇ τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ· μεταγγισθέντος τοῦ ὑγροῦ, περιπλύνεται καλῶς μὲ ἀπεσταγμένον ὕδωρ τὸ Ἴζημα καὶ ξηραίνεται ἐπὶ ἐμπορικοῦ χάρτου. Ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἱζήματος ἐπιχύνομεν τὸ ὑποτριπλάσιον θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου συγκερασθέντος πρότερον μὲ τὸ δεκαπλοῦν ἀπεσταγμένου ὕδατος. Τὸ μίγμα τοῦτο κατεργάζεται 24 ὥρας καὶ ἐπομένως μεταγγίζεται τὸ ὑγρὸν, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐξατμισθέντος σχηματίζονται κρύσταλλοι.

Τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ δύναται νὰ σχηματισθῇ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν πλειοτέρων ὀργανικῶν ὑλῶν, καθὼς καὶ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ χλωρίου ἐπὶ τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος, καὶ τῆς τοῦ κυανίου ἐπὶ τῆς ἀμμωνίας.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι κρύσταλλοι ὑλοειδεῖς, ὀξύτατοι τὴν γεῦσιν, διαλύσιμοι εἰς 9 μέρη ψυχροῦ ὕδατος. Ἐάν τὸ κρυσταλλωμένον ὀξαλικὸν ὀξύ, ἢ ὀξαλικά ἅλατα ἐπιχυθῶσιν διὰ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου, ἀποσυντίθεται αὐτὸ καὶ διὰ θερμάνσεως ἐκλύεται ὀξειδίων τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ μὲ ἀναβρασμόν. Τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ δύναται νὰ ἐνωθῇ μετὰ τοῦ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος πρὸς ἰδιαιτέρην τινὰ ἔνωσιν καλουμένην *χλωρο-ὀξαλικὸν ὀξύ*· ἡ ἔνωσις αὕτη ἀπολαμβάνεται, ἐάν ὀξαλικὸν ὀξύ ἄκρατον ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ χλωρίου διὰ τινὰς ὥρας καὶ ὑπὸ τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἡλιακοῦ φωτός. Ὀλίγον κατ' ὀλίγον σχηματίζονται εἰς τὸ ρευστὸν φυλλίδια κρυσταλλώδη συνιστάμενα ἐκ 49,8 ὀξαλικοῦ, καὶ 51,2 ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος. Σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακός 2 ατ. 12 — 33,33

Ὄξυγόνου 3 ατ. 24 — 66,67

Τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ χρησιμεύει ἔνεκα τῆς πρὸς τὴν τίτανον σχέσεώς του ὡς ἀντιδραστήριον πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς τιτάνου.

Ὁξαλικά ἄλατα. Oxalates

Ἡ συγγένεια τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη καὶ ὑπερτερεῖ πολλάκις τὴν τῶν μὴ ὀργανικῶν ὀξέων, οὕτω π. χ. ἀποσυντίθεται ἡ ὑδατώδης διάλυσις τῆς γύψου παρὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος, κατακρημνιζομένης τῆς τιτάνου ὡς ὀξαλικῆς, τὸ δὲ θεικὸν ὀξύ ἐλευθεροῦται. Ἄπαντα τὰ ὀξαλικά ἄλατα πυρακτούμενα φθείρονται καὶ μεταβάλλονται εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ ὀξειδιον τοῦ ἀνθρακός, ἐπιμένοντος ἀνθρακικοῦ τινος ἄλατος ἢ τοῦ ἀποκατασταθέντος μετάλλου.

Ὁξαλικὴ πότασσα· ἡ πότασσα δύναται νὰ ἐνωθῇ μετὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος εἰς τρεῖς ἀναλογίας, ἐξ ὧν ἀποτελοῦνται ἄλλας οὐδέτερον καὶ ἕτερον μετὰ ὑπερτεροῦντος ὀξέος.

Ὁξαλικὴ πότασσα εἰς οὐδέτεραν κατάστασιν. Ἀποτελεῖται διὰ τῆς οὐδετερώσεως τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος μετὰ τῆς ποτάσσης, ἢ διὰ τοῦ κόρου τῆς διαλύσεως τοῦ ὀξαλικοῦ ἄλατος διὰ τῆς ποτάσσης. Ἐκ τοῦ διαλύματος συμπηγνύονται κρύσταλλοι ἐξάεδροι διακλύμενοι εἰς 3 μέρη ψυχροῦ ὕδατος. Σύγκειται ἐκ

Καλίου	1 ατ. 47	—	42,81
Ὁξαλικοῦ ὀξέος	2 ατ. 45	—	40,83
Ὑδατος	2 ατ. 18	—	16,36

110 — 100,

Τὸ ὀξαλικὸν κάλιον μεθ' ὑπερτεροῦντος ὀξέος δύναται νὰ κατασκευασθῇ, προστεθέντος εἰς τὴν τῆς οὐδετέρας ὀξαλικῆς ποτάσσης διάλυσιν ὀξαλικοῦ ὀξέος. Τὸ ἄλλας τοῦτο ἐγνωρίσθη εἰς τὸν 17 αἰῶνα καὶ κατασκευάζεται ἐκ τοῦ ἐκθλιβομένου χυλοῦ τῆς ὀξαλίδος. Πρὸς κατασκευὴν δὲ αὐτοῦ ἐξατμίζεται ὁ ἐκθλιβόμενος καὶ διὰ ἐπανειλημμένης διύλισεως καθαρισθεὶς χυλὸς εἰς εὐρύχωρον ἀγγεῖον μέχρι βαθμοῦ κρυσταλλώσεως μετὰ παρέλευσιν τινῶν ἡμερῶν σχηματίζονται κρύσταλλοι φαιοί, οἵτινες διὰ δευτέρας διαλύσεως εἰς καθαρὸν ὕδωρ δύνανται νὰ καθαρισθῶσιν εἰς τὴν ἑλβετίαν καὶ τινὰ ἄλλα μέρη κατασκευάζεται τὸ εἰρημένον ἄλλας εἰς μεγάλας ποσότητας, καὶ ἐξ 100 λιτρῶν ὀξαλίδος ἐξάγονται 4 οὐγγίαι καθαρῷ ἄλατος.

Χαρακτηριστικά. Κρυσταλλοῦται εἰς σχῆμα μικρῶν ἀδιαφανῶν πα-

ραλληλεπιπέδων κρυστάλλων, ἀμεταβλήτων εἰς τὸν ἀέρα, ἔχει ὀξεῖαν καὶ ὀλίγον πικράν γεῦσιν, διαλύεται εἰς 14 ζέοντος ὕδατος, καὶ ὀλίγον μόνον εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ. Τὸ ὀξαλικὸν κάλιον σύγκειται ἐκ

Καλίου	1 ατ.	47,2	—	34,40
Ὄξαλικοῦ ὀξέος ὑποθετικῶς λειψύδρου	2 ατ.	72,	—	52,48
Ὑδατος	2 ατ.	18,	—	13,12
137,2 — 100,				

Ἡ ὀξαλικὴ σόδα, καθὼς καὶ ἡ ὀξαλικὴ ἀμμωνία κατασκευάζονται, ἐὰν τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ κορεσθῇ ἐκ τῶν εἰρημένων ἐάσεων, διὰ δὲ τῆς ἐξατμίσεως τῶν διαλυμάτων δύνανται νὰ συμπηχθῶσι κρύσταλλοι. Ἐὰν ἡ ὀξαλικὴ ἀμμωνία θερμανθῇ εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος, ἀπολαμβάνονται τὰ ἐξῆς· ἀμμωνία, ἀνθρακικὴ ἀμμωνία, ἀνθρακικὸν ὀξύ, κυάνιον καὶ ὕλη τις καλουμένη oxamid, ἥτις εἶναι λευκὴ καὶ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτος.

Ἡ ὀξαλικὴ βαρεῖα, στροντιανὴ καὶ μαγνησία εἶναι ἀδιάλυτοι ἐνώσεις, ἀποτελούμεναι διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τινὸς ὀξαλικοῦ ἄλατος μετὰ τῶν εἰρημένων ἀλάτων.

Ἡ ὀξαλικὴ τίτανος ἐμπεριέχεται εἰς πολλὰς ρίζας καὶ λειχήνας· ἐξ ὧν τῶν διαλύσεων τῆς τιτάνου ἀποχωρίζεται διὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος ἢ τινὸς ὀξαλικοῦ ἄλατος ἡ ὀξαλικὴ τίτανος, εἰς εἶδος ἀδιαλύτου ἄλατος διαλυσίμου μόνον εἰς ὑπερτεροῦν ὀξαλικὸν ἢ νιτρικὸν ὀξύ. Συνίσταται δὲ ἐκ

Τιτάνου	1 ατ.	28,5	—	38,78
Ὄξαλικοῦ ὀξέος	1 ατ.	36,	—	48,98
Ὑδατος	1 ατ.	9,	—	12,24
73,5 — 100,				

Τὰ περισσότερα ὀξαλικά μεταλλικὰ ἄλατα εἶναι ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, κατασκευάζόμενα, ἐὰν αἱ διαλύσεις των συμμιγνύωνται μετὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος ἢ ἄλλων ὀξαλικῶν ἀλάτων.

Ὁξαλικὸς μολύβδος εἶναι κόνις λευκὴ ἀποτελούμενη διὰ τῆς ἐνώσεως τῆς ὀξαλικῆς ποτάσεως μετὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου καὶ συνίσταται ἐξ

Ὄξειδίου τοῦ μολύβδου	1 ατ.	112	—	75,68
Ὄξαλικοῦ ὀξέος	1 ατ.	36	—	24,32
148 — 100,				

Ὁξαλικὸς σιδήρος δύναται νὰ κατασκευασθῇ διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ σιδήρου εἰς τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ, ἥτις γίνεται ὑπὸ τὴν ἐκκυσιν ὕδρογόνου· ἐξατ-

μιζόμενος διὰ πρᾶου πυρός κρυσταλλοῦται εἰς σχῆμα πρισμάτων χλωροειδῶν.

Ὁ ὀξαλικὸς χαλκὸς εἶναι κόνις ἀνοικτοκυανὴ ἀποτελουμένη, ἐὰν ὀξalikὸν ὀξύ διαλυθῇ εἰς διάλυμα θεϊκοῦ χαλκοῦ· τὸ διάλυμα τοῦ ὀξαλικοῦ καλίου μὲ ὑπερτεροῦν ὀξύ κατεργαζόμενον διὰ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ ὑδρομυκοῦς σχηματίζει διπλοῦν ἄλας κρυσταλλούμενον ἐν μορφῇ ἀγγίδων.

Τὸ ὀξαλικὸν νικελίον κατασκευάζεται, ἐὰν τὸ ὀξalikὸν ὀξύ διαλυθῇ εἰς διάλυσιν τοῦ νιτρικοῦ νικελίου· εἰς τὴν περίστασιν ταύτην κατ' ὀλίγον ἀποτίθεται πρασίνη κόνις, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ὀλίγον μόνον διαλύσιμος εἰς τὸ ὀξalikὸν ὀξύ.

Τὸ ὀξαλικὸν κοβάλτον εἶναι ῥοδόχρους κόνις, ἀποτελουμένη, ἐὰν διάλυμα τινὸς διὰ τοῦ κοβάλτου ἁλατος ἀποσυντεθῇ διὰ τινος ὀξαλικοῦ ἁλατος.

Χρῆσις. Ἡ ὀξαλικὴ πότασσα μεταχειρίζεται συχνάκις πρὸς ἐξάλειψιν κηλίδων τοῦ σιδήρου προξενουμένων εἰς τὰ ὑφάσματα διὰ τῆς μελάνης, ἢ ἄλλων σιδηρούχων βαφῶν, ἐνίοτε ὡς δροσιστικὸν μέσον εἰς τὴν ἱατρικὴν, ὡς δοκιμαστήριον πρὸς ἀνακάλυψιν καὶ ἀποχώρισιν τῆς τιτάνου ἐκ τῶν ἐνώσεών της.

Τὸ ὀξalikὸν ὀξύ μεταχειρίζεται εἰς τὰ βαφεῖα πρὸς τύπωσιν τῶν ὑφασμάτων καὶ πρὸς ἐξάλειψιν τινῶν χρωμάτων· εἰς δόσιν 8 δραμίων ἐνεργεῖ ὡς δηλητήριον, καὶ ἀντίδοτα εἶναι τὰ εὐδιάλυτα τιτανούχα ἅλατα.

Μηλικὸν ὀξύ.

Acidum malicum.

Τὸ μηλικὸν ὀξύ εὐρίσκεται εἰς τὰ πλείοτερα ὑπόζυνα ῥευστά, καὶ καθάρωτατον εἰς τὰ μῆλα, εὐύσσινα, πέπονας κ. τ. λ. ἠνωμένον δὲ μετὰ τῆς τιτάνου καὶ ἄλλων τινῶν θάσεων εὐρίσκεται εἰς διαφόρους ῥίζας, ξύλα, καὶ εἰς πολλῶν φυτῶν ὀπούς. Παράδοξον εἶναι, ὅτι τὸ μηλικὸν ὀξύ ἀνεκάλυφθη καὶ εἰς τοὺς μύρμηκας.

Τὸ μηλικὸν ὀξύ σχηματίζεται καὶ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῆς ζαχάρως καὶ ἄλλων ὀργανικῶν ὑλῶν. Κατασκευάζεται δὲ ἐκ τοῦ χυλοῦ τῶν μῆλων, ὅστις πρῶτον διὰ ποτάσεως κορεσθεὶς καταβυθίζεται δι' ὀξικοῦ μολύβδου. Τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα, τουτέστι ὁ μηλικὸς μολύβδος, ἀποσυντίθεται μετὰ ταῦτα διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, ἢ διὰ

τοῦ ὑδροθειωμένου αἰρίου. Τὸ οὕτως ἀποχωριζόμενον μηλικὸν ὀξύ ἐξα-
τμίζεται δι' ἐλαφροῦ πυρὸς μέχρι κρυσταλλώσεως.

Ἐπειδὴ ἡ ἀποχώρισις τοῦ καθαροῦ μηλικοῦ ὀξέος ἐκ τῶν μήλων εἶναι
ἀρκετὰ δύσκολος, μεταχειρίζονται καὶ ἄλλους ὑποξύνους καρποὺς πρὸ
πάντων δὲ τοὺς καρποὺς τῆς Ὄης (*Sorbus aucuparia*), καὶ εἰς ἔλλειψιν
αὐτῶν δύνανται νὰ μεταχειρισθῶσι τὰ βύσσινα καὶ ἄλλοι ὑπόξυνοι καρ-
ποί. Πρὸς ἀποχώρισιν τοῦ μηλικοῦ ὀξέος πιέζονται τὰ βύσσινα εἰς λίθι-
νον ἢ ξύλινον ὄλμον καὶ ἐκθλίβεται μετ' ὀλίγας ἡμέρας ὁ χυλὸς, ὅστις
διύλισθεις ἐνοῦται μετ' ὀξικοῦ μολύβδου ἐωσοῦ δὲν ἀποτελεσθῇ θόλωσις.
Τὸ ἀποτελούμενον κατακρήμνισμα ἀποπλύνεται ἀρκετὰ δι' ὕδατος, καὶ
ἀποσυντίθεται, ἀφοῦ πρῶτον ξηρανθῇ, διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου αἰρίου.

Τὸ μηλικὸν ὀξύ ἔχει ὀξινήν γεῦσιν, θερμανθὲν δὲ ἐκπέμπει ὀσμὴν κεκαυ-
μένης ζαχάρως· διῤγραίνεται καὶ ῥευστοῦται εἰς τὸν ἀέρα, εἰς τὸ ὕδωρ
καὶ εἰς τὸ οἶνόπνευμα εὐκόλως διαλύεται, καὶ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς
ὀξαλικὸν ὀξύ μεταβάλλεται.

Ἐὰν τὸ μηλικὸν ὀξύ ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν εἰς πῆλινον ἀποστακτικὸν
σκεῦος, ἐξαχνίζεται ἐμπυρευματικὸν ὀξύ εἰς εἶδος ἐπιμήκων ἀγγίδων, ὅξειαν
καὶ ὀσμειαν γεῦσιν ἐχουσῶν, τὸ ὀξύ τοῦτο ἐπονομάζεται πυρομηλικὸν
ὀξύ.

Τὸ μηλικὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τῶν βάσεων καὶ τὰ ἀποτελούμενα ἄλατα
καλοῦνται *μηλικά ἄλατα*, εἶναι δὲ εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, ἐξοιδρῶνται εἰς
πῦρ καὶ ἀποσυνθέτονται εἰς τὴν θερμότητι.

Τὰ διὰ μηλικοῦ ὀξέος ἄλατα κατασκευάζονται διὰ τῆς ἀμέσου ἐνώ-
σεως τούτου διὰ τοῦ κόρου τοῦ ὀξέος μετὰ διαφόρων βάσεων ἢ καὶ διὰ τῆς
διπλῆς συγγενείας, ἔγουν διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τῆς μηλικῆς ποτάσης
δι' ἐτέρου ἄλατος, καθὼς π. χ. ἀποτελεῖται ὁ μηλικὸς χαλκός, ὁ μηλι-
κὸς μόλυβδος, διὰ τῆς ἀμοιβαίας ἀποσυνθέσεως τῆς μηλικῆς ποτάσης
μετὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου.

Ἄπαντα τὰ διὰ τῶν γαιῶν, ἢ καὶ τὰ διάφορα διὰ τῶν μεταλλικῶν ὀξει-
δίων ἀποτελούμενα ἄλατα διὰ μηλικοῦ ὀξέος εἶναι εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτα
ἰζήματα, διαλυόμενα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ διὰ τοῦ ὑπερτεροῦντος μηλικοῦ ὀξέος.
Μεταξὺ τῶν διὰ μηλικοῦ ὀξέος ἀλάτων εἶναι χρήσιμα εἰς τὴν ἱατρικὴν.
Ὁ μηλικὸς ὑποξειδωμένος σίδηρος ὑπὸ τὸ ὄνομα *Extractum ferri*
pomatum καθὼς καὶ τὸ διάλυμά του δι' οἶνοπνεύματος ὑπὸ τὸ ὄνομα
Tinctura ferri pomata ὁ μηλικὸς σίδηρος ἀποτελεῖται διὰ τῆς διαλύ-
σεως ῥινισμάτων τοῦ σιδήρου εἰς τὸν χυλὸν ὑποξύνων μήλων.

Acidum benzoicum.

Τούτο τὸ όξύ περιεγράφη κατὰ τὸ 1708 παρὰ τοῦ *Blaese di Vigenere* ὑπὸ τὸ ὄνομα ἄνθος βενζοϊκόν. Ἀπαντᾷται εἰς τὴν βενζόην, εἰς τὸ περουβικόν καὶ τολονταϊκόν βάλαμον, εἰς τὸν τοῦ κιννάμωμου φλοιόν, εἰς τὴν βαννίλαν, εἰς τὰ ἄνθη τοῦ μελιλώτου, εἰς τὸ οὔρος τῶν ἀγελάδων, τῶν ἵππων, τῶν καμήλων, τοῦ ῥινοκέρου, καθὼς καὶ εἰς μερικὰ φυτὰ κ. λ. π.

Τὸ βενζοϊκόν όξύ δύνανται νὰ κατασκευασθῇ, ἐὰν προσεκτικῶς θερμάνωμεν τὴν βενζόην εἰς χύτρην, τῇς ὁποίας τὸ στόμιον καλύπτεται μὲ κο νοσιδῶς περιτυλιγμένον χάρτην· τὸ όξύ ἐξαχνίζεται εἰς εἶδος ἀγγίδων σιλ πνῶν ὡς ὁ ἄργυρος· ὁ χάρτης ἀλλάσσεται, ἀποξηρμένον τῶν κρυστάλλων διὰ πτεροῦ. Ἄλλη μέθοδος εἶναι ἡ ἐξῆς· λειοτριβθεῖσα βενζόη ζέσται μεθ' ἐνὸς μέρους τιτάνου καὶ 50 ὕδατος, ἡ οὕτω πορισθεῖσα βενζοϊκὴ τί τανος διῦλισθεῖσα καὶ ἐξατμισθεῖσα ἀποσυντίθεται δι' ὕδροχλωρικοῦ όξέος· ὡσαύτως κατασκευάζεται τὸ βενζοϊκόν όξύ διὰ τῆς ζέσεως τῆς βενζόης μὲ ἀνθρακικὴν πότασσαν ἔχουσαν βάρος τὸ $\frac{1}{10}$ τῆς βενζόης· οὕτω πο ρίζεται βενζοϊκὴ πότασσα, ἥτις δι' ὕδροχλωρικοῦ όξέος κεκραμένου ἀπο συντίθεται.

Ἄν θέλωμεν νὰ ἐξάξωμεν τὸ βενζοϊκόν όξύ ἀπὸ οὔρος τῶν καμήλων ἢ τῶν ἵππων, εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἡνωμένον μὲ πότασσαν ἢ σόδαν, χύ νομεν εἰς τὸ ἐξατμιζόμενον οὔρος κατ' ὀλίγον ὕδροχλωρικόν όξύ, ἕωσοῦ παύσῃ ἀπὸ τοῦ νὰ καταβυθίζεται τὸ βενζοϊκόν όξύ. Ἡ μετ' αὐτοῦ κατα βυθισθεῖσα χρωματιστικὴ ὕλη ἀφαιρεῖται διὰ τοῦ νιτρικοῦ όξέος καὶ ἀκολούθως καθαρίζεται τὸ όξύ διὰ τῆς ἐξαχνίσεως.

Τὸ ἐκ τῶν οὔρων τῶν ἵππων κατασκευαζόμενον βενζοϊκόν όξύ καλεῖ ται (*acidum Hippuricum*) *ἵπποβενζοϊκόν* όξύ.

Χαρακτηριστικά. Τὸ διὰ τῆς κρυσταλλώσεως ἀποτελούμενον όξύ εἶναι κρύσταλλοι στιλπνοὶ θελονοειδεῖς, περιέχοντες πολὺ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, καὶ διὰ ταῦτα ἀναθυμιῶντες βαλαμικὴν ὁσμὴν. Εἶναι πικροὶ τὴν γέυσιν, καὶ ἀμετάβλητοι εἰς τὸν ἀέρα, διαλύσιμοι εἰς 200 μέρη ψυχροῦ ὕδατος, καὶ εἰς 2 $\frac{1}{2}$ οἶνοπνεύματος. Ἐὰν τὸ βενζοϊκόν όξύ θερμανθῇ διὰ πρᾶου πυρὸς, ἀναθυμιᾶται εἰς εἶδος ἀτμῶν λευκῶν, διε γειρόντων πταρμῶν καὶ βῆχα, διὰ τοῦ θειικοῦ όξέος ἀκράτου διαλύεται, καὶ ἀμφοτέρα τὰ όξέα ἐνοῦνται πρὸς ἰδιαιτέρον όξύ *θειϊκόν βενζοϊκόν*

ὁξὺ καλούμενον. Σπανίως μεταχειρίζονται τὰ οὕτω καλούμενα ἄνθη τῆς βενζόης εἰς τὴν ἰατρικὴν. Συνίσταται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης 1 ατ. 90 — 75

Ὑδρογόνου 6 ατ. 6 — 5

Ὄξυγόνου 3 ατ. 24 — 20

120 — 100

Τὰ διὰ βενζοϊκοῦ ὀξέος ἄλατα εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐκ τῶν διαλύσεων των καταβυθίζουσι τὰ ἐκ τῶν ὀρυκτῶν ὀξέα τὸ βενζοϊκὸν ὁξὺ.

Τὰ διὰ βενζοϊκοῦ ὀξέος ἄλατα καθὼς τὸ βενζοϊκὸν κάλιον, τὸ νάτριν, ἡ ἀμμωνία κ. τ. λ. ἀποτελοῦνται διὰ τῆς ἀμέσου διαλύσεως τοῦ εἰρημένου ὀξέος ὑπὸ τῶν ἀλκαλίων, τὰ δὲ λοιπὰ, ὡς ὁ βενζοϊκὸς μόλυβδος, ὑδράργυρος, κ. τ. λ. ἀποτελοῦνται διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως διαλυσίμου τινὸς ἄλατος διὰ τινος μεταλλικοῦ. Εἰς τὴν ἀναλυτικὴν χημείαν μεταχειρίζομεθα ἐνίοτε τὴν βενζοϊκὴν πότασσαν, ἢ τὴν βενζοϊκὴν ἀμμωνίαν πρὸς ἀποχώρισιν τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου ἀπὸ ἄλλα μέταλλα.

Τὸ βενζοϊκὸν ὁξὺ καθὼς καὶ τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα ὑπόκεινται εἰς τινὰς ἀποσυνθέσεις, οὕτω λ. χ. ἐὰν βενζοϊκὴ τίτανος μεθ' ὑπερτερούσης τιτάνου ἀποσταχθῇ, ἀπολαμβάνεται ἐλαιώδης ρευστὸν ἔχον ἰδιαιτέραν ὀσμὴν, τὸ ὁποῖον, ἐὰν τεθῇ εἰς ψυχρὸν τόπον, πήγνυται καὶ σχηματίζει κρυσταλλώδη μάζαν, ἥτις καλεῖται benzin. Ἡ ῥηθεῖσα ὕλη ἐνουμένη μετὰ διαφόρων ὀξέων, ὡς μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος παρέχει ἐνώσεις, αἵτινες σύγκεινται ἐξ αὐτῆς καὶ τῶν ὀξέων ἢ τῶν στοιχείων αὐτῶν. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος παράγεται nitrobenzin, διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ χλωρίου τὸ chlorbenzin, διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ βρωμίου τὸ brombenzin.

Ἐὰν τὸ λεῖψυδρον θεϊκὸν ὁξὺ ἀναμιχθῇ μετὰ τῆς ὕλης ταύτης σχηματίζει γλίσχραν τινὰ μάζαν, ἥτις ἀναμιχθεῖσα μετὰ πολλοῦ ὕδατος παρέχει ἰδιαιτέραν ἔνωσησιν ἐκ benzin καὶ θεϊκοῦ ὀξέος καλουμένην sulphobenzin.

Ἄλλη ὕλη ἀποτελουμένη διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ βενζοϊκοῦ ὀξέος εἶναι τὸ Benzon, τὸ ὁποῖον ἔχει ἐλαιώδη συστάσιν καὶ ἐξάγεται ἐὰν βενζοϊκὴ τίτανος ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν.

Ἡλεκτρικὸν ὁξὺ.

Acidum succinicum.

Τὸ ἡλεκτρικὸν ὁξὺ περιέγραψεν πρῶτον ὁ Agricola ὑπὸ τὸ ὄνομα sal

succini· εὐρίσκεται εἰς τὸ ἤλεκτρον ἠνωμένον μετὰ ῥητίνης καὶ ἐλαίου, δύναται ὅμως νὰ προαχθῇ καὶ διὰ τῆς ἀποστάξεως διαφόρων εἰδῶν τερεβινθίνης. Συνήθως κατασκευάζεται τὸ ἠλεκτρικὸν ὀξύ διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τοῦ ἡλέκτρου εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος· ἀποσταζομένου πρῶτον ὕδατος καὶ ὀξικοῦ ὀξέος, ἐξαχνίζεται τὸ ὀξύ συνοδευόμενον μετὰ τινος ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου καὶ ὑπὸ ἐκλυσιν ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ διττο-ὑδρογονο-ἀνθρακούχου αἰρίου.

Τὰ διάφορα εἶδη τοῦ ἡλέκτρου δίδουσιν καὶ διαφορετικὸν ποσὸν ὀξέος καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 1 λίτρα ἡλέκτρου 1 $\frac{1}{2}$ ἕως 6 δράμιαι ἠλεκτρικοῦ ὀξέος.

Τὸ διὰ τῆς ἐξαχνίσεως ἀπολαμβανόμενον ἠλεκτρικὸν ὀξύ ἐμπεριέχει ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον καὶ δύναται νὰ καθαρισθῇ, ἐὰν διαλυθῇ εἰς ὕδωρ καὶ κορενόμενον μετὰ ποτάσεως ζεσθῇ μετ' ἀνθρακος. Τὸ ἠλεκτρικὸν κάλιον ἀποσυντίθεται δι' ὀξικοῦ μολύβδου καὶ ἐκ τοῦ ἠλεκτρικοῦ μολύβδου ἀποχωρίζεται τὸ ἠλεκτρικὸν ὀξύ, διὰ θειικοῦ ὀξέος κεκραμένου· καθαρίζεται δὲ ἐὰν ζεσθῇ μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος ἀκράτου, δι' οὗ φθείρεται τὸ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον ὅχι δὲ τὸ ὀξύ.

Χαρακτηριστικά. Τὸ ἠλεκτρικὸν ὀξύ σχηματίζει ἀχρόους ἢ διαφανεῖς κρυστάλλους, ἐμπεριέχοντας 21 τοῖς 0/0 ὕδατος, ἔχει ἰδιαιτέραν ὀξινήν γεῦσιν, ὁσμὴν ὁμοιάζουσαν τὴν τοῦ ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου. Ἄν τὸ ὀξύ ᾔηται καθαρὸν καὶ δὲν ἐμπεριέχῃ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, εἶναι πτητικὸν καὶ δύναται νὰ ἐξαχνισθῇ ἄνευ ὑπολείμματος· 25 μέρη ψυχροῦ καὶ 3 ζέοντος ὕδατος διαλύουσιν 1 μέρος ἠλεκτρικοῦ ὀξέος· εἰς τὸ ψυχρὸν οἶνόπνευμα εἶναι δυσδιάλυτον, διαλύεται δὲ εἰς $\frac{1}{2}$ μέρος ζέοντος οἶνοπνεύματος· δὲν ἀποσυντίθεται μήτε διὰ τοῦ νιτρικοῦ, μήτε διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος.

Τὸ ἠλεκτρικὸν ὀξύ συνίσταται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	4 ατ.	24 — 48
Ὑδρογόνου	2 ατ.	2 — 4
Ὄξυγόνου	3 ατ.	24 — 48

50 — 100

Τὰ διὰ ἠλεκτρικοῦ ὀξέος ἄλατα ἀποσυντίθενται, διὰ τῆς θερμότητος σχηματίζονται ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ ὑδρογονοανθρακούχον αἶριον, ὀξικὸν ὀξύ, ὕδωρ, καὶ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, ἐκ τοῦ ὁποίου δι' ἀποστάξεως ἀπολαμβάνεται λεπτόρευστον ἔλαιον καλούμενον *succinon*.

Τὰ πλείοτερα τῶν δι' ἠλεκτρικοῦ ὀξέος ἀλάτων ὡς ἡ ἠλεκτρικὴ πότασ-

σα, σόδα, άμμωνία. κ. τ. λ. άποτελοῦνται διὰ τῆς άμέσου διαλύσεως τοῦ ηλεκτρικοῦ ὀξέος ὑπὸ τῶν εἰρημένων βάσεων· τὰ δὲ δι' ηλεκτρικοῦ ὀξέος μεταλλικὰ ἄλατα λαμβάνονται διὰ τῆς άποσυνθέσεως τῶν εὐδιαλυσίμων ἁλάτων τοῦ ηλεκτρικοῦ ὀξέος ὑπὸ τῶν διαλυμάτων τῶν μετάλλων.

Τὸ ηλεκτρικὸν ὀξύ μεταχειρίζεται κεκορεσμένον δι' ἔμπυρευματικῆς άμμωνίας εἰς τὴν ικτρικὴν ὡς άντισπασμωδικὸν ιαματικὸν μέσον εἰς δὲ τὴν ἀναλυτικὴν χημεῖαν πρὸς ἀποχώρισιν τοῦ σιδήρου ἀπὸ τὸ μαγγανήσιον.

Ἐπειδὴ τὸ ηλεκτρικὸν ὀξύ εἶναι πολύτιμον, εὐρίσκεται τὸ άγοραῖον ὀξύ συνήθως νενοθευμένον· ἐνίοτε κατασκευάζεται τεχνητὸν ὀξύ ἐκ τρυγικοῦ ὀξέος, ἢ ἐκ θεικῆς ποτάσεως ὀξινῆς καὶ ἔμπυρευματικοῦ ἐλαίου τοῦ ηλεκτροῦ. Τὸ ηλεκτρικὸν ὀξύ δύναται νὰ ἐξετασθῇ ὡς πρὸς τὴν καθαρότητά του, ἐὰν θερμανθῇ εἰς ἐκ λευκοχρόσου κοχλιάριον, ὅπου ἐξαχνίζεται ὁλοτελῶς τὸ ηλεκτρικὸν ὀξύ, ἐνῶ τὸ νενοθευμένον ὑπολείπη ἢ ἄνθρακα ἢ τὴν θεικὴν ποτάσσαν· ἐνίοτε συνίσταται τὸ νενοθευμένον ὀξύ ἐξ ὕδροχλωρικῆς άμμωνίας ἀναμεμιγμένης μετ' ἔμπυρευματικοῦ ἐλαίου τοῦ ηλεκτροῦ· τοιοῦτον ὀξύ ἀναθυμιᾶται μὲν διὰ τῆς θερμάνσεως, ἐκλύει δὲ ὁσμὴν ὁμοίαν τῆς άμμωνίας, ἐὰν ἀναμιχθῇ μετὰ τιτάνου.

Κινικὸν ὀξύ.

Acidum Kinicum.

Τὸ ὀξύ τοῦτο ἀπαντᾶται εἰς τὸν φλοιὸν τῆς κίνας ἠνωμένον μετὰ τῆς τιτάνου, καθὼς καὶ μετὰ τῆς κίνης καὶ κιγχωνίνης· πρὸς τούτοις εὐρίσκεται καὶ εἰς τὸν φλοιὸν τῆς πεύκης. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὀξέος ἐξατμίζεται ἔμβρεγμα ψυχρὸν τοῦ φλοιοῦ τῆς κίνας μέχρι ξηροῦ, τὸ ὅποιον ἔπειτα κατεργάζεται δι' οἶνοπνεύματος. Τὸ ἀδιάλυτον παρὰ τοῦ οἶνοπνεύματος ὑπόλειμμα σύγκειται ἐκ κινικῆς τιτάνου καὶ κόμμεως.

Ἐὰν διαλυθῇ τὸ ὑπόλειμμα τοῦτο δι' ὕδατος καὶ ἐξατμισθῇ τὸ ρευστὸν, κρυσταλλοῦται ἡ κινικὴ τίτανος μετ' ὀλίγας ἐβδομάδας· ἀφοῦ αὕτη ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὸ ἐπιπολάζον ρευστὸν, άποσυντίθεται διὰ τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ ὀξάλικοῦ ὀξέος. Ἀποσυντίθεται δὲ ἡ κινικὴ τίτανος καὶ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, ὁ δὲ άποτελούμενος κινικὸς μολύβδος άποχωρίζεται διὰ τοῦ ὕδροθειωμένου ἀερίου.

Χαρακτηριστικά. Κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος φυλλιδίων, τὰ ὅποια εἶναι

ἀμετάβλητα εἰς τὸν ἀέρα· θερμανθὲν τήκεται μὲν, ἀλλὰ δὲν ἐξαχνίζεται καὶ εἶναι πολὺ εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ.

Τὰ διὰ τοῦ κινικοῦ ὀξέος προαχθέντα ἅλατα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ κατὰ μέγα μέρος κρυσταλλώσιμα, ἀποσυντίθενται δὲ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου.

Ἐὰν τὸ κινικὸν ὀξύ καθυποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν καὶ τὸ εἰς τὸ δοχεῖον συναχθὲν ῥευστὸν ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ ἐπιπολάζοντος ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου καὶ ἐξατμισθῇ διὰ πρᾶου πυρὸς, σχηματίζονται κρύσταλλοι ἀνήκοντες εἰς ἰδιαιτέρον ὀξύ καλούμενον πυροκινικὸν ὀξύ.

Τὸ πυροκινικὸν ὀξύ σχηματίζει μὲν μετὰ τῶν ἀλκαλίων παρομοίως εὐδιάλυτα ἅλατα, διαφέροντα ὅμως τῶν κινικῶν ἀλάτων, καθότι ἀποτελοῦν εἰς τὸ διάλυμα τοῦ θεϊκοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου ὠραῖον πράσινον καταβύθισμα.

Τὰ διαλύματα τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου καὶ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου ὀλίγον μόνον θολοῦνται.

Μηκωνικὸν ὀξύ.

Acidum meconicum.

Τὸ μηκωνικὸν ὀξύ ἀνεκαλύφθη κατὰ τὸ 1816 παρὰ τοῦ Serturner καὶ μέχρι τοῦδε δὲν εὐρίσκετο εἰμὴ μόνον εἰς τὸ ὄπιον καὶ εἰς τὰς κωδίας. Κατασκευάζεται δὲ ἐὰν ἔμβρεγμα ὀπίου ἐνωθῇ μετὰ ῥευστῆς ἀμμωνίας, δι' ἧς ἀποχωρίζεται ἡ μορφίνη, τὸ δὲ μηκωνικὸν ὀξύ ἐνούμενον μετὰ τῆς ἀμμωνίας σχηματίζει μηκωνικὴν ἀμμωνίαν· αὕτη ἐπομένως ἀποσυντίθεται διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρείας, ἕως οὗ δὲν προάγεται θόλωσις· τὸ τοιοῦτον λοιπὸν κατακρήμνισμα συνιστάμενον ἐκ μηκωνικῆς βαρείας ἀποσυντίθεται διὰ θεϊκοῦ ὀξέος κεκαυμένου, ἀφοῦ πρῶτον ἀποπλυθῇ δι' ὕδατος καὶ οἶνοπνεύματος· τὸ θεϊκὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τῆς βαρείας καὶ ἀποχωρίζει τὸ μηκωνικὸν ὀξύ. Ἐὰν τὸ ῥευστὸν τοῦτο διὰ πρᾶτάτου πυρὸς ἐξατμισθὲν τεθῇ εἰς ψύχος συμπηγνύονται κρύσταλλοι, οἵτινες διὰ δευτέρας διαλύσεως καὶ κρυσταλλώσεως καθαρίζονται.

Τὸ ὀξύ τοῦτο ἀπολαμβάνεται καὶ διὰ τῆς ἀκολουθοῦ μεθόδου· τὸ ἔμβρεγμα τοῦ ὀπίου ζέεται μετὰ κεκαυμένης μαγνησίας ἥτις ἀποτελεῖ καταβύθισμα συνιστάμενον ἐκ μορφίνης καὶ μηκωνικῆς μαγνησίας καὶ πρὸς διάλυσιν τῆς μορφίνης κατεργάζεται τὸ ἵζημα διὰ ζέοντος οἶνοπνεύματος· ἡ δὲ ἀδιάλυτος ἐπιμένουσα μηκωνικὴ μαγνησία διαλύεται εἰς θεϊ-

κόν οξύ και τὸ διάλυμα ἀποσυντίθεται δι' ὑδροχλωρικῆς βαρείας· τὸ ἀποπλυνόμενον καταβύθισμα σύγκεται ἐκ θειϊκῆς καὶ μηχανικῆς βαρείας, ἥτις διὰ τοῦ θειϊκοῦ οξέος ἀποσυντίθεται, τὸ ἀποχωρισθὲν μηχανικὸν οξύ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ἀποθέτει κρυστάλλους.

Ὡσαύτως δύναται νὰ κατασκευασθῇ τὸ εἰρημένον οξύ, ἐὰν ἐμβρεγμα ὀπίου καταβυθισθῇ δι' ὀξικοῦ μολύβδου καὶ τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα, τὸ ὁποῖον σύγκεται ἐκ μηχανικοῦ μολύβδου ἀποσυντεθῇ δι' ὑδροθειωμένου ἀερίου. Τὸ μηχανικὸν οξύ εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, μεταβάλλει τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου, ἔχει πολὺ πικρὰν γεῦσιν καὶ δὲν ἐπιφέρει δηλητηρίασιν· θερμαινόμενον μέχρι τῶν 110°P μεταβάλλεται ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ἀνθρακικοῦ οξέος εἰς πυρομηχανικὸν οξύ, τὸ ὁποῖον ἐξαχνίζεται· διαλυόμενον εἰς τὸ οἰνόπνευμα κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος φυλλιδίων· ἐὰν ἀναμιχθῇ μὲ διάλυσιν τοῦ χρυσοῦ καὶ θερμανθῇ, ἀποκατασταίνει τὸν χρυσὸν εἰς μεταλλικὴν κατὰστασιν· δίδει εἰς τὰ διαλύματα τοῦ σιδήρου αἵματόχρουν χρῶμα, καὶ γραμμένος χάρτης ἐμβαθεῖς εἰς διάλυσιν τοιούτων ἀλάτων ἢ ἀλειφθεὶς λαμβάνει αἰμοβαφεῖς χρῶμα.

Τὰ διὰ σιδήρου ἄλατα λαμβάνουν διὰ τοῦ μηχανικοῦ οξέος αἵματόχρουν χρῶμα. Μετὰ τῆς ποτάσεως, σόδας, ἀμμωνίας σχηματίζει ἄλατα κρυσταλλώσιμα εἰς τὸ ὕδωρ εὐδιάλυτα, ἀδιάλυτα ὅμως εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς θερμότητος ἐπὶ τοῦ μηχανικοῦ οξέος ἀποτελοῦνται.

α) Τὸ κομηρικὸν οξύ (*acidum comenicum*)· ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦ μηχανικοῦ οξέος ζέεται χρόνον τινὰ, σχηματίζεται τοῦτο τὸ νέον οξύ ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ἀνθρακικοῦ οξέος. Τὸ βρευστὸν ὀλίγον κατ' ὀλίγον βάφεται φαῖον καὶ ἀποθέτει μετὰ τὴν ἀπόψυξιν ἐρυθροὺς κρυστάλλους, οἵτινες ἀναδιαλυόμενοι εἰς βραστὸν ὕδωρ καὶ κατεργαζόμενοι μὲ ζωάνθρακα δύνανται νὰ λευθῶσιν ἄχρους. Κρυσταλλοῦται εἰς σκληροτάτους κόκκους, εἶναι δυσδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἀπαιτεῖ 16 μέρη βραστοῦ ὕδατος πρὸς διάλυσιν. Ἀπὸ τὰ κομηρικὰ ἄλατα κατασκευάσθη μέχρι τοῦδε μόνον ἡ κομηρικὴ ποτάσσα, ἥτις εἶναι ἄλλας δυσδιάλυτον καὶ ὁ κομηρικὸς σίδηρος ἄλλας ὁμοιάζον τὸν μηχανικὸν σίδηρον. Ὁ κομηρικὸς ἄργυρος καὶ μολύβδος εἶναι ἄλατα ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ.

β'.) Τὸ πυρομηχανικὸν οξύ (*acidum pyromeconicum*), καὶ τὸ ὁποῖον γεννᾶται εἰς τὸ τέλος τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τοῦ μηχανικοῦ οξέος, εἶναι δυσδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐξαχνίζεται εἰς πτερωτοὺς κρυστάλλους, οἵτινες

εἰς τὴν ἐξάχνισιν ἐνίοτε διαλύονται καὶ ἐξαλείφονται, χρωματίζει καὶ τὰ προμνησθέντα τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἅλατα ἐρυθρᾶ.

Βυρσοδεφικὰ ὀξέα.

Acida tannica.

Εἰς τοὺς φλοιοὺς τῶν δένδρων, εἰς πολλὰς ρίζας καὶ εἰς ἄλλα μέρη τῶν φυτῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι στυπτικά τὴν γεῦσιν εὐρίσκεται ἰδιαίτερον εἶδος ὀξέων τὰ λεγόμενα *βυρσοδεφικὰ*, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ ἐξῆς γενικὰ ιδιώματα. Κοκκινίζουν τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην, εἶναι στυπτικά, ὅχι δὲ ὀξινὰ τὴν γεῦσιν, καταβυθίζουν τὰς διαλύσεις τοῦ ζωτικοῦ πηκτώματος καὶ τοῦ λευκώματος, καὶ ἐνοῦνται μετὰ τῆς ἰνὸς τοῦ κρέατος καὶ τῶν δερμάτων, τὰ ὁποῖα μεταβάλλονται διὰ τῆς ζέσεως εἰς πῆκτωμα· ἐκ τῆς ἐνώσεως ταύτης γίνονται τὰ βυρσοδεφώμενα δέρματα ἢ τὸ σκῆτος. Πρὸς τούτοις ἐνοῦνται τὰ βυρσοδεφικὰ ὀξέα μετὰ τῶν ἐξ ὀρυκτῶν ὀξέων, εἰς δὲ τὰς ἐνώσεις ταύτας δεκνύουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν βάσεων· διὰ τοῦτο ἐγνωρίζοντο πολὺν καιρὸν καὶ ὑπὸ τὸ ὄνομα *βυρσοδεφικῆ ὕλη tannine*.

Μέχρι τοῦδε γνωρίζομεν τέσσαρα εἶδη βυρσοδεφικῶν ὀξέων, τὸ *δρυοβυρσοδεφικὸν ὀξύ Acidum quercitaunicum*, τὸ ὁποῖον μελανίζει τὰ δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἅλατα, τὸ *κιγχοβυρσοδεφικὸν ὀξύ A. cincho tanicum*, τὸ *μιμοβυρσοδεφικὸν ὀξύ, A. mimotanicum* καὶ τὸ *κοκκοβυρσοδεφικὸν ὀξύ A. coccotannicum*, τὰ ὁποῖα πρασινίζουν τὰ δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἅλατα.

Δρυοβυρσοδεφικὸν ὀξύ.

Acidum quercitanicum.

Τοῦτο τὸ βυρσοδεφικὸν ὀξύ εὐρίσκεται τόσον εἰς τὸ ξύλον καὶ εἰς τὴν ρίζαν, ὅσον εἰς τὸν φλοιὸν καὶ εἰς τὰ φύλλα τῆς δρυὸς (*quercus*), εἰς μεγάλην ποσότητα ὅμως ἐμπεριέχεται εἰς τὰς κηκίδας.

Τὸ τῶν κηκίδων ἐκχύλισμα δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς μετρίως καθαρὸν βυρσοδεφικὸν ὀξύ ἐμπεριέχον μόνον κηκιδικὸν ὀξύ, ἅλατά τινα ἐκ τιτά-νου ἢ καλίου καὶ ἐκ κηκιδικοῦ ἢ τοῦ αὐτοῦ βυρσοδεφικοῦ ὀξέος καὶ βα-θύφαιον δυσδιάλυτον οὐσίαν σχηματιζομένην διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ αἵρος ἐπὶ τοῦ βυρσοδεφικοῦ ὀξέος. Πρὸς ἀποχώρισιν τῶν ἑτερογενῶν τούτων

σωμάτων κατεργάζομεν τὰς κηλίδας δι' αἰθέρος, ὅστις διαλύει μόνον τὸ βυρσοδεψικὸν ὀξύ. Πρὸς τοῦτο θέτομεν ἐπὶ λαγίνου μακρὸν καὶ κενὸν χωνίον, εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ ὁποίου, ἀφοῦ διὰ βαμβάκιου καλῶς κλεισθῇ, στιβά- ζονται λειοτετριμμέναι κηλίδες, πληροῦμεν ἔπειτα τὸ χωνίον μὲ ἔνυδρον αἰθέρα καὶ τὸ ἐπιποματιζόμεν. Μετὰ τινα καιρὸν κατασταλάζει εἰς τὴν λάγνην ρευστὸν συγκείμενον ἐκ δύο στιβάδων, τῶν ὁποίων ἡ μὲν κάτω εἶναι διάλυσις τοῦ βυρσοδεψικοῦ ὀξέος εἰς ὕδωρ καὶ ὀλίγος αἰθέρ, ἡ δὲ ἄνω ἐμπεριέχει σχεδὸν καθαρὸν αἰθέρα. Ἀμφοτέραι αἱ στιβάδες ἀποχωρίζονται, ἡ δὲ κάτω ἀποπλύνεται δις ἢ τρίς μὲ καθαρὸν αἰθέρα καὶ ξηραίνεται ἡ διὰ μαλακῆς θερμότητος ἡ εἰς ἀερόκενον τόπον· ἐξατμιζομένου τοῦ αἰθέ- ρος καὶ τοῦ ὕδατος ἐπιμένει σπογγώδης, κρυσταλλώσιμος, λευκὴ καὶ στιλ- πνίζουσα μάζα, ἥτις εἶναι καθαρὸν δρυοβυρσοδεψικὸν ὀξύ. Αἱ κηλίδες ἐμπεριέχουσιν 35 ἕως 40 τοῖς 0/0 ὀξέος.

Τὸ δρυοβυρσοδεψικὸν ὀξύ δύναται νὰ κατασκευασθῇ καὶ κατὰ τὰς ἐξῆς μεθόδους, κατὰ τὰς ὁποίας δὲν λαμβάνεται μὲν εἰς τόσον καθαρὰν κατὰ- στασιν ὡς κατὰ τὴν προηγουμένην, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μετρίως καθαρὸν, κεχρωματισμένον μόνον διὰ τῆς ὠχρεᾶς οὐσίας, ἥτις σχηματίζε- ται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ αἵρος ἐπὶ τοῦ βυρσοδεψικοῦ ὀξέος.

α.) Τὸ διὰ ψυχροῦ ὕδατος ἔμβρεγμα τῶν κηλίδων διυλίζεται καὶ συμμιγνύεται μὲ τόσῃ κχυστικῇ ἀμμωνίαν, ὥστε νὰ ὑπερτερῇ ὀλίγον τὸ ὀξύ· μετὰ ταῦτα προστίθεται διαλελυμένη ὑδροχλωρικὴ βαρεῖα, ἐνό- σφ καταβυθίζεται δι' αὐτῆς Ἱζημα. Τὸ εἰς πεπληρωμένην καὶ κεκλεισμέ- νην λάγνην καθαριζόμενον ρευστὸν ἀποχύνεται, ἡ δὲ ἔνωσις τοῦ βυρσοδε- ψικοῦ ὀξέος μετὰ τῆς βαρεῖας ἀποπλύνεται ἐπὶ ὑλιστῆρος μὲ ψυχρὸν ὕδωρ καὶ διαλύεται εἰς ὀξικὸν ὀξύ. Ἡ διυλισθεῖσα διάλυσις καταβυθίζεται δι' ὑποξικοῦ μολύβδου καὶ τὸ Ἱζημα ὑγρὸν ἔτι ὄν καὶ μεμιγμένον μὲ ὕδωρ, ἀποσυντίθεται δι' ὑδροθειωμένου αἵριου.

β.) Θερμὸν καὶ ἄκρατον ἔμβρεγμα τῶν κηλίδων διὰ λίνου διυλίζε- ται καὶ ἐκθλίβεται· εἰς τὸ θολῶδες ρευστὸν σταλάζεται ὑπὸ ταχείας ἀνα- κινήσεως ὀλίγον κεκραμένον θεικὸν ὀξύ, δι' οὗ καταβυθίζονται τὰ τὸ ρευ- στὸν θολώσαντα μόρια καὶ μετὰ ταῦτα καθαρίζεται εὐκόλως διὰ τῆς διυλίσσεως. Τὸ ρευστὸν συμμιγνύεται μὲ διάλυσιν ἀνθρακικοῦ καλίου, ἐνόσφ καταβυθίζεται δι' αὐτοῦ λευκὸν Ἱζημα, συγκείμενον ἀπὸ βυρσοδε- ψικὸν κάλιον· τοῦτο ἀποπλύνεται μὲ πολλὰ ψυχρὸν ὕδωρ καὶ διαλύεται εἰς ζέον κεκραμένον ὀξικὸν ὀξύ· τὸ ἀποψυχρανθὲν διάλυμα συμμιγνύεται μὲ ὑποξικὸν μολύβδον καὶ τὸ δι' αὐτοῦ Ἱζημα ἀποσυντίθεται δι' ὕδρο-

θειωμένου αερίου κατὰ τὸν προῤῥηθέντα τρόπον. Τὸ ληφθὲν ὑελοφανὲς ῥευστὸν ἀποχωρίζεται διὰ διϋλίσεως ἀπὸ τὸν ἔνθειον μόλυβδον καὶ ἐξατμίζεται εἰς τὸ κενὸν ἐπὶ ἀνθρακικοῦ καλίου, τὸ ὅποιον ἀπορρόφῃ ὄχι μόνον τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπερτεροῦν ὑδροθειωμένον αέριον.

γ.) Θερμὸν καὶ ἄκρατον ἔμβρεγμα τῶν κηκίδων καθαρίζεται διὰ θειικοῦ ὀξέος κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον, διϋλίζεται μετὰ ταῦτα καὶ συμμιγνύεται κατ' ὀλίγον μὲ ἄκρατον θεικὸν ὀξύ, καὶ τὸ δι' αὐτοῦ καταβυθίζομενον συμπύγνυται μετὰ μίαν ὥραν πρὸς ὥχραν ἢ φαῖαν ῥητινώδη μάζαν. Αὕτη ἡ μάζα εἶναι ἔνωσις τοῦ θυρσοδεψικοῦ καὶ τοῦ θειικοῦ ὀξέος μετ' ἄλλης τινὸς οὐσίας δι' ἧς καθίσταται ῥητινώδης. Τὸ ὑελοφανὲς ἀποχυθὲν ῥευστὸν συμμιγνύεται ἐκ νέου μὲ ἄκρατον θεικὸν ὀξύ ἕως οὗ νὰ μὴν ἀποχωρίζωνται ὥχραι κροκίδες, αἵτινες ἀποπλύνονται ἐπὶ ὑλιστῆρος μὲ πολὺ κεκραμένον θεικὸν ὀξύ καὶ ἐκθλίβονται δι' ἐμπορικοῦ χάρτου, μετὰ τοῦ ὅ χάρτης δὲν διῶγναινεταί. Μετὰ ταῦτα διαλύεται ἡ ἐκθλιφθεῖσα μάζα εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, εἰς δὲ τὴν διάλυσιν προστίθεται κατὰ μικρὸν λειοτετριμμένος ἀνθρακικὸς μόλυβδος, ἐνόσω γίνεται δι' αὐτοῦ ἀναθρασμός, καὶ ἀφοῦ τὸ ῥευστὸν κατεργασθῇ ἀκόμη τόσον μὲ ὀλίγον ὑπερτεροῦν ἀνθρακικὸν μόλυβδον, ὥστε νὰ μὴ θολόνῃ πλέον τὴν διάλυσιν τῆς ὑδροχλωρικῆς θαρείας, διϋλίζεται καὶ ἐξατμίζεται εἰς τὸ κενὸν τῆς πνευματικῆς ἀντλίας.

Ἰπάρχουν καὶ ἄλλαι μέθοδοι πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος, αἵτινες συνίστανται εἰς τὸ νὰ καταβυθισθῇ τὸ τῶν κηκίδων ἔμβρεγμα δι' ὀξικοῦ χαλκοῦ ἢ δι' ἐμετικῆς τρυγός, καὶ ν' ἀποσυντεθῇ τὸ ἰζημα δι' ὑδροθειωμένου αερίου.

Χαρακτηριστικά. Τὸ καθαρὸν δρυοθυρσοδεψικὸν ὀξύ εἶναι ἄχρουν, ταχέως δὲ λαμβάνει κίτρινον χρῶμα διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ αέρος, κατ' ἐξοχὴν συνεργοῦντος τοῦ φωτός, ἔχει καθαρὰν στυπτικὴν γεῦσιν ἄνευ πικρότητος, εἶναι ἄοσμον, κοκκινίζει τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην καὶ δὲν διῶγναινεταί εἰς τὸν αέρα, ἀλλὰ λειοτριβεται εὐκόλως. Εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι εὐδιάλυτον καὶ τόσον δυσδιαλυτώτερον εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα, ὅσον ὀλιγώτερον ὕδωρ ἐμπεριέχεται. Τὸ διαλελυμένον δρυοθυρσοδεψικὸν ὀξύ δὲν μεταβάλλεται εἰς ἀερόκενον τόπον συναπτόμενον μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αέρος χάνει τὴν διαφάνειάν του, καταβυθίζομένης κρυσταλλώδους καὶ τεφροχρόου οὐσίας, ἥτις εἶναι κηκιδικὸν ὀξύ. Ἐὰν τὸ διαλελυμένον δρυοθυρσοδεψικὸν ὀξύ συναφθῇ εἰς ὑέλινον καὶ δι' ὕδραργύρου κεκλει-

σμένον σωλῆνα με ὀξυγόνον μετὰ τινα καιρὸν μεταβάλλεται εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ, εἰς δὲ τὸ ῥευστὸν σχηματίζονται ἄχροι ἀγκίδες κηκιδικοῦ ὀξέος.

Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποσταξέως ἐκπέμπει πυκνὸν καπνὸν καὶ καύσιμα αἲρια, μετὰ ταῦτα δὲ ἐξέρχεται ὠχρὸν ἔλαιον καὶ ῥευστὸν τι ἀποθέτον μετὰ τὴν ψύξιν ἀχρόους κρυστάλλους πυροκηκιδικοῦ ὀξέος.

Τὸ θυρσοδεψικὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τινων ὀξέων κατ' ἐξοχὴν μετὰ τοῦ θειικοῦ. Ἡ ἐνώσις τοῦ καθαροῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ θειικοῦ εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, ἀδιάλυτος δὲ εἰς τὸ θειικὸν ὀξύ. ἡ διάλυσις αὐτῆς εἶναι στυπτικὴ ὅχι δὲ ὀξινή τὴν γεῦσιν. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος καταβυθίζεται τὸ θυρσοδεψικὸν ὀξύ, ἀλλὰ διὰ περαιτέρω ἐπενέργειας τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς ὀξαλικὸν καὶ μηλικὸν ὀξύ. Πρὸς τούτοις καταβυθίζεται διὰ φωσφορικοῦ, ὑδροχλωρικοῦ καὶ ἀρσενικοῦ ὀξέος, δὲν καταβυθίζεται δὲ διὰ τοῦ ὀξικοῦ, ὀξαλικοῦ, κιτρικοῦ, τρυγικοῦ, μηλικοῦ, ἠλεκτρικοῦ καὶ γαλακτικοῦ ὀξέος.

Τὰ διὰ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος ἄλατα, ἐξαιρουμένου τοῦ δρυοθυρσοδεψικοῦ νάτρου, δὲν εἶναι κρυσταλλώσιμα, τὰ οὐδέτερα ἔχουσι στυπτικὴν γεῦσιν· τὸ δὲ κύριον χαρακτηριστικὸν τῶν εἶναι ὅτι καταβυθίζουν τὰ δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἄλατα με μέλιν χρῶμα, καὶ τὸ διάλυμα τοῦ ζωτικοῦ πηκτώματος, ἀφοῦ προστεθῇ ἕτερόν τι ἐλεύθερον ὀξύ.

Μετὰ τῶν ἀλκαλίων σχηματίζει τὸ δρυοθυρσοδεψικὸν ὀξύ οὐδέτερα ἄλατα δυσδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, εὐδιάλυτα δὲ εἰς ὑπερτεροῦν ἀλκαλίον, τὸ ἀλκαλικὸν διάλυμα ἐκτεθὲν εἰς τὴν ἐπιφύρῃ τοῦ αἵρος μεταβάλλεται καὶ γίνεται βαθύχρουν, ἀποσυντιθεμένου τοῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος.

Ἄπαντα τὰ μεταλλικὰ ὀξειδια σχηματίζουν μετὰ τοῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος δυσδιάλυτους ἐνώσεις, αἵτινες ἀποτελοῦνται διὰ τῆς συμμίξεως τοῦ θυρσοδεψικοῦ καλίου με τὰς διαλύσεις τῶν ὀξειδίων τῶν μετάλλων. Μεταλλικὰ τινα ἄλατα καταβυθίζονται καὶ διὰ τοῦ ἐλευθέρου θυρσοδεψικοῦ ὀξέος, ὡς τὰ δι' ὀξειδωμένου μολύβδου, χαλκοῦ, ἀργύρου, οὐρανίου, χρωμίου καὶ ὑδράργυρου, καὶ ὡς τὰ δι' ὑποξειδωμένου κασσιτέρου, ὃ δὲ διττοχλώριος ὑδράργυρος δὲν καταβυθίζεται δι' αὐτοῦ. Τὰ σχηματιζόμενα ἰζήματα εἶναι ἐνώσεις τοῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ μεταλλικοῦ ὀξειδίου, συγχρόνως ὅμως ἐνοῦται καὶ μέρος τοῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος ὡς θάσις μετὰ τοῦ ἐκ τοῦ ὀξειδίου ἀποχωριζομένου ὀξέος.

Τὰ διὰ μολύβδου ἄλατα καταβυθίζονται διὰ τοῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος ὑπόλευκα, τὸ ἰζήμα γίνεται βαθύχρουν εἰς τὸν αἶρα καὶ διὰ τοῦτο ἀπο-

ξηραίνεται εἰς ἀερόκενον τόπον. Τὸ δρυοβυρσοδεψικὸν ὀξειδωμένον στίμμι λαμβάνεται, συμμιχθέντος τοῦ βυρσοδεψικοῦ ὀξέος μετὰ διαλελυμένην ἐνστίμμιον τρύγα.

Ἡ ἐνέργεια τοῦ βυρσοδεψικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἀλάτων εἶναι σημαντική, διότι διὰ τῆς ἐνώσεως αὐτῶν ἀποτελοῦνται ἡ μελάνη καὶ τὰ πλείωτερα μελανὰ χρώματα. Τὰ δι' ὑποξειδωμένου σιδήρου ἅλατα δὲν μεταβάλλονται διὰ τοῦ βυρσοδεψικοῦ ὀξέος, ἐὰν ὅμως συναφθῇ αὐτὸ μετὰ τινος πολὺ κεκραμένου ἁλάτος τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου, λαμβάνει τὸ ῥευστὸν βαθύφαιον χρῶμα ἀποθέτον μετὰ τινα καιρὸν βαθυπρασίνους κροκίδας.

Τὸ βυρσοδεψικὸν ὀξύ σχηματίζει μετὰ τῶν πλειοτέρων φυτικῶν ἀλκαλίων δυσδιαλύτους ἐνώσεις· καταβυθίζει τὰ διαλύματα τοῦ ἀμύλου, τοῦ φυτικοῦ λευκώματος καὶ τῆς φυτικῆς πηκτῆς· μετὰ τοῦ ζωτικοῦ ὅμως πηκτώματος καὶ λευκώματος καθὼς καὶ μετὰ τοῦ κυψελώδους ἰστοῦ τῶν μεμβρανῶν, τῶν δερμάτων κ. τ. λ. σχηματίζει ἐνώσεις παντελῶς ἀδιαλύτους εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἀντισηπτικὰς, σχηματίζει δηλαδὴ μετ' αὐτῶν τὸ σκῦτος, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ κυριώτερον χαρακτηριστικὸν τοῦ βυρσοδεψικοῦ ὀξέος.

Τὸ δρυοβυρσοδεψικὸν ὀξύ σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	51,182
-----------------	--------

Ἰδρογόνου	4,178
-----------	-------

Ὄξυγόνου	44,640
----------	--------

100,

Τὸ δρυοβυρσοδεψικὸν ὀξύ εἶναι χρήσιμον εἰς τὴν ἱατρικὴν ὡς πολλὰ δυναμωτικὸν καὶ στυπτικὸν μέσον, συχνώτερα δὲ εἰς τὴν βυρσοδεψίαν καθὼς καὶ πρὸς κατασκευὴν τῆς μελάνης καὶ τῶν μελανῶν χρωμάτων· διὰ τὴν βυρσοδεψίαν ἐκχυλίζουν εἰς τὸ ὀξύ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς δρυὸς, διὰ δὲ τὴν μελάνην καὶ τὰ χρώματα μεταχειρίζονται τὸ τῶν κηκίδων βάμμα.

Τὸ χλωρίον ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ ἐξαλείφῃ τὰ διὰ μελάνης γεγραμμένα, ἀλλ' ἐπειδὴ εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν φθίρεται μόνον ἡ ἐκ τῶν κηκίδων ὀργανικὴ ὕλη, τὸ δὲ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἐπιμένει ὡς βασικὸς θεϊκὸς ὀξειδωμένος σίδηρος ἠνωμένον μετὰ τῆς ἰνὸς τοῦ χάρτου, διὰ τοῦτο δύνανται ν' ἀναφανῶσι πάλιν τὰ διὰ χλωρίου ἐξαλειφθέντα γράμματα καὶ νὰ λάβωσι τὸ ἐξ ἀρχῆς μελάν χρωμά των, ἐὰν ὁ χάρτης ἐπινοτισθῇ μετὰ κεκραμένην διάλυσιν τῆς ὑδροθεικῆς ἀμμωνίας, δι' ἧς σχηματίζεται ἐνθεῖος

σιδήρου· ἐὰν ὅμως ὁ χάρτης ἐμβαπτισθῇ εἰς διάλυσιν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ἐνσιδήρου καλίου μεμιγμένην μὲ ὀλίγον θεικὸν ὀξὺ κεκραμένον, ἀναφαίνονται τὰ ἐξαλειφθέντα γράμματα κυανὰ τὸ χρῶμα.

ὑπάρχουσι καὶ ἄλλα εἶδη σιδηρομελανιζόντων βυρσοδεφικῶν ὀξέων, τῶν ὁποίων μεταχειρίζονται τινα εἰς τὰς τέχνας λ. χ. τὰ ἐκ τῆς βυρσοδεφικῆς ῥοιᾶς (*Rhus coriaria*, Sumach), τῆς ἀρκτοκομαρίου (*Arbutus uva ursi*), τὰ ἐκ τῶν φλοιῶν τῆς κληθρος (*Betulus alnus*), τὰ τῆς σημύδης (*Betula alba*), τῆς ἀγρίας ὄης (*Sorbus aucuparia*) κ. τ. λ. ἀλλὰ δὲν ἡξέυρομεν κατὰ τι διαφέρουσι ὡς πρὸς τὰ χημικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν. Ὁ Metuart καὶ ὁ Bonastre ἀνεκάλυψαν, καὶ ἡ ἀξιόλογος ἀνακάλυψις αὕτη ἐβεβαιώθη καὶ ὑπ' ἄλλων χημικῶν, ὅτι τὸ ἔντομον *Calandra granaria*, τὸ ὁποῖον ἀνήκει εἰς τὴν κλάσιν τῶν κολεοπτέρων καὶ φθείρει εἰς τὴν μεσημβρινὴν Εὐρώπην συχνάκις τὰ σιτηρὰ, ἐμπεριέχει σιδηρομελανίζον βυρσοδεφικὸν καὶ κηκιδικὸν ὀξὺ.

Κηκιδικὸν ὀξὺ.

Acidum gallicum.

Ἡ τελευταία ἀνακάλυψις τοῦ περιφήμου χημικοῦ Scheele ἦτο τὸ κηκιδικὸν ὀξὺ· οὗτος ἐνόμιζε ὅτι ἐμπεριέχεται ἤδη σχηματισμένον εἰς τὰς κηκίδας, ἀλλὰ διὰ τῶν νεωτέρων ἐξετάσεων τοῦ Pelouze ἀπεδείχθη, ὅτι τὸ κηκιδικὸν ὀξὺ σχηματίζεται ἐκ τοῦ δρυοβυρσοδεφικοῦ ὀξέος διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, καὶ ὅτι αἱ κηκίδες δὲν ἐμπεριέχουσι κηκιδικὸν ὀξὺ, εἰμὴ τὸ ὀλίγον ποσόν, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται ἐκ τοῦ δρυοβυρσοδεφικοῦ ὀξέος διὰ τῆς ἀποξηράνσεως ἀρτισυλλέκτων κηκίδων.

Ἡ πλέον ἀσφαλὴς μέθοδος πρὸς κατασκευὴν τούτου τοῦ ὀξέος εἶναι, ἡ ἐξῆς. Τὸ τῶν κηκίδων θάμμα ἐκτίθεται μὴνάς τινας καὶ μάλιστα τὸ θέρος εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος· ὁ σχηματιζόμενος εὐρὼς πρέπει ν' ἀφαιρῇται ἐκ τοῦ θάμματος καὶ οἱ κατ' ὀλίγον συμπηγνύμενοι κρύσταλλοι καθαρίζονται δι' ἀναδιάλυσέως εἰς ζέον ὕδωρ καὶ ἀνακρυσταλλώσεως. Ὁ δὲ Braconnot διδάσκει τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Λειοτετριμμένα κηκίδες ἐπινοτίζονται μὲ ὕδωρ καὶ τίθενται ἐν μίᾳ εἰς τόπον 20—25°P θερμοκρασίας ἔχοντα, καὶ ὁσάκις ξηραίνονται, πρέπει ν' ἐπινοτίζωνται ἐκ νέου. Ἡ ὑγρὰ μάζα ἐξοιδούται καὶ σκεπάζεται μὲ εὐρύτω· μετὰ ταῦτα

ἐκθλίβεται ἡ μάζα, τὸ ὑπόλειμμα ζέεται μετ' ὕδωρ, τὸ ὁποῖον μετὰ τὴν διάλυσιν καὶ ψύξιν ἀποθέτει τὸ κηκιδικὸν ὄξύ ἐν μορφῇ ὠχρῶν κρυστάλλων· οὗτοι ζέονται μετ' 8 μέρη ὕδατος καὶ $\frac{1}{6}$ ζωάνθρακος διὰ νὰ καθα-
ρισθῶσιν.

Τὸ κηκιδικὸν ὄξύ σχηματίζει μακρὰς ἀγγίδας, μεταξώδεις τὴν στιλ-
πνότητα, ὑποξίνους καὶ στυπτικὰς τὴν γεῦσιν· εἶναι διαλύσιμον εἰς ἴσα
μέρη ψυχροῦ καὶ εἰς 3 ζέοντος ὕδατος. Τὸ σημαντικώτερον χαρακτη-
ριστικὸν τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος εἶναι, ὅτι σχηματίζει μετὰ τῶν τοῦ σιδήρου
ἀλάτων μέλανας ἐνώσεις, αἵτινες πρέπει νὰ θεωρηθῶσιν ὡς βάσις τῆς με-
λάνης καὶ ὄλων τῶν μελανῶν ἢ μόνον τεφροχρόων βαφῶν.

Αἱ ἐνώσεις τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν ἀλκαλίων καὶ γαιῶν λαμ-
βάνουν ἐκτεθεῖσαι εἰς τὴν ἐπιπόρῃν τοῦ ἀέρος πράσινον κυανοῦν καὶ τέλος
φαιὸν χρῶμα. Τὸ κηκιδικὸν ὄξύ συνίσταται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	6	ατ.	36	—	57,14
Ἰδρογόνου	1	ατ.	3	—	4,76
Ὄξυγόνου	3	ατ.	24	—	38,10
	63 — 100,				

Τὰ κηκιδικὰ ἄλατα εἶναι ὀλίγον μόνον γνωστά. Ἡ σχέσις τοῦ κηκιδι-
κοῦ ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων καὶ μάλιστα μετὰ τῶν γαιῶν εἶναι τόσον
ἀσθενής, ὥστε δὲν δύναται νὰ ἐκτυλιχθῇ τὸ ἀνθρακικὸν ὄξύ μήτε ἐκ
τῶν ἀνθρακικῶν ἀλάτων. Τὰ πλειότερα μεταλλοξειδία ἀποχωρίζονται
παρὰ τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν διαφόρων βάσεων ὡς μετὰ τῆς
ποτάσης, σόδας κ. τ. λ. διὰ δὲ τῆς ἀμέσου διαλύσεως τοῦ κη-
κιδικοῦ ὀξέος ὑπ' αὐτῶν ἀποτελοῦνται τὰ διάφορα ἄλατα (gallates)
τὰ δὲ λοιπὰ καὶ μάλιστα τὰ κηκιδικὰ μεταλλικὰ ἄλατα σχηματίζονται
ἀποσυντιθεμένου μεταλλικοῦ τινος ἄλατος διὰ τῆς κηκιδικῆς ποτάσης,
σόδας, κ. τ. λ. οὕτω π. χ. ἀπολαμβάνεται ὁ κηκιδικὸς μόλυβδος.

Χρησις τὸ καθαρὸν κηκιδικὸν ὄξύ μᾶς χρησιμεύει εἰς τὴν ἀναλυτικὴν
χημείαν πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου· ὁ δὲ κηκιδικὸς μόλυ-
βδος εἰς τὴν ἱατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Plumbum scytodepsicum aut
gallicum*.

Λυκικὸν ὄξύ.

Acidum catechucicum.

Τοῦτο τὸ ἰδιαίτερον ὄξύ ἀνεκαλύφθη εἰς ἐκεῖνο τὸ εἶδος τοῦ λυκίου, τὸ

όποιον κατασκευάζεται ἐκ *Nauclea Gambir*. Πρὸς κατασκευὴν του ἀναμι-
γνύεται τὸ λειοτριβημένον λύκιον μετὰ πολλοῦ ψυχροῦ ὕδατος· τὸ μετὰ
παρέλευσιν 24 ὥρῶν ἐπιπλέον ρευστὸν ἀποχωρίζεται διὰ διύλισεως καὶ ἡ
πράξις τῆς ἐκχυλίσεως ἐπαναλαμβάνεται δις καὶ τρίς μετὰ ψυχροῦ
ὕδατος· τὸ ὑπολειπόμενον διαλύεται εἰς ζέον ὕδωρ, καὶ ἐκ τοῦ διαλύ-
ματος καταβυθίζεται τὸ ἐμπεριεχόμενον βυρσοδεψικὸν ὁξὺ διὰ ὀξικοῦ
μολύβδου· ἀφοῦ δὲ ἀποχωρισθῇ τὸ περιπλέον τοῦ μολύβδου δι' ὑδροθει-
κοῦ ὁξέος, ἐξατμίζεται τὸ ρευστὸν καὶ διυλίζόμενον ἀφίεται πρὸς κρυ-
στάλλωσιν.

Τὸ καθαρὸν ὁξὺ σχηματίζει λευκὰς στιλβούσας ἀγγίδας εὐκόλως εἰς
κόνιν λεπτὴν μεταβαλλομένης, εἶναι ἄοσμον καὶ σχεδὸν ἄχρυμον, τίκεται
πρὸς ἄχρουν ρευστὸν, ἀποσυντίθεται εἰς τὴν ξηρὰν ἀπόσταξιν καὶ πρὸς τὸ
τέλος τῆς ἀποστάξεως ἐξαχνίζονται κρύσταλλοι· ἀπαιτεῖ πρὸς διάλυσίν
του 16,000 μέρη ψυχροῦ ὕδατος, βραστοῦ ὅμως μόνον τρία, εἶναι διαλύ-
σιμον εἰς 5 ἕως 6 μέρη οἰνοπνεύματος· εἰς τὴν ὑγρὰν του κατάστασιν
ἀποσυντίθεται εὐκόλως καὶ δὲν δύναται νὰ ξηρανθῇ εἰς τοιαύτην κατά-
στασιν χωρὶς νὰ ἐρυθροχρωματισθῇ· τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ὁξέος τούτου
εἶναι ὅτι προάγει μετὰ τῶν διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων πράσινον
χρῶμα καθὼς τὸ βυρσοδεψικὸν ὁξὺ τοῦ λυκίου. Ἐν συναφθῇ μετὰ τοῦ
νιτρικοῦ ὁξέος, ἀποσυντίθεται καὶ χρωματίζεται φαιόν.

Τὸ τοῦ λυκίου ὁξὺ παρέχει μετὰ τῶν βάσεων ἰδιαιτέρα ἄλατα τὰ
ὁποῖα ὅμως ἀποσυντίθενται τόσον εὐκόλως, ὥστε δὲν εἶναι τρόπος νὰ ἀπο-
τελεσθῶσιν εἰς ξηρὰν κατάστασιν καὶ κατασκευάζονται διὰ τῆς ἀμέσου
ἐνώσεως τοῦ ὁξέος μετὰ τῶν ἀλκαλίων δυνάμει τῆς διπλῆς συγγενείας.

Ἐν τῷ λυκικῷ ὁξὺ διαλυθῇ ὑπὸ τῶν καυστικῶν ἢ καὶ τῶν ἀνθρακι-
κῶν ἀλκαλίων ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, μεταβάλλεται
τὸ χρῶμα τοῦ διαλύματος εἰς ρόδινον, ἀνοικτοερυθροῦν, βαθυ-ερυθροῦν καὶ
μέλαν. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἀπορρόφῶται ὀξυγόνον καὶ σχηματί-
ζεται νέον ὁξὺ καλούμενον *acidum rubinicum*. Ἐπίσης ἀποσυντίθενται
τὰ διὰ τοῦ λυκικοῦ ὁξέος σχηματιζόμενα ἄλατα, ἐὰν διαλυόμενα εἰς ὕδωρ
ἐκτεθῶσιν εἰς τὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπιρροήν· λυκικὸν κάλιον λ. χ.
ἐκτεθὲν εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν ἀπορρόφῃ ὀξυγόνον, λαμβάνει ρόδινον, ἀνοι-
κτὸν καὶ βαθύ ἐρυθροῦν χρῶμα, ἐπομένως γίνεται φαιόν καὶ μέλαν, καὶ τὸ
κάλιον ἐν μέρει μεταβάλλεται εἰς ἀνθρακικόν, ἐν μέρει κορέννεται μετὰ
τινος μέλανος καὶ ὁξέος σώματος καλουμένου *acidum japonicum*. Διὰ νὰ
ἀποχωρισθῇ τὸ ὁξὺ τοῦτο ἀπὸ τοῦ κάλιου καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύ-

ματος διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, δι' οὗ τὸ ὀξύ ἀποχωρίζεται εἰς μέλανας θρόμβους, ἀδιαλύτους εἰς τὸ ὕδωρ, ἀόσμους καὶ ἀχύμους, κοκκινίζοντας τὸ τοῦ καγκαμίνου βάμμα. Τὸ ὀξύ τοῦτο ἐνόνεται μετὰ τῶν βάσεων καὶ τὰ οὕτω ποριζόμενα ἅλατα ἀναμιγνύμενα μετὰ τῶν διαλυμάτων τῶν μετάλλων δίδουσιν μέλανα καὶ φαῖα καταβύθισματα.

Μιμοθυρσοδεψικόν ὀξύ.

Acidum Mimotanicum.

Ἀπὸ τοὺς ἀόρους καρποὺς, ἀπὸ τὰ ξύλα καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς ἀκακίας κατασκευάζεται δι' ὕδατος ἐκχύλισμα *λύκιον ἰνδικόν ὀνομαζόμενον Terra Japonica seu Catechu*, τὸ ὁποῖον σύγκειται κατὰ μέγα μέρος ἐκ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος καὶ τινος ἰδιαιτέρου ὀξέος *λυκικοῦ* ὀνομαζομένου καὶ ἐκ τινος φαῖας ὕλης σχηματιζομένης διὰ τῆς τοῦ θυρσοδεψικοῦ ὀξέος ἀποσυνθέσεως. Τὸ θυρσοδεψικόν ὀξύ κατασκευάζεται ἐξ αὐτοῦ κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον.

Τὸ λύκιον ἐκχυλίζεται δι' ὕδατος καὶ τὸ διυλίζομενον ρευστὸν ἀναμίγνυται μετὰ θειικοῦ ὀξέος, δι' οὗ ἀποχωρίζεται ὀλίγον καταβύθισμα· μετὰ τὴν διύλυσιν καὶ ἀποχώρησιν αὐτοῦ προστίθεται θειικόν ὀξύ ἄκρατον ἑωσὺ νὰ ἀποτελεσθῇ καταβύθισμα· τὸ διὰ διύλισεως ἀποχωρισθὲν κατακρήμνισμα ἐκθλίβεται εἰς ἐμπορικὸν χάρτιν καὶ ἀποξηραίνεται· ἀκολούθως δὲ διαλύεται εἰς θραστὸν ὕδωρ καὶ τὸ διάλυμα ἀποψυχραίνεται. Τὸ διὰ τῆς διύλισεως ποριζόμενον καθαρὸν ρευστὸν ἀναμιγνύεται κατὰ μικρὰν μετὰ λειοτριβημένου ἀνθρακικοῦ μολύβδου μεχριστοῦ παύσῃ ὃ ἀναθρασμός· μετὰ τὴν παύσιν δὲ τούτου διυλίζεται τὸ ρευστὸν, τὸ ὁποῖον ἐξατμισθὲν εἰς ἀερόκενον τόπον παρέχει διαφανῆ συνεχῆ μάζαν, εὐκόλως καὶ ἄνευ ὑπολείμματος διαλυομένην εἰς ὕδωρ.

Τὸ τοῦ λυκίου θυρσοδεψικόν ὀξύ ἔχει γεῦσιν καθαρῶς στυπτικὴν, τὸ διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον λαμβάνει υπέρυθρον χρῶμα ἐκτεθὲν εἰς τὴν τοῦ αἵματος ἐπιρροήν· μετὰ τῶν ἀλκαλίων ἐνοῦται καὶ σχηματίζει εὐδιαλύτους ἐνώσεις.

Εἰς τὸ ἐκχύλισμα, τὸ ὁποῖον καλεῖται *Kind* ἢ *Gumi Kind* καὶ τὸ ὁποῖον ἐξάγεται δι' ἐκχύλισεως ἐκ τοῦ φυτοῦ *Coccoloba uvifera* εὐρίσκεται ὀξύ τι λεγόμενον *Acidum coccotanicum*.

Ὁξύ τῆς Εὐθαλείας.

Acidum atropicum.

Εἰς τὴν πόαν τῆς *atropa belladonna*.

Βολητικὸν ὀξύ.

Acidum Boleticum.

Τοῦτο τὸ ὀξύ ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Braconot, ἐμπεριέχεται εἰς τὸ *Boletus pseudoigniarius*, ἐξ οὗ κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. Ὁ μέχρι συστάσεως θεραπίου ἐξατμισθεὶς ὁπὸς κατεργάζεται μετὰ οἰνοπνεύματος, τὸ ὁποῖον ὑπολείπει λευκὴν ὕλην ἀδιάλυτον, ἥτις διαλυομένη εἰς ὕδωρ ἀποσυντίθεται διὰ νιτρικοῦ μολύβδου· τὸ οὕτω ληφθὲν ἔζημα ἀναμιγνύμενον μετ' ὀλίγου ποσοῦ ὕδατος ἀποσυντίθεται διὰ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, καὶ ἐκ τοῦ μεταγγισθέντος ρευστοῦ συμπηγνύονται διὰ τῆς ἐξατμίσεως κρύσταλλοι, οἵτινες δι' ἀναδιαλύσεως εἰς οἰνόπνευμα δύνανται νὰ καθαρισθῶσιν ἐντελῶς.

Τὸ ὀξύ εἶναι ἄχρουν, κρυσταλλοῦται εἰς τετραγωνικὰ πρίσματα ἔχοντα γεῦσιν ὀξεῖαν, τρίβει μεταξὺ τῶν ὀδόντων, καὶ διαλύεται εἰς 180 μέρη ὕδατος θερμοῦ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἶναι πτητικὸν καὶ δύναται νὰ ἐξαχισθῇ· διακρίνεται ἀπὸ τὰ ἄλλα ὀξέα, καθότι καταβυθίζει τὸ ὀξειδὸν τοῦ σιδήρου ἐκ τῶν ἀλάτων τοῦ ἐντελῶς, ὅχι δὲ καὶ τὸ ὑποξειδίου.

Μετὰ τῶν διαφόρων βάσεων ἐνοῦται καὶ σχηματίζει ἐν μέρει κρυσταλλώσεως ἐπιδεκτικὰ ἅλατα.

Δαφνικὸν ὀξύ.

Διὰ τῆς ἐκχυλίσσεως τῶν σπερμάτων τοῦ *Daphne gnidium* ἐξάγεται ἰδιαιτέρον ὀξύ κρυσταλλώσιμον εἰς τετράγωνα ἄχρσα πρίσματα.

Θηρανθέμιδικὸν ὀξύ.

Εἰς τὰ ἄνθη τῆς θηρανθέμιδος ἀνεκαλύφθη κρυσταλλώσιμόν τι ὀξύ κρυσταλλώμενον *acidum Tanacetium*.

Θριδακικὸν ὀξύ.

Acidum Lactucicum.

Τοῦτο τὸ ὀξύ ἀνεκαλύφθη πρὸ ὀλίγου εἰς τὸν ὁπὸν τῆς δηλητηρίου θριδακος ἢ θριδακίνης *Lactuca virosa*. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ εἰρημένου ὀξέος καταβυθίζεται ὁ ἐντελῶς καθαρισθεὶς ὁπὸς διὰ τοῦ θεϊκοῦ χαλκοῦ ἢ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου καὶ τὸ ποριζόμενον ἔζημα ἀποσυντίθεται ἐπομένως διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος. Ἐκ τοῦ ἐξατμισθέντος ὁποῦ κρυσταλ-

λοῦται τὸ θριδακικὸν ὀξύ εἰς μακροὺς κρυστάλλους, οἵτινες ἔχουσιν ἰσχυρὰν ὀξεῖαν γεῦσιν, καὶ τὸ διάλυμά του καταβυθίζει τὸ ὑποξειδίον τοῦ σιδήρου ἐκ τῶν διαλυμάτων του μετὰ πρασίνου καὶ τὸν χαλκὸν μετὰ φαιοῦ χρώματος.

Ἰππουρικὸν ὀξύ.

Acidum equiseticum.

Ἡνωμένον μετὰ τῆς μαγνησίας, ὡς καὶ μετὰ τῆς ποτάσσης καὶ τῆς τιτάνου εὐρίσκεται εἰς τὸ *Equisetum fluviatile*. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὀξέος διῴλίζεται ὁ ἐκ τῶν φυτῶν ἐκθλιβόμενος ὁπός, ὅστις ἐξατμίζεται μέχρι σεραπίου συστάσεως. Ἀφοῦ τὰ κρυσταλλωθέντα ἄλατα ἀποχωρισθῶσιν, ἐκχυλίζεται τὸ ὑπόλειμμα δι' οἶνοπνεύματος· τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ οἶνοπνεύματος ἐπιμένον διαλύεται εἰς ὕδωρ, καὶ τὸ διάλυμα ἀποσυντίθεται δι' ὀξικοῦ μολύβδου· τὸ ποριζόμενον ἱζημα κατὰ μέγα μέρος ἐξ ἰππουρικοῦ μολύβδου συνιστάμενον κατεργάζεται ἀκολούθως διὰθεικῶν ἢ διὰ ὑδροθεικῶν ὀξέος, καὶ τὸ τοιούτοτρόπως ἀποχωριζόμενον ὀξύ ἐξατμίζεται μέχρι κρυστάλλωσσεως. Δι' ἀναλύσεως τῶν κρυστάλλων εἰς οἶνοπνευμα δύναται νὰ καθαρισθῇ ἐντελῶς.

Κρυσταλλοῦται εἰς ἀχρούς ἀγκίδας, ἔχει ἀσθενῶς ὀξεῖαν γεῦσιν, εἶναι ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα, θερμαινόμενον ἐξοιδαίνεται σχηματίζον κρυσταλλώσιμόν τι βευστόν καὶ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον.

Τὰ δι' αὐτοῦ τοῦ ὀξέος ποριζόμενα ἄλατα εἶναι κατὰ μέγα μέρος εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ.

Κραμερικὸν ὀξύ ἢ Ρατανικόν.

Acidum Kramericum.

Κατ' ἀρχὰς ἀπεχωρίσθη ἐκ τοῦ τῆς ῤατανίας ἐκχυλίσματος. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ῤαθεντος ὀξέος ζέεται ἡ λειοτριβθεῖσα ῤίζα τῆς ῤατανίας δι' ὕδατος καὶ ἐκ τοῦ ἀφεψήματος ἀποχωρίζεται ἡ βυρσοδεψικὴ ὕλη διὰ διαλύματος τοῦ ζωϊκοῦ πηκτώματος, ἡ δὲ βαφικὴ ὕλη καὶ τὸ κηκιδικὸν ὀξύ διὰ τοῦθεικῶν ὀξειδωμένου σιδήρου· μετὰ ταῦτα διαλύεται καὶ ἐξατμίζεται τὸ ποριζόμενον βευστόν· τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ληφθὲν ὑπόλειμμα ἐκ ῤατανικῆς τιτάνου συγκείμενον ἀποσυντίθεται δι' ἀνθρακικῆς ποτάσσης καὶ τὸ ῤατανικὸν κάλιον δι' ὀξικοῦ μολύβδου, τέλος δὲ ἀποσυντίθεται ὁ ῤατανικὸς μολύβδος διὰ ὑδροθεικῶν

όξος, δι' οὗ ἀποχωρίζεται τὸ ρατανικὸν ὀξύ καὶ εξατμίζεται μέχρι σεραπίου συστάσεως.

Τὸ ρατανικὸν ὀξύ κρυσταλλοῦται δυσκόλως καὶ μόνον μετὰ τινα καιρὸν, οἱ δὲ κρύσταλλοι εἶναι ἀμετάβλητοι εἰς τὸν ἀέρα, ἔχουν ὀξεῖαν καὶ καθαρῶς στυπτικὴν γεῦσιν. Τὸ κυριώτερόν του χαρακτηριστικὸν εἶναι, ὅτι ἔχει πλειοτέραν συγγένειαν μετὰ τῆς βαρείας παρ' ὅσον τὸ θεϊκὸν ὀξύ καὶ μάλιστα ἡ θεϊκὴ βαρεῖα ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ ρατανικοῦ ὀξέος. Ἡ ρατανικὴ βαρεῖα σχηματίζει καὶ εὐκάμπτους κρυστάλλους.

Καπνικὸν ὀξύ.

Acidum fumaricum.

Ἡνωμένον μετὰ τῆς τιτάνου εὐρίσκεται εἰς τὴν καπνίαν *fumaria officinalis*. Ἀνεκαλύφθη μὲν παρὰ τοῦ Peschier, ἀλλ' ἡ κατασκευὴ του ἐτελειοποιήθη παρὰ τοῦ Winkler· δύναται νὰ προαχθῇ καὶ διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τοῦ μηλικοῦ ὀξέος καὶ τὸ οὕτω κατασκευασθὲν ὀξύ ἔλαβεν τὴν ὀνομασίαν *πυρομηλικὸν ὀξύ*.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ καπνικοῦ ὀξέος ἐκζέονται 50 μέχρι 100 λίτρων προσφάτου καὶ λειοκακομένης καπνιάς μετὰ τετραπλασίου ὕδατος δις καὶ τρίς καὶ τὸ ληφθὲν ἀφέψημα ἀποτίθεται ἡσύχως πρὸς ἀποχώρησιν τῶν ἐμπεριεχομένων ἐτερογενῶν ὑλῶν. Τὸ μετὰ προσοχῆς μεταγγιζόμενον καὶ διὰ χάρτου διυλιζόμενον ρευστὸν εξατμίζεται διὰ πρᾶου πυρὸς μέχρι συστάσεως σεραπίου· εἰς τὸ ἤδη θερμὸν ἐκχύλισμα προστίθεται ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος τόσον, ὥστε νὰ λάβῃ τὸ ρευστὸν ὑπόξινον γεῦσιν, καὶ ἐπομένως τίθεται τὸ μίγμα μέχρι τινὸς εἰς ψυχρὸν τόπον, ὅπου ἀποτίθενται τόσον εἰς τὰς πλευράς ὡς καὶ εἰς τὸν πυθμὲνα τοῦ καδίου σκληροὶ καὶ φαιοὶ κρύσταλλοι, οἵτινες εἶναι εὐανάφλεκτοι καὶ καίουσιν μετὰ λαμπρᾶς, ὅχι δὲ ἀσβολώδους φλογός· κοκκινίζει τὸν καγκάμινον χάρτην, ἡ δὲ ἀποτελεσθεῖσα ἐρύθρωσις ἀφανίζεται εἰς τὸν ἀέρα· παρὰ τῶν ἀκράτων ὀξέων ἀποσυντίθεται.

Τὰ διὰ τοῦ καθαροῦ ὀξέος ποριζόμενα ἅλατα ἔχουσιν ἰδιαιτέραν γεῦσιν ὑπογλυκεῖαν, ἐὰν καθαρὸν καπνικὸν ἅλας ἐπιχυθῇ μετὰ τινος ἀκράτου ὀξέος ἀποχωρίζεται τὸ καθαρὸν ὀξύ καὶ ἐπιπλέει.

Τὰ πλειότερα διὰ τῶν ἀλκαλίων ἅλατα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, ἀδιάλυτα δὲ τὰ διὰ τῶν μετάλλων.

Λειχηνικὸν ὀξύ.

Acidum Lichenicum.

Τὸ ὀξύ τοῦτο ἀνακαλυφθὲν παρὰ τοῦ Pfaff ἐμπεριέχεται εἰς τὸν Ἰσλανδικὸν λειχήνα κατὰ μέγα μέρος ἠνωμένον μετὰ τῆς τιτάνου· κατὰ τὸν ἐφευρετὴν κατεργάζεται ὁ λειχήν με ὕδωρ, εἰς ἐκάστην λίτρην τοῦ ὁποίου εἶναι διαλελυμένον $\frac{1}{2}$ λήθιον ἀνθρακικῆς ποτάσεως. Τὸ διάλυμα τοῦτο κορέννυται ἐπομένως δι' ὀξικοῦ ὀξέος καὶ καταβυθίζεται διὰ διαλύματος ὀξικοῦ μολύβδου. Τὸ καταβύθισμα ἐμπεριέχει ἔνωσην τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου με ἐκχυλισματικὴν καὶ πικράν τινα ὕλην, λειχηνικὸν ὀξύ καὶ τίτανον. Τὸ διῦλιζόμενον ῥευστὸν ἀποθέτει μετὰ τινα καιρὸν καθαρὸν λειχηνικὸν μολύβδον, ὅστις ἀποσυντίθεται διὰ ὑδροθειικοῦ ὀξέος. Κρυσταλλοῦται εἰς ὠχρὰς πρισματικὰς ἀγκίδας ἐχούσας ἰσχυρὰν ὀξειαν γεῦσιν· θερμανθὲν ἐξαχνίζεται ἀναθυμίων ἀρωματικὴν ὁσμὴν.

Μυκικὸν ὀξύ.

Acidum fungicum.

Καὶ τοῦτο τὸ ὀξύ ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Braconot καὶ ἀπαντᾷται εἰς τὰ πλείωτερα μανιτάρια, ἐνίοτε εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν ὡς εἰς *Peziza nigra*, ἄλλοτε ὡς μανιταρικὸν κάλιον εἰς τὸ *Hydnum hybridum*, *Boletus pseudoigniarius*, *Merulius cantharellus*, *Phallus impudicus*.

Τὰ πρὸς κατασκευὴν τοῦ ῥηθέντος ὀξέος μεταχειριζόμενα μανιτάρια ἐκπιέζονται καὶ ἐξ αὐτῶν ἐκθλίβεται ὁ ὀπός, ὅστις θερμαίνεται μεχριστοῦ τὸ φυτικὸν λεύκωμα πηχθῇ, ἐπομένως ἐξατμίζεται ὁ διῦλισθεὶς ὀπός διὰ μαλακοῦ πυρὸς μέχρι σεραπίου συστάσεως. Τὸ πορίζόμενον ὑπόλειμμα ἀναμίγνυται με οἰνόπνευμα, δι' οὗ ἀποχωρίζεται τὸ μανιταρικὸν κάλιον, ὅπερ διαλυόμενον εἰς ὕδωρ καὶ διῦλιζόμενον ἀποσυντίθεται διὰ νιτρικοῦ μολύβδου· τὸ δὲ ἔζημα ἐκ μανιταρικοῦ μολύβδου συγκεῖμενον ἀποσυντίθεται διὰθεικοῦ ὀξέος με τὸ δεκαπλοῦν ὕδατος κεκραμένου. Τὸ οὕτως ἀποχωρίζόμενον ἔτι ἀκάθαρτον μανιταρικὸν ὀξύ κορέννυται ἐξ ἀμμωνίας καὶ ἡ μανιταρικὴ ἀμμωνία ἐξατμίζεται μέχρι κρυσταλλώσεως. Ἡ κρυσταλλουμένη ἀμμωνία ἀποσυντίθεται δι' ὀξικοῦ μολύβδου καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀποχωρίζεται τὸ μανιταρικὸν ὀξύ διὰθεικοῦ ἢ ὑδροθειικοῦ ὀξέος.

Τὸ καθαρόν ὄξύ εἶναι ἄχρουν, ὀξύτατον τὴν γεῦσιν, μὴ κρυσταλλώσιμον καὶ διῤυγρᾶνεται εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν. Τὰ περισσότερα μανιταρικά ἄλατα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ.

Ναρδικὸν ὄξύ.

Acidum Valerianicum.

Τοῦτο τὸ ὄξύ εὐρίσκεται εἰς τὴν ῥίζαν τοῦ νάρδου *valeriana officinalis*, εἰς ἣν ὑπάρχει ἀναμειγμένον μετὰ τοῦ πτητικοῦ ἐλαίου καὶ ἐξ αὐτῆς κατασκευάζεται διὰ τῆς ἀποστάξεως τῆς τετμημένης ῥίζης μεθ' ὕδατος· ὁμοῦ μὲ τὸ ὕδωρ ἀποστάζεται τὸ ἔλαιον καὶ τόσον εἰς τὸ ὕδωρ καθὼς καὶ εἰς τὸ ἔλαιον εὐρίσκεται μέρος τοῦ ναρδικοῦ ὀξέος. Τὸ ἀπὸ τὸ ὕδωρ ἀποχωριζόμενον ἔλαιον ἀναταράττεται μὲ διάλυμα τῆς ποτάσης ἢ σόδας, μετρίσου νὰ κοκκινίσῃ τὸν καγκάμινον χάρτην.

Τὸ ἴδιον ἀλκαλικὸν ῥευστὸν δύναται νὰ χρησιμεύσῃ καὶ πρὸς κόρον τοῦ ὀξינוῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον ἐπομένως ἐξατμισθὲν καὶ μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἀναμιχθὲν ὑποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν. Τὸ ποριζόμενον ῥευστὸν συνίσταται ἐν μέρει μὲν ἐξ ἐλαίου, ἐν μέρει δὲ ἐξ ὑδατῶδους ῥευστοῦ.

Χαρακτηριστικά. Τὸ καθαρόν ὄξύ εἶναι ἄχρουν, ἐλαιῶδες τὴν σύστασιν, ἔχει ἰδιαιτέραν ὀξεῖαν καὶ κεντητικὴν ὁσμὴν καὶ ὑποδριμεῖαν γεῦσιν· ἐὰν σταχθῇ ἐπὶ τῆς γλώσσης διεγείρει καῦσιν καὶ μετ' ὀλίγον τὴν κατασπεάζει μετὰ λευκῆς κηλίδος. Ἐὰν ναρδική τιτάνος ἀναμιχθεῖσα μεθ' ὑπερτερούσης τιτάνου ἀποσταχθῇ, ὑπόκειται τὸ ναρδικὸν ὄξύ εἰς ἀποσύνθεσιν καὶ τὸ συγχρόνως ἐξαγόμενον ἐλαιῶδες ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ καθαρισθῇ δι' ἀναποστάξεως ἐπὶ τιτάνου ἐκαλέσθῃ *Valeron*.

Πρασινικὸν ὄξύ.

Acidum veridicum.

Τοῦτο τὸ ὄξύ ἀνακαλυφθὲν παρὰ τοῦ *Runge* εὐρίσκεται εἰς πολλὰ εἶδη φυτῶν· ἔλαβε δὲ τὸ ὄνομα τοῦτο, ἐπειδὴ λαμβάνει πράσινον χρῶμα μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως καὶ ἀπορρόφων ὀξυγόνον ὀξειδοῦται περισσότερον. Διὰ τοῦτο ἐδύνατο νὰ ὀνομασθῇ τὸ πρῶτον ὑποπράσινον τὸ δὲ τελευταῖον πράσινον ὄξύ.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ πρώτου ἐκχυλίζεται ἡ ἐντελὴς καθαρισθεῖσα

ξηρανθεῖσα καὶ λειοτριβηθεῖσα ρίζα *Scabiosa succisa* δι' οἰνοπνεύματος. Τὸ διάλυμα τοῦτο ἀναμίγνυται μὲ αἰθέρα, δι' οὗ καταβυθίζεται θρομβώδης ὕλη προσκολλημένη εἰς τὰς τοῦ ἀγγείου πλευράς. Ἡ ὕλη αὕτη διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ καὶ καταβυθίζεται δι' ὀξικοῦ μολύβδου· τὸ δὲ οὕτω ποριζόμενον Ἴζημα ἀποσυντίθεται δι' ὑδροθεικοῦ ὀξέος καὶ τὸ ἐπιπολάζον βρευστὸν διυλιζόμενον ἐξατμίζεται. Κατὰ τὸν προρρήνεντα τρόπον λαμβάνεται τὸ ὀξύ ἐν μορφῇ ὡχρᾶς εὐθρόπτου μάζης ἐρυθρώσεως τὸ τοῦ καγκραμίνου βάμμα.

Ἐν κορεσθῇ μετὰ τινος βάσεως, ὡς μετὰ τῆς ἀμμωνίας καὶ ἐκτεθῇ τὸ διάλυμα εἰς τὸν ἀέρα, ἀπορροφᾷ ὀξυγόνον καὶ ὀλίγον κατ' ὀλίγον πρασινίζει, καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν διαλυμάτων καταβυθίζεται ἡ ἐρυθρόφαιος κόνις, ἥτις εἶναι τὸ πράσινον ὀξύ διαλυόμενον εἰς τὰ ἀλκάλια μετὰ πρασίνου χρώματος. Τὰ ὑποπράσινα ἄλατα ἔχουσι κίτρινον, τὰ δὲ πράσινα ἄλατα πράσινον χρῶμα.

Ροκελικὸν ὀξύ.

Acidum Rocellicum.

Τοῦτο τὸ ὀξύ ἀνεκαλύφθη εἰς μνίον τι καλούμενον *Rocella tinctoria* καὶ εὐκόλως δύναται νὰ κατασκευασθῇ εἰς καθαρὰν κατάστασιν, ἐὰν τὸ φυτὸν τοῦτο κατεργασθῇ μετὰ καυστικῆς ὑγρᾶς ἀμμωνίας· τὸ διάλυμα ἀποσυντίθεται ἀκολούθως δι' ὑδροχλωρικῆς τιτάνου, τὸ δὲ οὕτω ποριζόμενον Ἴζημα δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καὶ τὸ ἐλευθερονόμενον ὀξύ διαλύονται εἰς τὸν αἰθέρα, ἐξ οὗ τὸ ὀξύ κρυσταλλοῦται ἐν μορφῇ μικρῶν, λευκῶν καὶ μεταξοειδῶς λαμπριζόντων κρυστάλλων.

Εἶναι ἄοσμον καὶ ἄχυμον, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ πολὺ εὐδιάλυτον εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Μετὰ τῶν βάσεων ἐνούμενον σχηματίζει ἄλατα, μετὰξὺ τῶν ὁποίων ἡ ροκελικὴ πότασσα κρυσταλλοῦται εἰς λεπτὰ φυλλίδια. Ἡ ροκελικὴ ἀμμωνία εἶναι ἄλλας εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ.

Σπιραικὸν ὀξύ.

Acidum Spiraicum.

Εἰς τὰ ἄνθη *Spiraea ulmaria* ἀνεκαλύφθη ἰδιαίτερα ὕλη δυναμένη νὰ ἐκχυλισθῇ διὰ τοῦ αἰθέρος ὁμοῦ μὲ λίπος καὶ νὰ ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου διὰ τοῦ ὕδατος· ἡ ὕλη αὕτη καλεῖται *Spirain*.

Διὰ τῆς διαλύσεώς της εἰς ἀνθρακικὴν πότασσαν προσλαμβάνει ὀξεῖα χαρακτηριστικὰ μεταβαλλομένη εἰς ὀξύ τι *acidum Spiraicum* καλούμενον. Ἡ ὕλη αὕτη ἐνοῦται μετὰ τοῦ βρωμίου, τοῦ νιτρογόνου καὶ τοῦ χλωρίου πρὸς ἰδιαιτέρας ἐνώσεις.

Acidum Solanicum.

Εἰς τὴν πόαν τοῦ στρυχνίου τοῦ μέλανος *Solanum nigrum*.

Φθειραρχικὸν ὀξύ.

Ἀπαντᾷται εἰς τὸ τῆς φθειράρχης σπέρμα. Τὰ λειοτριβήντα σπέρματα κατεργάζονται δι' οἰνοπνεύματος ὀξυνισμένου διὰ θεϊκοῦ ὀξέος, τὸ ληφθὲν βάμμα ἀναμίγνυται μετὰ τιτάνου καὶ ἐκ τοῦ διῦλισθέντος βάμματος ἀποσπάζεται τὸ οἰνόπνευμα· τὸ ὑπόλειμμα ἀποχωρίζεται διὰ διύλισεως ἀπὸ τὸ φθειράρχιον καὶ ὑπερκορύννυται διὰ θεϊκοῦ ὀξέος, καὶ ἀφεθὲν ἡσύχως κρυσταλλοῦται τὸ φθειραρχικὸν ὀξύ, τὸ ὅποιον ἀναδιαλύομενον εἰς οἰνόπνευμα καὶ ζεόμενον μετὰ ζώανθρακος παρέχει τὸ ὀξύ καθαρὸν.

Χελιδονικὸν ὀξύ.

Ἀπαντᾷται τόσον εἰς τὴν τοῦ χελιδονίου πόαν ὥς καὶ εἰς τὴν ῥίζαν *Chelidonium majus*. Τὸ φυτὸν τοῦτο εἰς νεαρὰν καὶ ἀπεξηραμένην κατάστασιν λειοτριβηθὲν κατεργάζεται μὲ διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τῆς σόδας· τὸ ἀποψυχρανθὲν ἀφέψημα ὑπερκορεσθὲν μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος ἀναμίγνυται μετὰ διαλύματος νιτρικοῦ μολύβδου· τὸ οὕτω ποριζόμενον κιτρινωπὸν ἴζημα, τὸ ὅποιον σύγκειται ἐκ τοῦ χελιδονικοῦ μολύβδου καὶ τινὸς φαιᾶς βαφικῆς ὕλης χελιδόξανθον *chelidoxanthin* καλουμένης, ἀποσυντίθεται διὰ ὑδροθειικοῦ ὀξέος· ἐὰν δὲ ἐξατμισθῇ κρυσταλλοῦται εἰς ὠχροὺς κρυστάλλους, ὀξυτάτους καὶ ἀόσμους. Ἐνούμενον μετὰ τῶν διαφόρων βάσεων σχηματίζει τὰ χελιδονικὰ ἅλατα.

Περὶ τινῶν ὀξέων διὰ τῆς ἐπιβρόχης τοῦ νιτρικοῦ

ὀξέος σχηματιζομένων.

Ἐὰν φυτικαὶ οὐσίαι κατεργασθῶσι μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος, ἀμφοτέρω

ἀποσυντίθενται ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ἀνθρακικοῦ ὀξέος, νιτρογο-οξειδίου καὶ συχνὰ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος. Τὰ εἰς τὴν ἐπιμένουσιν διάλυτιν ἐμπερι-
χόμενα διαφέρουσιν κατὰ τὴν πολλὴν ἢ ὀλίγην ἐπιφόρῃν τοῦ νιτρικοῦ
ὀξέος καὶ κατὰ τὴν τῶν ὀργανικῶν σωμάτων σύνθεσιν. Ἐκ τῶν πλειο-
τέρων σχηματίζεται ὀξαλικὸν ὀξύ, καθὼς καὶ ὅπως διόλου διαφορετικὰ
ὀξεᾶ, πρὸς τούτοις προάγονται ῥητινώδη καὶ λιπαρὰ σώματα, πικραὶ
οὐσίαι καὶ ἄλλαι κρυσταλλώσιμοι ὕλαι. Ἐξ αὐτῶν ἀναφέρομεν τὰ ἐξῆς
ὡς κυριώτερα·

Ζαχαρικὸν ὀξύ.

Acidum Sacharicum.

Πρὸς κατάσκευσιν τούτου διαλύονται 4 μέρη ζαχάρους εἰς 24 μέρη
νιτρικοῦ ὀξέος 1,220 εἰδικῆς βαρύτητος καὶ τὸ διάλυμα θερμαίνεται
εἰς κερατίνην μεχρισοῦ τὸ νιτρικὸν ὀξύ παύσθαι νὰ ἀποσυντίθεται καὶ νὰ
ἐκλύῃ ἀέριόν τι. Ἡ ζάχαρις ἀποβάλλει μέρος ἀνθρακος, ὅστις διὰ τοῦ
νιτρικοῦ ὀξέος ὀξειδοῦται πρὸς ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἐκλύομενον μετὰ τοῦ νι-
τρογονοξειδίου. Τὸ εἰς τὴν κερατίνην ἐπιμένον ἀποψυχαινόμενον παρέχει
κρυστάλλους, οἵτινες δι' ἀναδιαλύσεως καθαρίζονται.

Τὰ διὰ τοῦ ῥηθέντος ὀξέος προαχθέντα ἄλατα ἔχουσι τὸ περίεργον
δίωμα νὰ μεταβάλλωνται διαλυόμενα μετ' ὀλίγον χρόνον εἰς τρυγικὰ
ἄλατα.

Μυτικὸν ὀξύ.

Acidum mucicum.

Τὸ ὀξύ τοῦτο σχηματίζεται ἐκ κόμμι ἢ ἡ ζάχαρις τοῦ γάλακτος
ζέεται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος· τὸ ἐκ τῆς ζαχάρους τοῦ γάλακτος ἀπο-
τελούμενον ὀξύ ὠνομάσθη ζαχαρογαλακτικὸν ὀξύ *acidum sachola-
cticque*. Τοῦτο τὸ ὀξύ σχηματίζεται συγχρόνως μετὰ τὸ μηλικὸν καὶ ὀξα-
λικὸν ὀξύ διὰ τῆς ἐπιφόρης τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν εἰρημένων ὑλῶν.
Μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τοῦ ρευστοῦ καταβυθίζεται κόνις λευκὴ, ἥτις ἀπο-
πλύνεται δι' ὕδατος πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ συγχρόνως σχηματιζομένου
μηλικοῦ καὶ ὀξαλικοῦ ὀξέος.

Τὸ ὀξύ τοῦτο παρίσταται ὡς κόνις λευκὴ ἔχουσα ὀξεῖαν γεῦσιν θερ-
μαινόμενῃ εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος ἀποσυντίθεται, ἐξαχνίζεται καὶ

μεταβάλλεται εἰς ἰδιαίτερον ὄξύ καλούμενον πυρομυξικόν ὄξύ (acidum pyromucicūm.)

Τὸ μυξικόν ὄξύ σύγκειται ἐξ

Ἄνθρακος	6. ατ.	36	—	34,29
Ὑδρογόνου	5. ατ.	5	—	4,37
Ὄξυγόνου	8. ατ.	64	—	60,95
		105	—	99,61

Τὰ διὰ τοῦ μυξικοῦ ὀξέος σχηματιζόμενα ἅλατα ἔχοντα βάσιν ἀλκάλια εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ³ καὶ ἐν μέρει κρυσταλλώσιμα. Αἱ πλείοται ἐνώσεις τοῦ ὀξέος μετὰ τῶν ὀξειδίων τῶν μετάλλων εἶναι ἀδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ, ἡ δὲ μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου εἶναι ὡχρὸν ἀδιάλυτον καταβύθισμα.

Καφουρικόν ὄξύ.

Acidum camphoricum.

Τοῦτο τὸ ὄξύ σχηματίζεται, ἐὰν ἡ καφουρά ζεσθῇ μὲ ὀκτὼ μέρη νιτρικοῦ ὀξέος, ἐωσοῦ νὰ μὴν ἐκλύεται νιτρῶδες ὄξύ· μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τοῦ ρευστοῦ κρυσταλλοῦται τὸ ὄξύ, τὸ ὅποῖον ἐπανειλημμένως διαλυόμενον δι' ὕδατος ζέοντος καὶ κρυσταλλούμενον δύναται νὰ καθαρισθῇ ἐντελῶς. Εἰς τὴν ζέσιν ἀφαιρεῖται ὑπὸ τῆς καφουράς ὀξυγόνον ἐκ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος καὶ τὸ ἀποκατασταθὲν νιτρικόν ὄξύ μεταβάλλεται εἰς νιτρῶδες, ἡ δὲ καφουρά εἰς καφουρικόν ὄξύ.

Χαρακτηριστικά. Σχηματίζει μικροὺς καὶ συνεχομένους κρυστάλλους ἔχοντας πικράν γεῦσιν, διαλυσίμους εἰς ἑκατονταπλοῦν ψυχροῦ ὕδατος καὶ εἰς διπλοὺν ζέοντος· εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ οἶνόπνευμα· τὸ διαλυόμενον ὅμως ὄξύ δὲν δύναται ἐξ αὐτῆς τῆς δι' οἶνοπνεύματος διαλύσεως νὰ καταβυθισθῇ διὰ προσθέσεως ὕδατος· σύγκειται ἐξ

Ἄνθρακος	10. ατ.	60	—	61,23
Ὄξυγόνου	6. ατ.	34	—	32,65
Ὑδρογόνου	6. ατ.	6	—	6,12
		100	—	100,

Τὰ διὰ τοῦ καφουρικοῦ ὀξέος σχηματιζόμενα ἅλατα εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ, κρυσταλλώσιμα καὶ ἄοσμα

ἔχουσι πικράν γεῦσιν καὶ διὰ τῆς προσθήκης δυνατωτέρου ὀξέος καταβυθίζεται ἐκ τῶν ἀλάτων τὰ καφουρικὸν ὀξύ.

Αἱ μεταλλικαὶ ἐνώσεις ἀποτελοῦνται, ἐὰν ἡ καφουρικὴ πότασσα συναφθῇ μὲ διαλύματα μεταλλικῶν ἀλάτων, αἱ δὲ ποριζόμεναι ἐνώσεις εἶναι ἀδιάλυτα καταβυθίσματα.

Ὁ ψευδάργυρος, μόλυθος, κασσίτερος, ἄργυρος, ὑδράργυρος καταβυθίζονται διὰ τῶν καφουρικῶν ἀλάτων ἐκ τῶν διαλυμάτων μετὰ λευκοῦ, ὁ σίδηρος μετὰ φαιού, ὁ χαλκὸς καὶ τὸ νικέλιον μετὰ πρασίνου χρώματος. Τὸ καφουρικὸν ὑποξειδίου τοῦ μαγγανησίου εἶναι εἰς τὸ ὕδωρ διαλύσιμον καὶ κρυσταλλώσιμον ἄλας.

Φελλικὸν ὀξύ.

Acidum subericum.

Τὸ φελλικὸν ὀξύ σχηματίζεται, ἐὰν φελλὸς ζυσμένος ἢ κατὰ τινα τρόπον λειοτριβημένος, ἢ καὶ χάρτης ζέεται διὰ νιτρικοῦ ὀξέος ἕως οὗ νὰ μὴν ἐκλύῃ νιτρογονοξειδίου. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν εἰρημένων ὀργανικῶν ὑλῶν σχηματίζεται κηρώδης τις ὕλη, ἥτις μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἐξατμιζομένου ρευστοῦ ἐπιμένει. Ἐὰν δὲ ἐξατμισθῇ τὸ ρευστὸν περισσότερον, λαμβάνομεν τὸ ὀξύ εἰς εἶδος ἀόσμου καὶ ἐχούσης ὑπόξινον γεῦσιν· διαλύεται εἰς 80 μέρη ψυχροῦ ὕδατος καὶ εἰς 2 ζέοντος, εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ οἶνονπνευμα, εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ ἔλαιον τῆς τερεβινθίνης. Ἐὰν ἀναμιχθῇ μετὰ τιτάνιου ἀποσταχθῇ, ἐξάγεται ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, τὸ ὁποῖον καθαριζόμενον ὀνομάζεται *Suberin*.

Εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος προαγομένων ὀξέων ἀνήκει καὶ ἰδιαίτερόν τι λιπῶδες ὀξύ, σχηματιζόμενον διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ στεατικοῦ ὀξέος. Κατεργαζόμενον τὸ στεατικὸν ὀξύ μετὰ τοῦ νιτρικοῦ διαλύεται ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν τοῦ νιτρογονοξειδίου· ἐξατμιζομένου δὲ τοῦ ρευστοῦ ἐπιμένει πυκνὴ, κιτρίνη, ὀξεῖα, μετὰ κρυστάλλων συμμεμιγμένη μάζα, συγκειμένη ἐκ τοῦ ἰδιαίτερου τούτου ὀξέος καὶ πινος λιπώδους ὕλης. Ἐὰν ἡ μάζα αὕτη κατεργασθῇ μὲ 25 μέρη ψυχροῦ ὕδατος διαλύεται τὸ ὀξύ, τὸ ὁποῖον διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ ρευστοῦ κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος μικρῶν φυλλιδίων.

Περὶ τῶν φυτικῶν ἀλατογόνων βάσεων.

Ὁ Serturner πρῶτος ἀνεκάλυψεν εἰς τὰ φυτὰ ὀργανικὴν ἀλατογόνον βάσιν δηλαδὴ τὸ μόρφιον· μετ' ὀλίγον δὲ ἀνεκκλύφθησαν τὸ στρύχνιον, τὸ βεράτριον καὶ πολλαὶ ἄλλαι. Αὗται αἱ βάσεις ὀνομαζόμεναι καὶ φυτικά ἀλάλια εὐρίσκονται εἰς τὰ φυτὰ πάντοτε ἠνωμένοι μετὰ ὀργανικῶν ὀξέων ὡς μετὰ τοῦ μηλικοῦ, κικιδικοῦ καὶ ἄλλων.

Πρὸς ἀποχώρησιν τῶν βάσεων τούτων ἐκ τοῦ ὑδατώδους ἐμβρογγιατοῦ τῆς ὀργανικῆς οὐσίας δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ἡ ῥευστὴ ἀμυωνία, ἥτις σχηματίζει μετὰ τοῦ ὀξέος εὐδιάλυτον ἄλας καὶ καταβυθίζει τὴν βάσιν ὡς ἐν τῷ ὕδατι ἀδιάλυτον σῶμα, ἢ τὸ ἐμβρογγιαζόμενον μὲ κεκαυμένην μαγνησίαν καὶ διυλίζόμενον μετὰ τὴν ἀπόψυξιν. Τὸ καταβύθισμα ἀποπλύνεται μὲ ψυχρὸν ὕδωρ διὰ νὰ ἀποχωρισθῇ ἡ χρωματιστικὴ ὕλη, καὶ μετὰ ταῦτα ζέσται μὲ οἰνόπνευμα, τὸ ὅποιον διαλύει τὴν βάσιν· ἐξατμισθέντος δὲ τοῦ οἰνοπνεύματος ἐπιμένει ἡ βάσις εἰς κρυσταλλωμένην ἢ κονιώδη κατάστασιν. Οὕτω δύναται νὰ κατασκευασθῇ τὸ μόρφιον ἐκ τοῦ ὀπίου, τὸ στρύχνιον ἐκ τῶν ἐμετικῶν καρῶν ἢ ἐκ τῶν σπερμάτειν τῆς ἱγνατίας κ.τ.λ.

Φυσικὰ χαρακτηριστικά. Ἄπασσι σχεδὸν αἱ βάσεις εἶναι εἰς κηκτρὰν κατάστασιν στερεαί, λευκαὶ καὶ ἄοιμοι· αἱ ῥευσταὶ μόνον ἔχουσιν ἰδιαιτέραν ὀσμὴν· ὡς πρὸς τὴν γεῦσιν ὅμως τινὲς εἶναι πικραὶ, τινὲς δὲ δριμεῖαι· ἅπασαι εἶναι βαρύτεραι τοῦ ὕδατος καὶ σχηματίζουνσι κρυστάλλους ἢ λευκὴν κόκκιν.

Χημικὰ χαρακτηριστικά. Αἱ στερεαὶ βάσεις ὀλίγον διαλύονται εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ· τὸ μόρφιον δύναται νὰ θεωρηθῇ σχεδὸν ὡς ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ ψευδοστρύχνιον ἀπικτεῖ 100, τὸ δὲ στρύχνιον 6000 μέρη ψυχροῦ ὕδατος πρὸς τελείαν διάλυσίν του. Τὸ ζέον ὕδωρ διαλύει εὐκολώτερον τὰς ὕλας ταύτας ἀπὸ τὸ ψυχρὸν. Αἱ δὲ βάσεις αἵτινες εὐρίσκονται εἰς ῥευστὴν κατάστασιν εἶναι εὐδιάλυται εἰς τὸ ὕδωρ. Αἱ στερεαὶ βάσεις θερμαινόμεναι φθείρονται μὲν, ἀλλὰ δὲν ἐξαχνίζονται. Τὸ οἰνόπνευμα διαλύει τὰς πλείους βάσεις εὐκόλως καὶ εἰς ἀρκετὴν ποσότητα. Ὁ αἰθὴρ δὲν δεικνύει οὐδεμίαν ἐνέργειαν ἐπὶ τοῦ μορφίου, στρυχνίου καὶ ψευδοστρυχνίου, ἐνῶ πολλὰ ἄλλα διαλύονται εἰς αὐτόν. Τὰ διαλύματα ἐκείνων τῶν βάσεων, αἵτινες ἔχουσιν ἀλκαλικὰ χαρακτηριστικὰ πρᾶσνίζουσι τὸ διὰ ἴων σεράπιον καὶ μεταβάλλουσι τὸν τῆς κροκορροῆς δοκιμαστικὴν χάρτην εἰς φαιόν. Ἄπασαι αἱ βάσεις συνίστανται ἐξ

άνθρακικῆς ὕλης, ὀξυγόνου, ὕδρογόνου καὶ νιτρογόνου. Ἡ πρὸς τὰ ὀξέα ἐνέργεια τῶν βάσεων εἶναι διπλῇ, ἢ οὐδετερόνουν τὰ ὀξέα ἐντελῶς, ἢ ἐξουδετερόνουν αὐτὰ ἐν μέρει μόνον, σχηματίζονται δηλ. μετ' αὐτῶν πάντοτε ὀξέα ἄλλατα· ἔχουσιν ὀλίγην κορρεστικὴν δύναμιν καὶ ἀπαιτοῦσι μικρὰν ποσότητα ὀξέος διὰ νὰ σχηματίσωσι μετ' αὐτοῦ ἄλας. Αἱ βάσεις ἔχουν τὰ αὐτὰ χαρὰκτηριστικὰ τοῦ φυτοῦ ἐκ τοῦ ὁποίου περήχθησαν καὶ εἰς αὐτὰς ὑπάρχει μάλιστα ἡ δύναμις τοῦ φυτοῦ συγκεντρωμένη· πολλὰς ἐξ αὐτῶν μεταχειρίζονται εἰς τὴν ἰατρικὴν.

Μόρφιον.

Morphine.

Τὸ μόρφιον ἀνεκαλύφθη κατὰ τὸ 1016 ὑπὸ τοῦ Serturmer εἰς τὸ ὄπιον, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ μορφίου καὶ ἄλλας τρεῖς ἀλατογόνους βάσεις, τὴν κωδίνην, τὸ ναρκώτιον καὶ τὸ θηβάϊον. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ μορφίου ἐφευρέθησαν διάφοροι τρόποι συμφωνοῦντες ὅλοι εἰς τὸ νὰ ἐκχυλίσθῃ τὸ ὄπιον δι' ὕδατος δι' ὀξικοῦ ὀξέος κεκραμένου ἢ καὶ δι' ἄλλου ὀξέος, διὰ τοῦ ὁποίου νὰ διαλύεται κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον τὸ ἐν τῷ ὀπίῳ ἐμπεριεχόμενον μηκωνικὸν μόρφιον. Πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ μορφίου προστίθεται ἀνόργανός τις ἀλκαλικὴ βάση, μηχανικῶς φερ' εἰπεῖν, ἥτις ἐνούμενη μετὰ τοῦ μηκωνικοῦ ὀξέος καταβυθίζει τὸ μόρφιον, τὸ ὁποῖον καθαίρεται μετὰ ταῦτα διὰ τῆς διαλύσεως εἰς ζέον οἰνόπνευμα καὶ δι' ἐπικειλημμένης κρυσταλλώσεως. Ἐμπεριέχει δὲ αὐτὸ καὶ ναρκώτιον, ἀπὸ το ὁποῖον καθαίρεται κατὰ τοὺς ἐξῆς τρόπους.

Τὸ ἀκάθαρτον μόρφιον διαλύεται εἰς δι' ὕδατος κεκραμένον ὑδροχλωρικὸν ὀξύ· τὸ διάλυμα τοῦτο ἐξετμιζόμενον μέχρι κρυσταλλώσεως παρέχει μόνον κρυστάλλους ὑδροχλωρικοῦ μορφίου, οἵτινες διὰ δυνατῆς ἐκθλίψεως δύνανται νὰ χωρισθῶσιν ἀπὸ τὸ μὴ κρυσταλλώσιμον ὑδροχλωρικὸν ναρκώτιον. Ἄλλος τρόπος εἶναι νὰ κορεσθῇ τὸ εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ διάλυμα ἀμφοτέρων τῶν βάσεων μὲ κοινὸν ἄλας, δι' οὗ καταβυθίζεται τὸ ναρκώτιον μετὰ παρέλευσιν τινῶν ἡμερῶν εἰς εἶδος συνεχομένων κρυστάλλων, ἐκ δὲ τοῦ διῦλισθέντος ὑγροῦ ἀποχωρίζεται τὸ μόρφιον διὰ καυστικῆς ἀμμωνίας. Τέλος δύνανται ν' ἀποχωρισθῶσιν ἀμρότεραι αἱ βάσεις, ἐὰν ἡ εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ διάλυσις αὐτῶν συμμιχθῇ μὲ τόσον κεκραμένον καυστικὸν κάλιον, ὥστε αὐτὸ νὰ ὑπερτερῇ ὀλίγον· εἰς ταύτην τὴν περίστασιν ἀναδιαλύεται πάραυτα τὸ καταβυθιζόμενον μόρφιον· τὸ δὲ ναρκώτιον κατακρημνίζεται ὡς τυρῶδες ἴζημα.

Χαρακτηριστικά. Τὸ καθαρὸν μόρφιον κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος διαφκῶν, στυλινῶν, κωνονικῶν πρισματῶν ἢ ὀκταέδρων, τὰ ὅποια εἶναι ἀμετάβλητα εἰς τὸν ἀέρα, ἐμπεριέχουσι 6,32 κρυσταλλίνου ὕδατος καὶ εἶναι πολλὰ πικρὰ τὴν γεῦσιν. Δι' ἐλαφροῦ πυρὸς τήκεται τὸ μόρφιον καὶ μεταβάλλεται εἰς ῥευστὸν ὠχρὸν, διαφανές, πηγνύμενον μετὰ τὴν ψύξιν, θερμαινόμενον δὲ ὑπὸ τὴν ἐπίρροήν τῆς ἀτμοσφαιρας, ἀναφλέγεται καὶ ἐκπέμπει ἐρυθρὰν φλόγα ἐπιμένοντος ἀνθρακος. Διὰ τοῦ ἀκράτου νιτρικοῦ ὀξέος ἐρυθροῦται πρῶτον, ἔπειτα καθίσταται ὠχρὸν καὶ μεταβάλλεται εἰς ὀξαλικὸν ὀξύ· εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ εἶναι σχεδὸν ἀδιάλυτον, διαλύσιμον δὲ εἰς 500 μέρη ζέοντος ὕδατος, ὡς καὶ εἰς 40 μέρη ψυχροῦ 30 δὲ ζέοντος οἶνοπνεύματος. Εἶναι διαλύσιμον εἰς τὰ λιπαρὰ καὶ πτητικὰ ἔλαια καὶ σχεδὸν ἀδιάλυτον εἰς τὸν αἰθέρα· τὸ εἰς οἰνόπνευμα διαλυμένον μόρφιον ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ δοκιμαστικοῦ χάρτου ὡς τὰ ἀλκάλια· τὸ μόρφιον διαλύεται καὶ εἰς τὰ ἀλκάλια καθὼς καὶ εἰς τὸ τιτάνιον ὕδωρ.

Τὸ μόρφιον ἐνοῦται μετὰ τῶν ὀξέων καὶ σχηματίζει μετ' αὐτῶν οὐδέτερα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κρυσταλλώσιμα ἄχροα καὶ πικρὰ ἅλατα. Τὰ διαλύματα τῶν διὰ μορφίου ἀλάτων καταβυθίζονται διὰ τῶν ἀλκαλίων καὶ διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων. Τὸ μόρφιον καὶ τὰ δι' αὐτοῦ ἅλατα εἰς στερεάν κατάστασιν ἐπιχυθέντα μὲ νιτρικὸν ὀξύ λαμβάνουσιν ἐρυθρὸν χρῶμα μεταβαλλόμενα μετὰ ταῦτα εἰς ὠχρὸν· τοῦτο δὲ τὸ χαρακτηριστικὸν ἔχουσι καὶ τὸ στρύχνιον, τὸ ψευδοστρύχνιον καὶ τὰ δι' αὐτῶν ἅλατα. Τὸ μόρφιον λαμβάνει πράσινον χρῶμα διὰ μίγματος ἐκ νιτρικοῦ καὶθεικοῦ ὀξέος. Ἐάν τὸ μόρφιον ἢ τὰ δι' αὐτοῦ ἅλατα συμμιχθῶσι μὲ διάλυσιν οὐδετέρου τινὸς ἁλτος δι' ὀξειδωμένου σιδήρου, λαμβάνει τὸ μίγμα βαθυκυανοῦν χρῶμα, χαρακτηριστικὸν, δι' οὗ δύναται νὰ διακριθῇ τὸ μόρφιον εὐκόλως ἀπὸ τὰς ἄλλας βάσεις· τὸ κυανοῦν τοῦτο χρῶμα ἐξαλείφεται διὰ τῆς προσθήκης ὀξέος τινὸς, δύναται ὅμως νὰ ἀνακατασταθῇ διὰ τῆς ἐξουδετερώσεως τοῦ ὑπερτεροῦντος ὀξέος ὑπὸ τῶν ἀλκαλίων. Τὸ κυανοῦν χρῶμα ἐξαλείφεται ἐπίσης, ἐάν θερμανθῇ διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος, διὰ τοῦ νάρθα καὶ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, ὅχι δὲ καὶ διὰ τοῦ διὰθεικοῦ ὀξέος αἰθέρος. Τὸθεικὸν μόρφιον κρυσταλλοῦται εἰς συνεχομένης μεταξοειδεῖς ἀγγίδας, ἀμεταβλήτους εἰς τὸν ἀέρα καὶ διαλυσίμους εἰς 2 μέρη ψυχροῦ ὕδατος. Ὑπάρχει καὶθεικὸν μόρφιον μεθ' ὑπερτεροῦντος ὀξέος.

Τὸ ὕδροχλωρικὸν μόρφιον σχηματίζει λεπτὰ πρίσματα διαλύσιμα εἰς 16 μέρη ὕδατος καθὼς καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Νιτρικὸν μόρφιον. Ἐάν τὸ στερεὸν μόρφιον ἐπιχυθῇ μὲ νιτρικὸν ὀξύ,

λαμβάνει ἐρυθρὸν καὶ μετὰ ταῦτα ὡχρὸν χροῖμα, διαμεινύσης δὲ τῆς ἐπιπόρου τοῦ ὀξέος, μεταβάλλεται τὸ μὶοριον εἰς ὀξαλικὸν ὀξύ· ἐὰν ὅμως τὸ μὶοριον κορεσθῇ μὲ κεκραμένον νιτρικὸν ὀξύ, σχηματίζεται οὐδέτερον ἄλας κρυσταλλούμενον διὰ τῆς ἐξατμίσεως εἰς ἀστεροειδεῖς ἀγκίδας καὶ διαλύσιμον εἰς $1 \frac{1}{2}$ μέρη ὕδατος.

Ὀξικὸν μὶοριον. Ἐκ τῆς ὀξινῆς διαλύσεως τοῦ μὶορίου εἰς κεκραμένον ὀξικὸν ὀξύ κρυσταλλοῦται τὸ ἄλας εἰς συνεχομένης ἀγκίδας, εὐδιαλύτους εἰς τὸ ὕδωρ, δυσδιαλύτους δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Δι' ἰσχυρᾶς ἐξατμίσεως ἀναθυμιάται ὀλίγον ὀξικὸν ὀξύ, ἀποχωριζομένου μέρους τοῦ μὶορίου. Τὸ ὀξικὸν μὶοριον εἶναι χρήσιμον εἰς τὴν ἱατρικὴν καὶ ἔδωκε πολλάκις αἰτίαν θανατηφόρων δηλητηριάσεων· ἀντίδοτα δὲ τούτων θεωροῦνται τὰ ἀφεψήματα τῶν στυπτικῶν οὐσιῶν.

Τὸ *μηκωνικὸν μὶοριον* εὐρίσκεται μὲν εἰς τὸ ὄπιον, ἀλλὰ δὲν εἶναι κρυσταλλώσεως ἐπιδεκτικόν. Εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα εἶναι εὐδιάλυτον, ἐνούμενον μετὰ τινος δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἁλτος λαμβάνει αἰματόχρουν χροῖμα, διὰ τοῦ ὁποῖου ἀνακαλύπτεται ἡ παρουσία τοῦ μηκωνικοῦ ὀξέος· ἔνεκα δὲ τούτου μεταχειρίζονται τὰ δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἅλατα πρὸς ἐξίχνευσιν τῆς παρουσίας τοῦ ὀπίου.

Τὸ μὶοριον συνίσταται κατὰ τὸν Liebig ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	72, 340
Ἵδρογόνου	6, 366
Νιτρογόνου	4, 995
Ὄξυγόνου	16, 299
	100,

Κωδίτη.

Codein.

Τὸ φυτικὸν τοῦτο κίλιον ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Vauquelin, τὸ δὲ ὄνομα τῆς βάσεως ταύτης παρήχθη ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ ὀπίου *Κωδία* ὀνομαζομένους. Πρὸς κατασκευὴν τῆς ἐφευρέθησαν διάφοροι μέθοδοι, ἐξ ὧν ἀναφέρομεν τὴν ἐξῆς ὡς καλλητέραν.

Ἀφοῦ ἔκ τινος εἰς τὸ φύκος κατασκευαζομένου ἐμβρέγματος τοῦ ὀπίου καταβυθισθῇ διὰ τῆς ἀμμωνίας ἡ μορφίνη, ἀποχωρίζεται τὸ μηκωνικὸν ὀξύ διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς τιτάνου. Τὸ δι' ὕδατος κεκραμένον ρευστὸν καταβυθίζεται ἐπομένως δι' ὀξικοῦ μολύβδου καὶ ἀποχωρισθέντος τοῦ τελευταίου κατα-

θυοσίματος, αποχωρίζεται ὁ διαλυθεὶς ὀξικός μόλυβδος διὰ θεϊκοῦ ὀξέος, προστίθεται μετὰ ταῦτα ἀνθρακική πέτασσα καὶ ἐξατμίζεται, μεχραιοῦ ἀπολειφθῇ πυκνὴ τις μάζα ἐξ ἧς ἐκχυλίζεται ἡ κωδίνη διὰ τοῦ αἰθέρος· ἐξατμισθέντος τέλους τοῦ αἰθέρος ἐπιμένει διαφανὲς μάζα, ἥτις παρέχει κορεσθεῖσα δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος κρυσταλλώσιμον ὑδροχλωρικὴν κωδίνην.

Χαρακτηριστικά. Ἡ κωδίνη εἶναι ἄσμος καὶ σχεδὸν ἄχυμος, τήκεται εἰς θερμότητα 150° καὶ πήγνυται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν πρὸς κρυσταλλώσιμον μάζαν, ἐπὶ ἐρυθρωμένου καγκαμίνου χάρτου ἐνεργεῖ ὡς ἀρκετὰ δυνατὴ βάσις· ἐν μέρος κωδίνης διαλύεται εἰς 12 μέρη ψυχροῦ ὕδατος καὶ ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου ἀποτίθενται διαφανεῖς τετραγωνικοὶ κρύσταλλοι.

Ἡ κωδίνη σχηματίζει μετὰ τῶν ὀξέων ἄλατα ἔχοντα πικρὰν γεῦσιν, τὰ ὁποῖα δὲν κυανίζονται διὰ τῶν ἀλάτων τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, μήτε ἐρυθροῦνται παρὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, καταβυθίζονται δὲ διὰ τοῦ ἐμβρέγματος τῶν κηκίδων. Τὰ πλείοτερα τῆς κωδίνης ἄλατα εἶναι κρυσταλλώσιμα καὶ μὲ ἰδιαιτέραν εὐκολίαν κρυσταλλοῦνται ἢ ὑδροχλωρικὴ κωδίνη. Ἡ κωδίνη ἐσωτερικῶς λαμβανομένη ἐνεργεῖ καθὼς ἡ μορφίνη, δὲν προξενεῖ δὲ καρδιορραγίαν μετὰ τὸν ὕπνον καὶ ἐνεργεῖ ἰδίως ἐπὶ τῶν νευρῶν, τῶν ὁποίων τὰ γάγγλια εἶναι πλησίον τοῦ στομάχου.

Ναρκώτιον.

Narcotine, Opiane.

Τὸ ναρκώτιον ἀνεκαλύφθη κατὰ τὸ 1803 παρὰ τοῦ Derosne καὶ ἐγνωρίζετο πολὺν καιρὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα ἄλλας τοῦ Derosne. Τὸ ναρκώτιον δύναται νὰ κατασκευασθῇ, διαλυομένου τοῦ ναρκωτιούχου μορφίου εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ· διὰ τῆς ἐξατμίσεως καὶ ἀποψύξεως τοῦ διαλύματος κρυσταλλοῦται τὸ ὑδροχλωρικὸν μόρφιον, τὸ δὲ μὴ κρυσταλλώσιμον ναρκώτιον εὐρίσκεται εἰς τὸ ἐπιμένον ρευστὸν, ἐκ τοῦ ὁποίου δύναται νὰ καταβυθισθῇ διὰ καυστικῆς ἀμμωνίας. Ὡσαύτως δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὸ ἀκάθαρτον μόρφιον διὰ τοῦ αἰθέρος, τοῦ ὁποίου ἐξατμισθέντος, ἐπιμένει εἰς καθάραν κατάστασιν.

Τὸ ναρκώτιον κρυσταλλοῦται εἰς μεγάλους ἀχρούς κρυστάλλους ἢ εἰς μαργαριτοειδῆ λεπίδια, εἶναι ἄχυμον, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, διαλύσιμον δὲ εἰς 400 μέρη ζέοντος ὕδατος, ὡς καὶ εἰς 100 ψυχροῦ καὶ 24

θερμού οίνουπνεύματος, πρὸς τούτοις διαλύεται εἰς τὸν αἰθέρα, καθὼς καὶ εἰς τὰ πτητικὰ καὶ λιπαρὰ ἔλαια, αἱ διαλύσεις τοῦ ναρκωτίου δὲν μεταβάλλουσι τὸ τῆς κροκορρίνης χρῶμα.

Τὸ ναρκώτιον συνίσταται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης.	65, 66
Ὄξυγόνου	26, 99
Νιτρογόνου.	2, 51
Ἵδρογόνου	5, 50
	100.

Τὰ ὀξέα δὲν οὐδετερόνονται ἐντελῶς διὰ τοῦ ναρκωτίου καὶ ἕνεκα τούτου εἶναι ἅπαντα τὰ διὰ ναρκωτίου ἄλατα ὀξινά. Πρὸς κατασκευὴν αὐτῶν διαλύεται τὸ ναρκώτιον εἰς τὰ μὲ ὕδωρ κεκράμενα ὀξέα καὶ τὸ διάλυμα ἐξατμίζεται· εἶναι δὲ ὅλα εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ πολὺ πικρά τὴν γεῦσιν, διὰ μὲν τῶν ἀλκαλίων κατακρημνίζονται μετὰ λευκοῦ, διὰ δὲ τοῦ τῶν κηκίδων βάμματος μετὰ ὤρου χρώματος.

Ἐπειδὴ τὸ ναρκώτιον συνεχέστο πολὺν καιρὸν μετὰ τοῦ μόρφου, δὲν ἤθελεν εἶσθαι περιττὸν νὰ ἀναφέρωμεν τὰ χαρακτηριστικὰ, διὰ τῶν ὁποίων δύνανται νὰ διακριθῶν μετὰξὺ των. Τὸ μόρφιον ἔχει γεῦσιν πικράν τῆς ὁποίας στερεῖται τὸ ναρκώτιον. Τὸ ναρκώτιον διαλύεται εὐκόλως εἰς τὸν αἰθέρα, ὅχι ὅμως τὸ μόρφιον· τοῦτο εἶναι διαλύσιμον εἰς τὰ ἀλκάλια, ὅχι δὲ καὶ τὸ ναρκώτιον. Τὸ ναρκώτιον δὲν ἐρυθροῦται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, ἐπιχυθὲν δὲ μὲ θεικὸν ὀξύ $\frac{1}{1000}$ μόνον νιτρικοῦ ὀξέος ἐμπεριέχον λαμβάνει αἱματόχρουν χρῶμα. Τὸ αὐτὸ χρῶμα προάγεται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, τοῦ ὀξυγόνου καὶ τοῦ ὀξειδίου τοῦ νιτρογόνου ἐπὶ τοῦ εἰς ἄκρατον θεικὸν ὀξύ διαλυμένου ναρκωτίου. Μήτε τὸ ναρκώτιον μήτε τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα κυανίζονται διὰ τῶν τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου ἀλάτων, ἐνῶ τοῦτο ἐκτελεῖται εἰς τὸ μόρφιον καὶ εἰς τὰ ἐξ αὐτοῦ ἄλατα.

Στρώγγιον.

Strychnine.

Τὸ στρώγγιον ἀνεκαλύφθη κατὰ τὸ 1818 παρὰ τοῦ Pelletier καὶ Caven-
του εἰς τὰ ἐμετικὰ κάρυα, μετὰ ταῦτα δὲ εὐρέθη καὶ εἰς τὸ τῆς Ἰγνατίας
σπέρμα *Ignatia amara*, εἰς ξύλον μεταφερόμενον ἐκ τῆς Ἰνδίας καλού-

μενον ὀφιδόζυλον καὶ ἀνῆκον εἰς δένδρον ὀνομαζόμενον *Strychnus colubrina* καὶ εἰς δηλητηρίον τι καλούμενον *Upas* ἢ *Woorara* καὶ μεταχειριζόμενον ὑπὸ τῶν Ἰνδῶν πρὸς κατασκευὴν θανατηφόρων βελῶν. Τὸ στρύχγιον εὐρίσκεται εἰς τὰς οὐσίας ταύτας ἠνωμένον μετὰ τοῦ γαλακτικοῦ ὀξέος καὶ ἐνομιζέτο πρῶτον ἰγασουρικὸν ὀξύ, καθὼς καὶ μεμιγμένον κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἦττον μετὰ τοῦ ἄλλοτος ἐτέρας τινὸς βάσεως τοῦ ψευδοστρυχνίου. Ὑπάρχουν διάφοροι τρόποι πρὸς ἐκχύλισιν τοῦ στρυχνίου μεταξὺ τῶν ὁποίων προτιμότεροι εἶναι οἱ ἐξῆς.

Κάρυα ἐμετικὰ ἐξυσμένα κατεργάζονται δις ἢ τρις εἰς τετραπλοῦν οἶνο-πνεύματος ἀγοραίου· ἐκ τῶν διὰ τῆς ἐκθλίψεως ληφθέντων βαμμάτων ἀπο-σάζεται τὸ οἶνόπνευμα καὶ ἔπειτα ἐξατμίζεται τὸ ὑπόλειμμα, ἕωσού τὸ μένον ὑγρὸν νὰ ἰσοσταθμῇ μὲ ἐν καὶ ἡμισυ μέρος τῶν ληφθέντων καρύων· μὲ τοῦτο ἀναμίγνυνται διάλυμα ὀξικοῦ μολύβδου, ἐνῶσθι γεννᾶται ὑπ' αὐτοῦ ὑποστάθμη. Τὸ προαχθὲν ἴζημα ἀποπλύνεται καλῶς καὶ τὸ διῶλιζόμενον ῥευστὸν ἐξατμίζεται τόσον, ὥστε ἐκ 16 οὐγγίων ἐμετικῶν καρύων νὰ μείνωσι μόνον 6 ἢ 8 οὐγκία ῥευστοῦ· μὲ τοῦτο τὸ ῥευστὸν ἀναμειγνύονται 2 δράμια μαγνησίας καὶ κατεργάζονται ἡμέρας τινὰς πρὸς ἐντελῇ ἀποχώρησιν τῆς διαλυθείσης βρουκίνης. Τὸ οὕτω ληφθὲν καταβύθισμα ξηραίνόμενον κα-τεργάζεται μὲ οἶνόπνευμα 0,830 εἰδικῆς βαρύτητος. Ἐάν ἐκ τοῦ δια-λύματος τούτου ἀποσταχθῇ τὸ οἶνόπνευμα ἀποτίθεται ἡ στρυχνίνη εἰς εἶδος λευκῆς κρυσταλλωσίμου κόνεως, τῆς βρουκίνης εἰς τὸ ῥευστὸν ἐπιμενούσης.

Ἄν καὶ ἡ οὕτω ληφθεῖσα στρυχνίνη δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς καθαρὰ, μόνον τοῦτο πρὸς ἐντελῇ ἀποχώρησιν τῆς βρουκίνης διαλύεται εἰς νι-τρικὸν ὀξύ κεκραμένον καὶ τὸ διάλυμα ἐξατμιζόμενον ἐκτίθεται εἰς κρυστάλλωσιν. Ἡ σχηματισθεῖσα νιτρικὴ στρυχνίνη κατ' ἀρχὰς κρυσταλ-λοῦται εἰς εἶδος πτερωτῶν λευκῶν καὶ καθαρῶν κρυστάλλων, βραδύτερα δὲ ἡ νιτρικὴ βρουκίνη εἰς μεγάλους σκληροὺς καὶ κυβικοὺς κρυστάλλους. Ἐκ ταύτης τῆς νιτρικῆς στρυχνίνης ἀπολαμβάνεται ἡ καθαρὰ στρυχνίνη, ἐάν αὕτη διαλυθεῖσα καταβυθισθῇ διὰ τινος ἀλκαλίου. Ἐκ 16 οὐγγίων ἐμετικῶν καρύων ἀπολαμβάνονται 40 κόκκοι νιτρικῆς στρυχνίνης καὶ 50 κόκκοι νιτρικῆς βρουκίνης.

Ἐπειδὴ εἶναι δύσκολον νὰ ἀποχωρισθῇ ἡ στρυχνίνη ἀπὸ τὴν βρουκίνην, μεθ' ἧς σχεδὸν πάντοτε εὐρίσκεται ἠνωμένη, κατασκευάζεται εὐκολώ-τερον ἐκ τῶν τῆς Ἰγνατίας σπερμάτων κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Τὰ διὰ ῥίνης λειοτριβηθέντα σπέρματα κατεργάζονται δι' αἰθέρος, δι' οὗ δια-

λύεται ἐξ αὐτῶν λίπος· ἀκολουθῶς ζέονται δι' οἰνοπνεύματος ἐπανειλημμένως, τὰ ἀφεψήματα ἀποστάζονται καὶ τὸ ὑπόλειμμα ζέεται με ὕδωρ καὶ μαγνησίαν· τὸ τοιοῦτοτρόπως ἀποτελεσθὲν ἵζημα ἀφοῦ ἐκπλυθῇ καὶ ξηρανθῇ ζέεται δι' οἰνοπνεύματος, δι' οὗ διαλύεται ἡ στρυχνίνη.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι ὕλη ἀλκαλοειδῆς, ὑποκρυσταλλώδης, λευκῇ, ἄοσμος, πικροτάτῃ, ναυτιώδης τὴν γεῦσιν, εἰς τὸ ὕδωρ σχεδὸν ἀδιάλυτος· ἀπαιτεῖ 6660 ψυχροῦ καὶ 250 ζέοντος ὕδατος πρὸς διάλυσιν, εἰς τὸν αἰθέρα εἶναι ὀλίγον διαλυτὴ, εἰς δὲ τὸ οἰνόπνευμα καὶ αἰθέρια ἔλαια εὐδιάλυτος. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἀκράτου λαμβάνει τὸ στρύχνιον κατ' ἀρχὰς χρῶμα ἐρυθροῦν καὶ ἀκολουθῶς ὠχρὸν καὶ πρᾶσινωπὸν· διὰ τοῦ χλωρίου ἀποσυντίθεται πάραυτα. Ἐὰν διὰ τοῦ καθαροῦ στρυχνίου ἢ διὰ τινος ἄλλου διοχετευθῇ χλωρίον, σχηματίζονται λευκαὶ κροκίδες καὶ διὰ συνεχοῦς διόδου τὸ στρύχνιον ἀποσυντίθεται. Ἐὰν τὸ στρύχνιον ἐμπεριέχῃ βρουκίνην χρωματίζεται τὸ διάλυμα ἐρυθροῦν· σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος 76, 43

Ὄξυγόνου 11, 66

Νιτρογόνου 5, 81

Ἵδρογόνου 6, 70

100,

Διὰ τοῦ στρυχνίου δύνανται νὰ οὐδετερωθῶσιν ἐντελῶς τὰ ὀξέα· τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα εἶναι διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ, πικρότατα τὴν γεῦσιν καὶ κρυσταλλώσιμα· διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων θολόνονται, διὰ δὲ τῶν ἀλκαλίων ἀποσυνθέτονται.

Τὸ *θεικὸν στρύχνιον* κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος μικρῶν διαφανῶν κυβικῶν κρυστάλλων, οἵτινες χάνουσι τὴν διαφάνειάν των, ἐὰν ἐκτεθῶσιν εἰς τὴν ἐπιφύσην τῆς ἀτμοσφαίρας. Δι' ὀλίγης θερμότητος τήκεται, συμπηγνύεται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν καὶ διαλύεται εἰς 10 μέρη ὕδατος.

Τὸ *Νιτρικὸν στρύχνιον* σχηματίζει κρυστάλλους βελονοειδεῖς, ἀχρόους, μεταξῶδεις τὴν στιλπνότητα, πικροτάτους, εἰς μὲν τὸ βραστὸν ὕδωρ εὐκόλως, εἰς δὲ τὸ οἰνόπνευμα δυσκολώτερον διαλυομένους.

Τὸ *ὕδροχλωρικὸν στρύχνιον* σχηματίζεται καθὼς καὶ τὸ νιτρικὸν στρύχνιον διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ καθαροῦ στρυχνίου εἰς τὸ εἰρημένον ὀξύ.

Τὸ στρύχνιον καθὼς καὶ αἱ ἐνώσεις αὐτοῦ εἶναι πολλὰ κινδυνώδη δηλητήρια εἴτε ἐξωτερικῶς ληφθῶσι, εἴτε ἐπὶ τραυμάτων ἐπιχυθῶ-

σι· ἡ ἐνέργειά των προμηνύεται διὰ τινων σπαρμωδικῶν φαινομένων τῶν μυῶν τοῦ νοτιαίου μυελοῦ, διὰ τῶν ὁποίων ὅλον τὸ σῶμα στρέφεται πρὸς τὰ ὀπισθεν, καὶ μετ' ὀλίγον ἐπιφέρει θάνατον τετρατημόριον ἐνὸς κόκκου ἀρκεῖ πρὸς ταχεῖαν δηλητηρίασιν κυνός· τὰ κυριώτερα δὲ ἀντίδοτα κατὰ τοιαύτης διὰ στρυχνίου δηλητηριάσεως θεωροῦνται τὸ ἔμβρεγμα τῶν κηκίδων καὶ τοῦ τέϊ, ἐπειδὴ τὸ βυρσοδεψικόν ὀξύ παρέχει ἀδιάλυτόν τινα ἔνωσιν.

Τὸ στρύχνιον μεταχειρίζεται ὡς ἱμακτικὸν μέσον εἰς μικράν δόσιν εἰς παραλυτικὰς νότους.

Βρουκίνη. Brucine.

Τὸ βρούκιον ἀνκαλύφθη κατὰ τὸ 1819 ἔτος εἰς τὸν φλοιὸν τῆς ψευδοῦς ἀγγοστύρας *Brucea antidysenterica* δένδρον εἰς τὴν νότιον Ἀμερικὴν φυομένου, ἐμπεριέχεται δὲ καὶ εἰς τὰ ἐμετικά κάρυα καὶ εἰς ἄλλα τινὰ εἶδη στρυχνίου, καὶ εἰς μὲν τὸν φλοιὸν τῆς ἀγγοστύρας εὑρίσκεται τὸ βρούκιον ἠνωμένον μετὰ τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος, εἰς δὲ τὰ ἐμετικά κάρυα μετὰ τοῦ γαλακτικοῦ ὀξέος.

Κατὰ τὸν Thenard κατασκευάζεται ἡ εἰρημένη ὕλη ἐκ τοῦ ψευδοῦς φλοιοῦ, ἐὰν τὸ ἀφέψημά του ἐνωθῇ μετὰ ὀξαλικοῦ ὀξέος καὶ ἐξατμισθὲν μέχρι συστάσεως ἐκχυλίσματος κατεργασθῇ διὰ λειψύδρου οἰνοπνεύματος, τὸ ὅποιον διαλύει ἅπαντα τὰ δι' αὐτοῦ ἐκχυλιζόμενα σώματα, ἐξαιρουμένης τῆς ὀξαλικῆς βρουκίνης· ἡ ὑπόστασις αὕτη ζέεται ἀκολούθως μετὰ μαγνησίας κεκαυμένης, δι' ἧς ἀποσυντίθεται ἡ βρουκίνη καὶ διὰ θερμοῦ οἰνοπνεύματος δύναται νὰ ἐκχυλισθῇ καὶ νὰ συμπληχθῇ εἰς κρυστάλλους.

Χαρακτηριστικά. Τὸ βρούκιον κρυσταλλοῦται διὰ τῆς αὐτομάτου ἐξατμίσεως ἐκ τῆς διαλύσεώς του εἰς εἶδος διαφανῶν πρισμάτων καὶ εἰς μαργαριτοειδῶς στίλβοντα φυλλίδια. Οἱ κρυστάλλοι εἶναι ἄοσμοι, ἀμετάβλητοι εἰς τὸν ἀέρα, ἔχουσι πικροτάτην γεῦσιν, εἶναι διαλύσιμοι εἰς 850 μέρη ψυχροῦ καὶ εἰς 500 θερμοῦ ὕδατος, εἶναι εὐδιάλυτοι ὡσαύτως εἰς τὸ οἶνον πνευμα καὶ ὀλίγον μόνον εἰς τὰ αἰθέρια ἔλαια. Συνίσταται δὲ ἐξ

Ἀνθρακος	70,96
Ὄξυγόνου	17,40
Νιτρογόνου	5,14
Ύδρογόνου	6,50

100,

Διὰ τῆς διαλύσεως τῆς ὕλης εἰς τὰ ὀξέα σχηματίζονται ἄλατα, ἂν δὲ τὰ ὀξέα ἦναι οὐδέτερα σχηματίζονται ἄλατα κρυσταλλώσεως ἐπιδεικτικά, εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, πικρά τὴν γεῦσιν καὶ ὡς ἡ καθαρὰ βρουκίνη δηλητηριώδη.

Ἡ βρουκίνη διακρίνεται ἀπὸ τὸ στρύχνιον ἐκ τῶν ἐξῆς χαρακτηριστικῶν. Ἡ βρουκίνη λαμβάνει διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος φλογῶδες, τὸ δὲ στρύχνιον ὠχρὸν χρῶμα. Τὸ νιτρικὸν στρύχνιον κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος πτερωτῶν κρυστάλλων, ἡ δὲ νιτρικὴ βρουκίνη εἰς εἶδος τετραγώνων πρισματίων ὡς πρὸς τὰς δηλητηριώδεις ἐνεργείας ὁμοιάζει ἡ βρουκίνη τὸ στρύχνιον εἰς μεγάλας ὅμως ποσότητας.

Σαβαδιλίνη. Φθειράγχιον. *Sabadillin.*

Ἡ σαβαδιλίνη κατεσκευάσθη πρῶτον κατὰ τὸ 1818 καὶ ἀπαντᾷται εἰς τὸ τῆς φθειράγχης σπέρμα *Veratrum sabadilla* καθὼς καὶ εἰς τὰς ῥίζας τοῦ λευκοῦ ἑλλεβορίου καὶ τοῦ κολχικοῦ *colchicum autumnale*, καὶ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει εἰς τὰς εἰρημένας ῥίζας ἡνωμένη μετὰ τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος. Πρὸς κατασκευὴν ταύτης ἐκχυλίζεται τὸ τῆς φθειράγχης σπέρμα διὰ ζέοντος ὕδατος καὶ τὸ εἰσέτι καῖον ἀφέψημα μίγνυται μετὰ ὀξικοῦ μολύβδου, ὅστις καταβυθίζει διαφόρους φυτικάς οὐσίας· ἀφοῦ σχηματισθῇ ἡ ὑποστάθμη ἀποχωρίζεται διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου ὁ ἐνυπάρχων μολύβδος καὶ ἀφ' οὗ διὰ τῆς διύλισεως ὁ ὑδροθειωμένος μολύβδος ἀποχωρισθῇ, ζέεται διὰ μαγνησίας κεκαυμένης, δι' ἧς κατακρημνίζεται ἡ σαβαδιλίνη ἥτις διαλύεται εἰς ζέον οἶνοπνευμα, καὶ ἐκ τῆς διαλύσεως ταύτης συμπιέγνυται εἰς κρυστάλλους διὰ τῆς ἀποψύξεως.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι κόνις λευκὴ, ἄοσμος, πικροτάτη καὶ δριμεῖα τὴν γεῦσιν, ἀπορροφωμένη διὰ τῆς ρινὸς προξενεῖ δυνατόν καὶ ἐπικίνδυνον πταρμόν.

Ἑμετίνη. *Emetine.*

Ἡ ἑμετίνη ἡνωμένη μετὰ τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος ἀνεκαλύφθη εἰς τὴν ῥίζαν τῆς ἱπεκακουάνης *Cephaelis emetica, ipecacuanhae, viola emetica*, φυτοῦ διετοῦς εἰς τὰ δάση τῆς Βρασιλίας φυομένου· ἡ βασίς αὕτη κατεσκευάζεται ὡς ἀκολούθως. Ἡ ῥίζα λειοτριβθεῖσα κατεργάζεται διὰ τοῦ αἰθέρος, ὅστις διαλύει ἐξ αὐτῆς λιπώδη ὕλην· ἀκολούθως τὸ διὰ τοῦ αἰθέρος ἐκχυλιζόμενον ὑπόλειμμα κατεργάζεται δι' οἶνοπνεύματος, τὸ ὅποῖον διαλύει τὴν ἑμετίνην καθὼς καὶ τὴν χρωματιστικὴν ὕλην. Τὸ διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος διάλυμα

συμμιγνύμενον μεθ' ὕδατος ἀποστάζεται καὶ ἐξ αὐτοῦ θερμαινόμενου μετὰ μαγνησίας ἀποχωρίζεται ἡ ἐμετίνη. Ἡ γενομένη ὑπόστασις ἀφ' οὗ ἀποπλυθῇ δι' ἀρκούντος ὕδατος καὶ ξηρανθῇ, ἐκχυλίζεται δι' οἶνοπνεύματος, τὸ ὁποῖον διαλύει τὴν ἐμετίνην, ἥτις ἐπιμένει ἀφ' οὗ ἀποσταχθῇ τὸ οἶνόπνευμα. Ἐπειδὴ ὁμοῦς ἡ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον ληφθεῖσα ἐμετίνη δὲν εἶναι καθαρὰ ὅσον πρέπει, ἀναδιαλύεται καὶ ζέεται εἰς ὃξύτι κεκραμένον προστεθέντος ζωάνθρακος. Μετὰ τὴν διάλυσιν ἀποχωρίζεται ἡ ἐμετίνη διὰ τῆς μαγνησίας καὶ ἡ ἀποτελουμένη ὑπόστασις ξηρανθεῖσα διαλύεται εἰς ζέον οἶνόπνευμα, ἐκ τοῦ ὁποίου δύναται νὰ συμπηχθῇ εἰς κρυτάλλους.

Χαρακτηριστικά. Ἡ ἐμετίνη εἶναι κόνις λευκή, ἀμετάβλητος εἰς τὸν ἀέρα, ἄσμος καὶ ἄχυμος, τήκεται εἰς θερμότητα 50°P, εἶναι ἀδιάλυτος σχεδὸν τόσον εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ καθὼς καὶ εἰς τὸ ζέον καὶ διαλύεται εἰς μεγάλην ποσότητα οἶνοπνεύματος· ἡ διάλυσις αὕτη μεταβάλλει τὸν δοκιμαστικὸν χάρτην τῆς κροκοῤῥίζης. Σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	37
Ὄξυγόνου	10
Νιτρογόνου	2
Ἵδρογόνου	51
	100,

Ἡ ἐμετίνη ἐνοῦται μὲν μετὰ τῶν ὀξέων δὲν δύναται ὁμοῦς νὰ τὰ οὐδετερώσῃ ἐντελῶς· τὰ διὰ τῆς ἐμετίνης σχηματιζόμενα ἄλατα εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὴ κρυσταλλώσιμα, σχηματίζουν δὲ κομμιώδη ὕλην· τὰ πλείοτερα τούτων εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ κατακρημνίζονται διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων μὲ χρῶμα τεφρόλευκον. Ἡ κηκιδικὴ ἐμετίνη εἶναι ἔνωσις ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ δὲν ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἐπιφέρῃ ἐμετὸν ἔνεκα τούτου χρησιμεύει τὸ βάμμα τῶν κηκίδων ὡς ἀντιδοτον κατὰ τῆς ἐπιβλαβοῦς ἐνεργείας τῆς ἐμετίνης ἢ τῆς ἱπεκακουάνης ρίζης. $\frac{1}{16}$ τοῦ κόκκου ἔχει τὴν τῆς ἐμετίνης δύναμιν νὰ ἐπιφέρῃ ἐμετὸν θύω κόκκοι δηλητηριάζουσι κύνα διὰ δυνατῆς φλογώσεως τῆς γαστροῦ. Ἡ ἐμετικὴ δύναμις τῆς ἱπεκακουάνης πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς μόνον τὴν ὑπαρξίν τῆς ἐμετίνης.

Μὲ τὴν ἐμετίνην μεγάλην ὁμοιότητα ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἔχει τὸ ἱόλιον, ἥτις εἶναι ἰδιαιτέρως ὕλη ἐμπεριεχομένη εἰς τὰ ἄνθη, φύλλα καὶ σπόρους τῶν ἔων καὶ ἐκχυλίζεται ἐξ αὐτῶν ὡς καὶ ἡ ἐμετίνη.

Chinchoninum. Κινχωνίνη.

Εἰς τὰ διάφορα εἶδη τῆς Κίνας ὑπάρχουσιν δύο εἴσεις ἡ κινίνη καὶ ἡ κινχωνίνη, τῶν ὁποίων πρῶτος ὁ Pelletier ἀνεκάλυψεν τὰ ἀλκαλικά χαρακτηριστικά· ἡ κινχωνίνη ἀπαντᾷται ἐξόχως εἰς τὸν φλοιὸν φλοιὸν τῆς κίνας ἠνωμένη μετὰ τοῦ κινικοῦ ὀξέος καὶ μετ' ἐρυθρᾶς χρωματιστικῆς ὕλης· ἀλλ' ἐπειδὴ αἱ τῆς κινχωνίνης ἐνώσεις διὰ ζέοντος ὕδατος δὲν δύνανται νὰ ἐκχυλισθῶσι, διὰ τοῦτο μεταχειρίζομεθα τοὺς ἐξῆς τρόπους. Κατὰ τοὺς ἐφευρετὰς ἐκχυλίζεται ὁ φλοιὸς τῆς κίνας δι' οἶνοπνεύματος καὶ τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ἀποτελούμενον ἐκχύλισμα κατεργάζεται διὰ τοῦ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος δι' ὕδατος κεκραμένου· τὸ ῥευστὸν τοῦτο ἀφοῦ διῦλισθῇ, ζέεται μετὰ μαγνησίας κεκαυμένης, ἡ δὲ οὕτως ἀποτελουμένη ὑπόστασις, ἥτις ἐμπεριέχει τὴν κινχωνίνην, διαλύεται διὰ ζέοντος οἶνοπνεύματος καὶ τοῦ διαλύματος ἐξατμισθέντος κρυσταλλοῦται ἡ ἐμπεριεχομένη κινχωνίνη. Εὐκολώτερος εἶναι ὁ ἐξῆς τρόπος. Ἐν μέρος φλοιοῦ λειοτριβηθέντος καταβρέχεται δι' 8 μερῶν ἀπεσταγμένου ὕδατος, τὰ ὁποῖα συγκερασθέντα μὲ 5 μέρη θεϊκοῦ ὀξέος κατεργάζονται 6 — 8 ὥρας καὶ ἔπειτα διῦλίζονται καὶ ἀποθλίβονται· κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον πρέπει νὰ κατεργασθῇ καὶ ἐκπιεσθῇ δις ἢ καὶ τρίς τὸ ὑπόλειμμα, τὰ ἀποθλιφθέντα τίθενται εἰς κασιτέρινον ἀγγεῖον, ἐξατμίζονται ἕως νὰ μείνωσι διπλάσια σχεδὸν κατὰ τὸ βάρος ἀπὸ τὸν ληφθέντα φλοιὸν καὶ ἀφοῦ ψυχρανθῶσι, διῦλίζονται εἰς ὀστράκινον ἀγγεῖον καὶ εἰς τὸ ἤδη καθαρὸν ῥευστὸν ἐγχύνεται ἡ ἀρκοῦσα κεκαυμένη τίτanos μὲ ὕδωρ συμμεμιγμένη· ἀφίονται ἀκολούθως μίαν ἡμέραν ἀνακινούμενα ἐνίοτε καὶ ἀποχωρίζεται ἔπειτα ἡ ὑποστάθμη δι' ὕλιστῆρος, καὶ ἀποξηραίνεται ἀφοῦ πρότερον ἀποπλυθῇ μὲ ψυχρὸν ὕδωρ· τὸ ξηρὸν ὑπόλειμμα ἐκχυλίζεται δις ἢ τρίς μὲ τὸ ὀκταπλοῦν οἶνοπνεύματος λειψύδρου, καὶ μίξαντες τὰ ληφθέντα βάρματα ἀποσταλάζομεν τὸ οἶνοπνεῦμα, τὸ δὲ ἐπιμένον σύγκειται ἀπὸ κινχωνίνην καὶ κινίνην. Ἐπειδὴ δὲ διὰ τῆς πρώτης ταύτης ἐκχυλίσεως δὲν ἀπολαμβάνεται εἰς ἀρκετὰ καθαρὰν κατάστασιν, διαλύονται μετὰ ταῦτα εἰς θεϊκὸν ὀξύ ἢ ὕδροχλωρικὸν ὀξύ κεκραμένον· τοιοῦτοτρόπως σχηματίζονται ὕδροχλωρικὴ καὶ θεϊκὴ κινίνη, ἥτις ἀποσυντίθεται διὰ μαγνησίας κεκαυμένης· αὕτη δὲ καταβυθίζει τὴν κινχωνίνην, ἥτις διαλυθεῖσα δι' οἶνοπνεύματος καθαρίζεται.

Χαρακτηριστικά. εἶναι ὕλη κρυσταλλώδης ἔχουσα σχῆμα λευκῶν τετραγωνικῶν πρισμάτων ἢ ἀγγίδων διαφανῶν καὶ γεῦσιν πικροτάτην

εἶναι ἄοσμος· καὶ ἀμετάβλητος εἰς τὸν ἀέρα, θερμικινόμενη τήκεται καὶ ἐξαχνίζεται κατὰ μέγα μέρος· εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ εἶναι σχεδὸν ἀδιάλυτος, διαλύεται εἰς περίπου 2,500 μέρη ζέοντος ὕδατος, εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλύεται μὲν, ἀλλ' εἰς μικρὰν ποσότητα καὶ ἡ διάλυσις ἔχει ἀλκαλικά χαρακτηριστικά. Σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	76,97
Ὄξυγόνου	7,79
Νιτρογόνου	9,02
Ὑδρογόνου	6,22
	100,

Τὰ ὀξέα οὐδετερόνονται ἐντελῶς παρὰ τῆς κιγγωνίνης καὶ τὰ δι' αὐτῆς σχηματιζόμενα ἄλατα ἔχουσι πικρὰν γεῦσιν καὶ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κρυσταλλώσιμα, διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, ὅχι ὅμως εἰς τὸν αἰθέρα. Καταβυθίζονται παρὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων καὶ τῶν ἐκ τῶν ὀρυκτῶν ἀλκαλίων καθὼς καὶ παρὰ τῶν τρυγικῶν καὶ ὀξελικῶν ἀλάτων, καὶ διὰ τοῦτο δὲν δύνανται νὰ ἐνωθῶσι μετ' αὐτῶν.

Ἄπαντα τὰ ἄλατα ἀποτελοῦνται, ἐὰν ἡ ὕλη αὕτη διαλυθῇ διὰ τῶν διαφόρων ὀξέων· ἀφ' ὅλα τὰ ἐκ τῆς κιγγωνίνης ἄλατα τὸ χρησιμώτερον εἶναι ἡ θεϊκὴ κιγγωνίνη, ἥτις σχηματίζει κρυστάλλους λευκοτάτους, στίλβοντας, βελονοειδεῖς, πολλὰ εὐκάμπτους, εἰς τὸ ὕδωρ ὀλίγον εἰς δὲ τὸ θερμὸν οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος αἰθέρα πάντῃ διαλυτοὺς, πικροτάτους τὴν γεῦσιν καὶ ἀόσμους· εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς· ἡ δι' ὕδατος διάλυσις διδερὶ διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων ἄφθονον ὑπόστασιν.

Kwίνη. Chininum.

Καθὼς ἡ κιγγωνίνη ἀπαντᾷται εἰς τὸν φλοιὸν τῆς φαιῆς κίνας, οὕτω ἐμπεριέχεται ἡ κινίνη κατ' ἐξοχὴν εἰς τὸν φλοιὸν τοῦ βασιλικοῦ καὶ κιντρίνου λεγομένου, ὁ δὲ ἐρυθρὸς φλοιὸς ἐμπεριέχει ἀμφοτέρως τὰς βάσεις σχεδὸν εἰς τὴν ἰδίαν ποσότητα· ἡ ἐκχύλισις τῆς κινίνης ἐκ τοῦ ὠχροῦ φλοιοῦ εἶναι ὁμοία τοῦ προεκτεθέντος, ζέοντες δηλ. τοὺς εἰρημένους φλοιοὺς μὲ ὕδροχλωρικὸν ὀξὺ κεκραμένον καὶ ἀποσυνθέτοντες διὰ τῆς τιτάνου.

Εἰς καθαρωτάτην κατάστασιν δύναται νὰ ληφθῇ ἡ κινίνη, ἐὰν ἡ διάλυσις τῆς θεϊκῆς κινίνης καταβυθισθῇ διὰ τῆς ρευστῆς σόδας καὶ τὸ ἀπο-

τελούμενον κατακρήμνισμα διαλυθῇ εἰς ζέον οἰνόπνευμα, ἐκ τοῦ ὁποῖου κρυσταλλοῦται διὰ τῆς ἐξατμίσεως.

Χαρακτηριστικά. Ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἶναι λευκόχρους μάζα, δύναται νὰ κρυσταλλωθῇ διὰ τῆς αὐτομάτου ἐξατμίσεως της ἐκ τοῦ οἰνόπνευματώδους διαλύματος εἰς εἶδος μετὰξοειδῶν ἀγγιδίων, εἶναι ἀμετάβλητος εἰς τὸν ἀέρα, ἄσμος καὶ ἔχει πικρὰν γεῦσιν· διὰ πρᾶου πυρὸς θερμαινομένη τήκεται, σχηματίζουσα διαφανὲς ρευστὸν, εἶναι διαλυτὴ εἰς 200 μέρη ζέοντος ὕδατος, εὐδιάλυτος εἰς τὸ οἰνόπνευμα καθὼς καὶ εἰς τὸν αἰθέρα· ἢ εἰς τὸ οἰνόπνευμα διάλυσις ἔχει ἀλκαλικὰ χαρακτηριστικά. Συνίσταται δὲ ἐξ

Ὄξυγόνου	10,43
Ἀνθρακος	75,02
Νιτρογόνου	8,45
Ίδρογόνου	6,66

Διὰ τῆς κινήσης κορέννυνται ἐντελῶς τὰ ὀξέα, τὰ ἀποτελούμενα ἅλατα εἶναι κρυσταλλώσεως ἐπιδεικτικὰ, ἔχουσι πικρὰν γεῦσιν καὶ διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ δυσκολώτερον παρὰ τὰ ἐκ τῆς κυχωρίνης· ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ τρυγικοῦ καὶ ὀξελικοῦ ὀξέος καὶ διὰ τοῦ τῶν κηκιδίων βάμματος.

Ἡ κίνησις ἀποσυντίθεται καὶ διὰ τοῦ χλωρίου, ἐὰν θεϊκὴ κίνησις διαλυθῇ εἰς μέγα ποσὸν ἐγγλωρίου ὕδατος, ἐὰν π. χ. 200 κόκκοι θεϊκῆς κινήσεως διαλυθῶσιν εἰς 80 οὔγγιας ἐγγλωρίου ὕδατος καὶ προστεθῶσιν 10 οὔγγια καυσικῆς ἀμμωνίας ὑγρᾶς, προάγεται πράσινον ἴζημα δίδον καὶ εἰς τὸ ἐπιπολῶζον ρευστὸν τὸ αὐτὸ χρῶμα· τοῦτο τὸ ρευστὸν ἐξατμιζόμενον ὑπὸ τὴν ἐπιβρόσιν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος προσλαμβάνει φαῖον χρῶμα· τὸ πράσινον ἴζημα ὀνομάζεται *θαλλοκινίνη* *Dalleochininum*, τὸ δὲ φαῖον *ρουσσοκινίνη* *Russiochininum*· πρὸς τούτοις σχηματίζεται καὶ ἄλλη τις ὕλη μέλαινα καλεσθεῖσα *Melanochininum*.

Εἰς τὴν ἐκχύλισιν τῆς κινήσεως καὶ τῶν ἀλάτων της, ἐξόχως τῆς θεϊκῆς καὶ ὑδροχλωρικῆς κινήσεως ἐνασχολοῦνται ἀρκετὰ χημικὰ ἐργαστάσια τῆς Εὐρώπης, ἐπεὶ δὲ ἔγινε γνωστὸν ἐκ πείρας ὅτι ἡ ἐνέργεια τοῦ φλοιοῦ τῆς κίνης πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς ἀμφοτέρως τὰς ἐν αὐτῷ βάσεις διὰ τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἀναπληρωθῇ πολὺ μεγαλύτερον ποσὸν τοῦ ἰδίου φλοιοῦ.

Ἰτέτη. *Salicinum*.

Καθὼς εἰς τοὺς φλοιοὺς τῆς κίνης ὑπάρχει ἰδιαίτερα ὕλη ἔχουσα τὴν δύναμιν τοῦ φλοιοῦ τῆς κίνης, οὕτως ἀνεκαλύφθη καὶ εἰς τὸν τῆς ἰτέας

φλοιὸν ὕλητις, ἥτις δύναται νὰ κορεννῇ τὰ ὀξέα· ἐκχυλίζεται δὲ καὶ κατασκευάζεται ἡ περὶ ἧς ὁ λόγος ὕλη εἰς κρυσταλλώδη κατὰστασιν, ἐὰν τρεῖς λίτραι φλοιοῦ ἰτέας εἰς μεγάλη τμήματα κεκομμένου ζέωνται μίαν ὥραν εἰς δεκαπέντε λίτρας ὕδατος, ἀφοῦ πρότερον διαλυθῶσιν εἰς αὐτὸ 4 οὔγγια ὑπανθρακικῆς ποτάσεως, καὶ ἀναπληροῦνται τὸ διὰ τῆς θράσσεως ἐξατμιζόμενον ὕδωρ, διῦλισθέντος δὲ τοῦ ρευστοῦ προπθίνονται ὀξικοῦ μολύβδου ρευστοῦ λίτραι τρεῖς· τὸ ἀποτελούμενον κατακρήμνισμα ἀποχωρίζεται δι' ὑλιστήρος καὶ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου ἀποχωρίζεται ἐντελῶς ὁ ἐνυπάρχων μολύβδος.

Χαρακτηριστικά. Ἡ ἰτένη διαλύεται εἰς 20 μέρη ὕδατος ψυχροῦ, καὶ πολὺ εὐκολώτερον εἰς τὸ θραστὸν ὕδωρ, δὲν ἔχει μῆτε ἀλκαλικὰ μῆτε ὀξέα χαρακτηριστικά, δὲν ἐμπεριέχει νιτρογόνον, εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ οἶνον-πνευμα, ὅχι ὅμως εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ ἔλαιον τῆς τερεβινθίνης· παρὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου λαμβάνει χρῶμα ἐρυθροῦν ὅμοιον μὲ τὸ τῆς χρωμικῆς ποτάσεως· ἐὰν διαλυθῇ εἰς θεϊκὸν ὀξύ κεκραμένον καὶ τὸ διάλυμα τοῦτο θερμανθῇ μέχρι ζέσεως, ἀποκρίνεται ῥητινώδης ὕλη καλουμένη Saliretin· ἡ ὕλη αὕτη συνίσταται ἀπὸ πλῆθος μαργαριτοειδῶς λαμπριζόντων κρυστάλλων, οἵτινες διαλυθέντες εἰς τὸ χλώριον παρέχουσιν δύο ἐνώσεις Proto καὶ Deuto Saliretin.

Ἡ ἰτένη διαλύεται ὁμοίως εἰς τὸ ὑδροχλωρικὸν καὶ νιτρικὸν ὀξύ χωρὶς ποσῶς νὰ χρωματισθῇ, διὰ μαλακοῦ πυρὸς τίκεται καὶ κρυσταλλοῦται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν, διὰ μεγαλητέρου ποσοῦ θερμότητος χρωματίζεται ὠχρὰ καὶ γίνεται εὐθρυπτος ὡς ἡ ῥητίνη. Συνίσταται δὲ ἐξ

Ἀνθρακος	55,49
Ἰδρογόνου	6,38
Ὄξυγόνου	38,13

100,

Κατὰ τὰς δοκιμὰς πολλῶν ἱατρῶν ἐξιχνιάσθη ὅτι ἡ ἰτένη ἔχει ἀντι-πυρετικὴν δύναμιν κατὰ διαλειπόντων πυρετῶν καὶ τὴν αὐτὴν μὲ τὴν θεϊκὴν κινίνην ἐνέργειαν.

Ἀρικίνη. Aricin.

Τοῦτο τὸ φυτικὸν κάλιον ἀνεκαλύφθη εἰς τὸν φλοιὸν τῆς κίνας, ὅστις λέγεται China de Cusco ἢ cortex d'arica. Ἡ βάσις αὕτη ἐκχυλίζεται

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, καθ' ὃν ἡ κίνη καὶ κιγχωνίνη. Κρυσταλλοῦται εἰς λευκάς, στιλβούσας καὶ διαφανεῖς ἀγγίδας, εἶναι κατ' ἀρχὰς ἄχυρον, ἐπομένως πικρὸν καὶ ὑπόστυρον, ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα καὶ μὴ πτητικόν, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμον δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα, καὶ κατὰ τοῦτο διακρίνεται ἀπὸ τὴν κιγχωνίνην. Παρὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος χρωματίζεται πράσινον καὶ μετὰ τῶν κεκραμένων ὀξέων ἐνοῦται καὶ σχηματίζει ἅλατα.

Ακονιτίνη. Aconitin.

Ἡ φυτικὴ αὕτη βάσις ἀπαντᾷται εἰς τινὰ εἶδη ἀκονίτου ἰδίως εἰς *Aconitum napellus*, ἐξάγεται δὲ ἐκ τοῦ ὁποῦ τοῦ νεαροῦ φυτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἀποξηρανθέντων φύλλων· ἐκ τοῦ ὁποῦ κατασκευάζεται, ἐὰν ὁ ἀναζέομενος καὶ διῦλισθῇς ὁπὸς συμμιχθεὶς μετὰ τιτάνου ὑδρομιγοῦς ἀναταραχθῇ ἀκριβῶς καὶ ἀναμιχθῇ μὲ ἀνθρακικὴν πότασσαν. Τὸ μίγμα τοῦτο ἀναταράττεται ἐπομένως μὲ αἰθέρα διὰ νὰ ἐκχυλισθῇ ἐξ αὐτοῦ ἡ ἀκονιτίνη, ἥτις ἀποσταχθέντος τοῦ αἰθέρος ἐπιμένει.

Χαρακτηριστικά. Ἡ βάσις αὕτη κρυσταλλοῦται δυσκόλως εἰς θρόμβους καὶ σχηματίζει συνήθως λαμπρίζουσαν, διαφανῆ, ἄχρουν μάζαν· εἶναι ἄσμος, ἔχει γεῦσιν πικράν, δριμύειαν, ὅχι ὅμως ὁποῖαν αἰσθανόμεθα, ὅταν μασσῶμεν τὸ φυτόν· διότι αὕτη ἀποδίδεται εἰς ἐμπεριεχομένην τινὰ πτητικὴν ὕλην. Μικρὰ ποσότης τῆς ῥηθείσης ὕλης τεθεῖσα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκτείνει τὴν κόρην διὰ τινὰ καιρὸν· εἶναι εὐτηκτος, πτητικὴ καὶ καίει ἄνευ ὑπολείμματος μὲ ἀσβολοῦσαν φλόγα, ἐνεργεῖ ὡς ἰσχυρόν ἀλκάλιον καὶ διαλύεται εἰς 150 ψυχροῦ καὶ 50 μέρη ζέοντος ὕδατος, εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα καὶ τὸ διάλυμά του κατακρημνίζεται διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηλίδων μετὰ φαιοῦ χρώματος.

Τὸ ἄκρατον νιτρικὸν ὀξύ διαλύει τὴν βάσιν χωρὶς νὰ ἀλλοιώσῃ τὸ χρώμά της, τὸ δὲ ἄκρατονθεικὸν ὀξύ χρωματίζεται κατ' ἀρχὰς ὑποκίτρινον καὶ ἀκολούθως ὑπέρυθρον. Ἡ ἀκονιτίνη παρέχει μετὰ τῶν ὀξέων ἐντελῶς οὐδέτερα ἅλατα, μὴ κρυσταλλώσιμα καὶ ἀποξηραινόμενα πρὸς θρομβώδη μάζαν· ἔχουν δὲ γεῦσιν δριμύειαν καὶ πικράν, ἐνεργοῦσιν ὡς δηλητήρια καὶ εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Δατουρίνη. Daturin.

Ἡ βάσις αὕτη εὐρίσκεται εἰς τὸ *Datura stramonium*· ἡ εὐκολωτέρα

κατασκευή της γίνεται, ὡς καὶ ἡ τῆς ἀκονιτίνης, ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ στραμονίου. Ἡ οὕτω ληφθεῖσα δατουρίνη κρυσταλλοῦται ἐκ τοῦ μὲ ὕδωρ κεκραμένου οἶνοπνευματώδους βάμματος ἐν εἶδη ἀχρόων, στιλβόντων κρυστάλλων, οὔτινες καθαρὸι ὄντες εἶναι ἄοσμοι, ἐνῶ ἡ ἀκάθαρτος βάσις ἔχει δυσάρεστον ὀσμὴν, πικρὰν καὶ δριμεῖαν γεῦσιν· ὀλίγον ποσὸν ἀλειφόμενον ἐπὶ τῶν βλεφάρων διεγείρει πολὺν χρόνον διαστολὴν τῆς τοῦ ὀφθαλμοῦ κόρης, ἐνεργεῖ ὡς βάσις ἐπὶ τοῦ κιτρίνου χάρτου, εἶναι ἀμετάβλητος εἰς τὸν ἀέρα καὶ δι' ἐλαφροῦς θερμάνσεως τήκεται πρὸς ἔλαιον ἐπιπολάζον ἐπὶ τοῦ ὕδατος· ἰσχυρότερον θερμικινόμενη ἐξαχνίζεται εἰς λευκὰς σχεδὸν ἀόσμους κροκίδας· εἶναι διαλύσιμος εἰς 280 μέρη ψυχροῦ καὶ εἰς 72 ζέοντος ὕδατος, εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ ἐξατμιζομένου αὐτοῦ, ἐπιμένει ἡ βάσις εἰς εἶδος ὑελοειδοῦς μάζης. Ἐὰν τὸ διάλυμα τῆς βάσεως ταύτης ἀναμιχθῇ μὲ βάμμα τοῦ ἰώδους, ἀποθέτει καστανόχρουν καταβύθισμα· ὡσαύτως ἀποχωρίζεται ἐκ τοῦ διαλύματός του δι' ἐμβρέγματος τῶν κηλίδων εἰς εἶδος λευκοῦ ἰζήματος· δὲν χρωματίζεται μῆτε διὰ τοῦ θεϊκοῦ, μῆτε διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος.

Μετὰ τῶν ὀξέων παρέχει ἡ δατουρίνη οὐδέτερα εὐκόλως κρυσταλλούμενα ἄλατα ἔχοντα πικρὰν καὶ δριμεῖαν γεῦσιν.

Ἡ θεϊκὴ δατουρίνη κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος λεπτῶν ἀγκιδωτῶν πρισματῶν.

Νικοτίνη. Nicotin.

Ἡ βάσις αὕτη ἐμπεριέχεται εἰς τὴν τῆς νικοτίνης πόαν, εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκεται ὡς ὀξικὸν ἄλας, καὶ εἰς αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδοθῇ ἡ δριμύτης καὶ ἡ ναρκοτικὴ ἐνέργεια τῆς νικοτιάνης. Ἡ βάσις αὕτη ἀποχωρίζεται ἐκ διαφόρων εἰδῶν ὡς ἐκ *Nicotiana tabacum*, *macrophylla*, *rusticana*, *glutinosa*· καὶ δὲν ἀπαντᾷται μόνον εἰς τὰ φύλλα, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς σπόρους τῶν φυτῶν τούτων καὶ διακρίνεται ἀπὸ τὰς ἄλλας βάσεις διὰ τῆς εὐκόλου εἰς τὸ ὕδωρ διαλύσεώς της. Ἡ νικοτίνη κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον· 12 λίτραι ξηρῶν τῆς νικοτίνης φύλλων ζέονται μὲ ὕδωρ δι' ὀλίγου ποσοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ὀξυνιζομένου, τὸ ληφθὲν ἀφέψημα ἐξατμιζεται διὰ πρᾶου πυρὸς καὶ τὸ ὑπόλειμμα ἐκχυλίζεται διὰ δυνατοῦ οἶνοπνεύματος· τὸ οἶνοπνευματώδες διάλυμα ἐπιτυκνοῦται δι' ἀποστάξεως καὶ ἀναμιχθὲν μετὰ τιτάνου ἢ μαγνησίας ὑδρομιγοῦς ὑπο-

βάλλεται εἰς δευτέρην ἀπόσταξιν, δι' ἧς πορίζεται διάλυμα τῆς νικοτίνης, καὶ διὰ προσεκτικῆς ἐξατμίσεως δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ὁ αἰθὴρ ἀπὸ τὴν νικοτίνην, ἥτις διὰ θερμότητος 100° P δύναται νὰ ἀποσταλαχθῇ. Ἐκτασκειυάσθη προσέτι ἡ νικοτίνη ἐκ τοῦ ὁποῦ καὶ τοῦ σπόρου τῆς νικοτιάνης.

Ἡ νικοτίνη εἶναι εἰς ῥευστὴν κατάστασιν διαφανῆς, ἄχρους, ἔχει ὁσμὴν ὡς τὴν τῆς πύας τῆς νικοτίνης, εἶναι ὁμῶς δριμεῖα καὶ κεντητικὴ τὴν γεῦσιν, ἐπαναφέρει εἰς τὸν δι' ὀξέων ἐρυθρωθέντα κυανοῦν χάρτην τὸ κυανοῦν χρῶμα καὶ βάφει τὸν τῆς κροκορρίζης χάρτην μὲ φαιὸν χρῶμα. Θερμαινομένη μέχρι τῶν 100 βαθμῶν ἀναθυμιᾷ λευκὸν καπνὸν τὸν τῆς κροκορρίζης χάρτην εἰς φαιὸν μεταβάλλοντα, ζέει, ἀποσυντίθεται, λαμβάνει πικρὰν γεῦσιν καὶ ἀποβάλλει τὴν δριμύτητά της, εἰς τὸν αἰθέρα εἶναι εὐδιάλυτος, ὡσαύτως εἰς τὸ τερμίνθιον ἔλαιον κατὰ μικρὸν καθὼς καὶ εἰς τὸ ἀμυγδαλίον ἔλαιον, ἐξ οὗ διαλύεται διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος.

Διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰώδους φθείρεται ἡ νικοτίνη καὶ μεταβάλλει τὸ χρῶμά της εἰς ὠχρὸν καὶ τέλος εἰς ὑπέρυθρον. Ἐνεργεῖ ὡς ἰσχυρὸν δηλητήριον, καὶ εἰς σταγῶν θανατόνει κύνα. Τὰ τῆς νικοτίνης διὰ τῶν ὀξέων προαγόμενα ἄλατα ἔχουσι δριμεῖαν καὶ καυστικὴν γεῦσιν ὡς τὴν τῆς νικοτιανῆς πύας, εἶναι ἄχρα, διαλύσιμα κατὰ μέγα μέρος εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ τὸ ὕδωρ· φαίνονται δὲ ἀδιάλυτα εἰς τὸν αἰθέρα. Μέχρι τοῦδε προήχθησαν ἡ θειικὴ, ὀξικὴ, φωσφορικὴ καὶ ὀξαλικὴ ἢ τρυγικὴ νικοτίνη, τῶν ὁποίων αἱ πλησιότεραι εἶναι κρυσταλλώσιμοι.

Κολχικίνη, Colchicin.

Ἡ φυτικὴ αὕτη βάσις ἀνεκκλύφθη παρὰ τῶν Pelletier καὶ Caventou, οἵτινες τὴν ὑπέλαβον ὁμοίαν μὲ τὴν βερατρίνην, πρὸ ὀλίγου ὁμῶς ἀπεδείχθη, ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρας φύσεως καὶ ἀπαντᾷται εἰς τὸν κολχικὸν *Colchicum autumnale*. Τὸ κάλιον τοῦτο κατασκευάζεται ἐκ τοῦ λειοτριβημένου σπόρου, ὅςτις ἐλχυλίζεται μετὰ μίγματος ἐκ θειικοῦ ὀξέος καὶ οἶνοπνεύματος· τὸ ἀποτελούμενον ῥευστὸν ἀναμιγνύεται μετὰ ὑδρομιγοῦς τιτάνου καὶ ἐκ τοῦ σχηματιζομένου καταβυθίσματος διαλύεται ἡ συγχρόνως καταβυθισθεῖσα βάσις δι' οἶνοπνεύματος. Ἡ διὰ τῆς ῥηθείσεως πράξεως πορισθεῖσα κολχικίνη κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος ἀχρόων πρισματῶν, ἢ ἀγκίδων, ἔχει γεῦσιν πικρὰν καὶ δριμεῖαν, ὅχι δὲ καυστικὴν, εἶναι ἄοσμος καὶ δὲν διεγείρει πταρμὸν, εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἶνόπνευμα.

Τὸ δι' οἶνοπνεύματος διάλυμα λαμβάνει διὰ τοῦ βάμματος τῶν κη-
κίδων λευκὸν χρώμα, διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου κίτρινον, διὰ τοῦ
νιτρικοῦ ὀξέος βαθυ-ἰώδες ἢ κόκκινον, τὸ ὁποῖον ἀλλοιοῦται ταχέως
εἰς κίτρινον καὶ πράσινον.

Ἡ κολχικίνη παρέχει μὲ τὰ ὀξέα οὐδέτερα ἅλατα ἔχοντα γεῦσιν
πικρὰν καὶ δριμύειαν· τόσον ἡ καθαρὰ κολχικίνη, ὅσον καὶ τὰ δι' αὐτῆς
ποριζόμενα ἅλατα ἐνεργοῦσι καὶ εἰς ὀλίγην δόσιν ὡς ἐμετικά καὶ ἐκ-
κοπρωτικά, εἰς δὲ μεγαλητέραν ὡς δηλητήρια· ἔχει ἐπωφελεῖ ἐνέργειαν
ἐπὶ τινων ἀρθριτικῶν νόσων, καὶ ἔνεκα τούτου μεταχειρίζονται τὸν
βολβὸν ὡς καὶ τὰ σπέρματα τοῦ κολχίνου κατ' αὐτῶν τῶν νόσων.

Γερβίνη. *Jervin*,

Ἡ ὕλη αὕτη ἀνεκαλύφθη εἰς τὴν ρίζαν τοῦ λευκοῦ ἐλλαδόρου *Helle-
borus albus* καὶ ἐπωνομάσθη οὕτως, ἐπειδὴ οἱ Ἴσπανοὶ καλοῦσι τὸ ἐκ
τῆς ῥηθείσης ρίζης κατασκευαζόμενον δηλητήριο *de Jerva*.

Πρὸς κατασκευὴν τῆς ὕλης ταύτης ἐκφέεται τὸ δι' οἶνοπνεύματος ἀπο-
τελούμενον ἐκχύλισμα τῆς ρίζης τοῦ ἐλλαδόρου δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος
δι' ὕδατος κεκραμένου· τὸ ρευστὸν καθαρισθὲν διὰ διυλύσεως καταβυ-
θίζεται ἀκολούθως διὰ διαλύσεως τοῦ ἀνθρακικοῦ νάτρου· τὸ ἔζημα δια-
λύεται εἰς οἶνόπνευμα καὶ ἀποχρωματίζεται διὰ ζωάνθρακος, μετὰ ταῦτα
ἀποχωρίζεται τὸ οἶνόπνευμα δι' ἀποστάξεως καὶ ἀκολούθως πήγνυται
τὸ διάλυμα πρὸς κρυσταλλώδη μάζαν· δι' ἀναδιάλυσεως εἰς τὸ οἶνό-
πνευμα καθαρίζεται ἐντελῶς.

Χαρακτηριστικά. Ἡ γερβίνη παρέχει μετὰ τοῦ θεϊκοῦ, νιτρικοῦ καὶ
ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἐνώσεις δυσδιαλύτους εἰς τὸ ὕδωρ, διὰ τοῦ ὀξι-
κοῦ καὶ φωσφορικοῦ ὀξέος σχηματίζονται ῥητινώδεις εὐδιάλυτοι ἐνώσεις.

Κωρίνη. *Conin*.

Ἡ βάσις αὕτη ἀπαντᾷται εἰς τὸ κόνειον *Conium maculatum*·
εὐκολωτέρα κατασκευὴ εἶναι ἡ ἐξῆς· οἱ σπόροι λειοτριβηθέντες ἀναμι-
γνύονται μὲ τετραπλάσιον ὕδωρ, καὶ ἀποῦ προστεθῇ διάλυμα πο-
τάσεως $\frac{1}{2}$ τοῦ βάρους τῶν σπερμάτων, ὑποβάλλονται εἰς ἀπόσταξιν
ἐνόσω ἀποστάζεται ὕδωρ ἀλκαλικὴν ὁσμὴν ἐκπέμπον. Τὸ διὰ τῆς ἀποστά-
ξεως ποριζόμενον ρευστὸν κορέννυται μὲ θεϊκὸν ὀξύ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξα-

τμιζεται δια πρᾶου πυρός μέχρι συστάσεως σερapiίου. Τὸ ληφθὲν ὑπόλειμμα κατεργάζεται ἀκολούθως μετὰ συμμιξεως ἐξ ἐνός αἰθέρος καὶ 2 μερῶν λειψύδρου οἶνοπνεύματος, ἐνόσῳ διαλύεται μέρος αὐτοῦ. Οὕτω διαλύεται ἡθεικὴ κωνίνη, τῆς ἡεικῆς ἀμμωνίας ἐπιμενούσης· ἡ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ αἰθέρος ἐπιμένουσα κωνίνη ἐξατμιζεται διὰ πραοτάτου πυρός πρὸς ἐντελῇ ἀποχώρησιν τοῦ αἰθέρος καὶ τοῦ οἶνοπνεύματος καὶ ἀποσάζεται με ὀλίγον ποσὸν καυστικοῦ καλίου. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἡ κωνίνη ἐκ τοῦ πρὸ τῆς ἀνθήσεως συλλεγομένου νεαροῦ κωνείου.

Χαρακτηριστικά. Ἡ κωνίνη εἶναι διαφανὲς, ἄχρουν καὶ ἐλαιῶδες ρευστὸν, 0,98 εἰδικῆς βαρύτητος, ἔχει διαπερατικὴν καὶ ἀηδῇ ὁσμὴν, προσβάλλουσιν ὀδυνηρῶς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ διεγείρουσιν κεφαλαλγίαν, ἔχει γεῦσιν δριμυτάτην, ἀηδῇ, ὁμοιάζουσιν τὴν τῆς νικοτίνης, δὲν ἐκτείνει τὴν τοῦ ὀφθαλμοῦ κόρην, μήτε ἐνεργεῖ ἀλκαλικῶς, ἐὰν δὲν προστιθῇ ὕδωρ· εἶναι ὀλίγον διαλύσιμος καὶ εἰς τὸ οἶνόπνευμα, διαλύεται δὲ εἰς 6 μέρη αἰθέρος, ἐὰν θερμανθῇ εἰς τὸν αἶρα ἀναρλέγεται καὶ καίει· διὰ τοῦ ἡεικοῦ ὀξέος λαμβάνει χρῶμα πορφυροῦν καὶ ἀκολούθως ὑπωχρον, διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος γίνεται αἰμοδαφής, διὰ πλείονος ὀξέος καταντᾷ νὰ ζέῃ, ἀναθυμιᾷ ἐρυθροῦς ἀτμοὺς καὶ τέλος γίνεται χρυσοειδές· παρὰ τοῦ χλωρίου βάφεται κατ' ἀρχὰς ὠχρὰ, ἀκολούθως φαιὰ καὶ τέλος πῆγνυται. Διὰ τοῦ ἰώδους γίνεται αἰμοδαφής, ἔπειτα βαθυ-πράσινος καὶ λαμβάνει μεταλλικὴν στιλπνότητα· παρὰ τοῦ λειψύδρου ὕδροχλωρικοῦ αερίου γίνεται κατ' ἀρχὰς πορφυρὰ καὶ ἔπειτα κυανὴ ὡς τὸ ἰνδικόν.

Ἡ Κωνίνη σχηματίζει μετὰ τῶν διαφόρων ὀξέων οὐδέτερα ἅλατα, ἀτινα ὅμως πρέπει νὰ ἐξατμισθῶσιν εἰς αερόκενον τόπον, ἐπεὶδὴ ἄλλως ἀποσυντίθεται ἡ βάσις διὰ τῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αέρος ἐπιρροῆς. Μερικὰ τῶν διὰ τῆς κωνίνης ἀλάτων εἶναι κρυσθλώσιμα, εὐδιάλυτα εἰς τὸ οἶνόπνευμα ὅχι δὲ εἰς τὸν αἰθέρα. Τὸ τοῦ ἰώδους βάμμα δίδει εἰς τὰ τῆς κωνίνης ἅλατα χρῶμα ὠχρὸν ὡς τοῦ κρόκου, τὸ δὲ καταβύθισμα ἀναδιαλύεται καὶ τὸ διάλυμα γίνεται καθαρόν. Διὰ τῆς τῶν ἀλκαλίων προσθήκης ἐκλύεται ἐκ τῶν διαλυμάτων ὁσμὴ ὡς τῆς κωνίνης. Τὸ διάλυμα τῶν ἀλάτων τούτων γίνεται ὑπὸ τὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αέρος ἐπιρροὴν ἐρυθρὸν ἢ ἰώδες, ἔπειτα βαθυπράσινον καὶ κυανοῦν, προστεθείσης δὲ τινος βάσεως ἐξαλείφεται τὸ χρῶμα καὶ ἡ τῆς κωνίνης ὁσμὴ ἐπανέρχεται. Ἡ κωνίνη ἔχει πολλὰ δηλητηριώδη ἐνέργειαν, ὀλιγωτέραν δὲ τὰ διὰ αὐτῆς ἅλατα.

Άσπαραγίνη, Asparagin. Althein.

Απαντᾷται εἰς τοὺς νέους βλαστοὺς τοῦ ἀσπαραγίου, εἰς τὰ γεώμηλα, εἰς τὴν τῆς γλυκοζήρης καὶ τῆς ἀλθαίας ρίζαν· εἰς τὴν τελευταίαν ὅμως δὲν εὐρίσκεται σχηματισμένη, ἀλλὰ γεννᾶται διὰ τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιρροῆς. Εὐκολώτερα ἐξάγεται ἐκ τῆς ρίζης τῆς ἀλθαίας κατὰ τὴν ἐξῆς μέθοδον. Αἱ ἀπὸ τὸν ἔξω φλοιὸν καλῶς καθαρισθεῖσαι καὶ λεπτοτμηθεῖσαι ρίζαι ἐπιχύνονται μετὰ ψυχροῦ ὕδατος· μετὰ 48 ὥρων διάστημα μεταγγίζεται τὸ διάλυμα, καὶ ἐκτμηζόμενον μέχρι συστάσεως ἀραιοῦ σερπίνου ἀποτίθεται εἰς ψυχρὸν τόπον ἡμέρας τινάς. Οἱ ἀποτιθέμενοι κρύσταλλοι ἀναδιαλυθέντες καὶ καθαρισθέντες, κρυσταλλοῦνται εἰς ὀκτάεδρα ἢ ἐξάεδρα. Ἡ ὕλη αὕτη εἶναι ἄχρμος καὶ ἄσμος, ἀδιάλυτος εἰς τὸ λεῖψυδρον οἰνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα, διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως παρέχει ἀμμωνίαν, κατεργασθεῖσα δι' ἀκράτου διαλύματος ποτάσεως μεταβάλλεται ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν τῆς ἀμμωνίας εἰς ἀσπαραγινικὸν κάλιον.

Ἐάν τὸ ὕδατῶδες διάλυμα τῆς ἀσπαραγινικῆς ποτάσεως ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τριπλασίας θλίψεως τοῦ ἀέρος, μεταβάλλεται εἰς ἀσπαραγινικὴν ἀμμωνίαν. Ἐκ τῶν τοιούτων διαλυμάτων ἀποχωρίζεται διὰ τῶν ὀξέων τὸ ἀσπαραγινικὸν ὀξύ· τοῦτο δὲ προάγεται, ἐάν ἡ ἀσπαραγίνη βρασθῇ μετὰ βαρεῖας ὑδρομιγοῦς, μεχριστοῦ δὲν ἐκλύεται πλέον ἀμμωνία, ἀκολούθως διυλίζεται τὸ διάλυμα καὶ ἡ βαρεῖα ἀποχωρίζεται διὰ θεϊκοῦ ὀξέος. Ἐκ τοῦ γενομένου διαλύματος ἀποχωρίζεται εἰς μαργαριτοειδῶς λαμπρίζοντας κρυστάλλους, οἵτινες ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων ἐκπέμπουσι τὴν ὁσμὴν κακαυμένων πτερῶν.

Πιπερίνη, Piperine.

Ἡ πιπερίνη ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Oerstedt εἰς τὸ μέλαν πιπέρι καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς τὸ ὄριμον. Πρὸς κατασκευὴν τῆς πιπερίνης ἐκχυλίζεται τὸ λειοτριβούμενον πιπέρι διὰ ζέοντος οἰνοπνεύματος· τὸ διάλυμα τοῦτο καθυποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν, τὸ δὲ μετὰ τὴν ἀπόσταξιν τοῦ οἰνοπνεύματος ἐπιμένον ῥευστὸν κατεργάζεται μετὰ θερμοῦ ὕδατος, καὶ τὸ ἀδιάλυτον μέρος διαλύεται ἀκολούθως δι' οἰνοπνεύματος θερμοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου διὰ τῆς ἀποψύξεως κρυσταλλοῦται ἡ πιπερίνη καὶ διὰ δευτέρως διαλύσεως καὶ κρυσταλλώσεως δύναται νὰ καθαρῇ.

Εἶναι ὕλη συνισταμένη ἀπὸ κρυστάλλους λευκοὺς, ἀδιαφανεῖς, σχεδὸν ἀόσμους καὶ ἀχύμους, εἰς τὸ ὕδωρ πάντῃ ἀδιαλῦτους, εἰς τὸν διὰ θεϊκοῦ ὀξέος αἰθέρα ὀλίγον διαλυτοὺς, εἰς δὲ τὸ θερμὸν οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὰ πτητικὰ καθὼς καὶ εἰς τὰ ἔμμονα ἔλκια εὐδιαλύτους· εἰς τὴν θερμότητα τήκεται καὶ φθείρεται, παρὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου χρωματίζεται ἐρυθρᾷ, διαλύεται ἀπὸ τὸ ὀξικὸν ὀξύ, ὅχι ὅμως ἀπὸ τὰ λοιπὰ ἐκ τῶν ὀρυκτῶν κεκραμένα ὀξέα. Ἡ πιπερίνη ὡς ἔχουσα ἀντιπυρετικὰς δυνάμεις μεταχειρίζεται καὶ εἰς τὴν ἱατρικὴν.

Καφεΐνη, Caffein.

Ἡ ὕλη αὕτη, ἥτις ἐμπεριέχεται εἰς τὸν καφὲ, ἀνεκκλύφθη παρὰ τοῦ Runge καὶ ἀπεχωρίσθη κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Διὰ βραστοῦ ὕδατος ἔγχυμα τοῦ καφὲ ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, καὶ διὰ τῆς διοχετεύσεως ὑδροθειωμένου ἀερίου ἀποχωρίζεται ὁ διαλελυμένος ὀξικὸς μολύβδος· τὸ ἐπιπολᾶζον ῥευστὸν, ἀφοῦ διυλισθῇ καὶ ἐξατμισθῇ, δίδει τὴν εἰρημένην ὕλην εἰς εἶδος κρυστάλλων.

Ὁ Pelletier καὶ Robiquet ἔξεν τὸ ἔγχυμα τοῦ καφὲ μετὰ μαγνησίας καὶ διέλυον ἐκ τοῦ ἀποτελουμένου κατακρημνίσματος τὴν καφεΐνην διὰ ζέοντος οἰνοπνεύματος.

Ἡ καφεΐνη κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος μεταξοειδῶν ἀγγίδων, καὶ δι' αὐτομάτου ἐξατμίσεως τῆς διαλύσεως εἰς λεπτὰ ἢ διαφανῆ πρίσματα· εἶναι ἀμετάβλητος εἰς τὸν αἶρα, ἄοσμος καὶ πικρὰ τὴν γεῦσιν· θερμαινομένη διὰ πρᾶου πυρὸς τήκεται πρὸς διαφανὲς ῥευστὸν καὶ ἐξχνιίζεται εἰς εἶδος ἀγγίδων, χωρὶς νὰ ἀφήσῃ ποσὴς ὑπόλειμμα εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, καὶ εἰς τὸ βραστὸν δὲ εἶναι δυσδιάλυτος. Τὸ ζέον οἰνόπνευμα διαλύει μέγαλον ποτὸν τῆς ῥηθείσης ὕλης καὶ διὰ τῆς ἀποψύξεως τοῦ διαλύματος τούτου κρυσταλλοῦται μέρος καφεΐνης· τὸ διάλυμα τοῦτο δὲν δεικνύει μῆτε ὀξέα, μῆτε ἀλκαλοειδῆ χαρακτηριστικὰ. Τὸ λεῖψυδρον οἰνόπνευμα διαλύει ὀλίγην μόνον ποσότητα, ὃ δὲ αἶθρ διόλου. Βραχεῖσα μὲ ὕδωρ δὲν σήπεται· ἐὰν φριχθῇ ὁ καφὲς δὲν μεταβάλλεται ἢ καφεΐνη, ἀλλὰ μόνον ἢ πρασίνῃ ἐκχυλισματικῇ ὕλῃ.

Κατὰ τὸν Plaff ἡ καφεΐνη εἶναι ὕλη οὐδετέρα, μεταξοειδοῦς στιλπνότητος, ὀλίγον πικρὰ καὶ πολὺ νιτρογόνον ἐμπεριέχουσα. Ἐὰν τὸ ἀρέψημα τοῦ σπέρματος τοῦ καφὲ ἀναμιχθῇ μὲ διάλυσιν οὐδετέρου ὀξικοῦ μολύβδου, ἀποχωρίζεται ἰδιαιτέρον τι ὀξύ καλούμενον καφεϊκὸν ὀξύ,

τὸ ὁποῖον εἰς συνήθη θερμοκρασίαν εἶναι ἄοσμον, θερμαινόμενον δὲ ἐκπέμπει τὴν εὐώδη ὁσμὴν τοῦ καφῆ, ὥστε φαίνεται ὅτι εἶναι τὸ ἀρωματικὸν μέρος αὐτοῦ.

Πλουμβαγίνη, *Plumbagin*.

Ἐκ τῆς ρίζης *Plumbago europaea* ἐκχυλίσθη παρὰ τοῦ Dalong d'Aford διὰ τοῦ αἰθέρος ἡ πλουμβαγίνη εἰς εἶδος λεπτῶν ἀγκιδῶν. ἔχει δριμύειαν καυστικὴν γεῦσιν, εἶναι εὐτηκτος, μήτε χαρακτηρὰ ὀξέος μήτε βράσεως δεικνύει καὶ ἐν μέρει εἶναι ἐξατμίσεως ἐπιδεκτικὴ.

Τὸ ψυχρὸν ὕδωρ σχεδὸν διόλου δὲν τὴν διαλύει, πλείωτερον δὲ τὸ θερμὸν, εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ οἰνόπνευμα, καθὼς καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Τὸ διάλυμα αὐτῆς εἰς τὸ ὕδωρ χρωματίζεται παρὰ τῶν ἀλκαλίων ἐρυθρὸν, διὰ δὲ τῶν ὀξέων ἐπαναλαμβάνει τὸ ὠχρόν του χρῶμα καὶ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου τοῦ ρευστοῦ ἀποτελεῖται εἰς τὸ ὑδατῶδες διάλυμα καταβύθισμα ἐρυθροῦν.

Ξανθοπικρίνη. *Xanthopiecin*.

Τὸ Ξανθόπικρον ἀνεκαλύφθη εἰς τὸν φλοιὸν τοῦ Ξανθοξύλου καριβάκου καὶ κατασκευάζεται, ἐὰν ἐκχυλισθῇ τὸ διάλυμα τοῦτο. Κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος κιτρίνων μεταξοειδῶν ἀγκιδῶν, ἁόσμων, αἵτινες ἔχουσι πικρὰν καὶ συπτικὴν γεῦσιν ἐπαυξάνουσιν τὴν ἔκκρισιν τῆς σιέλου· ἡ ὕλη αὕτη θερμαινόμενη εἰς τὸν ἀέρα ἀνερλέγεται καὶ καίει μετὰ φλογός, διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ, εὐκολώτερον εἰς τὸ οἰνόπνευμα, ὅχι ὅμως εἰς τὸν αἰθέρα.

Τείνη. *Thein*.

Κατὰ τὸν Oudry 12 $\frac{1}{2}$ μέρη τέϊ ἐγχύνονται εἰς 200 μέρη ψυχροῦ ὕδατος, εἰς τὸ ὁποῖον διαλύονται τρία μέρη ἀλικῆς σόδας· μετὰ παρέλευσιν 24 ὥρων ἐξατμίζεται τὸ διυλισθὲν ρευστὸν μέχρι ξηροῦ καὶ διαλύεται τὸ υπόλειμμα δι' οἰνοπνεύματος. Τὸ ληφθὲν ρευστὸν ἀφοῦ ἐξατμίσθῃ καὶ ἀναδιαλυθῇ εἰς ὕδωρ κατεργάζεται μετὰ καθαρὰν μαγνησίαν, εἰς δὲ τὸ διυλισθὲν ρευστὸν σχηματίζονται μετὰ τὴν ἐξάτμισιν κρύσταλλοι εἰς εἶδος πτερωτῶν πρισματῶν, διαλυσίμων εἰς 34, 40 μέρη ὕδατος· τὰ διαλύματα δὲν δεικνύουσι ἀλκαλικά χαρακτηριστικά· ἡ ὕλη αὕτη τίκεται εἰς τὴν θερμότητα καὶ ἀνθρακοῦται.

Μενισπέρμιον καὶ παραμενισπέρμιον.

Menispermine, Paramenispermine.

Τὸ μενισπέρμιον ἀνεκάλυφθη ὑπὸ τοῦ Pelletier καὶ τοῦ Couërbe εἰς τὰ λεπίδια τῶν κόκκων τοῦ δένδρου *Menispermum Cocculus*. Οἱ τε-
τεθλασμένοι κόκκοι ἐκχυλίζονται διὰ ζέοντος οἰνόπνευματος, ἐκ τοῦ λη-
φθέντος θάμματος ἀποττλάζεται τὸ οἰνόπνευμα, τὸ δὲ ὑπόλειμμα
ζέεται μὲ ὕδωρ καὶ τὸ ζέον ἔτι ῥευστὸν διυλίζεται. Εἰς τοῦτο τὸ
ῥευστὸν ἐμπεριέχεται ἡ πικροτοξίνη, ἣτις κρυσταλλοῦται προστιθεμέ-
νων ὀλίγων σταγόνων ὀξέος τινός, πρὶν τὸ διάλυμα ἀποψυχρανθῇ.
Τὸ διὰ τοῦ ζέοντος καθαρῷ ὕδατος μὴ διαλυόμενον κατεργάζεται μὲ
θερμὸν ὀξυνισθὲν ὕδωρ. Ἐκ τοῦ ληφθέντος διαλύματος καταβυθίζεται
διὰ τινος ἀλκαλίου φαιὸν ἔζημα, τὸ ὅποιον ἐκχυλίζεται μὲ πολὺ κε-
κραμένον ὀξικὸν ὀξύ, τὸ δὲ διάλυμα ἀποθίεται, προστιθεμένου τινός
ἀλκαλίου, χονδροειδὲς ἔζημα· τοῦτο ἐπιχύνεται καὶ ἀνταρτάσσεται
μὲ ὀλίγον ψυχρὸν οἰνόπνευμα, τὸ ὅποιον διαλύει ἐξ αὐτοῦ ὡχρὰν τινα
βασικὴν οὐσίαν, διὰ δὲ τοῦ αἰθέρος διαλύεται ἐκ τοῦ ὑπολείμματος
τὸ μενισπέρμιον. Τὸ διὰ τοῦ αἰθέρος μὴ διαλυόμενον εἶναι βλενωδές,
ἀφ' οὗ ὅμως διαλυθῇ εἰς λείψυδρον οἰνόπνευμα καὶ τὸ διάλυμα ἐξ-
τμισθῇ διὰ πολὺ μαλακοῦ πυρὸς, πορίζονται κρυσταλλοὶ, οἵτινες εἶναι
τὸ παραμενισπέρμιον.

Τὸ μενισπέρμιον εἶναι λευκὸν, ἀδιαφανές, κρυσταλλούμενον ἐν μορ-
φῇ τετραγώνων πρισμάτων ὁδῶν καὶ ὡς φαίνεται, δὲν εἶναι δη-
λητήριον· εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι ἀδιάλυτον, διαλύσιμον δὲ εἰς τὸ οἰνό-
πνευμα καὶ τὸν αἰθέρα· μετὰ τῶν κεκραμένων ὀξέων σχηματίζει
ιδιαιτέρα ἄλατα.

Τὸ Παραμενισπέρμιον ὀνομάζεται οὕτω διότι εἶναι ἀλλοίωσις
τοῦ μενισπερίου. Κρυσταλλοῦται εἰς τετράγωνα πρίσματα, εἶναι πτη-
τικόν, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, δυσδιάλυτον εἰς τὸν αἰθέρα, εὐδιά-
λυτον δὲ εἰς λείψυδρον οἰνόπνευμα. Τὰ κεκραμένα ὀξέα τὸ διαλύουσιν,
ἀλλὰ δὲν οὐδετεροῦνται δι' αὐτοῦ.

Βιολίη (Ἰεορ.) **Violine.**

Ἄν καὶ ἀρκούντως ἀπεδείχθη, ὅτι τὰ διάφορα εἶδη τοῦ ἴου (*viola*)
ἐμπεριέχουσιν ἐμετίνην, μ' ὅλον τοῦτο νομίζει ὁ Boullay ὅτι εἰς τὸ

εὐωσμον Ἴον (*Viola odorata*) ἐμπεριέχεται ἰδιαιτέρᾳ θάσις ὁμοιάζουσα τὴν ἐμετίνην τὴν ὁποῖαν ὀνομάζει *Violine*.

Πρὸς κατασκευὴν τῆς βιολίνης κατεργάζεται τὸ δι' οἶνοπνεύματος ἐκχύλισμα τοῦ φυτοῦ δι' αἰθέρος πρὸς διάλυσιν τοῦ ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένου λίπους καὶ τοῦ χλωροφύλλου, τὸ ὑπόλειμμα ζέεται με κεκραμένον θεϊκὸν ὀξύ καὶ τὸ διάλυμα καταβυθίζεται δι' ἐνύδρου ὀξειδωμένου μολύβδου. Τὸ καταβύθισμα ἐμπεριέχον θεϊκὸν μολύβδον καὶ βιολίνην ξηραίνεται καὶ κατεργάζεται με οἶνόπνευμα, δι' οὗ διαλύεται ἡ βιολίνη· μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ διαλύματος ἐπιμένει ὡς ὠχρὰ κόνις, ἥτις δι' ἀποπλύσεως με οἶνόπνευμα καθαρίζεται ἀπὸ τὴν βαφικὴν ὕλην. Ὁ Boullay ἀναφέρει, ὅτι ἡ βιολίνη διαφέρει ἀπὸ τὴν ἐμετίνην, καθότι πρᾶσινίζει τὸν τοῦ καγκρινίνου ἐρυθροθέντα χάρτην καὶ καθότι εἶναι διαλυσιμωτέρα εἰς τὸ ὕδωρ, ὅχι δὲ τόσο διαλύσιμος εἰς τὸ οἶνόπνευμα ὅσον ἡ ἐμετίνη. διεγείρει ἐμετὸν ὡς ἡ ἐμετίνη.

Κυναπίνη. Cynapine.

Εἰς φυτὸν λεγόμενον *Aethusa cynapium* ἀνεκάλυψεν ὁ Ficinus ταύτην τὴν φυτικὴν θάσιν. Ἡ κυναπίνη εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ τὸ οἶνόπνευμα, ἀδιάλυτος εἰς τὸν αἰθέρα, καὶ κρυσταλλοῦται ἐκ τῶν διαλυμάτων τῆς εἰς εἶδος ῥομβοειδῶν πρισμάτων· τὸ διὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἄλλας τῆς κρυσταλλοῦται εἰς πρίσματα.

Σαγγιναρίνη. Sanguinarine.

Ὁ Dana τὴν ἀνεκάλυψεν εἰς τὴν ῥίζαν τοῦ φυτοῦ *Sanguinaria canadensis*. Ἡ ῥίζα ἐκχυλίζεται διὰ λειψύδρου οἶνοπνεύματος καὶ τὸ διάλυμα συμμιγνύεται με ὕδωρ καὶ ἀμυωνίαν, δι' ἧς καταβυθίζεται ἐρυθρὸν ἱζημα· τοῦτο ἀποπλύνεται καὶ ζέεται με ὕδωρ καὶ ζωάνθρακα, μετὰ ταῦτα ἀποχύνεται τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ ἐπιμένον μίγμα ἐκ ζωάνθρακος καὶ τῆς σαγγιναρίνης κατεργάζεται με οἶνόπνευμα· διῶλισθέντος καὶ ἐξατμισθέντος τοῦ ῥευστοῦ, πορίζεται ἡ σαγγιναρίνη ὡς λευκὴ ἢ τεφροχρῶς μάζα, πικρὰ τὴν γεῦσιν, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος δὲ εἰς τὸν αἰθέρα καὶ τὸ οἶνόπνευμα καὶ τόσο ἀλκαλική, ὥστε θάφει τὸν τῆς κροκορρίζης χάρτην φαιόν. Μετὰ τῶν ὀξέων σχηματίζει ἐρυθρὰ ἅλατα.

Γουαρανίνη. Guaranine.

Αὕτη ἡ βάσις ἀνεκαλύφθη ὑπὸ τοῦ Th. Martius εἰς τοὺς καρποὺς τῆς *Paullinia sorbilis*, οἷτινες ὑπὸ σχῆμα τμημάτων μιᾶς ὁκάδος πωλοῦνται εἰς τὴν Βρασιλίαν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Guarana* ὡς στυπτικὸν ἱατρικόν. Πρὸς ἀποχώρησιν τῆς γουαρανίνης λειοτριβονται τὰ τμήματα, ἡ δὲ κόνις συμμιγνύεται μετ' $\frac{1}{3}$ ἐνύδρου τιτάνου καὶ ἐκχυλίζεται δι' οἶνοπνεύματος, μετὰ ταῦτα ἀποσταλάζεται τὸ οἶνοπνευμα κατὰ μέγα μέρος· οὕτως ἀποχωρίζεται πράσινόν τι λιπαρὸν ἔλαιον· τὸ ἐπιμένον ρευστὸν διῆλυθὲν ἐξατμίζεται μέχρι ξηροῦ, ἡ δὲ ξηρὰ μάζα υποβάλλεται εἰς ἐξάχνισιν, δι' ἧς λαμβάνεται ἡ γουαρανίνη ὡς λευκὴ κρυσταλλώδης ὕλη.

Ἡ γουαρανίνη εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, εὐδιάλυτος δὲ εἰς τὸ οἶνοπνευμα· ἡ διάλυσις ἔχει πικρὰν γεῦσιν, πρασινίζει ὀλίγον τὸ τῶν ῥόδων χρῶμα καὶ ἐξατμιζομένου τοῦ οἶνοπνεύματος ἐπιμένει εἰς κρυσταλλωμένην κατάστασιν· ἐνοῦται μετὰ τοῦ ἰωδίου, καθὼς καὶ διὰ τῆς συντίξεως μετὰ τοῦ φωσφόρου καὶ θείου, ἀλλὰ μέχρι τοῦδε δὲν ἠξέουμεν ἂν ὑπάρχωσι δι' αὐτῆς ἄλλατα.

Ἐσενβεκίνη. Esenbeckine.

Ἀνεκαλύφθη ὑπὸ τοῦ Buchner εἰς τὸν φλοιὸν τοῦ δένδρου *Esenbeckia febrifuga*. Ὁ λεῖος φλοιὸς ἐκχυλίζεται μὲ ὀξυνισθὲν ὕδωρ, τὸ ἀφέψημα ζέεται μὲ μαγνησίαν καὶ τὸ δι' αὐτῆς σχηματιζόμενον ἔζημα ξηραίνεται καὶ κατεργάζεται μὲ ζέον οἶνοπνευμα, τοῦ ὁποῖου ἐξατμιζομένου ἐπιμένει ἡ ἐσενβεκίνη ὡς ποικίλως λαμπρίζουσα μάζα. ἔχει πικρὰν γεῦσιν ὡς τὴν τῆς κίνας, διαλύεται εἰς ὀλίγον ὕδωρ καὶ καταβυθίζεται ἐκ τῆς διαλύσεως τῶν δι' αὐτοῦ ἀλάτων τόσον διὰ τοῦ ὀξαλικοῦ καλίου, ὡς καὶ διὰ τοῦ τῶν κηκίδων θάμματος. Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποσταλάξεως ἐκλύει πολλὴν ἀμμωνίαν.

Κροτορίνη. Crotonine.

Εὐρίσκεται κατὰ τὸν Brandes εἰς τὸν σπόρον τοῦ *Croton Tiglium*. Ὁ σπόρος ζέεται μὲ οἶνοπνευμα καὶ ἀποσταλαχθέντος αὐτοῦ συμμιγνύεται τὸ ἐπιμένον ρευστὸν μὲ ὕδωρ καὶ μαγνησίαν· ἀφοῦ κατεργασθῇ μετ' αὐτῆς καιρὸν τινα, ζέεται τὸ ὑπόλειμμα μὲ οἶνοπνευμα καὶ διῆ-

λίζεται τὸ ἀφέψημα, τὸ ὁποῖον ἀποψυχραινόμενον ἀποβάλλει τὴν κροτονίνην ἐν μορφῇ μικρῶν συνεχομένων κρυστάλλων δύναται δὲ νὰ κατασκευασθῇ καὶ ἐκ τοῦ κροτονίου ἐλαίου, ἐὰν αὐτὸ ζέεται μὲ ὕδωρ καὶ μαγνησίαν καὶ τὸ ξηρανθὲν ἔζημα ἐκχυλισθῇ δι' οἰνοπνεύματος.

Ἡ κροτονίνη εἶναι εὐτηκτος, ἀδιάλυτος σχεδὸν εἰς τὸ ζέον ὕδωρ, καὶ διαλύσιμος εἰς τὸ ζέον οἰνόπνευμα, ἀποψυχραινόμενου δὲ αὐτοῦ ἀποχωρίζεται πάλιν μετὰ τοῦ φωσφορικοῦ καὶ θειικοῦ ὀξέος σχηματίζει κρυσταλλώσιμα ἅλατα.

Ποξίνη. Buxine.

Ὁ Fauré εὗρεκεν αὐτὴν τὴν βάσιν εἰς τὴν πύξον *Buxus sempervirens*. Ὁ φλοιὸς τῆς πύξου ἐκχυλίζεται δι' οἰνοπνεύματος, τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ληρθὲν ἐκχύλισμα διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἡ διάλυσις ζέεται μὲ μαγνησίαν· τὸ δι' αὐτῆς καταβυθίζόμενον κατεργάζεται μὲ οἰνόπνευμα, ἀροῦ δὲ τοῦτο ἐξατμισθῇ ἐπιμένει τὸ πύξιον ὡς θαθύφαιος διαφανὲς μάζα, ἣτις ἀποβάλλει δυσκόλως τὸ χρώμα της, ἂν κατεργασθῇ καὶ μὲ ζωάνθηρα. Εἶναι πικρά, διεγείρει πταρμὸν, εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα κατὰ μικρὸν καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Μετὰ τῶν ὀξέων σχηματίζει οὐδέτερα ἅλατα, ἐκ τῶν ὁποίων καταβυθίζουσι τὰ ἀλκάλια πηκτώδη ἰζήματα.

Εὐπατορίνη. Eupatorine.

Αὕτη ἡ βάση εὗρέθη ὑπὸ τοῦ Righini εἰς τὸ *Eupatorium cannabinum*. Ἐκχυλίζεται δι' ὕδατος μειγμένου μὲ θεικὸν ὀξύ, καταβυθίζεται δι' ἐνύδρου τιτάνου καὶ ἀφοῦ τὸ ἔζημα ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπορροφᾷ ἡ ὑπερτεροῦσα τίτanos ἀνθρακικὸν ὀξύ, διαθρέχεται 3 ἡμέρας μὲ οἰνόπνευμα· ἐξατμισθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιμένει ἡ εὐπατορίνη ὡς λευκὴ κόνις. Εἶναι πικρά καὶ κεντητικὴ τὴν γεῦσιν, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, σχηματίζει μετὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἄλλας κρυσταλλούμενον ἐν μορφῇ λαμπρίζουσων ἀγκίδων.

Ἀπυρίνη. Apirine.

Εὗρέθη ὑπὸ τοῦ Bizio εἰς τοὺς κόκκους τῆς *Cocco lapidea* καὶ ἔλαβε

τὸ ὄνομα τοῦτο, διότι αἱ διαλύσεις τῶν δι' αὐτῆς ἀλάτων θολώνονται διὰ τῆς θερμότητος. Οἱ τετριμμένοι κόκκοι ἐκχυλίζονται δι' ὕδατος καὶ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, ἡ διυλισθεῖσα διάλυσις καταβυθίζεται δι' ἀμμωνίης, τὸ δὲ ἔζημα ἀποπλύνεται καὶ ξηραίνεται. Εἶναι λευκὴ, ὁμοιάζει τὸ ἄμυλον, εἶναι ἄσμος, ὀλίγον κεντητικὴ τὴν γεῦσιν, διαλύσιμος εἰς 600 μέρη ψυχροῦ ὕδατος. Μετὰ τῶν ὀξέων σχηματίζει ἅλατα κρυσταλλώσιμα καὶ διαλυσιμώτερα εἰς τὸ ψυχρὸν παρὰ εἰς τὸ ζέον ὕδωρ, διὰ τοῦτο θολώνονται αἱ διαλύσεις των διὰ τῆς θερμότητος.

Δακτύλιον (Ελύτριον.) Digitaline.

Ὁ Lancelot ἀνεκάλυψε ταύτην τὴν βάσιν. Τὸ δι' ὕδατος ἐκχύλισμα τοῦ ἐλύτρου κατεργάζεται μετὰ πολὺ δυνατόν οἰνόπνευμα καὶ ἡ διάλυσις ἐξατμίζεται μέχρι συστάσεως μαλθακοῦ ἐκχυλίσματος· τοῦτο τὸ ἐκχύλισμα διαλύεται μετὰ ταῦτα εἰς ὕδωρ μεμιγμένον μετὰ κεκραμένον ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, ἐνόςφω ἀποχωρίζεται δι' αὐτοῦ ὡχρὸν ἔζημα, τὸ ὅποσον ἀποπλύνεται, ξηραίνεται καὶ διαλύεται εἰς οἰνόπνευμα. Ἐκ τῆς διὰ ζωάνθρακος καθαρισθεῖσης διαλύσεως ἀποχωρίζεται ἡ δακτυλίνη δι' αὐτομάτου ἐξατμίσεως. Συνίσταται ἀπὸ κρυσταλλώδη μάζαν, πικράν τὴν γεῦσιν καὶ ἀμετάβλητον εἰς τὸν αἶρα, εἶναι ἀλκαλικὴ καὶ διαλύσιμος εἰς τὰ ὀξέα, καταβυθίζεται δὲ πάλιν προστιθεμένου ὕδατος, διὰ τοῦ ἀκράτου θειικοῦ ὀξέος λαμβάνει πρῶτον ῥοδόχρουν καὶ μετὰ ταῦτα εἰλαιόχρουν χροῶμα.

Δαφνίνη. Daphnine.

Ἐν τὸ διὰ ζέοντος ὕδατος ἔμβρεγμα τοῦ φλοιοῦ τοῦ δαφνοειδοῦς *Daphne Mezereum* συμμιχθῇ μετὰ μαγνησίας καὶ ἀποσταλαχθῇ, λαμβάνομεν ῥευστὸν δριμύ τὴν γεῦσιν καὶ ὀσμὴν, καὶ μεταβάλλον τὸν δοκιμαστικὸν χάρτην ὡς τὰ ἀλκάλια· ἐν δὲ οὐδετερωθῇ διὰ τινος ὀξέος καὶ ἐξατμισθῇ, σχηματίζει κρυσταλλώσιμον ἅλας, ἐκ τοῦ ὁποίου δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ἡ βασικὴ ὕλη διὰ τῆς διαλύσεως εἰς ὀλίγον ὕδωρ καὶ διὰ τῆς μετὰ ταῦτα ἀνασταλάξεως μετὰ μαγνησίας.

Φυτικαὶ βάσεις ἐκ τινῶν εἰδῶν κίνας.

China de Cathagena. Εἰς τοῦτον τὸν φλοιὸν ἀνεκαλύφθη ὑπὸ τοῦ

Gruner φυτική βάσις κρυσταλλουμένη υπό μορφήν λεπτῶν ἀγκίδων, ἄχυμος, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος εἰς τὸ οἰνόπνευμα· διαλύεται εἰς τὸν αἰθέρα, ἀλλ' ὄχι καθὼς τὸ κίνιον. Μετὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος σχηματίζει ἄλλας κρυσταλλούμενον ἐν μορφῇ τετραγώνων πρισμάτων καὶ πικρὸν ὡς ἡ ἀλόη. Κατὰ τὰς παρατηρήσεις τινῶν χημικῶν ὁμοιάζει ἡ βάσις αὕτη τὸ κίνιον μὲ τὴν διαφορὰν ὅμως ὅτι δὲν ἔχει ἀντιπυρετικὴν ἐνέργειαν.

China nova. Καὶ εἰς αὐτὸν τὸν φλοιὸν ἀνεκάλυψεν ὁ **Gruner** φυτικὴν τινα βάσιν ὁμοιάζουσαν τὸ κίνιον.

China blanca. Ὁ **Mill** εὗρεκεν εἰς τοῦτον τὸν φλοιὸν, ὅστις προάγεται ἀπὸ τὴν *Cinchona ovifolia* ἢ *macrocarpa*, φυτικὴν τινα βάσιν ὀνομασθεῖσαν ὑπ' αὐτοῦ **Blanchinine**.

China Pitoya. Ὁ **Peretti** ἀπεχώρησεν ἐξ αὐτῆς νέαν βάσιν, τὴν ὁποίαν ὀνομάζει **Pitoyine**· εἶναι ἄχυμος, πικρὰ δὲ ἀφοῦ ἐνωθῇ μετὰ τῶν ὀξέων, καὶ ἐξαχνιζομένη σχηματίζει λεπτὰ πρίσματα. Τὸ διὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἄλλας αὐτῆς εἶναι κρυσταλλώσιμον.

Περὶ τῶν οὐδέτερων ὀξειδίων.

ὑπὸ τὸ ὄνομα οὐδέτερα ὀξείδια ἐννοοῦμεν ἐκεῖνας τὰς οὐσίας τὰς μὴτε ὀξεᾶ μὴτε ἀλκαλικά χαρακτηριστικά ἐχούσας. Ἀλλ' ἂν καὶ ἦναι οὐδέτερα, κατέχουσιν ὅμως μέχρι τινὸς τὴν ιδιότητα τοῦ νὰ ἐνοῦνται μετ' ὀξέων καὶ βάσεων καὶ μετὰ τινων ἄλλων ὑλῶν. Τὰ οὐδέτερα ὀξείδια ἀπαντῶνται εἰς τὰ πλείοτερα φυτὰ, καὶ ἔνεκα τούτου δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς κύρια συστατικά ὅλων τῶν φυτῶν.

Κόμμι Gummi

Τὸ κόμμι καὶ ὁ φυτικὸς χυλὸς εἶναι οὐσίαι ἀπαντῶμεναι συχνότατα εἰς ἅπαντα σχεδὸν τὰ τῶν φυτῶν ὄργανα, καθὼς εἰς τοὺς καρπούς, ῥίζας, φύλλα κ.τ.λ. δύναται δὲ καὶ διὰ τῆς τέχνης νὰ σχηματισθῇ τὸ κόμμι διὰ τῆς φρύξεως τοῦ σιταμύλου καθὼς καὶ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ ξύλου.

Τὸ κόμμι εἶναι δύο εἰδῶν 1) κόμμι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ὡς τὸ κόμμι τὸ ἀραβικὸν καὶ ὁ χυλός. 2) κόμμι οἰδαινόμενον εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ.

Τὸ κόμμι γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα ἀραβικὸν κόμμι ἢ τοῦ senegal, gummī arabicum aut senegal εἶναι χυλὸς σταλάζων ἐκ τῆς ἀραβικῆς ἀκακίας καὶ ἄλλων ὁμοειδῶν δένδρων εἰς τὴν Ἀραβίαν φυομένων, καὶ εἰς τὸν ἀέρα πυκνούμενος σχηματίζει τμήματα ἀνόμοια κατὰ τὸ μέγεθος, ξηρὰ, σκληρὰ, ῥυτιδῶδη, λαμπρὰ τὴν θραῦσιν, ὑποδιαφανῆ, ὑποχρᾶ, κολλῶδη τὴν γεῦσιν καὶ ὄσμη. Ἐάν θερμανθῇ ἐξοιδούται, ἀλλὰ δὲν τήκεται, παρέχει ἅπαντα τὰ ἀποτελέσματα τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τῶν φυτικῶν οὐσιῶν ἐπιμένοντος σπογγώδους ἀνθρακος. Τὸ κόμμι εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ψυχρὸν, εὐδιαλυτώτερον δὲ εἰς τὸ ζέον ὕδωρ. Ἐάν διαλυθῇ 1 μέρος κόμμεως εἰς 3 μέρη ὕδατος, ἀποτελεῖται κολλῶδες ῥευστὴν ἔχον σεραπίου σύσχευ καὶ γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα γλίσχραμα τοῦ ἀραβικοῦ κόμμεως mucilago gummi arabici. Τὸ διάλυμα τοῦτο ἐκτεθὲν εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ὀξυνίζει. Τὸ οἰνόπνευμα, ὁ αἶθρ καὶ τὰ ἔλαια δὲν διαλύουσι τὸ κόμμι καὶ ἔνεκα τούτου καταβυθίζεται ἐκ τῆς ὑδατώδους διαλύσεως του διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος. Τὸ κόμμι διαλύεται ὑπὸ τῶν δι' ὕδατος κεκραμένων ὀξέων τίσον εὐκόλως, ὡς καὶ ὑπὸ τοῦ ὕδατος, διὰ δὲ τῶν ἀκράτων ὀξέων φθείρεται ἐν μέρει. Μιγνύμενον μετὰθεικτοῦ ὀξέος ἀκράτου λαμβάνει μετὰ τινος ὥρας ὠχρὸν χρῶμα, θερμαινόμενον δὲ μετ' αὐτοῦ ἀνθρακοῦται καὶ σχηματίζεται θειῶδες ὀξύ, ὕδωρ καὶ ὀξικὸν ὀξύ. Ἐάν θερμανθῇ τὸ κόμμι μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος σχηματίζεται ἰξῶδες ὀξύ εἰς εἶδος λευκῆς σχεδὸν ἀδιαλύτου κόνεως, καὶ τοῦτο εἶναι ἐν τῶν διακριτικωτέρων χημικῶν χαρακτηριστικῶν σχηματίζεται προσέτι διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ κόμμεως ἀνθρακικὸν ὀξύ, μηλικὴ καὶ ὀξαλικὴ τίτανος.

Κόνις τοῦ ἀραβικοῦ κόμμεως τεθεῖσα εἰς ἀγγεῖα καὶ συναφθεῖσα μετὰ χλωρίου μεταβάλλεται μετὰ τινος καιρὸν διὰ τῆς ἀπορρόφησεως τοῦ χλωρίου καὶ ὑπὸ ἔκλυσιν τοῦ ἀνθρακικοῦ ἀερίου εἰς κολλῶδες φύραμα, ἐκ τοῦ ὁποῦ το ἄκρατον θεικὸν ὀξύ ἐκλύει μετ' ἀναξέσεως τὸ ὑδροχλωρικὸν ἀέριον. Ὡσαύτως ἀπορρόφῃ ἡ κόνις τοῦ κόμμεως ὑδροχλωρικὸν ἀέριον μεταβαλλομένη εἰς γλίσχρῶδη ὕλην, ἥτις ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου μετ' ἀναξέσεως καὶ ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδροχλωρικοῦ ἀερίου.

Μετὰ τῶν ἀλαλιῶν ἰδίως δὲ μετὰ τῆς ποτάσης καὶ τῆς ἀμμωνίας ἐνοῦται τὸ κόμμι πρὸς εὐδιάλυτον ἐνωσιν ἐκ τῆς ὁποίας δύναται νὰ αποχωρισθῇ διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος. Ἡ ἐνωσις τοῦ κόμμεως μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ δύναται νὰ ληφθῇ, ἐάν ἡ ὑδατώδης διάλυσις αὐτοῦ κατεργασθῇ μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, ἢ ἐάν γλίσχραμα κόμμεως ἐνωθὲν μετὰ διαλύσεως ὀξικοῦ μολύβδου κατα-

εὐθισθῇ δι' ἀμμωνίας ρευστῆς. Ὁ ὀξικός μόλυβδος δὲν θολοῦται παρὰ τῆς τοῦ κόμμεως διχλύσεως.

Τὸ γλίσχραμα τοῦ ἀραβικοῦ κόμμεως θολοῦται καὶ διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ χαλκοῦ καὶ τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα σύγκειται ἐκ κόμμεως καὶ χαλκοῦ. Ὁμοίως πηγνυται ἡ ὑδατώδης διάλυσις τοῦ κόμμεως διὰ τοῦ βόρακος, φαινόμενον τὸ ὅποιον δὲν γίνεται εἰς τὴν διάλυσιν τοῦ ἐκ τῶν σπόρων καὶ ριζῶν ἐκχυλισθέντος χυλοῦ. Τὸ εἰς τὸ ὕδωρ διαλελυμένον κόμμι μεταβάλλεται παρὰ τοῦ θεϊκοῦ καὶ ὑδροχλωρικοῦ σιδήρου εἰς ὠχράν καὶ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτον πηκτὴν, ἥτις ξηρανθεῖσα σχηματίζει φαιὰν διαφανῆ μάζαν, χαρακτηριστικὸν μὴ ἀνῆκον εἰς τὸν χυλόν.

Φύραμα συνιστάμενον ἐκ πολλῆς ποσότητος γλισχράματος τοῦ κόμμεως καὶ ὀλίγου ποσοῦ ἁλατός τινος τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου δὲν κατακρημνίζεται διὰ τῶν ἀλκαλίων· τοιοῦτόν τι ἀποτελεῖται καὶ μετὰ τῶν διὰ τοῦ χαλκοῦ σχηματιζομένων ἀλάτων.

Ἡ τοῦ κόμμεως διάλυσις κατακρημνίζεται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὑποξειδωμένου ὕδραργύρου μετὰ λευκοῦ χρώματος, ὅχι ὅμως ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξειδωμένου ὕδραργύρου. Ὑπὸ τοῦ ἐμβρέγματος τῶν κηκίδων δὲν θολοῦται ἡ διάλυσις τοῦ κόμμεως.

Χυλός ἢ Φυτικὴ βλέννα.

Διάφορα φυτὰ ἐμπεριέχουσιν εἰς τὰς ρίζας, εἰς τὰ σπέρματα, εἰς τὰ ἄνθη χυλὸν mucus, ὅστις περιβάλλει τὰς ῥηθείσας οὐσίας, καὶ εὐκόλως δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ, ἐὰν τοῦ λίνου, ἢ τῶν κυδωνίων τὸ σπέρμα, τῆς ἀλθαίας ἢ ρίζα κ. τ. λ. ἐκχυλισθῶσι διὰ ψυχροῦ ἢ βραστοῦ ὕδατος, καὶ τὸ ἀποτελούμενον ἐκχύλισμα διὰ πρῶου πυρὸς ἐξατμισθὲν κατεργασθῇ δι' οἶνον ὕμματος, δι' οὗ ἀποχωρίζεται ὁ χυλός. Ὁ ξηρανθεὶς χυλός διαφέρει καὶ ἀπὸ τοῦ κόμμι, καθότι εἶναι ὀλιγώτερον διαφανὲς καὶ εὐθραυστος, μᾶλλον γλίσχρος.

Ἡ δι' ὕδατος διάλυσις τοῦ χυλοῦ εἶναι θολή καὶ γλισχρώδης, κατακρημνίζεται διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ κασσιτέρου καὶ τοῦ ὀξικοῦ μόλυβδου, ὅχι ὅμως διὰ τοῦ χαλικοῦ χαλίου, μήτε διὰ τοῦ βόρακος καὶ τῶν διὰ τοῦ σιδήρου ὀξειδωμένων ἀλάτων.

Ὁ χυλός σπόρων τινῶν ὡς τοῦ λίνου ἐμπεριέχει νιτρογόνον, καὶ ἔνεκα τούτου σχηματίζεται εἰς τὴν ξηρὰν ἀπόσταξιν ἀμμωνία. Ἐὰν τὸ τῶν κυ-

δωνίων σπέρμα ἀνακινηθῇ μετὰ 40 μερῶν ὕδατος, δίδει εἰς αὐτὸ πυκνὴν χυλῶδη σύστασιν *mucilago cydoniorum* καλούμενον.

Ὁ χυλὸς οὗτος εἶναι διαυγὴς καὶ ἄχρους καὶ κατακρημνίζεται παρὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου καὶ τοῦ νιτρικοῦ ὑποξειδωμένου ὕδραργύρου, ἐντελῶς δὲ ὑπὸ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου καὶ τοῦ διὰ κασσιτέρου ἄλατος. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς χυλῶδες ὀξύ. Πικρομοίως ἢ τοῦ ὄρχεως ρίζα ἐμπεριέχει ἐκτὸς ὀλίγου ποσοῦ κόμμεως καὶ σιταμύλου ἀρκετὴν ποσότητα χυλοῦ.

Κόμμι εἰς τὸ ὕδωρ οἰδαιρόμενον.

Τούτου τοῦ κόμμεως τὸ εἶδος ἐμπεριέχεται εἰς τὸ κόμμι τῆς βασσορίνης, τῆς τραγακάνθης καὶ τῆς κερασίας. Ὁ καθαρὸς οὗτος χυλὸς γνωρίζεται ὑπὸ τὸ ὄνομα *βασσορίνη, τραγακανθίνη, κερασίνη* *Bassorin, Prunin, Cerasin, Traganthin*. Τὸ τῆς τραγακάνθης κόμμι εἶναι χυλὸς σταλάζων ἐκ τῶν φλοιῶν, τῶν στελεχῶν καὶ τῶν ἀκρεμόνων τινὸς φυτοῦ *astragalus tragacantha* καλούμενον καὶ σκληρυνόμενος ἔπειτα εἰς τὸν ἥλιον. Τὸ κόμμι τοῦτο συνίσταται ἀπὸ βωλάρια διάφορα κατὰ τὸ σχῆμα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πολυειδῶς συνεστραμμένα, ὑποδιαυγῇ, ὑπωχρα, ἄοσμα, βλεννώδη τὴν γεῦσιν καὶ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτα μὲν, ἀλλὰ πολὺ ἐξοιδούμενα. Πρὸς ἀποχώρησιν τῆς βασσορίνης καταβρέχεται τὸ τῆς τραγακάνθης κόμμι μετὰ πολλοῦ ψυχροῦ ὕδατος διὰ τοῦ ὁποίου ἐξοιδοῦται καὶ αὐξάνει τὸν ὄγκον· ἀκολουθῶς μεταγγίζεται τὸ ρευστὸν καὶ ἀφοῦ τὸ ὑπόλειμμα ἐκθλιβθῇ ἐπιμένει ἡ βασσορίνη, ἥτις ἐὰν ξηρανθῇ παριστάνει λευκὴν διαφανῇ μάζαν κογχῶδη τὴν θραῦσιν ἄοσμον καὶ ἄχυμον.

Διὰ τοῦ ψυχροῦ ὕδατος ἐξοιδοῦται ὑπερβολικὰ, ἀπορρόφᾷ πολλὴν ποσότητα ὕδατος χωρὶς νὰ διαλυθῇ καὶ μεταβάλλεται εἰς διαφανῇ πηκτὴν, καὶ ἐξ ἑνὸς μέρους τραγακάνθης καὶ 60 ὕδατος ἀποτελεῖται τὸ λεγόμενον *mucilago tragacanthae*. Διὰ συνεχοῦς ζέσεως μὲ ὕδωρ μεταβάλλεται εἰς κόμμι καὶ ἡ ἐξατμισθεῖσα διάλυσις ἀφίνει μάζαν ὁμοίαν τῆς τοῦ ἀραβικοῦ κόμμεως.

Ἡ βασσορίνη διαλύεται ἐντελῶς εἰς τὰ ἀλκάλια καὶ δὲν πηγνυται μῆτε ἀπὸ τὰ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἄλατα, μῆτε ἀπὸ τὸ χαλκοῦχον κάλιον. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς χυλῶδες ὀξύ τὸ ὅποιον ἐμπεριέχει καὶ ὀξαλικὴν τίτανον.

Χρῆσις. Τὸ κόμμι μεταχειρίζεται συχνάκις ὡς ἱατρικὸν μέσον πρὸς

ἐσωτερικὴν χρῆσιν· ἐκτὸς τούτου εἰς τὰ βαρεῖα, χρωματοποιεῖα καὶ εἰς τὴν πιλοποιεῖαν διὰ νὰ δώσωσιν εἰς διάφορα ὑφάσματα στιλπνότητα καὶ ἐλασικότητα· προστίθεται προσέτι εἰς τὴν μελάνην διὰ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ καταβύθις τῶν λεπτῶν μορίων τοῦ κηκιδικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου. Οἱ χυλοὶ τῶν τῆς ἀλθαίας ῥίζας, τοῦ λινოსπόρου, τῶν τοῦ κυδωνίου σπερμάτων μεταχειρίζονται συχνότατα πρὸς ἐξωτερικὴν καὶ ἐσωτερικὴν χρῆσιν.

Πηκτὴ. Pectin. Coagulum.

Ἡ πηκτὴ εὐρίσκεται εἰς πλῆθος ῥιζῶν καθὼς εἰς *Scorzonera hispanica*, *Daucus carota*, *Paeonia officinalis* εἰς τοὺς βολβοὺς τοῦ *Dahlia pinnata*, *Helianthus tuberosus*, εἰς τοὺς μίσχους διαφόρων φυτῶν, καθὼς καὶ εἰς τοὺς διαφόρους καρποὺς τὰ μῆλα, ἀπιδία, τοὺς πέπονας, κεράσια, κυδώνια, δαμάσκινα κ. τ. λ. Πρὸς ἀποχώρησιν δὲ ταύτης ἀναμειγνύεται ὁ διῦλισθεις ὁπὸς τῶν μῆλων καὶ ἀπιδίων μὲ οἰνόπνευμα, δι' οὗ ἡ πηκτὴ ἀποχωρίζεται ἢ ἀμέσως ἢ μετ' ὀλίγας ἡμέρας· τὸ ἀποκρινόμενον ἀποχωρίζεται διὰ διῦλιστῆρος, ἀποπλύνεται καὶ ἀποξηραίνεται. Ἡ πηκτὴ εἰς καθαρὰν κατὰστασιν εἶναι διαφανὴς μάζα, ἄοσμος καὶ ἄχυμος, οἰθαίνεται δι' ὕδατος, ἐὰν κατεργασθῇ δι' ἀλκαλίων μεταβάλλεται ἡ πηκτὴ εἰς πηκτώδες ὁξὺ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐνώσεων δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ διὰ διαφόρων ὀξέων.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ καθαροῦ πηκτώδους ὀξέος *acide pectique* λειοτριβόνται διὰ ξύστρας τὰ λευκὰ ἢ κίτρινα τεῦτλα καὶ ἐκθλίβονται· πεντήκοντα μέρη τοῦ ληφθέντος ὑπολείμματος κατεργάζονται ἀκολούθως μετὰ ὑδρομιγοῦς ποτάσεως· καὶ 300 μερῶν ὕδατος καὶ τὸ μίγμα θερμαίνεται. Τὸ διὰ τῆς διαλύσεως ἀποτελούμενον γλισχρῶδες ῥευστὸν συνιζόμενον ἐκ πηκτώδους ποτάσεως ἐὰν ἀναμειχθῇ μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, παρέχει ἴζημα ἐκ πηκτώδους ὀξέος, τὸ ὁποῖον ἀποπλυνόμενον ξηραίνεται. Τὸ οὕτω ληφθὲν ὁξὺ δὲν κρυσταλλοῦται καὶ ἐρυθροὶ τὸ θάμμα τοῦ καγκρινίου. Τὸ ὑδατώδες διάλυμα δὲν πήγνυται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν, πήγνυται ὅμως διὰ τῆς ζαχάρους, διὰ τοῦ οἰνόπνεύματος, δι' ὀξειδίων κ. τ. λ. καὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ιδιώματος ἐπιστηρίζεται ἡ κατασκευὴ τῶν πηκτωμάτων ἐκ τοῦ ὁποῦ τῶν μῆλων, ἀπιδίων κ. τ. λ. Τὸ πηκτώδες ὁξὺ ἐνώμενον μετὰ τῶν θάσεων σχηματίζει διάφορα ἄλατα καὶ μεταξὺ τούτων ἀναφέρομεν ἰδίως τὴν πηκτώδη ποτάσσαν δυναμένην νὰ χρησιμεύσῃ ὡς

ἀντιδοτον κατὰ τῶν πλειοτέρων διὰ μετὰλλων δηλητηριάσεων καὶ ἰδίως κατὰ τῆς διὰ τοῦ χαλκοῦ καὶ μολύβδου.

Περὶ ζαχάρως.

Ζάχαρις *sacharum* ὀνομάζεται ἐν γένει πᾶσα ὀργανικὴ οὐσία, γλυκεῖα τὴν γεῦσιν καὶ μεταβαλλομένη εἰς οἰνόπνευμα καὶ ἀνθρακικὸν ὄξυ, ἢ μὲ ἄλλους λόγους ὑποκειμένη εἰς οἰνώδη ζύμωσιν ἂν διαλυθῇ εἰς ὕδωρ καὶ ἀναμιχθῇ μὲ ζύμην· ἀλλ' αἱ γλυκεῖαι μὲν τὴν γεῦσιν, μὴ ἐπιδεκτικαὶ ὅμως τῆς οἰνώδους ζυμώσεως οὐσίαι, ὡς τὸ γλυκόρριζον, ἢ τοῦ γάλακτος ζάχαρις, ἢ τοῦ μάννα ὕλη, ἢ γλυκεῖα τοῦ σχέλε κ. τ. λ. θεωροῦνται μόνον ὡς ὀργανικαὶ γλυκεῖαι οὐσίαι, ὅχι δὲ ὡς ζάχαρις. Ἡ ζάχαρις δύναται νὰ διαιρεθῇ κατὰ τὴν ποιότητα καὶ τὴν σύστασιν εἰς τρία εἶδη 1) εἰς καλαμοζάχαριν ἢ κρυσταλλώσιμον 2) εἰς σαφυλοζάχαριν, καὶ 3) εἰς ῥευστὴν ζάχαριν.

Περὶ τῆς καλαμοζαχάρως.

Εἰς τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἰνδίαν ἡ ζάχαρις οὕσα πρὸ καιροῦ γνωστὴ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου τοῦ μεγάλου μετεφέρθη πρῶτον εἰς τὴν Εὐρώπην. Πρὸ τῆς ἀνακαλύψεως τῆς Ἀμερικῆς τὴν ἐμεταχειρίζοντο διὰ τὴν σπανιότητά της μόνον ὡς ἱατρικόν, μετὰ ταῦτα ὅμως φυτευθέντος τοῦ ζαχαροκαλάμου εἰς τὴν νότιον Ἀμερικὴν καὶ μάλιστα εἰς τὴν μεσημβρινὴν Ἰνδίαν μὲ μεγάλην ἐπιτυχίαν, κατέστη ἡ ζάχαρις ἐν τῶν ἀναγκααιοτάτων πρὸς τὰς τοῦ βίου χρεῖας.

Ἡ καλαμοζάχαρις ἢ κοινὴ ζάχαρις καλουμένη δὲν εὑρίσκεται εἰς πολλὰ εἶδη φυτῶν ἀλλὰ κυρίως εἰς τὸ ζαχαροκάλαμον *sacharum officinarum*, εἰς τινὰ εἶδη σφενδάμου *acer sacharinum, rubrum, platanoides* κ. τ. λ. καὶ εἰς τὰ τεύτλα *Beta vulgaris*. Ἐκ τῶν ὁποίων ἀποχωρίζεται ἡ ζάχαρις εἰς μεγάλην ποσότητα. Ἐκτὸς τούτων ἐμπεριέχεται ζάχαρις εἰς τὴν τῆς ἀλθαίας ῥίζαν, εἰς τοὺς τοῦ ἀραβικοῦ σίτου κυλοῦς καὶ εἰς τοὺς τῆς κουμαρίας καρπούς.

Οἱ τοῦ ζαχαροκαλάμου κυλοὶ μετὰ 17 μηνῶν διάρκειαν ὀριμάζουν καὶ κιτρινίζοντες κόπτονται, ἀποχωρίζονται ἀπὸ τὰ φύλλα καὶ ἀπὸ τὸν ἐπανοστάχων καὶ συμπιέζονται διὰ σιδηρῶν κιλίνδρων. Ὁ ἀπὸ τοὺς κιλίνδρους ἀπορρέων ὀπός, ἐκτὸς τῆς καλαμοζαχάρως καὶ τῆς ῥευστῆς ζαχάρως

εμπεριέχει λεύκωμα, ελεύθερον μηλικόν ὀξύ, βλενωδὴ καὶ ἀλατώδη μόρια, δύναμει δὲ αὐτῶν ὑπόκειται εὐκόλως εἰς ζύμωσιν ὑπὸ τῆς θερμότητος ἐπιρροήν, καὶ διὰ τοῦτο πρέπει ὁ ὀπὸς νὰ ἐξατμίζεται ὅσον ἔνεστι ταχύ-
τερον. Πρὸς τοῦτο ἀναμιγνύεται μὲ τίτανον ἐσθεςμένην καὶ θερμαίνεται ἕως 60°P εἰς μεγάλους χαλκίους λέβητας. Τὸ λεύκωμα ἐνοῦται μὲ τὴν τί-
τανον ἐπιπλέον ἐν μορῇ χιτῶνος εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὀποῦ, συγχρό-
νως δὲ ἐξουδετεροῦται διὰ τῆς τιτάνου τὸ εἰς τὸν ὀπὸν ἐμπεριεχόμενον
ὀξύ· ὁ δὲ ὑπὸ τὸν χιτῶνα εὐρισκόμενος ὀπὸς μεταγγιζόμενος ἐξατμίζεται
ἐπιμελῶς καὶ ἐξαφρίζεται ἕως οὗ λάβῃ 1,220 εἰδικὴν βαρύτητα, διυλίζεται
ἔπειτα διὰ πλεγμάτων ἐκ λεπτῶν κλόνων κατεσκευασμένων καὶ μὲ ὑφα-
σμά μάλλινον σκεπασμένων· ὁ διυλισθεὶς ὀπὸς καλεῖται *Vesou*. Μετὰ
τινα καιρὸν ἀποχυθεὶς ἐκ δευτέρου εἰς λέβητα μέχρις ἱκανῆς συστάσεως
ἐγχύνεται εἰς ἀποφυκτικά πλατέα ἀγγεῖα καὶ μετ' ὀλίγον εἰς ἄλλα, εἰς
τὸν πυθμένα τῶν ὁποίων ὑπάρχει ὁπὴ δυναμένη νὰ κλείσται δι' ἐπι-
στομίου μὲ ἄχυρα τυλιγμένον· ζεθεὶς μετὰ 24 ὥρας ἀνακινεῖται ὁ
ὀπὸς διὰ ξυλίνων ῥάβδων. πρὸς ἐπιτάχυνσιν δὲ τῆς κρυσταλλώσεως,
ἣτις γίνεται μετὰ περίπου 6 ὥρῶν διάστημα, ἀνοίγονται ἀκολουθῶς τὰ
ἐπιστόμια πρὸς ἐκκροὴν τοῦ ρευστοῦ σεραπίου ἢ ζαχάρεως· διὰ τῆς
ἐξατμίσεως καὶ ἀποψύξεως αὐτοῦ σχηματίζεται *melasse mēlar* σερά-
πιον, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν Εὐρώπην μεταχειρίζεται πρὸς οἰνώδη ζύμωσιν
καὶ κατὰσκευάζουν δι' αὐτοῦ τὸ ροῦμι καὶ ἄλλα οἰνώδη καὶ οἰνοπνευμα-
τώδη ρευστά. Ἀφοῦ ἀποχωρισθῇ τὸ σεράπιον ξηραίνεται εἰς τὸν ἥλιον·
εἰς τὸ ἀγγεῖον ἐπιμένει ζάχαρις, ἣτις παρουσιάζεται ὡς φαιοκιτρίνη μάζα
ὑπὸ τὸ ὄνομα *cassonade*, *moscovade* ἢ *ζαχαρόλευρον*. Εἰς αὐτὴν τὴν
κατάστασιν μεταφέρεται πρὸς κάθαρσιν εἰς τὴν Εὐρώπην, μόνον ὅτι καὶ
ἀκάθαρτον τὴν μεταχειρίζονται. Διὰ τῆς καθάρσεως χωρίζεται τὸ μὲ τὴν
ἀκάθαρτον ζάχαριν μεμιγμένον μέλαν σεράπιον ἀπὸ τὴν κρυσταλλώσιμον
ζάχαριν. Ἡ καθάρσις ἐπιστηρίζεται πρὸ πάντων εἰς τὸ ὅτι τὸ μέλαν
σεράπιον εἶναι εἰς τὸ ὕδωρ εὐδιαλυτώτερον τῆς λευκοζαχάρεως, ἐπεὶδὴ ὅμως
εὐρίσκεται εἰς τὰ τῶν μικρῶν κρυστάλλων ἐνδότερα μέρη, δὲν δύναται
νὰ χωρισθῇ ἐντελῶς δι' ἀπλῆς ἀποπλύσεως, ἀλλὰ πρέπει νὰ διαλυθῇ
καὶ κρυσταλλωθῇ ἐκ δευτέρου. Ἡ ἀκάθαρτος ζάχαρις καθαρίζεται εἰς τοὺς
Παρισίους, εἰς Πράγαν καὶ εἰς πολλὰ τῆς Γερμανίας μέρη κατὰ τὸν ἐξῆς
τρόπον. Διαλύεται εἰς ὕδωρ τιτάνιον προστιθεμένου βοείου αἵματος ὡς κα-
θαρτικοῦ, τὸ διάλυμα θερμαίνεται μέχρις ἀναξέσεως εἰς χάλκινον λέβητα.
Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἡ τίτανος ἐνοῦται μὲ τὴν βαρυντικὴν ἐχχυλισμα-

τικὴν οὐσίαν ἀποκαθιστῶσα αὐτὴν ἀδιάλυτον· ἀφοῦ ἐξαφρισθῇ, ἀκολουθεῖ ἡ ζέσις μέχρις ἐντελοῦς καθάρσεως. Τὸ σεράπιον ἔπειτα ἐστὶ ζέον δυνάμιζται διὰ μαλλίνου ὑφάσματος ἐξατμιζόμενον εἰς καθαρὸν λέβητα, μεχριστοῦ λεπτὸν μικρὸν ποσὸν μεταξύ τῶν δακτύλων παρέχει νήματα ἢ χορδὰς εὐκάμπτους, εἰς δὲ τοιαύτην κατάστασιν ἀποψυχραίνεται ἕως τὴν 32° διὰ συνεχοῦς ἀνακινήσεως καὶ ἐγγύνεται ἐπομένως εἰς κωνικοὺς πηλίνους τύπους ἔσωθεν ὑελωμένους, οἵτινες τίθενται ἐπὶ ἀγγείων. Τὸ εἰς τοὺς τύπους ψυχραίνόμενον σεράπιον ἀνακινεῖται ἐνίοτε διὰ νὰ μὴ σχηματίζωνται κανονικοί, ἀλλὰ μόνον χονδρώδεις κρύσταλλοι· μετὰ τὴν ψύξιν ἐκπωματίζονται πρὸς ἐκροὴν τοῦ μὴ στερεοῦ σεραπίου, ἀφοῦ δὲ δὲν ἐκφέρει πλέον αὐτομάτως σεράπιον, ἢ ἄνω στιβάς ἀποξεσθεῖσα σκεπάζεται με λευκὴν ζάχαριν, αὕτη δὲ με ἄλλην στιβάδα ἐκ λευκῆς ἀργίλλου ἢ μεθ' ὑδροῦ σπόγγου. Ἡ ἄργιλλος ἀφίνει θαμνηδὸν τὸ ὕδωρ αὐτῆς, ὅπερ διαβρέχον κατ' ὀλίγον τὴν ζάχαριν διαλύει τὴν εἰσέτι ἐμπεριεχόμενὴν ὑπομελανὴν ζάχαριν ἣτις ἐμπεριέχεται εἰς τὰ ἀγγεῖα. Μετὰ τινὰς ἡμέρας ἡ ἄργιλλος ξηρανθεῖσα ἀλλάσσεται δι' ἄλλου ὑδροῦ φυράματος, ἡ δὲ πρᾶξις αὕτη ἐπαναλαμβάνεται μεχριστοῦ ἢ ζάχαρις λευκανθῇ καὶ τὸ ἀπορρέον σεράπιον μείνη παντελῶς ἄχρουν. Τέλος οἱ ζαχαρόκωνοι ἀναστρέφονται ἐπὶ τῆς θάσεως τῶν καὶ ξηραίνονται εἰς θερμὰ δωμάτια· ἀντὶ τοῦ βοείου αἵματος χρησιμεύει καὶ τὸ τῶν ὠν λεύκωμα, ἢ τὸ γάλα ἀλλ' εἶναι πολυδαπανώτερον. Ἄλλως καθαρίζεται, ἐὰν ἡ ἀκάρτος ζάχαρις ζεσθῇ μετὰ ζωτικῷ ἀνθρακος. Ὑπάρχουν δὲ καὶ ἄλλοι διάφοροι τρόποι πρὸς κάθαρσιν τῆς ἀκαθάρτου ζαχάρως π. χ. ὁ φλοιὸς τοῦ *Ulmus pyramidalis* καὶ τοῦ *theobroma guaranna* διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ἐμπεριεχόμενον πηκτικὸν ὀξύ. Ἡ χρῆσις τοῦ θειικοῦ ψευδαργύρου δὲν συγχωρεῖται, ἐπειδὴ ἐνδέχεται νὰ μείνωσιν μέρος αὐτοῦ εἰς τὴν ζάχαριν.

Κατασκευὴ τῆς ζαχάρως ἐκ τῶν κοκκινουσεύτων.

Ἡ τῆς ζαχάρως ἐκ τῶν τεύτλων ἀποχώρησις ἔχει δυσκολίαν περισσοτέραν ἀπὸ τὴν τοῦ ζαχαροκαλάμου. Ὁ Κ. Margraf ἀνεκάλυψεν ὅτι ἐκ τοῦ ἐξατμιθέντος ὁποῦ τῶν κοκκινουσεύτων δύναται ν' ἀποχωρισθῇ κρυσταλλώσιμος ζάχαρις διὰ οἰνοπνεύματος, τὸ ὁποῖον διαλύον τὴν ζάχαριν ἀφίνει ἀδιάλυτα τὰ ἐλενωδὴ μόρια.

Ὁ Κ. Achard ἔκαμε δοκιμὰς περὶ τούτου εἰς μεγάλης ποσότητος, ἀλλὰ ἂν καὶ ἐξήγαγε πολλὴν ζαχάρως ποσότητα ἐκ τῶν τεύτλων, ἡ τιμὴ ὑπε-

ρίβη τὴν τοῦ ζαχαροκαλίου. Καθ' ἣν ἐποχὴν ὁμοῦς ὁ Ναπολέων ἐμπόδι-
σεν εἰς τὴν Εὐρώπην τὴν ἐλευθεράν μετακίνησιν τῶν τῆς Ἀγγλίας χειρο-
τεχνημάτων καὶ προϊόντων, ἡ τῷ ἐκ τῆς Ἰνδίας ζαχαροκαλάμου τιμὴ
ἠῤῥξησε τόσον, ὥστε προῆλθε ὄφελος ἀπὸ τὴν ἐκ τῶν κοκκινοσεύτων τῆς
ζαχάρως κατασκευὴν καὶ ἀνεκκλύφθησαν τρόποι δι' ὧν εὐκολύνεται ἡ
ἀποχώρησις τῆς.

Τὰ ὄριμα κοκκινόσευτα συνάγονται περὶ τὰ τέλη τοῦ Ὀκτωβρίου, κα-
θαρίζονται ἀπὸ τὴν γῆν καὶ τὰ φύλλα καὶ ξύονται διὰ ξύστρων πρὸς ἰνώδη
πόλτον, ὅστις παρευθὺς ἐγκλείεται εἰς ἐκ πυκνοῦ ὑφάσματος σάκκους καὶ
δι' ἰσχυροῦ πιεστηρίου ἐκθλίβεται, ὁ δὲ ἐξαγόμενος ὁπὸς μιγνυόμενος με-
τ' ὀλίγην ποσότητα θειικοῦ ὀξέος καὶ μετὰ 14 μέρη ὕδατος κεκραμένου θερμαί-
νεται εἰς λήθητα ἕως τὴν 35°P πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ πηκτικοῦ ὀξέος,
τοῦ λευκώματος κ. τ. λ. ἀκολούθως ζέεται προσθεθείσης τιτάνου, καὶ ἀπο-
χωρισθείσης τῆς ὑποστάθης καθαρίζεται διὰ τῆς ζέσεως μετὰ ζωάνθρακα.
Ὁ διυλισθεὶς ὁπὸς, ὅστις διὰ τῆς εἰς πλατέα τήγνα ἀναζέσεως πυκνοῦ-
ται, ψυχραίνεται ἕως τὴν 40° καὶ μετὰ ταῦτα ἐγχύνεται εἰς μεγάλους
κωνικοὺς τύπους, ἐντὸς τῶν ὁποίων μετ' ὀλίγας ἡμέρας στερεοῦται.
Ἐπειτα ἀπορρέει τὸ σεράπιον διὰ τῶν εἰς τοὺς τύπους ἀνεφγμένων
στομίων. Ἡ εἰς τοὺς τύπους ὑπολειπομένη ἀκάθαρτος ζάχαρις καθαρίζε-
ται κατὰ τὸν ἐκτεθέντα τρόπον.

Τὸ ἀπορρέον μέλαν σεράπιον melasse ἔχει γεῦσιν ἀηδῇ καὶ ἐμπεριέχει
νιτρικὸν κάλιον καὶ ἄλλας ἐτερεγενεῖς οὐσίας, καὶ διὰ τοῦτο δὲν χρησιμεύει
ὡς γλυκαντικὸν μέσον, εἰμὴ μόνον πρὸς οἰνώδη ζύμωσιν.

Κατασκευὴ τῆς ζαχάρως ἐκ τοῦ ὀποῦ τοῦ σφενδάμου.

Εὐκολώτερος καὶ ἀπλούστερος τρόπος εἶναι ἡ τῆς ζαχάρως ἀποχώρη-
σις ἐκ τοῦ ὀποῦ τοῦ σφενδάμου, ἐπειδὴ οὗτος ἐμπεριέχει ὀλίγον μόνον
μέλαν σεράπιον καὶ μηλικὴν τίτανον· εἰς τὴν θόρειον Ἀμερικὴν τρυπῶνται
τὴν ἀνοιξὶν οἱ σφένδαμοι μέχρι τοῦ ξύλου, εἰς δὲ τὴν ὀπὴν προσαρμόζεται
σίφων, ὅστις εἰσέρχεται εἰς τι τὸν ἐκρέοντα ὀπὸν δεχόμενον ἀγγεῖον. Ἐμπε-
ριέχει δὲ ὁ ὁπὸς εἰς 100 μέρη 5 ζαχάρως, ἐξατμίζεται ἀφ' ἐκτουτοῦ ἕως οὗ
ἔχει 1,380 εἰδικὴν βαρύτητα καὶ ἐγχύνεται εἰς τύπους, ὅπου ἀνακινού-
μενος συνεχῶς ψυχραίνεται καὶ στερεοῦται.

Αὕτη ἡ ζάχαρις (Cassonade) εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ δὲν
φέρεται εἰς τὴν Εὐρώπην· διὰ τῶν προρρήθέντων καθαριστικῶν τρόπων
δύναται νὰ κατασταθῇ λευκοτάτη.

Χαρακτηριστικά. Ἡ ἐκ τοῦ ζαχαροκαλάμου ζάχαρις μετὰ τὴν ἐντε-
λῇ κάθαρσιν δὲν διακρίνεται ἀπὸ τὴν τῶν κοκκινোসεύτλων καὶ ἀπὸ τὴν
τοῦ σφενδάμου, ἀλλὰ καὶ τὰ τρία εἶδη ὁμοιάζουσιν μεταξὺ τῶν τόσον
ὡς πρὸς τὴν ὄψιν, ὅσον καὶ ὡς πρὸς τὰ χαρακτηριστικά.

Ἡ ζάχαρις εἰς κώνους εἶναι λευκὴ, γλυκυτάτη, πορώδης, ἀφίνουσα εὐ-
κόλως ν' ἀνυψωθῇ τὸ ὕδωρ εἰς τοὺς πόρους τῆς· δύο τμήματα ζαχάρως
τριφθέντα εἰς σκοτεινὸν μέρος φωτοβολοῦν· ἡ εἰδικὴ βαρύτης τῆς εἶναι
1,606, εἰς τὸν ξηρὸν ἀέρα εἶναι ἀμετάβλητος. Πρὸς διάλυσιν ἀπαιτεῖ $\frac{1}{3}$
τοῦ βάρους τῆς ψυχροῦ ὕδατος καὶ πολὺ ὀλιγώτερον ζέοντος. Τὸ πυκνὸν
ὑγρὸν ἔχει ἰξώδη σύστασιν καὶ εἶναι γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα σεράπιον, τὸ
ὁποῖον εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν καὶ εἰς κεκλεισμένα ἀγγεῖα δύναται νὰ
φυλαχθῇ πολὺν καιρὸν· κεκραμένον δὲ με ὕδωρ ὑπόκειται εἰς ὀξύνισιν καὶ
σῆπεται ταχέως. Ἀφοῦ ἐξατμισθῇ τὸ πυκνὸν τῆς ζαχάρως διάλυμα, κατ'
ὀλίγον κρυσταλλοῦται ἡ ζάχαρις εἰς εἶδος τετραγωνικῶν ἢ ἐξαγωνικῶν
πρισμάτων. Αὕτη ἡ πράξις γίνεται εἰς μεγάλας ποσότητας τόσον τῆς κα-
θαρᾶς, καθὼς καὶ τῆς ἀκαθάρτου ζαχάρως, μάλιστα οὕτως, ὥστε οἱ
κρύσταλλοι σχηματίζονται κύκλῳ μιᾶς κλωστῆς. Οἱ κρύσταλλοι εἶναι
κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον φαιοὶ τὸ χρῶμα, γνωστοὶ ὑπὸ τὸ ὄνομα κρυ-
σταλλωμένη ζάχαρις *Kandis*. Ἡ ζάχαρις θερμανθεῖσα εἰς θερμοκρασίαν
ὑπερβαίνουσαν τὴν τοῦ ζέοντος ὕδατος τήκεται, ψυχρανθεῖσα δὲ πηγνύεται
εἰς μάζαν διαφανῇ καὶ ἄχρουν, δι' ἰσχυροτέρου πυρὸς γίνεται κίτρινος
καὶ μετὰ ταῦτα βαθύφαιος. Τὴν βαθύφαιον χωνευθεῖσαν μάζαν *Caramel*
(κεκαυμένην ζάχαριν) ὀνομασθεῖσαν μεταχειρίζονται διαλελυμένην εἰς ὕδωρ,
ὡς βαφικὴν ὕλην διὰ τὸν οἶνον καὶ ἄλλα ποτά. Ἐὰν ἡ ζάχαρις ριφθῇ ἐπὶ δια-
πύρων ἀνθράκων ἢ τεθῇ εἰς τὸ φῶς τοῦ κηρίου, ἀναφλέγεται με καθαρὰν
φλόγα καὶ με ὁσμὴν ἰδιαιτέραν. Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως παρέχει τὰ
τῶν φυτικῶν οὐσιῶν ἀποτελέσματα, σπογγώδους ἀνθρακος ἐπιμένοντος.
Ἡ ζάχαρις διαλύεται εἰς τέσσαρα μέρη κεκραμένου καὶ ζέοντος οἶνοπνεύ-
ματος, εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ λεῖψυδρον οἶνόπνευμα, ἀδιάλυτος δὲ εἰς
τὸν αἰθέρα.

Ἀπὸ τὰς καυσίμους ὀργανικὰς ὕλας μόνον τὸ χλώριον, τὸ ἰώδες
καὶ ὁ φώσφορος ἐνεργοῦν ἐπὶ τῆς ζαχάρως, ἀπὸ τὰς δύο πρώτας με-
ταβάλλεται κατ' ὀλίγον εἰς βαθύφαιον ὕλην σχηματιζομένου ὑδροχλωρικοῦ
καὶ ὑδριωδικοῦ ὀξέος. Ἐὰν τμήμα φωσφόρου περιβληθῇ με λείαν ζάχαριν
καὶ εἰς ἀγγεῖον καλῶς κλεισθῇ, ἀνθρακούται ἡ ζάχαρις μετὰ τινα καιρὸν
ὑπὸ τὸν σχηματισμὸν φωσφορώδους ὀξέος. Διὰ τῆς τῶν ὀξέων ἐπιρροῆς

υπόκειται ἡ ζάχαρις εἰς τινὰς ἀξιοπαρατηρήτους μεταβολάς. Τὸ ἄκρατον θεϊκὸν ὀξύ μελανίζει τὴν ζάχαριν, προστεθέντος δὲ ὕδατος ἐπιμένει ὕλη τις ἀνθρακώδης. Ἐὰν πυκνὸν διάλυμα ζαχάρους ἀναμιχθῇ μόνον μὲ ὀλίγους σταγόνας κεκραμένου θεϊκοῦ ὀξέος, δὲν σχηματίζονται πλέον σκληροὶ κρύσταλλοι διὰ τῆς ἐξατμίσεως, ἀλλὰ μόνον μαλακοὶ καὶ διαφανεῖς κόκκοι. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐνεργεῖ τὸ κεκραμένον νιτρικὸν ὀξύ προστεθὲν εἰς διάλυσιν τῆς ζαχάρους. Ἐὰν τὸ νιτρικὸν ὀξύ θερμανθῇ μὲ τὴν ζάχαριν, μεταβάλλεται εἰς μηλικὸν καὶ τέλος εἰς ὀξελικὸν ὀξύ.

Τὰ ὀργανικὰ ὀξέα ἀφαιροῦσιν ἀπὸ τὴν ζάχαριν τὴν τῆς κρυσταλλώσεως ιδιότητα· ὅθεν ἂν προστεθῇ εἰς πυκνὴν τῆς ζαχάρους διάλυσιν ἀπεσταγ- μένον ὄξος, ὀξελικὸν, τρυγικὸν, μηδικὸν ὀξύ, ἢ ὅποι τῶν κερασίων καὶ ἄλλων ὑποξίνων καρπῶν καὶ ἔαν τὸ ὑγρὸν κατ' ὀλίγον ἐξατμισθῇ, ἡ ζάχαρις δὲν κρυσταλλοῦται πλέον κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον, ἀλλ' ἀποτίθεται μόνον εἰς εἶδος μαλακῶν καὶ μικρῶν κόκκων. Ἐὰν ἡ ζάχαρις διαλυθῇ εἰς διάλυμα τοῦ κυστικοῦ καλίου καὶ ἐξατμισθῇ τὸ ὑγρὸν, ἐπιμένει μάζα μὴ γλυκεῖα καὶ ἀδιάλυτος εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Λεία ζάχαρις εἰς ὑέλινον κώδωνα ὑπὲρ ὑδράργυρον ἐκτεθεῖσα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἀμμωνιακοῦ αἰρίου, ἀπορροφᾷ τὸ αἶριον καὶ σχηματίζει πυκνὴν συμπαγῇ μάζαν ἐκτεθεῖσα εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν. Ἡ ζάχαρις ἔχει τὸ χαρακτηριστικὸν ν' ἀποσυνθέτῃ τινὰ τῶν μεταλλικῶν ἀλάτων. Ἐὰν διάλυμα θεϊκοῦ χαλκοῦ ζεσθῇ μὲ ζάχαριν, ἀποχωρίζεται χαλκὸς εἰς με- ταλλικὴν καὶ λειοτάτην κατάστασιν καὶ ἐν μέρει ἐλευθεροῦται θεϊκὸν ὀξύ.

Ἐὰν διάλυσιν τοῦ νιτρικοῦ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου ζεσθῇ μὲ ζάχαριν, ἀποκρίνεται μέλαινα τις κόνις συνισταμένη ἐξ ὑποξειδωμένου καὶ μεταλλικοῦ ὑδραργύρου· οὕτως ἐνεργεῖ ἡ ζάχαρις ἐπὶ τινος τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου διαλύσεως.

Ἡ διάλυσιν τῆς τοῦ ὑδραργύρου ἄχνης μὲ ζάχαριν ζεσθεῖσα γίνεται γα- λακτόχρους, ἐπεὶδὴ σχηματίζεται ποσότης τις καλομέλανος (ἀλικοῦ ὑδραργύρου ἡπίου) καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ἀποσυνθετικῆς δυνάμεως τῆς ζαχά- ρους ἐπὶ τῶν διαλυμάτων τῶν μετάλλων ἐπιστηρίζεται ἡ χρῆσις αὐτῆς ὡς ἀντιδοτὸν κατὰ τῶν πλειοτέρων διὰ μετάλλων δηλητηριάσεων.

Ἡ ζάχαρις σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	44,31
Ἵδρογόνου	6,46
Ὄξυγόνου	49,23

Ζάχαρις ἐκ τῶν σταφυλῶν.

Τοῦτο τὸ εἶδος τῆς ζαχαρέως εὑρίσκεται εἰς τὰ ἄνθη τῶν πλειοτέρων φυτῶν, εἰς τὸ νεκτάριον καλούμενον εἰς τοὺς μίσχους, τὰ φύλλα, τὰς ρίζας καὶ ἰδίως εἰς τοὺς περισσοτέρους γλυκεῖς καρποὺς καθὼς εἰς τὰ μήλα, εἰς τὰ σῦκα καὶ εἰς τὰ ἀρμενικὰ μήλα, εἰς τὰ κάστανα καὶ μάλιστα εἰς τὰς ὀρίμους σταφυλὰς, προσέτι εἰς τὸ πυκνὸν μέλι καὶ εἰς τὸ οὖρος τῶν ἀπὸ διαβήτην πασχόντων. Πρὸς τοῦτοις δύναται νὰ σχηματισθῇ ἡ ζάχαρις αὕτη καὶ τεχνητῶς καὶ μάλιστα διὰ τῆς τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπιρροῆς ἐπὶ τοῦ σιταμύλου καὶ ἐπὶ τῶν ἰνῶν τῶν ξύλων ὁμοίως δι' ἐμβρέξεως τῆς φυτοκόλλας μὲ ἄμυλον καὶ ὕδωρ καθὼς καὶ διὰ τῆς αὐτομάτου ἀποσυνθέσεως τῆς ἐξ ἄμυλου κατασκευαζομένης πικτῆς.

Εἰς μεγίστην ποσότητα κατασκευάζεται ἡ σταφυλοζάχαρις ἐκ τῶν σταφυλῶν ὁ ἐκπιεσθεὶς ὁπὸς τῶν ὀρίμων σταφυλῶν βράζεται καὶ τὸ ἐλεύθερον ὀξύ αὐτοῦ ἐξουδετεροῦται διὰ λείου μαρμαρίου, ἀκολούθως ἀπογίνεται τὸ καθαρὸν ὑγρὸν ἐκ τῆς ὑποστάθμης καὶ καθαρισθὲν διὰ λευκώματος τῶν ὠν ἐξατμίζεται μέχρι συστάσεως σεράπιου πυκνοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου συμπήγνυται μετ' ὀλίγας ἐβδομάδας ἡ σταφυλοζάχαρις εἰς χονδρώδη τινὰ μάζαν, ἐξ ἧς ἀφοῦ ἀπορρέυσῃ τὸ μὴ κρυσταλλώσιμον σεράπιον, καθαρίζεται τελευταῖον διαλυομένη διὰ τῆς μετὰ ζωάνθρακος ζέσεως τὸ μὴ κρυσταλλώσιμον σεράπιον ἐμπεριέχει θληνοζάχαριν.

Χαρακτηριστικά. Δὲν σχηματίζει κρυστάλλους σκληροὺς καὶ διαφανεῖς, ἀλλὰ μόνον μάζαν γλισχρώδη ἀδιαφανῇ, ἔχει ὀλιγωτέραν γλυκεῖαν γεῦσιν ἀπὸ τὴν τοῦ ζαχαροκαλάμου, ὥστε ἀπαιτεῖται $\frac{1}{2}$ σταφυλοζαχαρέως διὰ ν' ἀποτελεσθῇ ἡ γλυκύτης τοῦ καλαμοζαχαροῦ.

Ἐξ 100 λιτρῶν ὀρίμων σταφυλῶν ἀπολαμβάνονται 18 — 20 λίτραι σταφυλοζαχαρέως καὶ 9 — 10 λίτραι σεράπιου ἢ μὴ κρυσταλλώσιμου ζαχαρέως. Σύγκριται κατὰ τὸν Laussure ἐξ

Ἄνθρακος	36,71
Ἵδρογόνου	6,78
Ὄξυγόνου	56,51

Μὴ κρυσταλλώσιμος ζάχαρις ἢ σεράπιον

Ἀφοῦ ἐκ τοῦ ὁποῦ τοῦ ζαχαροκαλάμου, τῶν τεύτλων ἢ τῶν σταφυλῶν ἀποχωρισθῇ ἡ στερεὰ ζάχαρις διὰ τῆς ἐξατμίσεως καὶ τῆς ἀποψύξεως, μένει τέλος πάντων σεράπιόν τι πυκνὸν, μὴ λαμβάνον ποτὲ διαρκῇ στε-

ρεάν κατάστασιν· τοῦτο τὸ ὑγρὸν εἶναι ἡ ὀνομαζομένη βρευστὴ ζάχαρις ἢ μελανοζάχαρις ἢ καὶ θλενωδὴς ζάχαρις.

Εὐρίσκεται δὲ καθὼς ἤδη ἀνεφέραμεν μετὰ τῆς καλαμοζαχάρεως καὶ σταφυλοζαχάρεως εἰς τὸ ζαχαροκάλαμον, εἰς τὰ τεῦτλα καὶ εἰς τὰς σταφυλάς, εἰς τὰ μῆλα καὶ τὰ ἄπια, εἰς τὸ μέλι, εἰς τὰς προσφάτους δολίχους, εἰς τὰ ἀμύγδαλα κ. τ. λ. λέγεται δὲ ὅτι σχηματίζεται καὶ διὰ τῆς συνεχοῦς ζέσεως τῆς καλαμοζαχάρεως καὶ τῆς σταφυλοζαχάρεως.

Χαρακτηριστικά. Σεράπιον διαυγὲς κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον φαίν, ἰξῶδες καὶ γλυκύτατον· ἀπορρόφᾷ τὴν τῆς ἀτμοσφαίρας ὑγρασίαν, ἀναμίγνυται μὲ τὸ ὕδωρ εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν· εἰς τὸ οἰνόπνευμα εἶναι πλέον εὐδιάλυτον παρὰ τὴν κίχμοζάχχριν καὶ σταφυλοζάχχριν· ἡ ὑπαρξίς δικφύρων ἑτερογενῶν οὐσιῶν εἶναι τὸ αἷτιον τοῦ φαιού του χρώματος, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἀφαιρεθῇ ἐν μέρει διὰ τῆς μὲ ζωάνθρακα ζέσεως.

Τὸ μὲ ἀρκετὴν ποσότητα ὕδατος κεκραμένον σεράπιον ὑπόκειται χωρὶς νὰ προστεθῇ ζύμη εἰς ἀσθενῇ οἰνώδη ζύμωσιν. Θερμαζὲν μὲ κάλιον ἢ μὲ τίτανον λαμβάνει θαθύφαιον χρώμα καὶ πικράν γεῦσιν. Αὕτη ἡ μὴ κρυσταλλώσιμος ζάχαρις δύναται νὰ κατασκευασθῇ καθαροτάτη ἐκ τοῦ μέλιτος διὰ τοῦ ψυχροῦ καὶ λειψύδρου οἰνοπνεύματος, τὸ ὁποῖον διαλύει μὲν ἐξ αὐτοῦ τὴν βρευστὴν ζάχχριν ὅχι δὲ καὶ τὴν στερεάν.

Χρήσις. Ἡ χρῆσις τῆς ζαχάρεως ὡς γλυκαντικὸν μέσον εἶναι ἱκανῶς γνωστὴ, ἡ ζάχαρις εἶναι μὲν θρεπτικὴ, δὲν δύναται ὅμως νὰ χρησιμεύσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον ὡς μόνη τροφή, ἐπεὶ δὲ ἐμπεριέχει νιτρογόνον. Ἡ ζάχαρις εἶναι ἐν τῶν πλέον σημαντικῶν μέσων πρὸς διατήρησιν τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν ἀπὸ τὴν σήψιν, ὅθεν τὴν μεταχειρίζονται πρὸς διατήρησιν τῶν διαφόρων ὑλῶν, ἐξ ὧν κατασκευάζονται π. χ. τὰ σεράπια, τὰ γλυκύσματα διὰ ρόδων, τὰ διὰ σισυμβρίου condita κ. τ. λ. χρησιμεύει πρὸς διατήρησιν προσφάτων εὐόσμων ἀνθῶν, καθὼς τῶν τοῦ ρόδου καὶ τῆς νεραντζίας flor naphae, conserve ὡσαύτως πρὸς διατήρησιν τοῦ κρέατος, τῶν ἰχθύων κ. τ. λ. τέλος πρὸς τὴν οἰνώδη ζύμωσιν, πρὸς κατασκευὴν τῶν διαφόρων συκέρων, τοῦ ὄξους κ. τ. λ.

Ὁ Κ. Braconnot ἐρεῦρεν ἄλλο εἶδος ζαχάρεως ζυμώσεως ἐπιδεκτικὸν εἰς διάφορα μανιτάρια, καθὼς εἰς τὸ *Agaricus campestris*, *Boletus juglandis*, *Lycoperdon cervinum*, *Hydnum repandum*, *Peziza nigra* κ. τ. λ. καὶ τοῦτο τὸ εἶδος ἐπωνομάσθη παρὰ τοῦ ἐφευρετοῦ μυκοζάχαρις sucre de champignons.

Πρὸς κατασκευὴν δὲ ταύτης λειοτριβόνται τὰ ῥηθέντα μανιτάρια μὲ

ολίγον ὕδωρ· τὸ ρευστὸν ἐξατμίζεται σχεδὸν μέχρι ξηροῦ καὶ ἐκ τοῦ υπολείμματος τούτου ἐξάγεται ἡ ζάχαρις δι' οἰνοπνεύματος, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλύματος κρυσταλλοῦται μετὰ ταῦτα ἡ ζάχαρις.

Περὶ τοῦ μέλιτος.

Ἄν τὸ μέλι εὐρίσκεται τοιοῦτον εἰς τὰ νεκτάρια τῶν ἀνθῶν ἢ ἂν ᾖ μᾶλλον προῖον τῶν μελισσῶν, ὑπάρχει εἰσέτι ἀμφιβολία. Ὁ κηρὸς τοῦλάχιστον φαίνεται πλαστούργημα τῶν μελισσῶν, ἐπεὶδὴ ἀπεδείχθη ὅτι αἱ μὲ ζάχαριν μόνον τραφείσαι μέλισσαι προήγαγον μέλι καὶ κηρόν. Ἐὰν αἱ μέλισσαι λαμβάνουσι τὴν τροφήν των ἀπὸ ἀγρῶν μὲ ῥάφανον ἐσπαρμένους, τὸ μέλι λαμβάνει φαῖν χρῶμα· αἱ μέλισσαι προάγουσι ἀπὸ τὰ ἀνθὰ τῶν φυλῶν τρεφόμεναι μέλι γλυκύτερον παρὰ ἀπὸ τὸν σίτον καὶ ἀπὸ ἄλλα φυτά.

Ἄν καὶ τὸ μέλι διαφέρει εἰς διαφόρους τῶν τρόπων κατὰ τὸ χρῶμα, τὴν ὁσμὴν καὶ τὴν γεῦσιν, πάντοτε ὁμοῦς σύγκειται ἐκ σταφυλοζάχαρος καὶ ρευστῆς ζαχάρεως. Τὸ χονδρῶδες μέλι ἐμπεριέχει περισσότεραν σταφυλοζάχαριν, τὸ δὲ ρευστότερον περισσότεραν ρευστὴν ζάχαριν.

Πρὸς τούτοις ἐμπεριέχονται εἰς πᾶν εἶδος μέλιτος μέρος κηροῦ, ὕλη βλενωδῆς, ἐλευθερον ὀξύ, βαφικὴ ἐκχυλισματικὴ ὕλη καταβυθίζουσα τὸν ἀλικὸν ὑποξειδόμενον κασσίτερον μὲ κίτρινον χρῶμα καὶ τέλος εὐοσμος ὕλη ἀρωματικὴ, ὡς φαίνεται, προερχομένη ἐκ τῶν αἰθερίων ἐλαίων τῶν ἀνθῶν. Τὸ καλλήτερον μέλι *Mel narbonense* ἐμπεριέχει μόνον τὰ δύο ῥηθέντα εἶδη ζαχάρεως καὶ ἀρωματικὴν ὕλην. Πρὸς ἀποχώρησιν τῶν δύο τούτων εἰδῶν τῆς ζαχάρεως ἐκθλίβεται τὸ μὲ ὀλίγον οἰνόπνευμα ἀναμειγμένον μέλι διὰ πυκνοῦ λινοῦ ὑφάσματος. Τὸ οἰνόπνευμα διχλύνει σχεδὸν ὅλην τὴν ρευστὴν ζάχαριν, ὀλίγη μόνον σταφυλοζάχαρις μένει εἰς τὸ ὑφάσμα ὡς στερεὰ μάζα ἣτις δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὴν προσκολλημένην ρευστὴν ζάχαριν, ἀφοῦ ἡ δι' οἰνοπνεύματος διαβραχεῖσα μάζα ἐκθλιφθῇ ἐπανειλημένως. Διὰ νὰ κατασκευασθῇ ἡ σταφυλοζάχαρις ἀποστάζεται ἀκολούθως τὸ οἰνόπνευμα πρὸς ἐντελῇ τοῦ μέλιτος καθαρισμόν καὶ εἰς ἄοσμον σεράπιον μεταποίησιν ἀναμειγνύεται μὲ $\frac{1}{5}$ ὕδατος, μὲ ὀλίγον ἄνθρακα, κρητίδα καὶ λεύκωμα τῶν ὠν· τοῦτο μεταχειρίσθησαν εἰς πολλὰ τῆς Γαλλίας μέρη ἀντὶ τῆς ζαχάρεως, καθ' ἣν ἐποχὴν ἠϋξήσεν ἡ τιμὴ τῆς.

Εκτὸς τῆς εἰς τὴν ἱατρικὴν τοῦ μέλιτος χρήσεως καὶ τῆς εἰς τὴν οἰκο-
νομίαν μεταχειρίζεται καὶ πρὸς κατασκευὴν τοῦ οἶνουμέλιτος καὶ ἄλλων
διαφόρων πομάτων.

Γλυκεῖαι οὐσίαι μὴ ὑποκείμεναι εἰς οἰνώδη ζύμωσιν.

Marrubium ἢ Ἰαχάρις τοῦ μάννα.

Ἐκ διαφόρων εἰδῶν *Fraxinus*, *Pinus* πεύκης ἐκκρέει τὸ ἕαρ πυκνὸς καὶ
γλυκὺς ὁπὸς πρὸς λευκοὺς ἢ φαιοὺς σταλαγμοὺς πηγνύμενος, τὸ προῖον
τοῦτο λέγεται *μάννα*. Κατὰ μέγα μέρος συνίσταται ἐξ ἰδιαίτερας
ζαχάρους *marrubium* λεγομένης, ἥτις εὐρίσκεται εἰς τὴν πᾶν
καὶ εἰς τὴν ῥίζαν διαφόρων φυτῶν, εἰς τοὺς ζυμωμένους ὁποὺς τῶν
μελοπεπόνων καὶ τῶν κρομμύων, εἰς τὸν ὅπῃ τῶν κοκκινωσέυτων
καὶ τοῦ ἀσπαράγου, καὶ εἰς πλῆθος ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν. Ἡ μαννίνη δύ-
ναι νὰ κατασκευασθῇ, ἐὰν τὸ μάννα ζεσθῇ μὲ οἰνόπνευμα 28—30°
καὶ τὸ ζέον ἔτι ὑγρὸν διυλισθῇ, ἢ μετὰ τὴν ἀπόψυξιν καταβυθισθεῖσα
μαννίνη δύναται νὰ καθαρισθῇ διὰ δευτέρας εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλύ-
σεως ἢ μαννίνη δύναται νὰ κατασκευασθῇ καὶ διὰ ζέοντος οἰνοπνεύματος
ἐκ τοῦ ἐξατμισθέντος ὁποῦ της. Σχηματίζει κρυστάλλους λευκοὺς, δια-
φανεῖς, μεταξώδεις, βελονοειδεῖς, ὀλίγον γλυκεῖς τὴν γεῦσιν, διὰ τοῦ
νιτρικοῦ ὀξέος εἰς ὀξαλικὸν ὄξυ μεταβαλλομένους· εἰς μὲν τὸ λεῖψυδρον
οἰνίπνευμα εἶναι δυσδιάλυτος, εἰς δὲ τὸ κεκραμένον καὶ ζέον εὐδιάλυτος
καὶ ἀποτίθεται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τοῦ βευστοῦ. Ἡ μαννίνη σύγκειται ἐξ

Ἄνθρακος	38, 53
Ὑδρογόνου	7, 87
Ὄξυγόνου	53, 60

100,

Γλυκορρίζιον.

Οὕτως ὀνομάζεται ἡ εἰς τὴν τῆς γλυκορρίζης ῥίζαν *Glycyrrhiza glabra* καὶ
τοῦ πολυποδίου *Polypodium vulgare* καθὼς καὶ εἰς τὰ φύλλα τοῦ *Abrus*
praecatorius ἐμπεριεχομένη γλυκεῖα μὲν, ἀλλὰ μὴ ἐπιδεκτικὴ ζυμώ-
σεως οὐσία. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ γλυκορρίζιου ἐκχυλίζεται ἡ τῆς
γλυκορρίζης ῥίζα μὲ ζέον ὕδωρ, τοῦ δὲ ὑγροῦ ὀλίγον ἐξατμισθέντος προσ-
τίθεται καὶ θεϊκὸν ὄξυ, δι' οὗ προάγεται λευκὸν ἔζημα ἐμπεριέχον τὸ

γλυκορρίζιον ἡνωμένον μὲ θεϊκὸν ὄζον καὶ λεύκωμα. Τὸ ἀποτελεσθὲν ἴζημα ἀποπλύνεται μὲ κεκραμένον θεϊκὸν ὄζον καὶ κατεργάζεται μὲ οἰνόπνευμα διὰ νὰ ἐπιμείνῃ τὸ λεύκωμα.

Τὸ γλυκορρίζιον ἐπίσης δύναται νὰ κατασκευασθῇ καὶ ἐκ τοῦ ἀγοραίου ἐκχυλίσματος τῆς γλυκορρίζης *Succus Liquiritiae* διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος· κατὰ τὸν **K. Döbereiner** καταβυθίζεται τὸ μὲ ψυχρὸν ὕδωρ κατεσκευασμένον τῆς γλυκορρίζης ἔμβρεγμα μὲ ἀλικὸν ψευδάργυρον, ἐὰν ἡ προαχθεῖσα ὑποστάθμη κατεργασθῇ μὲ οἰνόπνευμα, μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τούτου ἐπιλείπεται τὸ γλυκορρίζιον.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι μάζα κιτρίνη, διαφανὴς, γλυκυτάτη καὶ αἰδέης τὴν γεῦσιν, διαλυτὴ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, θερμαινομένη εἰς τὸν ἀέρα ἐξοιδαίνεται καὶ καίει μὲ καθαρὰν λευκὴν φλόγα καὶ μὲ πολλὴν ἀσβολὴν χωρὶς ν' ἀφίνη τέφραν· μὲ τὰ ὑπερτεροῦντα ὀξέα σχηματίζει δυσδιαλύτους ἐνώσεις ἐχούσας γεῦσιν γλυκεῖαν. Τὸ ὀξικὸν γλυκορρίζιον διαλύεται εἰς τὸ ζέον ὕδωρ καὶ σχηματίζει μετὰ τὴν ψύξιν πηκτὴν, ἥτις ἀποξηρανθεῖσα ἀποθέτει λεπίδας γλυκεῖας τὴν γεῦσιν.

Τὸ γλυκορρίζιον ἐνοῦται μὲ βάσεις καὶ μὲ μεταλλικὰ τινα ἄλατα· τὰ διαλύματα αὐτοῦ καταβυθίζονται διὰ τῶν τοῦ κασσιτέρου, τοῦ μολύβδου, τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χαλκοῦ ἀλάτων.

Ἄμυλον.

Τὸ ἄμυλον εὐρίσκεται εἰς μέγαν ἀριθμὸν φυτῶν καὶ πρὸ πάντων εἰς τοὺς δημητριακοὺς καρποὺς, εἰς τὰ τῶν ἀγροστίδων σπέρματα *Gramineæ*, εἰς τοὺς κυάμους, πίσσους, εἰς πολλὰς ῥίζας, εἰς τὰ γαιόμηλα, εἰς τὴν τῆς θρουσῆς ῥίζαν, εἰς τὸν σάγον καὶ εἰς διάφορα εἶδη λειχήνων. Τὸ ἐκ τῆς ἐντερικῆς διαφόρων εἰδῶν φοινίκων δι' ὕδατος ἐκπλυνόμενον ἄμυλον καλεῖται *Arrow Root* μαρρανθάμυλον· ἐκ τῆς κριθῆς καὶ ἐκ τοῦ σίτου δύναται νὰ κατασκευασθῇ τὸ ἄμυλον κατὰ διαφόρους τρόπους· ὁ σίτος νοτισθεὶς μὲ ψυχρὸν ὕδωρ ἑωστοῦ νὰ συνθλίβεται εὐκόλως διὰ τῶν δακτύλων, πιέζεται διὰ κυλίνδρων, καὶ ὁ εἰς σάκκους ἐγκεκλεισμένος πόλτος ἐκθλίβεται διὰ πιεστήρων, ἐκ δὲ τοῦ ἀποτρέχοντος γαλακτοχρόου ὑγροῦ ἀποτίθεται εἰς τὸν πυθμένα τῶν καθίων τὸ ἄμυλον, ὑπὲρ ἀποπλυνθὲν εἰς ἀρκετὴν ποσότητα ψυχροῦ ὕδατος ξηραίνεται· ἐπειδὴ ὅμως δι' αὐτῆς τῆς πράξεως χάνεται πολὺ ἄμυλον ὥς εἰς τὰ λέπτυσμα ὑπολειπόμενον, προτιμᾶται ἡ τοῦ ἀμύλου ἀποχώρησις διὰ τῆς ζυμώσεως·

πρὸς τοῦτο μὴ γνύεται κεκομμένος σῖτος μὲ ἄρτι ζυμωθέν ἄμυλον καὶ ὕδωρ ἢ μὲ ζύμην, διὰ ταύτης τῆς πράξεως διαλύεται εἰς διάστημα 12—14 ἡμερῶν ἢ εἰς τὸν σίτον φυτοκόλλα· ἔπειτα τὸ ὀξινόν, σιτηπὸς καὶ δυσώδες ὑγρὸν, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει τὴν φυτοκόλλαν εἰς τὸ ἐσχηματισμένον ὀξικὸν ὀξύ διαλελυμένην, καθὼς καὶ ὀλίγον οἰνόπνευμα, ὀξικὴν ἀμμωνίαν καὶ φωσφορικὴν τίτανον, ἀποχύνεται ἀπὸ τὸ εἰς τὸν πυθμένα ἄμυλον· πολλάκις δὲ διὰ ψυχροῦ ὕδατος πλυθὲν θλίβεται διὰ κοσκίνου πρὸς ἀποχώρησιν τῶν πιτύρων καὶ μετὰ ταῦτα ἀποξηραίνεται· τὸ εἰσέτι ὑγρὸν ἄμυλον ξηρανθὲν ταχέως εἰς κάμινον ἔχουσιν 60° P θερμοκρασίαν πυκνοῦται εἰς μάζαν διαφανῇ σκληρυνομένην μετὰ τὴν ἀποξήρανσιν· κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον κατασκευάζεται τὸ ψευδὲς σάγον Sago.

Διὰ τὰ κατασκευασθῇ τὸ ἄμυλον ἐκ τῶν γαιομήλων, ζύονται αὐτὰ ἢ συνθλίβονται διὰ κυλίνδρων, ὁ δὲ γενόμενος πύλτος πλύνεται διὰ τριχοσκοκίνου μὲ ψυχρὸν ὕδωρ, ἕως οὗ τὸ ὕδωρ νὰ μὴν ἀπορῶρῃ πλέον γαλακτόχρουν. Τὸ εἰς τὸν πυθμένα ἀποτιθέμενον ἄμυλον πλύνεται μὲ ὕδωρ καὶ ἀφοῦ τὸ ὑγρὸν ἀποχυθῇ, ἀποξηραίνεται.

Χαρακτηριστικά. Τὸ ἐκ τοῦ σίτου ἄμυλον σχηματίζει βολάρια λευκὰ, ἀμετάβλητα εἰς τὸν ἀέρα, ἄχρμα καὶ ἄοσμα, διὰ τοῦ μικροσκοπίου δύνανται νὰ παρατηρηθῶσιν εἰς αὐτὰ μικροὶ κρύσταλλοι· εἰς τὸ ὕδωρ διασκορπίζεται εὐκόλως ἀποτελοῦν γαλακτώδες βευστὸν χωρὶς νὰ διαλύεται, ἐπίσης εἶναι ἀδιάλυτον καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Τὸ δι' ὀλίγου πυρὸς πεφρυγμένον ἄμυλον καὶ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ διαλελυμένον ἔχει σύστασιν ἱξώδη, καὶ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν ἐπιλείπει οὐσίαν σκληράν, διαφανῇ, πολὺ ἀνάλογον μὲ τὸ κόμμι, χρῆσιμον ἀντ' αὐτοῦ εἰς τινὰς τέχνας, καὶ ἥτις δὲν μεταβάλλεται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς ἱξώδη· εἰς μεγάλην θερμοκρασίαν ἐξοιδάινεται τὸ ἄμυλον καὶ καίει μὲ φλόγα, ἀνθρακούμενον δὲ εἰς ἀερατίνην δίδει τὰ συνήθη τῶν φυτικῶν οὐσιῶν ἀποτελέσματα. Τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν τοῦ ἀμύλου εἶναι ὅτι ὀλίγον διαλύεται εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ζεσθὲν δὲ μετ' αὐτοῦ ἐξοιδοῦται σχηματίζον μετὰ τὴν ἀπόψυξιν πηκτὴν τινα τρέμουσαν ὀνομαζομένην κόλλαν.

Τὸ ἐκ τῶν γαιομήλων κατασκευαζόμενον ἄμυλον ἐνούμενον μὲ ὕδωρ 60 $\frac{1}{2}$ θερμοότητος σχηματίζει διαφανῇ καὶ κολλώδη πηκτὴν, ἐνθ' ὃ τὸ ἐξ ὀρύζης ἄμυλον δὲν εἶναι κατάλληλον πρὸς σχηματισμὸν κόλλας. Τὸ ἄμυλον πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς συνιστάμενον ἐκ πολλῶν στρωμάτων με-

ταξὺ τῶν ὁποίων εὐρίσκεται καὶ ῥευστόν τι. Ἐνὸς τοῦ ἐξωτερικὸν κάλυμμα τοῦ ἀμύλου μένει ἀβλαβές, δὲν διαλύεται ὑπὸ τοῦ ὕδατος, ἀφοῦ ὁμως τριφθῇ ἐπὶ τινος λίθου, διατρυπᾶται τὸ κάλυμμα καὶ τὸ ἀμυλον μεταβάλλεται εἰς χιονόλευκον κόκκιν, διαχέεται εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐξοιδούται πρὸς διαφανές πηκτώδες φύραμα. Ἐὰν τὸ ἀμυλον ἀναμιχθῇ μετὰ ὕδωρ καὶ θερμανθῇ μέχρι 60 βαθμῶν, ἐκτείνονται τὰ καλύμματα, διασπῶνται καὶ οὕτως ἀποτελεῖται ἐπίσης ἡ λεγομένη κόλλα. Ἡ οὕτω προαχθεῖσα κόλλα δὲν εἶναι διάλυσις, ἀλλὰ μόνον ἐξοίδησις δι' ὕδατος, καὶ δύναται νὰ παραβληθῇ μετὰ σπόγγον. Ἐὰν ἡ κόλλα τεθῇ ἐπὶ ἐμπορικῷ χάρτου, ἀφαιρεῖται ὑπ' αὐτοῦ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπιμένει κερατοειδὲς μάζα, ἥτις ξηρανθεῖσα καὶ θραχεῖσα μετὰ ὕδωρ δεικνύει ἐκ νέου τὰ αὐτὰ φαινόμενα. Τὸ ἐξ ἑνὸς μέρους ἀμύλου καὶ 20 ὕδατος κατεσκευασμένον φύραμα ἐὰν ἀφεθῇ εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν, καὶ ἀναπληροῦται τὸ ἐξατμιζόμενον ὕδωρ καὶ ἐμποδίζεται ἡ σῆψις διὰ συχνῆς ἀνακινήσεως, σχηματίζεται κατὰ τὸν K. Saussure ζάχαρις καὶ κόμμι, ἐὰν δὲ τὸ φύραμα ὀξίνισι προάγεται ὀξινόν τι ῥευστόν ἐμπεριέχον γαλακτικόν καὶ ὀξικόν ὄξύ, τὸ ὅποιον ὁ K. Braconot τὸ καλεῖ acide nancique.

Τὸ φύραμα τοῦτο ἀπορρόφᾷ καὶ ὀξυγόνον ἐκ τοῦ ἀέρος, καὶ ἐκλύει ἀντ' αὐτοῦ ἀνθρακικόν ἀέριον· ἄνευ δὲ τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς σχηματίζεται ζάχαρις καὶ κόμμι, ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ ἀερίου καὶ ὕδρογόνου. Τὸ οὕτω σχηματισθὲν κόμμι ἐμπεριέχει κατὰ τὸν K. Saussure καὶ γιτρογόνον.

Ἀμιδίνη Amidin.

Ἀπὸ τὰ ἀπλᾶ καύσιμα σώματα μόνον τὸ χλώριον καὶ τὸ ἰώδες ἐνεργοῦσιν εἰς τὸ ἀμυλον· λείον ξηρὸν ἀμυλον τεθὲν εἰς λάγνην καὶ συναφθὲν μετὰ χλώριον ἀνθρακοῦται μετὰ τινὰς ἐβδομάδας, σχηματιζομένου ἀνθρακικοῦ ἀερίου καὶ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος. Τὸ ἰώδες ἐνοῦται μετὰ τὸ ἀμυλον, αἱ δὲ ποριζόμεναι ἐνώσεις εἶναι κυαναί, ἰώδεις, ὑπέρυθροι καὶ λευκαὶ κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ ἐμπεριεχομένου ἰώδους, καὶ ἡ μὲν κυανὴ ἐνώσις ἐμπεριέχει τὴν μεγίστην ποσότητα ἰώδους, ἡ δὲ λευκὴ τὴν ἐλάχιστην.

Ἡ εἰς τὸ ὕδωρ ἢ εἰς τὸ οἰνόπνευμα διάλυσις τοῦ ἰώδους χρησιμεύει ὡς δοκιμαστήριον πρὸς τὴν τοῦ ἀμύλου ἀνακάλυψιν. Ἡ κυανὴ διάλυσις τοῦ ἰωδαμύλου ἀποβάλλει κατ' ὀλίγον τὸ χρῶμα διὰ τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς, ταχύτερον δὲ ἐὰν προστεθῇ εἰς τὸ ὑγρὸν ἀλκάλιον

ἢ ἐὰν ζεσθῇ· καθότι ἀναθυμιωμένου ὀλίγου ἰώδους, σχηματίζεται συγχρόνως ὑδριωδικὸν ὀξύ. Τὸ τοῦ ἰωδαμύλου κυανοῦν χρῶμα διαφθίρεται διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, διὰ τοῦ θειώδους καὶ ἀρσενικώδους ὀξέος, καθὼς καὶ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου, δι' ὃν μεταβάλλεται τὸ ἰώδες εἰς ὑδριωδικὸν ὀξύ. Τὸ ἐγγλῶριον ὕδωρ διαφθίρει τὸ κυανοῦν χρῶμα οὕτως, ὥστε δὲν δύναται πλέον νὰ ἐπανεέλθῃ, ἐνῶ ἐξ ἐναντίας τὸ δι' ἀλκαλίων διεσθαρμένον χρῶμα ἐπανέρχεται πάλιν διὰ τῶν ὀξέων.

Τὸ ἄκρατον θεικὸν ὀξύ μεταβάλλει τὸ ἄμυλον εἰς μέλαιναν ἀνθρακώδη μάζαν ἐκλυομένου θειώδους ὀξέος, ἐὰν ἐν μέρος ἀμύλου θερμανθῇ μετὰ 3 θειικοῦ ὀξέος καὶ 36 ὕδατος μεχριστοῦ διαλυθῇ τὸ ἄμυλον, καὶ τὸ διάλυμα ἐξατμισθῇ, σχηματίζονται κρύσταλλοι διαφανεῖς καὶ βελονοειδεῖς· ἐὰν τὸ ἄμυλον ἢ καὶ τὸ κόμμι ζέσται πολὺν καιρὸν, μεταβάλλεται εἰς κόμμι καὶ τοῦτο διὰ πλειότερας ζέσεως εἰς ζάχαριν. Εἰς τὰς ῥηθείσας δοκιμὰς ἐπαρτήρησεν ὁ Biot ὅτι τὸ οὕτω προαχθὲν κόμμι ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ ἀποκλίνῃ τὰς διερχομένας ἀκτῖνας πρὸς δεξιὰν μὲ τὰ αὐτὰ χρώματα ὡς τὸ διάλυμα τῆς ζαχάρους τὸ ὅποιον τὰς ἀποκλίνει πρὸς ἀριστεράν· ἔνεκα τοῦ ιδιώματος τούτου ἐκαλέσθη τὸ ἐκ τοῦ ἀμύλου ἀποτελούμενον κόμμι **Gumi Dextrin** καὶ ἀμυλο-Dextrin.

Ἄν καὶ ὁ Foucroy καὶ ἄλλοι χημικοὶ ἐγνώριζαν ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ μεταβληθῇ τὸ ἄμυλον διὰ χημικῶν μέσων εἰς ζάχαριν, ὁ Kirchhoff ὅμως εἰς Πετρούπολιν ἔδειξεν κατὰ πρῶτον δι' ἀρκετῶν δοκιμῶν ὅτι τὸ ἄμυλον διὰ τῆς μὲ κεκραμένον θεικὸν ὀξύ ζέσεως μεταβάλλεται εἰς κόμμι καὶ ἀκολούθως εἰς ζάχαριν. Εἰς δὲ ἡλκὸς ἐν μέρος ἀμύλου ζέσται 8 ὥρας κατὰ συνέχειαν μὲ ὕδωρ μεμιγμένον μὲ 10 τοῖς 0/0 ἀκράτου θειικοῦ ὀξέος καὶ ἀναπληροῦται τὸ ἐξατμιζόμενον ὕδωρ, ἕως οὗ μέρος τι μεμιγμένον μὲ διπλασίαν ποσότητῃ οἰνοπνεύματος νὰ μὴν θολόνεται πλέον δι' αὐτοῦ, τὸ κατ' ἀρχὰς γενόμενον κόμμι μεταβάλλεται εἰς ζάχαριν· ἡ ζέσις δύναται νὰ γενῇ εἰς χαλκίνους λέβητας, καλῆτερὰ δὲ εἰς μεγάλα ξύλινα ἀγγεῖα, εἰς τὰ ὅποια διὰ ξυλίνου σωλῆνος μετοχετεύονται ἀτμοὶ τοῦ ὕδατος. Τὸ ὀξινὸν ὑγρὸν κορεσθὲν δι' ὑπανθρακικῆς τιτάνου διυλίζεται πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ σχηματισθέντος γύψου, τὸ δὲ καθαρὸν καὶ γλυκεῖαν γεῦσιν ἔχον ὑγρὸν ἐξατμίζεται εἰς εὐρυχώρους λέβητας· εἰς ταύτην τὴν πρᾶξιν ὁ καταβυθισθεὶς ὀλίγος γύψος, δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ ψυχρανθέντος ὑγροῦ διὰ τῆς μεταγγίσεως. Διὰ νὰ λευκάνωμεν τὴν ζάχαριν ταύτην, θερμαίνομεν τὸ ὑγρὸν μὲ ζωάνθρακα καὶ τὸ ἐξα-

τμήζομεν μετὰ τὴν διάλυσιν μέχρι συστάσεως σεραπίου, μετ' ὀλίγας δὲ ἡμέρας πήγνυται ἡ ἀμυλοζάχαρις εἰς κρυσταλλώδη μάζαν. Εἰς τὴν τοῦ ἀμύλου μὲ κεκραμένον θεικὸν ὄξυ ζέσιν δὲν παρατηρεῖται μῆτε ἐκλυσίς ἀερίου, μῆτε ἀπορρόφησις ὀξυγόνου, μῆτε δὲ τὸ θεικὸν ὄξυ μεταβάλλεται, ἀλλὰ μόνον τὸ ἄμυλον ὑπόκειται εἰς τινα μεταβολὴν ὡς πρὸς τὸ ποσὸν τῶν συστατικῶν του· κατὰ τὸν Saussure λαμβάνονται ἐξ 100 μερῶν ἀπεξηραμμένου ἀμύλου, 110 μέρη ξηρᾶς ἀμυλοζαχάρεως.

Παρὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος διαλύεται τὸ ἄμυλον, τὸ δὲ εἰς τὸ ψυχρὸς γεννώμενον διάλυμα συνιστᾷ διαφανῇ πηκτὴν· εἰς τὴν θερμότητα μεταβάλλεται τὸ ἄμυλον διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς μηλικὸν καὶ ὀξαλικὸν ὄξύ· ἀπὸ δὲ τὸ ἄκρατον ἀλικὸν ὄξύ διαλύεται τὸ ἄμυλον βραδέως σχηματίζον ὑγρὸν φαῖον καὶ κολλῶδες ἢ πηκτῶδες. Διάλυμα καυστικοῦ καλίου μὲ ἄμυλον συμμιγνύμενον σχηματίζει πηκτὴν διαφανῇ, εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἶόνπνευμα διαλυτὴν, τὸ δὲ ἄμυλον καταβυθίζεται διὰ τῶν ὀξέων ἐκ τῆς διαλύσεως.

Αἱ τοῦ ἀμύλου μὲ τὴν τίτανον καὶ τὴν βαρεῖαν ἐνώσεις εἶναι εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ σχεδὸν ἀδιάλυτοι. Ὑπάρχει καὶ ἔνωσις τοῦ ἀμύλου μετὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου, ἥτις μεταχειρίζεται ὡς ἀξιόλογον κυανοῦν χρῶμα· ἀποτελεῖται δὲ αἷτη, ἐὰν τὸ ἄμυλον ἀναμιχθῇ μὲ διάλυσιν τινὸς διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἄλατος. Τὸ οὕτως ἐστυμμένον ἄμυλον ἐπὶ χύνεται ἀκολούθως μὲ διάλυσιν τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλίου καὶ κατεργάζεται μετ' αὐτοῦ, μεχριστοῦ λάβῃ ὠραῖον κυανοῦν χρῶμα. Διὰ τῆς χρυσοκόλλας πήγνυται ἡ τοῦ ἀμύλου διάλυσις. Ἡ τοῦ ἀμύλου ζέουσα διάλυσις διαλύει τὴν φωσφορικὴν τίτανον, ἥτις ἐξιχνεύεται διὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος καὶ τοῦ ὑποξικοῦ μολύβδου. Τὸ ἐκ τῶν γαιομήλων ἄμυλον συνίσταται ἐξ

Ἀνθρακος	43, 55
Ὑδρογόνου	6, 77
Ὄξυγόνου	49, 68

100,

Χρῆσις. Τὸ ἄμυλον χρησιμεύει ὡς θρεπτικὸν καὶ εἶναι τὸ κυριώτερον συστατικὸν τῶν διαφόρων εἰδῶν τοῦ ἀλεύρου, τῆς ὀρύζης, τῶν γαιομήλων, τοῦ σάγου κ. τ. λ· τὸ μεταχειρίζονται εἰς τὴν βαφικὴν πρὸς τύπωσιν τῶν ὑφασμάτων, οἱ βιβλιοδέται ὡς κόλλαν· δι' αὐτοῦ δίδεται καὶ εἰς τὰ ὑφάσματα μεγαλητέρα τραχύτης. Ἡ ἔνωσις τοῦ ἀμύλου μετὰ

τοῦ ἰώδους **Ioduretum Amyli** χρησιμεύει εἰς τὴν ἰατρικὴν ὡς ἀντιχοι-
ραδιακὸν μέσον.

Διάστασις. Diastase.

Ἡ φυτικὴ αὕτη οὐσία ἀπαντᾷται εἰς τὴν βεβυνωμένην κριθὴν καὶ σχηματίζεται διὰ τῆς βλαστήσεως· ἐπωνομάσθη διάστασις, ἐπειδὴ ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ διαρρήγνῃ τὸ ἀδιάλυτον κάλυμμα τῶν σφαιριδίων τοῦ ἄμυλου καὶ οὕτω νὰ προξενῇ τὴν ἐκκροὴν τοῦ ἐμπεριεχομένου ρευστοῦ. Πρὸς κατασκευὴν αὐτῆς τῆς ὕλης τρίβεται ἡ βύνη μὲ ὕδωρ εἰς ὄλκον καὶ τὸ ἀποτελούμενον ρευστὸν ἀναμίγνυται μὲ οἰνόπνευμα, δι' οὗ ἀποχω-
ρίζεται· ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἰζήματος διαλύεται δι' ὕδατος καὶ καταβυθίζεται ἐκ νέου δι' οἰνοπνεύματος καὶ ἀκολούθως ξηραίνεται ὅσον ἐνεστὶ ταχύτερον. Τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν τῆς ῥηθείσεως ὕλης εἶναι ὅτι, διαλυθεῖσα καὶ ἐνωθεῖσα μὲ διαλύσιν τοῦ ἄμυλου εἰς θερμοκρασίαν 65—70° διαρρή-
γνυσι τοὺς ἐξω ὑμένας τῶν τοῦ ἄμυλου σφαιριδίων καὶ τὸ μεταβάλλει εἰς **Dextrin** καὶ ἀκολούθως διὰ τῆς θερμότητος εἰς ζάχαριν· ἔχει δὲ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦτο εἰς τοιοῦτον βαθμὸν, ὥστε 4 μέρη διαλυόμενα μεταβάλλουσι 2000 ἄμυλου εἰς **Dextrin** καὶ 1000 τοῦλάχιστον εἰς ζάχαριν. Ἡ διάστασις εὐρίσκεται εἰς τὰ βλαστάνοντα σπέρματα τῶν σιτηρῶν καὶ ἰδίως εἰς τοὺς βλαστοὺς καὶ ὀφθαλμοὺς τῶν γαιομήλων, οὐχὶ δὲ εἰς τὰς ῥίζας· ἡ εὐεργετικὴ δηλ. φύσις ἐναπέθεσεν τὴν ὕλην ἐκεῖ, ὅπου τὸ ἀδιάλυτον ἄμυλον ἀπαιτεῖ τὴν μεταβολὴν του εἰς διαλύσιμον τινὰ ὕλην.

Ἄν ἡ διάστασις διατηρῇ τὴν καταλυτικὴν ταύτην δύναμιν καὶ ἐντὸς τοῦ ζωϊκοῦ ὀργανισμοῦ, τοῦτο εἶναι εἰσέτι ἀδύνατον.

Bryorάμυλος ἢ λειχηράμυλος.

Εὐρίσκεται εἰς εἶδη τινὰ λειχίνων μάλιστα εἰς τὸν ἰσλανδικὸν λειχή-
να **Cetraria islandica** εἰς **Lichen plicatus** κ.τ.λ. Κατὰ τὸν K. Berze-
lius κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον· μία λίτρα τετμημένων ἰσλαν-
δικῶν λειχίνων ἐμβρέχεται 24 ὥρας μὲ 18 μέρη ὕδατος, εἰς τὸ ὅποιον προδιελύθη ὑπανθρακικοῦ καλίου 1 οὔγγις. Τὸ φύραμα ἐγκλειόμενον εἰς λιγὸν ὕφασμα ἐκθλίβεται πρὸς ἐκκροὴν τοῦ ὑγροῦ, ἐπὶ δὲ τοῦ ὑπολειφθέν-
τος ἐπιχύνεται ἄλλη ποσότης ὕδατος· ἡ πρᾶξις αὕτη ἐπαναλαμβάνεται

έωστού τὸ ἐκπιεσθὲν ὕδωρ νὰ ἀπορρέῃ ἐντελῶς ἄχρμον, ὁ λειχὴν ζεσταί ἐκ νέου, διῦλίζεται καὶ ἐκθλίβεται.

Ἡ μετὰ τὴν ψύξιν ἀποτελουμένη τεφρόχρους πηκτὴ εἶναι τὸ βρουνά-
μυλον, ὅπερ ἀποξηρανθὲν παρίσταται ὡς μάζα σκληρὰ μέλαινα, ὑ-
λοειδὴς τὴν θραύσιν καὶ εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἐξοιδαινομένη· εἶναι δὲ ἄχυ-
μον, εἰς ζέον ὕδωρ διαλυθὲν συνιστᾷ μετὰ τὴν ψύξιν πηκτὴν ἄχρουν, μὴ
διαφανῇ καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν μὲ λεπιδὰ ἐσκαπασμένην.

Τὸ ἄμυλον τοῦτο ζεσθὲν μὲ κεκραμένον θεϊκὸν ὀξὺ μεταβάλλεται εἰς ζά-
χαριν. Ἡ εἰς ὕδωρ τοῦ λειχηνάμυλου διάλυσις λαμβάνει ἐκ τοῦ βάμματος
τοῦ ἰώδους τεφρόχρου χροῖμα, τὸ ὅποιον μετὰ 24 ὥρας μεταβάλλεται
εἰς ὑποκυανθὸν. Τὰ χημικὰ του χαρακτηριστικὰ εἶναι ἀνάλογα μὲ τὰ τοῦ
κοινοῦ ἀμύλου, χρησιμεύει ὡς θρεπτικὸν καὶ ἰαματικὸν μέσον εἰς τοὺς
ἀπὸ τὸ στήθος πάσχοντας.

Ἑλενίνη. Inuline.

Ἡ ἑλενίνη εὑρέθη κατὰ τὸ 1832 ἀπὸ τὸν K. Valentin Rose εἰς τὴν
ρίζαν τοῦ ἑλενίου *Inula Helenium*, μετὰ ταῦτα δὲ ἀνεκαλύφθη καὶ εἰς τὰς
βολβώδεις ρίζας τῆς *Georgina* ἢ *Dahlia variabilis*, εἰς τὰς ρίζας τοῦ κι-
χωρίου *Cichorium Intybus* καὶ τοῦ πυρέθρου *Pyrethrum*, εἰς τὰ τοῦ
μηνυανθοῦς φύλλα *Menyanthes trifoliata*, εἰς τὰ γαϊόμηλα, εἰς τὰς ρίζας
τῶν εἰς τὴν συγγενεσίαν ἀνηκόντων φυτῶν μὴ ἐμπεριεχόντων κοινὸν ἄμυ-
λον κ. τ. λ. Ὅθεν τὸ εἶδος τοῦτο τοῦ ἀμύλου ἔλαβε διάφορα ὀνόματα
κατὰ τὰ διάφορα φυτὰ ἐξ ὧν κατασκευάσθη *Alantine*, *Helenine*, *Men-
yanthin*, *Datiscline* καὶ *Dahline*.

Κατασκευή. Αἱ ρίζαι τοῦ ἑλενίου ζέονται μὲ ὕδωρ καὶ τὸ διῦλισθὲν
ἀφέψημα ἐξατμίζεται σχεδὸν μέχρι συστάσεως σερπίου· ἡ ἑλενίνη κατα-
βυθίζεται μετὰ τὴν ψύξιν ἐκ τοῦ πηκτοῦ ὑγροῦ, ἀποπλύνεται μὲ ψυχρὸν
ὕδωρ καὶ καθυρίζειται δι' ἐπανειλημμένης διαλύσεως εἰς πολλὰ ὀλίγον ζέον
ὕδωρ καὶ διὰ ψύξεως τοῦ ὑγροῦ ἀποχωρίζεται.

Ἡ ἑλενίνη εἶναι κόνις λευκὴ, λεπτοτάτη, κρυσταλλώδης, ἄχρμος καὶ ὁ-
σμος, τίθεται διὰ θερμότητος ἀνωτέρως τῆς τοῦ ζέοντος ὕδατος καὶ μετα-
βάλλεται εἰς γλυκεῖαν μάζαν, ἥτις εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ εἶναι εὐδιάλυτος.
Ἡ καθαρὰ ἑλενίνη εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ὑπαικοῦνται 240
μέρη αὐτοῦ πρὸς διάλυσιν. Εἰς τὸ ζέον ὕδωρ εἶναι εὐδιάλυτος, ἀλλὰ μετὰ

τὴν ψύξιν καταβυθίζεται πάλιν ὡς κόνις, χωρὶς νὰ σχηματίζῃ πηκτὴν καὶ δι' αὐτοῦ τοῦ χαρακτηριστικοῦ διακρίνεται μάλιστα ἀπὸ τὸ ἄμυλον.

Τὸ οἰνόπνευμα καταβυθίζει τὴν ἐλενίνην ἐκ τῆς εἰς τὸ ὕδωρ διαλύσεως της. Ἐὰν ζεσθῇ μὲ κεκραμένον θεικὸν ὀξύ μεταβάλλεται ταχέως εἰς ἄμυλοζάχαριν. Ἐκ τοῦ ἰώδους λαμβάνει κίτρινον χρῶμα.

Φυτοκόλλα.

Ἡ φυτοκόλλα ἐθεωρήθη πρῶτον ὡς ἰδιαιτέρα οὐσία ἀπὸ τὸν K. Beccaria, εὑρίσκεται μετὰ τοῦ ἄμυλου, τοῦ φυτικοῦ λευκώματος καὶ ὀλίγης ζαχάρους εἰς τὰ τῶν ἀγροστίδων (Gramineae) καὶ μάλιστα τῶν δημητριακῶν καρπῶν σπέρματα, καθὼς καὶ εἰς τοὺς πύσσους καὶ κνήμες· καθαρὰτε κατασκευάζεται ἐκ τοῦ ἀλεύρου τοῦ σίτου.

Πρὸς τοῦτο ἀναμιγνύεται τὸ ἄλευρον μὲ τὸ ἀκοῦν ψυχρὸν ὕδωρ διὰ νὰ γένῃ πόλτος, ὅστις εἰς λίνον ἐγκλεισθεὶς ἐκπλύνεται τόσον δι' ὕδατος ὥστε νὰ μὴν ἀπορῶρῃ τὸ ὕδωρ γαλακτόχρουν. Τὸ ἀπορῶρον γαλακτόχρουν ὑγρὸν ἐμπεριέχει τὸ ἄμυλον, ὀλίγον λεύκωμα καὶ ζάχαριν· ἡ δὲ φυτοκόλλα ἐπιμένει ὡς μάζα ὑπόλευκος, ἐλαστικὴ, ἰσώδης καὶ 37 τοῖς $\frac{0}{100}$ ὕδατος ἐμπεριέχουσα. Ἡ ἐκ τοῦ ἀλεύρου τῆς βρώμης καὶ τῆς κριθῆς κατασκευασμένη φυτοκόλλα δὲν εἶναι τόσον συμπαγὴς ὡς ἡ ἐκ σίτου, καὶ διόλου ἐλαστικὴ. Ἐὰν ἀποξηρανθῇ ἡ ἐκ σίτου φυτοκόλλα διὰ μαλακῆς θερμῆς, ὑπολείπεται μάζα τεφρόχρους, διχρυνῆς, κερατοειδῆς, ἄχυμος καὶ ἄοσμος, ἥτις ἐπινοτισθεῖσα μὲ ὕδωρ δὲν ἀναλαμβάνει πλέον τὴν διὰ τῆς θερμότητος διαφθαρεῖσαν ἐλαστικὴν δύναμιν. Οἱ χημικοὶ ἐνόμιζαν πολὺν καιρὸν τὴν οὕτω ἀπολαμβανομένην μάζαν, ὡς καθαρὰν φυτοκόλλαν· ἐὰν ὅμως κατεργασθῇ μὲ ζέον οἰνόπνευμα, χωρίζεται εἰς 2 μέρη, ἐξ ὧν τὸ μὲν εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλυτὸν μέρος ἐκαλέσθη ἀπὸ τὸν K. Jaddei γλοιιδίνη (Gliadine), τὸ δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτον ὠνομάσθη φυτολεύκωμα ἢ ζύμωμα (Zymome).

Τὸ φυτολεύκωμα σχηματίζει καθὼς καὶ τὸ ζύμωμα μὲ τὴν τοῦ ἀλικοῦ ὑδραργύρου ἄχνην ἀδιάλυτον ἐνωσιν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ μεταχειρίζονται ὡς ἀντίδοτον κατ' αὐτῆς. Τὸ φυτολεύκωμα καὶ ἡ φυτοκόλλα ἐμπεριέχουσιν πολὺ νιτρογόνον, καὶ διὰ τοῦτο δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ζωϊκαὶ οὐσίαι.

Εἰς τὰ χέδροπα Leguminosae καθὼς καὶ εἰς τοὺς πύσσους, κνήμες καὶ φακοὺς ἀνακάλυψεν ὁ K. Einhoff οὐσίαν τινὰ ὁμοιάζουσαν τὴν φυτο-

κόλλαν, ἥτις ἀπὸ τὸν *K. Braconot Legumine* χροδρσπίνη ὠνομάσθη· κατὰσκευάζεται δὲ ἐκ τοῦ τῶν πίσσω ἀλεύρου.

Ἀξιοπαρατήρητος εἶναι καὶ ἡ τῆς φυτοκόλλας καὶ τοῦ φυτολευκώματος ἐπιρροὴ ἐπὶ τοῦ ἀμύλου, τὸ ὅποιον μεταβάλλεται δι' αὐτῆς εἰς ζάχαριν. Ἐὰν εἰς ἓν μέρος ἀμύλου προστεθῶσιν 10 ζέοντος ὕδατος καὶ τὸ οὕτω γεννώμενον φύραμα κατεργασθῇ εἰς 50—75° P μὲ $\frac{1}{2}$ ξηρᾶς καὶ λείας φυτοκόλλας ἐκ σίτου, μετὰ 8 ὥρας ἀποβάλλει ἡ μάζα τὴν κολλώδη σύστασιν καὶ γίνεται τέλος λεπτόρρευστος, καθαρὰ καὶ γλυκεῖα, τότε δὲ τὸ ἀμύλον μεταβάλλεται εἰς κόμμι καὶ ζάχαριν. Ἐὰν τὸ ὑγρὸν ἐξατμισθῇ δύναται νὰ χωρισθῇ ἡ ἀμυλοζάχαρις δι' οἰνοπνεύματος, τὸ ὅποιον δὲν διαλύει τὸ κόμμι. Δι' αὐτῶν τῶν δοκιμῶν ἀποδεικνύεται ἡ προαγωγή τῆς ζαχαρώσεως, ἥτις συμβαίνει ὅταν τὰ δι' ὕδατος ἐξοιδούμενα σιτηρὰ ἄρχωνται νὰ βλαστάνουσιν, καθὼς καὶ ἡ μεταβολὴ αὐτῶν εἰς βύνην διὰ τῆς ἀποξηράνσεως.

Ἡ εἰς τοὺς δημητριακοὺς καρποὺς ἐμπεριεχομένη φυτοκόλλα εἶναι αἶτιον τοῦ νὰ μεταβάλλεται τὸ ἄλευρον εἰς πόλτον συμμιγνύμενον μὲ ὕδωρ· ὁ πόλτος οὗτος ἐξοιδουῖται ἐὰν ἐνωθῇ μὲ ζύμην, ἐνῶ τὸ ἄλευρον ζυμώνεται, σχηματίζεται οἰνόπνευμα, ὃξυ καὶ ἀνθρακικὸν ἀέριον, τὸ ὅποιον ἐκλύμενον εἰς εἶδος πομφολύγων ἐξοιδάινει τὸν ἄρτον ἀποκατασταίνων αὐτὸν ἐλαφρὸν, σπογγώδη, καὶ λευκόν.

Χρήσις. Ἡ φυτοκόλλα εἶναι τὸ θρεπτικὸν μέρος τῶν διαφόρων ἀλεύρων καὶ κύριον τοῦ ἄρτου συστατικόν, τὸ διάλυμα τῆς φυτοκόλλας εἰς ζέον οἰνόπνευμα χρησιμεύει πρὸς κόλλησιν τῶν πορφυρῶν ἀγγείων. Εἰς ὑγρὰν κατὰστασιν μὲ ὕδωρ μεμιγμένη συσταίνεται ὡς κύριον ἀντιφάρμακον κατὰ τῆς δηλητηριάσεως διὰ τῆς τοῦ ἀλικοῦ ὑδραργύρου ἄχνης.

Περὶ τῆς τοῦ ξύλου ἱνικῆς ὕλης ἢ περὶ τοῦ σκελετοῦ τῶν φυτῶν.

Μεταξὺ τῶν κυρίων συστατικῶν τῶν φυτῶν ἀπαντᾷται συχνότατα ἡ ἱνικὴ ὕλη, μάλιστα εἰς τὸ ξύλον τὸ παριζάνον τὸ σκελετὸν τῶν καυλῶν καὶ τῶν κλόνων τῶν δένδρων ἐμπεριέχεται 96 τοῖς $\frac{0}{100}$ ἱνικῆς ὕλης.

Ἐὰν ὁ ὅπως τῶν φυτῶν ἐκθλιφθῇ καὶ τὸ ἐπιμένον μέρος κατεργασθῇ μὲ ψυχρὸν καὶ ζέον ὕδωρ, ἔπειτα μὲ οἰνόπνευμα, μὲ αἰθέρα, δι' ὕδατος κεκραμένην διάλυσιν τῆς ποτάσεως καὶ τέλος μὲ ἐγγχώριον ὕδωρ πρὸς ἀποχώρησιν ὕλων τῶν διαλυσίμων μερῶν, ὑπολείπεται τελευταῖον τὸ σκληρὸν σκελετὸν

ἢ ἡ τῶν φυτῶν ἰνικὴ ὕλη. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κατὰσκευάζεται καὶ ἡ ἰνικὴ ὕλη ἐκ τοῦ λειοσκεομένου ξύλου.

Ὡς πρὸς τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικὰ διακρίνονται διάφορα εἶδη ἰνῶν, καὶ τινες μὲν καλῶς συμπεπλεγμένοι μετ' ἀλλήλων λέγονται ἐλεφαντοειδεῖς ἵνες καθὼς αἱ εὐρισκόμεναι εἰς τὸ ἱερόξυλον καὶ εἰς τὸ τῆς δρυὸς εἰς τὸ τῶν καρύων καὶ τῶν δρυσεπῶν περικάρπιον καὶ εἰς τὰ τῶν ἀγροστιδῶν (Gramineae) γόνυα· ἄλλαι δὲ ὀλίγον μόνον συμπεπλεγμέναι καλοῦνται σχιστικαί, εὐρισκόμεναι εἰς τὸ τῶν πεύκων καὶ τῶν σημύδων ξύλον ὡς καὶ εἰς τοὺς τῶν ἀγροστιδῶν καυλούς· τινὲς δὲ εὐσχιστοὶ οὔσαι καὶ μικραὶ καὶ ἐλίκται ὀνομάζονται γηματοειδεῖς ὡς αἱ τοῦ λίνου καὶ τῆς καννάβεως· ἄλλαι πάλιν κεχωρισμέναι, εὐκυμπτοὶ, τραχεῖαι καὶ ἐλαστικαὶ καλοῦνται χνοώδεις ὡς αἱ τῆς βύσσου. Αἱ τελευταῖαι αὗται εἶναι τραχύγονοι καὶ διεγείρουσιν ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιδερμίδος τρίβιν τινὰ καὶ ἕνεκα τούτου τὰ ἐξ αὐτῶν ὑφάσματα δὲν εἶναι χρήσιμα μῆτε εἰς τὴν καταρρόην, μῆτε εἰς τὰς πληγὰς. Ἡ ἰνικὴ ὕλη εἶναι λευκὴ, ἀδικοφανὴς, ἄσμος καὶ ἄχυμος, καὶ 1, 5 εἰδικῆς βαρύτητος.

Τὰ πλείονα τῶν ξύλων εἶδη πλέουσιν ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἢ δὲ φαινομένη αὕτη ἐλαφρότης προέρχεται ἀπὸ τοὺς μὲ ἀέρα πεπληρωμένους τοῦ ξύλου πόρους, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸ κενὸν τῆς πνευματικῆς ἀντλίας καταβυθίζεται· ἐὰν τὸ ξύλον ἀφελῇ εἰς τὸ ὕδωρ πολὺν καιρὸν καταβυθίζεται· τὸ ἱερόξυλον καὶ ἄλλα τινὰ καταδύονται ἀμέσως· τὸ παντελῶς ἀπεξηραμμένον δὲν εἶναι ἠλεκτραγωγόν. Ἐὰν τὸ ξύλον κατ' ὀλίγον πυρωθῇ εἰς κεκλεισμένα ἀγγεῖα μῆτε ἀναθυμιᾶται, μῆτε ἐξοιδανέται, μῆτε τήκεται, ἀλλὰ διατηρεῖ τὸ σχῆμά του, ἀνθρακοῦται καὶ ἐκτὸς τῶν διαφόρων ἀερίων σχηματίζεται πυροξυλικὸν ὀξύ, πίσσα ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, περὶ ὧν εἰς τὸ περὶ ὀξικοῦ ὀξέος καὶ ρητίνης διεξοδικώτερον. Ἡ τοῦ ξύλου ἀνθράκωσις δύναται νὰ γένη ἢ εἰς σιδηρὰ κιβώτια διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποσταξέως ἐὰν θέλωμεν νὰ κάμωμεν χρῆσιν τῶν ἐκλυομένων πτητικῶν σωμάτων, ἢ καὶ εἰς σωροὺς, ὅπου τὰ πτητικὰ μόρια ἀναθυμιῶνται ὡς ἄχρηστα· ἐν γένει ὑπολείπονται ἀπὸ καλῶς ἀπεξηραμμένου ξύλου 25—27 τοῖς ἑκατὸν ἀνθράκος· εἰς ξηρὸν ἀέρα δύναται νὰ φυλαχθῇ τὸ ξύλον διὰ πολλοὺς αἰῶνας, εἰς ὑγρὸν δὲ φθείρεται κατ' ὀλίγον, ἐπειδὴ ἀφαιροῦν ὀξυγόνον μεταδίδει ἀνθρακικὸν ἀέριον καὶ μεταβάλλεται εἰς εὐρωτιώσαν πολλάκις δὲ εἰς φωτοβολοῦσαν σπογγώδη μάζαν. Ὅτι τὸ μὲ χρώματα ἡλειμμένον ξύλον δύναται νὰ διατηρηθῇ

πολλούς αἰῶνας αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν Αἰγυπτιακῶν λαβράκων· ὁμοίως τὸ ξύλον ὑπὸ τὸ ὕδωρ μένει πολλοὺς χρόνους ἀμετάβλητον.

Περὶ τῆς ἐπιρρόης τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου ἐπὶ τοῦ ξύλου.

Ἐάν εἰς τὸ ξύλον ἐπιχύσωμεν θεϊκὸν ὄξυ ἀκράτον καὶ ἔπειτα τὸ θερμάνωμεν, τὸ ξύλον ἀνθρακίζονται σχηματιζομένου ὕδατος, ὀξικοῦ, θειώδους καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Ἄπαντες οἱ χημικοὶ παρέδεχθησαν ὅτι διὰ τῆς ἐκτεθείσης τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπιρρόης ἀπρσυντίθεται τὸ ξύλον εἰς ἀνθρακα καὶ ὕδωρ, καὶ ὅτι ἡ ἐκλυομένη θερμότης προέρχεται ἀπὸ τὴν ἔνωσιν τοῦ σχηματιζομένου ὕδατος μετὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος. Ὁ Κ. Braconot παρατήρησεν, ὅτι εἰς τὴν πρᾶξιν ταύτην μεταβάλλεται τὸ ξύλον κατὰ μέγα μέρος εἰς κόμμι καὶ ζάχαριν μὲ φαιὸν χρῶμα, ἐάν ὅμως μεταχειρισθῶμεν λευκά ὑφάσματα ἐκ λίνου ἢ βύσσου, ἀπολαμβάνομεν καὶ τὴν ζάχαριν καὶ τὸ κόμμι λευκά. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἐκζέσται πρότερον τὸ λευκὸν ἐκ λίνου ὑφάσμα μὲ δι' ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τῆς ποτάσης, μεχριστοῦ δὲν διαλύεται τι ἐξ αὐτοῦ· μετὰ ταῦτα ἀποστεγνοῦται καὶ ἐπὶ 32 λοθίων ὑφασμάτων ἐπιχύνονται 43 λόθια ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος 1,800 εἰδικῆς βαρύτητος καὶ κατεργάζονται διὰ συνεχῶς ἀνακινήσεως. Ἐάν τὸ μίγμα τοῦτο ἀφεθῇ ἡμέρας τινάς, ἄρχεται νὰ ἐλαττοῦται ὁ ὄγκος τοῦ φυράματος, ἡ μάζα γίνεται ἰξώδης καὶ τέλος ρευστοτέρα, χωρὶς νὰ προσλαμβάνῃ μέλαν χρῶμα, καὶ ἐάν ἐπιχυθῇ εἰς αὐτὴν ζέον ὕδωρ διαλύεται κατὰ μέγα μέρος, ἐκτὸς ὀλίγων ἀμεταβλήτων ὀργανικῶν μορίων.

Περὶ χλωροφύλλου.

Chromule verte.

Τὸ χλωρόφυλλον εἶναι σχεδὸν ἡ μόνη πρασίνη βαφικὴ ὕλη, ἡ ὁποία εὐρίσκεται εἰς ὅλην τὴν φυτικὴν βασιλείαν καὶ μάλιστα εἰς ἄμετρον ποσότητα ἀπαντᾷται εἰς τὰ φύλλα, εἰς τοὺς καυλοὺς καὶ εἰς τοὺς πρασίνους καρπούς· ἐπειδὴ δὲ τὸ χλωρόφυλλον δὲν δύναται νὰ χρησιμεύσῃ εἰς τὴν βαφικὴν, τὰ φυτικὰ πράσινα χρώματα συντίθενται ἐξ ὠχροῦ καὶ κυανοῦ χρώματος ἢ προάγονται διὰ τῆς χημικῆς ἐπιρρόης.

Τὸ χλωρόφυλλον κατασκευάζεται, ἐάν ἐκπιεσθῇ ὁ ὅπως ἐκ τῶν χλωρῶν φύλλων καὶ ἀποπλυθῇ πολλάκις τὸ ἐπιμένον ὕδωρ καὶ πάλιν ἐκπιεσθῇ· ἀφοῦ δὲ ἀποξηρανθῇ καὶ ἀποχωρισθῇ ὁ κηρὸς καὶ τὸ στέαρ δι' αἰθέρος

ἐμβρέχεται μὲ οἰνόπνευμα, ἔπειτα τὸ διϋλισθὲν ὑγρὸν ἐξατμίζεται, τὸ δὲ ἐπιμένον βράζεται μὲ ὕδωρ διὰ νὰ διαλυθῇ ἡ ἐκχυλισματικὴ ὕλη.

Τὸ εἰς τὸν ἀέρα ἀπεξηραμμένον χρωρόφυλλον εἶναι στερεόν, βαθυπράσινον, ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα, ἄσμοι καὶ ἄχρυμον· πυρούμενον ἐπὶ ἀνθράκων καίει μὲ φλόγα, ἐκπέμπει ὁσμὴν εὐώδη. Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποζάξεως μαλακοῦται μὲν, ἀλλὰ δὲν τήκεται, μήτε ἀναθυμιᾶται ἀμμωνία· εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ ψυχρὸν καὶ ζέον ὕδωρ, εὐδιάλυτον δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὰ λιπαρὰ καὶ πτητικὰ ἔλαια. Τὰ διαλύματα ταῦτα ἔχουν πράσινον χρῶμα, τὸ ὅποιον ὁμῶς φθείρεται πολὺ ταχέως διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου. Εἰς ψυχρὸν θετικὸν ὀξύ διαλύεται καὶ κατακρημνίζεται ἐν μέρει δι' ὕδατος.

Ὁ Clamor Marquart εἰς τὸ περὶ χρωμάτων τῶν ἀνθῶν πόνημά του ἐπροσπάθησεν ν' ἀποδείξῃ ὅτι τὰ φύλλα τῶν ἀνθέων ἐνῶ εὐρίσκονται εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἐγκεκλεισμένα ἔχουσι πρασίνην βαφὴν καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς θεμελιώδους βαφῆς προάγονται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς ζωϊκῆς δυνάμεως δύο βαφικαὶ ὕλαι, δι' ὧν ἅπαντα τὰ χρώματα τῶν ἀνθέων γενιῶνται· ἡ μὲν εἶναι κυανῇ καὶ λέγεται ἀνθοκυανοῦν Anthokyan, ἡ δὲ ἄλλη ξανθῇ καὶ λέγεται ἀνθόξανθον Anthoxanthin· τὸ ἀνθοκυανοῦν ἀποτελεῖται ἐκ τῆς πρασίνης βαφῆς διὰ τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ ὕδατος ἐκ τῶν τοῦ ἀνθους στοιχείων, τὸ δὲ ἀνθόξανθον διὰ τῆς προσθήκης τοῦ ὕδατος. Ἐκτὸς τούτων τῶν δύο βαφικῶν ὑλῶν εὐρίσκεται εἰς τὰ λευκά, τὰ ἐρυθρά καὶ τὰ ἰώδη ἰδιαιτέρα τις ῥητίνη. Τὰ χρυσοειδῆ ἄνθη λ. χ' ἐμπεριέχουσιν ἀμφοτέρας τὰς βαφικὰς ὕλας, τὸ ἀνθόξανθον καὶ τὸ δι' ὀξέων ἐρυθρωθὲν ἀνθοκυανοῦν. Τὰ φαιὰ ἄνθη ἐμπεριέχουσιν τὸ δι' ὀξέων ἐρυθρωθὲν ἀνθοκυανοῦν καὶ χλωρόφυλλον· τὸ δὲ κίτρινον εἶναι μεταβολὴ τοῦ χλωροφύλλου. Τὸ ἀνθοκυανοῦν δύναται νὰ ἀποτελεσθῇ εἰς καθαρὰν κατάστασιν, ἐν τῇ κυανὰ ἄνθη ἐκχυλισθοῦν δι' οἰνοπνεύματος, τὸ δὲ ἀνθόξανθον, ἐκ τῶν ξανθῶν ἀνθέων κατὰ τὸν προσκετεθέντα τρόπον. Ἡ ἐρυθρὰ βαφικὴ ὕλη τῶν ἀνθῶν μεταβάλλεται διὰ τῶν ἀλκαλίων εἰς κυανὴν καὶ κιτρινίζεται διὰ τῶν ὀξέων.

Περὶ τοῦ χρώματος τῶν φύλλων κατὰ τὸ φθινόπωρον.

Πασιδὴλον εἶναι ὅτι τὰ φύλλα πολλῶν δένδρων ὡς τοῦ Sorbus aucuparia, Prunus sanguinea, Prunus Cerasus προσλαμβάνουσιν τὸ φθινόπωρον ὥραϊον ἐρυθρὸν χρῶμα, ἐνῶ τὰ φύλλα τῶν ἄλλων μεταβάλλονται

εἰς κίτρινα ὡς εἰς τὰ δένδρα τῶν δασῶν καὶ τὰς πεύκας, λεύκας κ. τ. λ. Ὁ Macaire Prinsep παραδέχεται εἰς τὰ φύλλα ἰδιαίτεραν πρασίνην βαφὴν, τὴν ὁποίαν καλεῖ Chromule καὶ ἥτις διὰ τῆς ἐπιφύρου διαφόρων χημικῶν οὐσιῶν μεταβάλλεται εἰς κιτρίνην καὶ ἐρυθρὰν. Ὁ Berzelius ἀπέδει-
ξεν ὅτι ὑπάρχουσιν ἰδιαίτεραι βαφικαὶ ὕλαι καὶ ἡ μὲν ἐρυθρὰ καλεῖται ὑπ' αὐτοῦ ἐρυθρόφυλλον Erythrophyl ἡ δὲ κιτρίνη ξανθόφυλλον Xantophyll. Αὐταὶ αἱ δύο βαφικαὶ ὕλαι κατασκευάζονται, ἐὰν τὰ διαφόρως κεχρωματισμένα φύλλα κατεργασθῶσι μὲ οἰνόπνευμα καὶ ἐξατμισθῶσι τὰ βάμματα ταῦτα.

Συστατικὰ τῶν φυτῶν.

Περὶ τῆς ἐκχυλισματικῆς ὕλης καὶ τῶν ἐκχυλισμάτων.

Ἐὰν οἱ ἐκπιεσθέντες ὅποι τῶν νεαρῶν φυτῶν, καθὼς καὶ τὸ ἔμβρυγμα καὶ τὰ ἀνεψήματα τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν ἐξατμισθῶσι μέχρι συστάσεως μέλιτος ἢ μέχρι στερεοῦ, ἐπιμένει μάζα κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον χρωματισμένη ἐκχύλισμα Extractum καλουμένη.

Χημικοὶ τινες ἐνόμιζον ὅτι τὰ ἐκχυλίσματα ἐμπεριέχουσιν ἐκτὸς ὀξικῶν καὶ ἀλικῶν ἀλάτων καὶ ἄλλας οὐσίας καθὼς τὸ κόμμι, τὴν ζάχαριν κ. τ. λ. καὶ ὕλην τινὰ ἰδιαίτεραν, τὴν ὁποίαν ὠνόμασαν ἄλλοτε μὲν σαπωνώδη ἄλλοτε δὲ ἐκχυλισματικὴν ὕλην. Ὁ K. Vauquelin ἐπροσπάθησε νὰ ἀποχωρίσῃ ταύτην τὴν ἐκχυλισματικὴν ὕλην ἀπὸ τὰ ἄλλα συστατικὰ τῶν ἐκχυλισμάτων καὶ νὰ τὴν κατασκευάσῃ ὅσον ἐνδέχεται καθαρὰν εἰς καθαρὰν κατάστασιν ἔχει τὰ ἐξῆς χαρακτηριστικά.

1) Βραδέως ἀποξηρανομένη συνιστᾷ λεπίδια στιλπνὰ, φαιὰ, πολλὰ-
κις πικρὰ καὶ μὴ κρυσταλλώσιμα, ἐξαιρουμένης τῆς ἐκχυλισματικῆς ὕλης τῆς γεντιανῆς gentianin καλουμένης.

2) Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως δίδει ὀξινὸν μὲν ὑγρὸν, ὃχι δὲ ἐναμμώ-
νιον.

3) Εἶναι διαλυτὴ εἰς τὸ ὕδωρ καθὼς καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

4) Μὲ μέταλλά τινα ὀξειδωμένα σχηματίζει ἐνώσεις εἰς τὸ ὕδωρ ἀδια-
λύτους.

5) Ἐὰν ζέεται τὸ διάλυμα αὐτῆς ὑπὸ τὴν ἐπιφύου τοῦ ἀέρος, ἀπορροφᾷ ὀξυγόνον καὶ ἀναθυμιά ἀντ' αὐτοῦ ἀνθρακικὸν ἀέριον. Διὰ τῆς τοῦ ὀξυγό-
νου ἀπορρόφησεως σχηματίζεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ φαιὰ
τις λεπίς, καὶ ἡ ἐκχυλισματικὴ ὕλη γίνεται ἐν μέρει ἀδιάλυτος καὶ κατα-

κρημνίζεται ὡς φαιὰ κόνις εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἐξατμιστηρίου. Ἐὰν τὸ ἐκχύλισμα διαλυθῇ πάλιν εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἀναζέεται τὸ διάλυμα εἰς τὸν ἀέρα, σχηματίζεται ἐκ νέου ὀλίγον τῆς προεξηρημένης φαιᾶς κόνεως, καὶ τοῦτο ἐξακολουθεῖ ἐνὸσω τὸ διάλυμα ἐμπεριέχει ἐκχυλισματικὴν ὕλην. Ἀὕτη ἡ ὑποστάθμη ὠνομάσθη ὀξειδωμένη ἐκχυλισματικὴ ὕλη. Ὁ δὲ K. Berzelius τὴν ὀνομάζει ἀπόθεμα.

Περὶ τοῦ ὀπίου. *Opium*

Τὸ ὀπιον κατασκευάζεται ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἀνάρων κωδιδῶν τοῦ ὑπνωτικοῦ μήκωνος *Papaver somniferum*. Αἱ κωδίαι ἐγχαράττονται καὶ ὁ ἐκρέων ὅπως ξηραίνόμενος ἀποτελεῖ τὸ καθαρώτατον ὀπιον. Τοῦτο τὸ εἶδος καλεῖται δάκρυον τοῦ ὀπίου *Lacryma opii*. Συχνότερον δὲ αἱ κωδίαι καὶ τὰ φύλλα ἐκθλίβονται καὶ ζέονται μὲ ὕδωρ καὶ τὸ οὕτω ἀποτελούμενον ὑγρὸν ἀποξηραίνεται ἐντελῶς εἰς τὸν ἥλιον.

Τὸ ὀπιον μεταφέρεται ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς σχῆμα θρόμβων στρογγύλων, πολλάκις μὲ φύλλα τοῦ μήκωνος περιτυλιγμένων. Εἶναι φαῖον, ἀδιαφανές, ναρκωτικὸν τὴν ὁσμὴν, πολὺ πικρὸν καὶ δριμύ τὴν γεῦσιν, γλίσχρον καὶ συπτικόν, γίνεται δὲ ξηρὸν καὶ βαθύχρουν μετὰ καιρὸν. Τὸ ὀπιον διαλύεται ἐν μέρει εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ καὶ τὸ διάλυμα δίδει μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τὸ ὕδατος ἐκχύλισμα τοῦ ὀπίου (*Extractum opii aquosum*). Ἐὰν τὸ ὀπιον ἀποσταλάζεται μὲ ὕδωρ, ἐξέρχεται ὕδωρ, τὸ ὅποσον ἔχει δυνατότην ὁσμὴν τοῦ ὀπίου, δὲν ἐμπεριέχει ὅμως αἰθέριον ἔλαιον· εἰς τὸ κεκραμένον οἰνόπνευμα εἶναι πλέον εὐδιάλυτον παρὰ εἰς τὸ λεῖψυδρον ἢ εἰς τὸ ὕδωρ μόνον. Τὸ ὀπιον ὑπεβλήθη πολλάκις εἰς χημικὰς ἐξετάσεις καὶ κατ' αὐτὰς εὐρέθησαν τὰ ἑξῆς.

Μορφίνη	10,30
Κωδίνη	0,25
Μηκωνίνη	0,08
Ναρκωτίνη	1,30
Νατροίνη	0,71
Μηκωνικὸν ὀξύ	4,70
Ῥητινώδης οὐσία	40,93
Τίτανος	0,40
Μαγνησία	0,07

Άργίλλος, ὀξείδιον τοῦ σιδήρου καὶ φωσφορικὴ τίτανος . . .	0,24
Άλατῶδη μόρια καὶ πτητικὸν ἔλαιον	0,26
Φυτικὸς χυλὸς, ἐλαστικὸν κόμμι, λίπος καὶ φυτικὴ ἰνικὴ ὕλη	26,25
Διαλύσιμα μόρια εἰς οἰνόπνευμα καὶ ὕδωρ, ὡς κόμμι, ὀξέα κτλ.	41,17

Περὶ δηλητηριάσεως διὰ τοῦ ὀπίου.

Ἡ ἐνέργεια τοῦ ὀπίου εἶναι διαφορετικὴ κατὰ τὴν ποσότητα, εἰς δόσιν 1 — 2 κόκκων εἶναι πολυτιμότεον ἱατρικόν, ἐνεργεῖ ὡς καταπραϋντικὸν καὶ ναρκωτικὸν μέσον, ἐπιφέρει βαθμὸν μέθης, κάμνει τὸν ἄνθρωπον εὐθυμον καὶ ἰσχυρόν, καὶ ὁμοιάζει ὡς πρὸς τοῦτο μὲ τὸ οἰνόπνευμα. Οἱ τοῦρκοι πίνοντες τὸ ὕπιον λησμονοῦν τὰ δυστυχήματά των, καὶ πληθος εὐαρέστων εἰκόνων καὶ φαινομένων ἐμφανίζονται εἰς τὴν φαντασίαν των. Εἰς τὴν διὰ τοῦ ὀπίου μέθην διακρίνονται θορυβώδεις γέλωτες καὶ μωρολογίαί, ἡ κατὰστασις αὕτη διαρκεῖ μόνον τινὰς ὥρας, ἀκολουθῶς ἔπεται χαυνότης καὶ χαλαρότης, ὕπνος καὶ τέλος λύπη.

Συμπτώματα τῆς δηλητηριάσεως. Ἐάν ὅμως τὸ ὕπιον καταπίνηται εἰς μεγαλύτεραν δόσιν 20 — 40 κόκκων, τότε προξενεῖται δηλητηρίασις, ταχύτατα ἀκολουθεῖ ἐκκένωσις καὶ θήλας ξηρὸς, ὅστις πάλιν παύει, ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐξαπλοῦται, ἡ θερμότης τοῦ σώματος μειοῦται, ὁ σφυγμὸς γίνεται βραδύς, ἡ ἀναπνοὴ βραδεία, τὰ ἄθροα κρύνουσιν, δίψα, κατήφεια, ἀναισθησία, λιθαργία, ἀναπνοὴ μὲ ἀνοικτὸν στόμα, ἀκίνησία, ἀδυναμία τῆς καταπόσεως κ. τ. λ. εἶναι τὰ συμπτώματα τῆς διὰ τοῦ ὀπίου δηλητηριάσεως.

Αἰτίδοτα. Εἰς τὰς διὰ τοῦ ὀπίου δηλητηριάσεις πρέπει νὰ δοθῇ πάραυτα δυνατόν ἐμετικὸν πρὸς ἐκκένωσιν τοῦ στομάχου, μετὰ ταῦτα εἶναι καλὸν νὰ πῇ ὁ ἀσθενὴς καφὲ μετὰ χυλοῦ τῶν λεμονίων ἢ μόνον μετὰ ὄξους συγκερασμένον τὸ ὄξος ἐφάνη πολλάκις ὠφέλιμον ὅχι μόνον εἰς τὰς διὰ τοῦ ὀπίου δηλητηριάσεις, ἀλλὰ ἐν γένει εἰς τὰ ἐκ τῶν φυτῶν ναρκωτικὰ φάρμακα, καὶ πιθανῶς ἐνεργεῖ ὅχι μόνον ὡς ἐλαφρόν ἐρεθιστικὸν μέσον ἀλλὰ ἐξουδετερόνει καὶ σχηματίζει μετὰ τῶν ναρκωτικῶν ἀλκαλίων ἄλλα μετ' ὑπεριερωδντος ὀξέος, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς βάσεως. Παρομοίως 5 — 10 σταγόνες καθαρᾶς καὶ ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας ἀναμεμιγμένης μετὰ πολλοῦ ὕδατος ἐφάνησαν πολλὰ ὠφέλιμοι, καὶ ἔνεκα τούτου δυνάμεθα νὰ ἐλπίζωμεν ἀρκετὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς χρήσεως τῆς ἀνθρακικῆς ποτάσεως. Πρὸς τούτοις ἐδοκιμάσθησαν καὶ ἄλλα τινὰ

ἐρεθιστικά μέσα, καθὼς τὸ νάφθα, ἡ καφουρά, τὸ σίλφιον κόμμι, τὰ ἐκδόρια, ὁ ὀξειδωμένος σίδηρος κ. τ. λ. τὰ ὁποῖα ὅμως ἐνίοτε δὲν ἀπέβησαν ὠφελίμα. Διὰ τὴν ἐξέληθ' ὁ δηλητηριασμένος ἐκ τῆς λιθαργίας εἰς ἣν πολλάκις εὐρίσκεται μεταχειρίζονται ῥαπισμοὺς ἐπὶ τοῦ γυμνοῦ σώματος.

Ἐξίχνευσις. Ἡ ἀνακάλυψις τοῦ ὀπίου ἢ μᾶλλον τῆς μορφίνης εἶναι μὲν δύσκολος ὄχι ὅμως ἀδύνατος, ἐὰν ὑπάρχῃ εἰς ἀρκετὸν ποσόν. Αἱ ὕλαι ἐντὸς τῶν ὁποίων ὑπάρχει ὑποψία τῆς παρουσίας τοῦ ὀπίου δύνανται κατ' ἀρχὰς νὰ κατεργασθῶσι μετὰ ὀξικοῦ ὀξέος δι' ὕδατος κεκραμένου· τὸ ἀποτελούμενον ῥευστὸν δι' ὕλης διὰ χάρτου ἐξατμίζεται διὰ πύρου, καὶ ἀναμίγνυται μετὰ ταῦτα μετὰ κεκαυμένης μαγνησίας ἢ καθαροῦ τιτάνου· διὰ τούτων τῶν μέσων ἀποχωρίζεται ὅλον τὸ ποσὸν τῆς μορφίνης ἐκ τοῦ ὀξικοῦ διαλύματος. Τὸ διὰ τῆς τιτάνου ἀποτελούμενον καταβύθισμα, ἀφοῦ ἀποπλυθῇ δι' ἀρκούντος ψυχροῦ ὕδατος διαλύεται διὰ τοῦ οἴνοπνεύματος, δι' οὗ διαλύεται ἡ μορφίνη ἢ καὶ ἕκαστον ἄλλο ναρκωτικὸν ἀλκάλιον, ἂν ὑπάρχουν, καὶ δι' ἐξατμίσεως τοῦ διαλύματος καὶ κρυσταλλώσεως, ἀφοῦ ἐξουδετερωθῇ διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος δύναται νὰ γνωρισθῇ. Διὰ τὴν βεβαιωθῶν ἂν εἰς τὸ ἐξεταζόμενον ῥευστὸν ἐμπεριέχεται ναρκωτικὴ ὕλη, αἰεῖφουν τὰ βλέφαρα τινὸς ζώου συνήθως τῆς γαλλῆς, τῆς ὁποίας ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐκτείνεται καὶ ἂν ἐμπεριέχεται ὀλίγη ποσότης ναρκωτικῆς ὕλης· πρὸς ἀποφυγὴν πάτης ἐνδεχομένης ἀπάτης αἰεῖφεται ὁ εἰς μόνον ὀφθαλμὸς, διότι εὐκόλως δυνάμεθα νὰ τὸν παραβάλλωμεν· ἀφοῦ δὲ αἰεῖψωμεν τὸ ὅσον τὸ δυνατόν ἐξουδετερωθὲν ῥευστὸν ἐπὶ τοῦ ἄκρου τοῦ κάτω βλεφάρου, κλείομεν καὶ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ ζώου λεπτά τινα καὶ ἔπειτα παρατηροῦμεν ἂν ἡ κόρη τοῦ αἰειφθέντος ὀφθαλμοῦ φαίνεται μᾶλλον ἐκτεινομένη ἀπὸ τὴν τοῦ μὴ αἰειφθέντος. Πρὸς τελείαν βεβαίωσιν τῆς διὰ τοῦ ὀπίου δηλητηρίασεως ἀπαιτεῖται νὰ εὐρεθῇ ἐκτὸς τῆς ναρκωτικῆς ὕλης καὶ τὸ μηχανικὸν ὄξύ· ἡ παρουσία δὲ τούτου ἀποδεικνύεται, ἐὰν καταβυθισθῇ τὸ ῥευστὸν μετὰ ὀξικοῦ μολύβδου καὶ τὸ ἀποτελούμενον ἴζημα ἀποσυντεθῇ διὰ ὑδροθειωμένου ἀερίου, ἢ θεϊκοῦ ὀξέος κεκραμένου. Ἐὰν τὸ οὕτω ἀποχωρίζομενον ὄξύ διδῇ εἰς τὰ διαλύματα τῶν δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἀλάτων αἱματόχροον χρῶμα, τότε θεωρεῖται ἀποδεδειγμένη ἡ τοῦ μηχανικοῦ ὀξέος παρουσία.

Φλοριδίνη. *Phloridzin*.

Ἡ ὕλη αὕτη ἀνεκαλύφθη εἰς τὸν φλοιδὸν τῶν προσφάτων ῥιζῶν τῶν ἀπιῶν καὶ μηλεῶν. Πρὸς κατασκευὴν ταύτης ἐκχυλίζεται ὁ νεαρὸς φλοιδὸς

διὰ θερμοῦ ὕδατος, καὶ ἡ ἐκχυλίσαις αὕτη ἐπαναλαμβάνεται δις καὶ τρίς· ἐὰν τὰ διυλισθέντα καὶ ἀποψυχρανθέντα ἀφεψήματα ἀφεθῶσι καιρὸν τινα εἰς ἡσυχίαν, ἐναποτίθεται εἰς τὸν πυθμένα μέγα μέρος τῆς ὕλης ταύτης εἰς σχῆμα κρυστάλλων, οἵτινες ἀναδιαλυόμενοι εἰς ζέον ὕδωρ, εἰς τὸ ὁποῖον προστίθεται ζωάνθραξ, δύνανται νὰ καθαρισθῶσι καὶ νὰ ἀποκατασταθῶσι λευκοί. Κατ' ἄλλον τρόπον κατασκευάζεται, ἐὰν ἐκχυλισθῇ δι' οἰνοπνεύματος μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ ὁποῖου σχηματίζονται κρυστάλλοι ὑποκίτρινοι, διαλίσσιμοι τόσον εἰς τὸ ὀξικὸν ὥξυ καθὼς καὶ εἰς τὰ ἀλκάλια.

Ἐὰν ἡ ὕλη αὕτη διαλυθῇ εἰς θεϊκὸν ὥξυ κεκραμένον καὶ τὸ διάλυμα θερμανθῇ μέχρι 80°P, ἀποτίθεται, ἀποψυχαινομένου τοῦ διαλύματος, κρυσταλλώσιμος τις ὕλη ὀνομασθεῖσα *phloretin*· ἐὰν ἀκολούθως κατεργασθῇ διὰ νιτρικοῦ ὀξέος ἀποσυντίθεται τόσον τὸ ὥξυ, ὅσον καὶ ἡ *phloretin* καὶ σχηματίζεται ἰδιαιτέρον ὥξυ *acidum phloretinicum* καλούμενον. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἀμμωνίας ἐπὶ τῶν δύο τούτων ὑλῶν σχηματίζεται ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἐξυγόνου ὕλη τις διάφορος τῶν ἐκτεθεισῶν καλεσθεῖσα *phlorozein*.

Αλοῖνη ὀνομάζεται ἡ πικρά τῆς ἀλόης ὕλη.

Αρνικίνη Arnicin ἐκχυλίζεται ἐκ τῆς ῥίζης τῆς *Arnica montana*.

Ἀζαρίνη Asarin ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ *Asarum europaeum*.

Καθαρότινη ἢ *σερίνη* ἐκ τῶν φύλλων τῆς σένης *cassia senna*, *cytissus alpinus*, *Anargyris foetida*.

Αουρίνη Aurin. Ὑλη ἐξαχνομένη ἐκ τινος ξύλου *bois de sable* ὀνομαζομένου καὶ ἔχουσα σχῆμα χρυσιζόντων καὶ ἐρυθρῶν κρυστάλλων.

Κολοκυνθίνη Colocynthin ἐνεργητικὴ καὶ πικρά οὐσία τῶν κολοκυνθίων.

Μυρτίδανον Cubebin ὀνομάζεται ἡ ῥητινώδης καὶ κρυσταλλώσιμος ὕλη τῶν μυρτιδάνων *Piper cubeba*.

Διοσμίνη Diosmin ἡ πικρά ὕλη τῶν φύλλων τοῦ *Diosma crenata*.

Ἐργοτίνη Ergotin καλεῖται ἡ ἐνεργητικὴ ὕλη τῆς βρώμης ἐρυσσιβώδους *Secale cornutum*.

Φηγίνη Fagin καλεῖται ἡ ναρκωτικὴ ὕλη εἰς τοὺς σπόρους τοῦ *Fagus sylvatica*, ἥτις δύναται νὰ ἐκχυλισθῇ δι' οἰνοπνεύματος ἐκ τῶν σπόρων τοῦ φυτοῦ τούτου ἀφοῦ ἐκθλιφθῇ τὸ ἔλαιον.

Ίλικίνη Ilicin ἡ πικρά οὐσία τοῦ *Ilex equifolium*.

Λυκισκίνη Lupulin ἰδιαιτέρα πικρά ὕλη τῶν στροβύλων τοῦ λυκίσκου *Humulus Lupulus*.

Μενιαρθήνη Menyanthin ἐξάγεται ἐκ τῶν φύλλων τοῦ *Menyanthes trifoliata*.

Μουνδαρίνη Mundarin ἡ πικρά οὐσία τῆς ῥίζης τοῦ *Colothropis Mudari*.

Πολυγαλίνη Polygalin ἐξάγεται ἐκ τῆς πόας τῆς πολυγάλου *Polygala amara*.

Ῥαμρίνη Rhamnin ὀνομάζεται ἡ πικρά ὕλη ἐκ τοῦ φλοιοῦ *Rhamnus frangula*.

Σκορδίνη Scordün ὕλη τις ἐκ τοῦ *scordum*.

Σκουτελαρίνη Scutellarin ἰδιαιτέρα ὕλη ἀνακλυθρεῖσα εἰς τὰ φύλλα τοῦ *Scutellaria latifolia*.

Ῥοφιδίνη Serpentin ἐκχυλίζεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ ὀφίου *Aristolochia serpentaria*.

Ῥαρήνη Rhabarbarin ἡ ἐκ τῆς ῥίζης ῥᾶς *radix rhei* ἰδιαιτέρα ὕλη.

Σκυλλίνη Scillitine ἡ κρυσταλλώσιμος ὕλη ἐκ τοῦ βολβοῦ τῆς σκύλης.

Γεντιανίνη Gentianin ἡ πικρά ὕλη ἐκ τῆς ῥίζης τῆς γεντιάνης.

Βερβερίνη Berberin κρυσταλλώσιμος ὕλη ἐκ τῆς ῥίζης *Berberis vulgaris*.

Ἀνθιαρίνη Anthiarin λέγεται κρυσταλλώσιμός τις ὕλη εἰς τὸ δηλητήριον τὸ *anthiar* καλούμενον.

Ἀρτανιτίνη Arthanitin ἢ *Cyclamin* εἰς λευκὰς ἀγκίδας κρυσταλλώσιμος ὕλη εἰς τὸ *Cyclamen europaeum*.

Πορτογαλλίνη Aurantün ἢ *Hesperidin* ἐξάγεται ἐκ τοῦ λευκοῦ σαρκώδους μέρους τῶν πορτογαλλίων κίτρων καὶ λεμονίων.

Κετραρίνη Cetrarin λέγεται ἡ καθαρὰ πικρά οὐσία ἐκ τοῦ λειχήνος τοῦ ἰσλανδικῷ *Cetraria islandica*.

Κολουμβίνη Columbin ἐὰν ἡ λειοτριβηθεῖσα ῥίζα τοῦ *colombo* κατεργασθῇ δι' αἰθέρος, κρυσταλλοῦται ἡ ὕλη αὕτη ἐκ τοῦ θάμματος εἰς εἶδος διαφανῶν ῥομβοειδῶν πρισμάτων.

Κορνίνη Cornin ὕλη ἐκχυρόμενη ἐκ τοῦ φλοιοῦ τοῦ *Cornus florida*.

Γουσπαρίνη Cusparin ἐκ τοῦ ψευδοῦς φλοιοῦ τοῦ *Cusparia febrifuga*.

Δατισκίνη Datiscin ἐκ τοῦ *Datisca cannabina*.

Ἐλατηρίνη Elaterin κρυσταλλοῦται ἐκ τοῦ ἐκθλιβομένου ὀποῦ τοῦ *Momordica elaterium*.

Εὐωνυμίνη Evonymin· κρυσταλλώσιμος ὕλη ἐκ τοῦ λιπαροῦ ἐλαίου τῶν κόκκων τοῦ *Evonymus europaeus*.

Φραξιρίνη Fraxinin· ἐκ τοῦ φλοιοῦ *Fraxinus excelsa*.

Ἱμπερατορίνη Imperatorin· ἐν αἱ λειοτριβηθεῖσαι ῥίζαι τοῦ *Imperatorium ostruthium* κατεργασθῶσι διὰ θειικοῦ αἰθέρος καὶ ἐκ τοῦ βάμματος τούτου ὁ αἰθὴρ ἀποσταχθῇ, κρυσταλλοῦται ἐκ τοῦ ἐπιμένοντος ῥευστοῦ ἢ ῥηθεῖσα ὕλη.

Δαφνίνη Daphnin· οἱ καρποὶ τοῦ *Laurus nobilis* ἐκχυλίζονται διὰ ζέοντος οἰνοπνεύματος καὶ ἐκ τοῦ θερμοῦ βάμματος σχηματίζονται ὀκτάεδρα, τὰ ὅποια εἶναι ἡ ῥηθεῖσα ὕλη.

Λιριοδενδρίνη Liriodendrin· ἐκχυλίζεται δι' οἰνοπνεύματος ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥίζης τοῦ *Liriodendron tulpifera*.

Μηκωνίνη Myconin· ἐκχυλισματικὴ ὕλη ἀπαντωμένη εἰς τὰ χειρότερα εἶδη τοῦ ὀπίου τῆς Σμύρνης· ἐν ἡ ὕλη αὕτη κατεργασθῇ διὰ νιτρικοῦ ὀξέος ἀκράτου, διαλύεται μὲ ὠραῖον κίτρινον χρῶμα· μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ διαλύματος ἐπιμένουσιν ἐλαιώδεις σταγόνες, αἵτινες πηγνύμεναι σχηματίζουν κιτρίνους κρυστάλλους ἀνήκοντας εἰς ἰδιαιτέρον ὀξύ καλούμενον *νιτρομηκωνικὸν ὄξύ*. Ἐν ἡ μηχανίνη ἐκτεθῇ εἰς τὴν τοῦ χλωρίου ἐπιρροήν, λαμβάνει ἐρυθροῦν χρῶμα, ἐὰν δὲ διαλυθῇ εἰς οἰνόπνευμα, ἀποθέτει δι' αὐτομάτου ἐξατμίσεως μικροὺς κρυστάλλους ἰδιαιτέρου ὀξέος καλουμένου *acide mechloique*.

Μελαμπυρίνη Melampyrin λέγεται ἡ κρυσταλλώσιμος ὕλη ἐκ τῆς πόας *Melampyrum nemorosum*.

Ὀλιβίλη Olivil· ἐν ἡ ῥητίνη, ἥτις ἐκρέει ἐκ τῶν ἐλαιῶν, διαλυθῇ εἰς οἰνόπνευμα καὶ τὸ βάμμα τοῦτο ἀφεθῇ ἡσυχῶς, σχηματίζονται κρύσταλλοι.

Πευκεδαρίνη Peucedanin ἐξάγεται ἐκ τῆς ῥίζης *Peucedanum officinale* δι' οἰνοπνεύματος.

Φιλυρίνη Philyrin· ἐκχυλίζεται διὰ τῆς δι' ὕδατος ἐκζέσεως ἐκ τοῦ φλοιοῦ *Philyraea media* καὶ *latifolia*.

Πικρολειχηρίνη Picrolichenin· ἡ ὕλη αὕτη ἀνεκαλύφθη εἰς λειχήνᾶτινα *variolaria amara* καλούμενον καὶ διακρινόμενον ἐκ τῆς ἰδιαιτέρας πικρᾶς γεύσεως.

Πολύχρουν ἢ *στρεψίχρουν Polychrom*· διάφορα φυτὰ ἐκχυλισθέντα δι' ὕδατος θερμοῦ παρέχουσι βάμμα τὸ ὁποῖον φαίνεται ἐνίοτε ἰώδες, ἄλλοτε κυανοῦν κατὰ τὴν τοῦ φωτὸς θλάσιν. Τὸ φαινόμενον τοῦτο προέρχεται ἀπὸ τὸ πολύχρουν, ἥτις εἶναι ἰδιαιτέρα ὕλη καὶ εἰς μεγάλην ποσότητα εἰς

τὸν φλοιὸν τοῦ *Aesculus hypocastanum* ἐμπεριεχομένη. Ὑπάρχουν διάφοροι τρόποι πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ πολυχρόου μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀναφέρομεν τὸν ἐξῆς ὡς καλλήτερον. Ὁ λαιοτριβηθεὶς φλοιὸς ἐκχυλίζεται δι' οἶνοπνεύματος, καὶ ἀφοῦ ἐκ τοῦ βάμματος τούτου ἀποσταχθῇ κατὰ μέγα μέρος τὸ οἶνόπνευμα, ἀφίεται τὸ ὑπόλειμμα ἐβδομάδας τινὰς ἡσύχως· εἰς τὸ διάστημα τοῦτο ἀποχωρίζεται ἡ τοῦ φλοιοῦ ἰδιαιτέρα ὕλη ἡ *Aesculin* ἢ *Polychrom* ἢ *Enallochrom*, ἥτις διαλύεται ἐκ νέου εἰς μίγμα ἐξ αἰθέρος καὶ 5 μερῶν οἶνοπνεύματος· ἀποψυχαινομένου τοῦ διαλύματος ἀποχωρίζεται τὸ πολύχρουν.

Τὸ καθαρὸν στρεψίχρουν σχηματίζει λευκὴν καὶ λεπτὴν κόκκιν, εἶναι ὀλίγον διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ τὸ διάλυμα ἀνεπαισθήτως στρεψίχροεῖ μετὰ κυανοῦ χρώματος, δυνατώτερα δὲ ἐὰν τὸ διάλυμα συμμιχθῇ μετὰ κοινοῦ ὕδατος· ἐν μέρος τοῦ πολυχρόου διαλυόμενον εἰς 1,000,000 ὕδατος μεταδίδει εἰς αὐτὸ τὸ ἰδίωμα τοῦ στρεψίχρου· τὸ διάλυμα ἀποβάλλει τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦτο, ἐὰν ἀναμιχθῇ μετὰ τινων σταλαγμῶν θειικοῦ, φωσφορικοῦ ἢ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, τὸ ἐπαναλαμβάνει δὲ διὰ τῆς προσθήκης τῶν ἀλκαλίων ἢ τῶν διαλύσεων τῆς θειεῖας τιτάνου κ. τ. λ. καὶ ἐν γένει τὰ ἀλκάλια ἐπαυξάνουσιν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦτο.

Λευκίνη Populin· ἐξάγεται ἐκ τοῦ φλοιοῦ τινῶν εἰδῶν λευκῆς *Populus tremula, graeca, alba*. Ἡ ὕλη αὕτη ἀποχωρίζεται, ἐὰν τὸ ἀφέψημα καταβυθισθῇ δι' ὀξικοῦ μολύβδου· ἐκ τοῦ διῦλισθέντος ῥευστοῦ ἐξατμισθέντος μέχρι συστάσεως σερapiοῦ ἐναποτίθεται ἡ λευκίνη εἰς εἶδος κρυστάλλων· εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ θερμαινομένη παρέχει ἐκτὸς τῶν συνήθων προϊόντων τῆς ἀποσυνθέσεως καὶ θενζοϊκὸν ὀξύ. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου ἀποσυντίθεται καὶ σχηματίζει ἐρυθρὰν ῥητίνην, ἥτις καλεῖται *Rutilin* ῥουτιλίνη καὶ ἡ ὕλη αὕτη προάγεται ἐκ τῆς ἰτείνης διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος.

Πριμουλίνη Primulin ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ *Primula veris*.

Ἄβροταρλη Santonin εἰς τοὺς σπόρους καὶ τὰ ἄνθη τοῦ ἄβροτάνου τοῦ ἄρρενος *sem cynae*. Πρὸς ἐξαγωγὴν τῆς ὕλης ταύτης ἀναμιγνύονται 4 μέρη λαιοτριβηθέντων σπόρων μὲ 1½ λόθιον τιτάνου, καὶ μετὰ ταῦτα μὲ 16 — 20 μέρη οἶνοπνεύματος. Τὰ βάμματα ταῦτα διῦλισθέντα ἐξατμίζονται ἕως νὰ μείνουν τὰ ἡμισυ καὶ ἀφοῦ ὑπερκορεσθῇ μὲ ὀξικὸν ὀξύ τίθεται τὸ μίγμα εἰς ἡσυχίαν καὶ μετὰ παρέλευσιν τινῶν ἡμερῶν ἀποτίθενται πτερωτοὶ κρύσταλλοι. Διὰ τῆς ἀναδιαλύσεως τῶν κρυστάλλων τούτων εἰς οἶνόπνευμα ἐμπεριέχον ζωάνθρακα καθαρίζονται ἐντελῶς. Ἡ ἄβροτο-

νίνη κρυσταλλοῦται εἰς ἐξάγωνα πρίσματα, εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος εἰς τὰ ὀξέα χωρὶς νὰ τὰ οὐδετερόνη καθὼς καὶ εἰς τὰ ἀλκάλια, ἐξ ὧν ἀπολαμβάνονται ἰδιαιτέραι ἐνώσεις· οὕτως ἐνοῦται μετὰ τῆς τιτάνου, τῆς βαρείας, τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου καὶ ἄλλων τινῶν βάσεων.

Οἱ κρύσταλλοι τῆς ἀβροτανίνης εἶναι σχεδὸν λευκοὶ, κίτρινίζουσιν δὲ εἰς τὸν ἥλιον τόσον εἰς ἀερόκενον τόπον, ὅσον καὶ ὑπὸ τὸ ὕδωρ, ἔλαιον ἢ αἰθέρα. Παράδοξον εἶναι ὅτι οἱ κρύσταλλοι ἐνῶ κίτρινίζουσιν διαρρήγνυνται εἰς μικροτέρους κρυστάλλους, πολλάκις μακρὰ διασπειρομένους. Ἐπειδὴ ὁμοῦ μὲ τὴν τοῦ χρώματος μεταβολὴν γίνεται καὶ μεταβολὴ τινῶν χαρακτῆρων τῆς ὕλης ταύτης, φαίνεται ὅτι ὁ χρωματισμὸς οὗτος εἶναι συνέπεια ἀποσυνθέσεως ἢ τοῦλάχιστον ἀλλοιώσεως τῶν στοιχείων.

Σαπωνίνη Saponin· ἐν ἡ λειοτριβηθεῖσα ῥίζα τοῦ *Saponaria officinalis* καὶ *Gypsophila ostruthium* κατεργασθῇ δι' οἶνοπνεύματος καὶ ἐξατμισθῇ τὸ βάμμα, ἀπολαμβάνεται ἡ ἰδιαιτέρα αὕτη ὕλη. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀλκαλίων ἐπὶ τῆς ῥηθείσης ὕλης σχηματίζεται ἰδιαιτέρον ὀξύ καλούμενον σαπωνιακὸν ὀξύ.

Σερεγίνη Senegin· ἐξάγεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ *polygala senega* διὰ τῆς δι' ὕδατος ἐκχυλίσεως καὶ καταβυθίσεως τοῦ ἐγχύματος δι' ὀξικοῦ μολύβδου. Εἰς τὰ ἀλκάλια δεικνύει ὀξέα χαρακτηριστικά.

Σμιλακίνη Smilacin *Pariglin*, *Salsaparin*· ἀπαντᾶται εἰς τὴν ῥίζαν τοῦ *smilax sarsaparilla* καὶ εἰς τὸν φλοιὸν τοῦ *china nova*· ἐξάγεται ἐὰν τὸ δι' οἶνοπνεύματος βάμμα τῆς ῥηθείσης ῥίζης ἐξατμισθῇ μέχρι κρυσταλλώσεως.

Σολανίνη Solanin· ἡ ὕλη αὕτη ἀνακαλυφθεῖσα τὸ 1821 ἔτος ὑπὸ τοῦ *Desfosses* εὐρίσκεται εἰς τοὺς καρποὺς τοῦ μέλανος στρυχνίου *Solanum nigrum* καὶ τοὺς κλόνους τοῦ γλυκυπίκρου *Solanum dulcamara*.

Σπαρτίνη Spartiin ἰδιαιτέρα κρυσταλλώσιμος ὕλη ὁμοία τῆς ἱπείνης *salicin* ἐκ τοῦ *Spartium monospermum*.

Σουριναμίνη Surinamin ἐξάγεται διὰ τῆς κατεργάσεως δι' οἶνοπνεύματος τοῦ φλοιοῦ *geoffroya surinamensis*.

Τανγινίνη Tanghinin ἐκ τῶν κόκκων τοῦ *Tanghinia madagascariensis*· ἐὰν οἱ λειοτριβηθέντες κόκκοι κατεργασθῶσι δι' οἶνοπνεύματος καὶ τὸ βάμμα τοῦτο ἐκτεθῇ εἰς αὐτόματον ἐξάτμισιν, κρυσταλλοῦνται ἀγγίδες.

Βαριολανίνη Variolarin ἐκ τοῦ λειχήνος *variolaria dealbata*, *lichen dealbatus*.

Περὶ τῶν λιπαρῶν ἐλαίων.

Τὰ λιπαρὰ ἔλαια εὐρίσκονται εἰς τὰ σπέρματα πολλῶν φυτῶν καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς τὰς κοτυληθόνας αὐτῶν, αἱ ἐλαῖαι ὅμως ἐμπεριέχουσι τὸ ἔλαιον εἰς τὸ περιβάλλον τὸν πηρῆνα σαρκώδες μέρος. Ἀπὸ ὅλας τὰς φυτικὰς οἰκογενεῖας ἡ τῶν σταυροφόρων εἶναι ἐκείνη, τῆς ὁποίας τὰ πλείοτερα φυτὰ ἐμπεριέχουσιν ἔλαιον, μετ' αὐτὴν δὲ αἱ τῶν *Drupaceae*, *Amentaceae*, *Solaneae*.

Ἀπὸ τὰ ἔλαια ἄλλα εἶναι ῥευστὰ καὶ ἄλλα στερεά· τὰ τελευτηκία καλοῦνται καὶ στερεὰ ἢ βούτυρον τῶν φυτῶν· τὰ περισσότερα λιπαρὰ ἔλαια κατασκευάζονται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον· τὰ θλασθέντα σπέρματα ἐγκλείονται εἰς λινὸν σάκκον καὶ ἐκθλίβονται διὰ πιεστηρίου. Πρὸς ἀπολαυτὴν μεγαλητέρας ποσότητος ἐλαίου, θερμαίνονται τὰ τεθλασμένα σπέρματα μέχρι τῆς θερμοκρασίας τοῦ ζέοντος ὕδατος, ἀκολούθως δὲ συνθλίβονται μετὰ τῶν πλακῶν τοῦ πιεστηρίου θερμαινόμενων καὶ αὐτῶν. Διὰ τῆς θερμότητος ἀποκαθίσταται τὸ ἔλαιον ῥευστότερον, τὸ λεύκωμα τῶν σπερμάτων πήγνυται, τὰ δὲ βλεννώδη μέρη ξηραίνονται τόσον, ὥστε τὸ ἔλαιον ἀποχωρίζεται εὐκολώτερον ἐξ αὐτῶν· δύναται ὡσαύτως νὰ χωρισθῇ τὸ ἔλαιον, ἐὰν τὰ τεθλασμένα σπέρματα βρασθῶσι με ὕδωρ.

Ἡ εἰς τὰ σπέρματα τῶν διαφόρων φυτῶν ἐμπεριεχομένη ποσότης τοῦ ἐλαίου εἶναι διάφορος· τὰ σπέρματα π. χ. τῶν καρύων καὶ τῆς *Bertholetia excelsa* ἐμπεριέχουν τὸ ἥμισυ τοῦ βάρους των ἔλαιον· τὰ σπέρματα τῆς *brassica campestris* καὶ *oleracea* τὸ $\frac{1}{3}$, τὰ τῆς καννάβεως $\frac{1}{4}$ καὶ τὰ τοῦ λίνου $\frac{1}{5}$ ὡς ἔγγιστα.

Τὰ νεαρὰ ἔλαια εἶναι πάντοτε σχεδὸν θολὰ, καθαρίζονται δὲ εἰς ὀλίγας ἡμέρας ἀφινόμενα εἰς ἡσυχίαν.

Γενικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ῥευστῶν ἐλαίων.

Τὰ ῥευστὰ λιπαρὰ ἔλαια εἶναι γλίσχρα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐλαφρότερα τοῦ ὕδατος καὶ ἐπ' αὐτοῦ ἐπιπλέουν, ἡ εἰδικὴ βαρύτης των εἶναι 0,918, — 0,936. Διαπερνοῦν τὸν ἀέρα, τὸν ἀποκαθιστῶσι διαφανῇ καὶ ἀφίνουν ἐπ' αὐτοῦ σπῖλωμα· πολὺν καιρὸν ἐθεωροῦντο τὰ λιπαρὰ ἔλαια ὡς ὁμογενεῖς οὐσίαι, ἀλλ' οἱ *K. K. Braconnot* καὶ *Chevreul* ἀπέδειξαν ὅτι σύγκεινται ἐκ διαφόρων ὑλῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πλέον δύστηκτος πήγνυται εἰς ὀλίγην θερμοκρασίαν, ὅθεν δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἐκ τῆς ῥευστο-

τέρας διὰ μεταγγίσεως ἢ διϋλίσεως. Ἡ στερεὰ καὶ στεατώδης μάζα ἡ ἀποχωριζόμενη ἐκ τῶν λιπαρῶν ἐλαίων διὰ τοῦ ψύχους καὶ καταπίπτουσα εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἀγγείου λέγεται *στεατίνη ὕλη* ἢ *στέαρ stearine*, ἡ δὲ μένουσα ρευστὴ εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν καλεῖται *ἐλαιώδης ὕλη eleine*.

Ἡ στεατώδης ὕλη εὐρίσκεται ὅχι μόνον εἰς τὰ ρευστὰ ἔλαια, ἀλλὰ μάλιστα καὶ εἰς τὸ στέαρ, εἰς τὸ βούτυρον καὶ ἐν γένει εἰς ὅλα τὰ στερεὰ ἔλαια τῶν φυτῶν· δύναται δὲ νὰ ἀποχωρισθῇ ἐκ τῶν ρευστῶν ἐλαίων, ἐὰν αὐτὰ ἐκτεθῶσιν εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ψύχους· ἡ ἀποχωρισθεῖσα στερεὰ ὕλη συνθλιβομένη εἰς ἐμπορικὸν χάρτην μεταλλαττόμενον, ἀφοῦ παύσῃ νὰ σπιλῶνῃ αὐτὸν παρέχει τὴν λεγομένην στεατῶδη ὕλην τῆς ὁποίας τὰ χαρακτηριστικὰ θέλομεν περιγράψαι εἰς τὸ περὶ στεατίνου ὁξέος καὶ κατασκευῆς τοῦ σάπωνος κεφάλαιον.

Ἡ ἐλαιώδης ὕλη εὐρίσκεται εἰς μεγαλύτεραν ποσότητα εἰς τὰ ρευστὰ ἔλαια παρὰ εἰς τὰ στερεὰ καὶ ζωτικὰ στέατα· ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἀποψύξεως ἐλαίου τινὸς ρευστοῦ μέχρι τῆς 5°, καθότι τότε ἀποχωρίζεται κατὰ μέγα μέρος ἡ στεατώδης ὕλη, ἐπιμένει δὲ τὸ ἐλαιώδες μέρος, τὸ ὅποιον μεταγγιζόμενον ἀποψυχραίνεται πάλιν διὰ νὰ ἀποχωρισθῇ ὅλον τὸ ποσὸν τῆς στεατώδους ὕλης.

Ἡ στεατώδης ὕλη ἀποχωρίζεται καὶ ἂν τὰ λιπαρὰ ἔλαια διαλυθῶσιν εἰς ζέον λειψυδρον οἰνόπνευμα· ἐν τῷ διάλυμα τοῦτο ἀποψυχρανθῇ ἀποτίθεται ἡ στεατώδης ὕλη, τὸ δὲ ἐπιμένον ρευστὸν ἐὰν ἀναμιχθῇ μὲ ὕδωρ καὶ ἐξατμισθῇ ἀποθέτει τὴν ἐλαιώδη ὕλην εἰς καθαρὰν κατάρσασιν. Ἡ ἐλαιώδης ὕλη δύναται νὰ κατασκευασθῇ, ἐὰν ἔλαιον λιπαρὸν, νεαρὸν καὶ εἰς ψῦχος ἐκθλιφθὲν ἀναμιχθῇ μὲ τὸ ἥμισυ ἀπὸ τὸ πρὸς σχηματισμὸν τοῦ σάπωνος ἀπαιτούμενον καυσικὸν νάτρον οὕτω μεταβάλλεται πρότερον ἢ στεατίνη ὕλη καὶ μικρὸν μέρος μόνον τῆς ἐλαιώδους εἰς σάπωνα, τὸ δὲ πλεῖστον μέρος αὐτῆς ὑπολείπεται εἰς καθαρὰν κατάρσασιν.

Τὰ λιπαρὰ ἔλαια δύναται νὰ διατηρηθῶσιν εἰς κλεισμένα ἀγγεῖα πολὺν καιρὸν διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος τινὰ μὲν γίνονται πυκνότερα καὶ καλύπτονται μὲ λεπίδα, τινὰ δὲ ξηραίνονται ὅλως διόλου καθὼς π. χ. τὸ ἔλαιον τοῦ λίνου, τῆς καννάβεως, τῶν καρύων κ. τ. λ. ἄλλα τέλος μένουσιν ἰξώδη, ἢ πιμελώδη καὶ συγχρόνως σχηματίζεται εἰς αὐτὰ ἰδιαιτερον ὀξύ καὶ λαμβάνουσιν ὁσμὴν πολὺ ταγγίζουσαν· τοιαῦτα εἶναι τὸ ἔλαιον τῶν ἀμυγδάλων, τῶν ἐλαίων κ. τ. λ. Ἔνεκα τούτου διαιροῦνται τὰ ρευστὰ ἔλαια εἰς δύο τάξεις εἰς ἔλαια ξηραίνόμενα, καὶ εἰς ἔλαια γλίσχρα ἢ μὴ ξηραίνόμενα· τὰ λιπαρὰ ἔλαια καὶ μάλιστα τὰ ξηραίνόμενα ἀπορρο-

φῶσι κατ' ἀρχὰς ὀλίγην ποσότητα ὀξυγόνου ἐκ τοῦ αἵρος, ἔπειτα δὲ εξαί-
φνης εἰς ὀλίγον διάστημα μεγάλην ποσότητα.

Κατὰ τὰς δοκιμὰς τοῦ K. Saussure στίβας ἐλαίου τριῶν γραμμῶν
πάχος καὶ τριῶν δακτύλων διάμετρον ἔχουσα ἀπερρόφησεν ὑπὸ κώδωνα
πλήρη ὀξυγόνου διὰ ὑδραργύρου κλεισμένον πρῶτον μὲν εἰς διάστημα
τριῶν μηνῶν τριπλάσιον τοῦ ὅγκου τοῦ ὀξυγόνου, ἔπειτα δὲ εἰς δέκα ἡμέ-
ρας τὸ ἐξήκονταπλάσιον, ὥς τὸ ἐλαίον εἶχεν ἀπορρόφησει εἰς διάστημα
δέκα λεπτῶν 145 ὅγκους ὀξυγόνου, οὕτω ἐσχηματίσθη ὕδωρ καὶ ἀνθρακι-
κὸν ὀξύ καὶ τὸ ἐλαίον ἐμεταβλήθη εἰς πηκτώδη μάζαν, ἥτις δὲν ἄφινε
πλέον σπιλώματα εἰς τὸν χάρτην· ἐὰν λοιπὸν ἔριον ἢ βύσσος ἀλείφονται
μὲ τὸ ξηραίνόμενον ἐλαίον τοῦ λίνου, καὶ ἐὰν σωρεύονται εἰς μεγά-
λην ποσότητα, δύναται νὰ συμβῇ διὰ τῆς ταχείας ἀπορρόφησης τοῦ ὀξυ-
γόνου μεγάλη αὔξησης τῆς θερμοκρασίας, καὶ ἐπομένως νὰ γίνη ἀνάφλεξις.
Οὕτως ἐξηγοῦνται αἱ ἀνευ αἰτίας συμβαίνουσαι πυρκαϊαὶ εἰς τὰ ἐριουργεῖα·
διὰ τοῦτο εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ἡ βύσσος δὲν ἀλείφεται πλέον μὲ
λινέλαιον ἀλλὰ μὲ τὸ μὴ ξηραίνόμενον καινὸν ἐλαίον, καὶ ἡ ἀλείφομένη βύσ-
σος δὲν σωρεύεται πλέον εἰς τόσην μεγάλην ποσότητα καθὼς ἐγίνετο
προλαβόντως καὶ ἐπομένως δὲν συμβαίνουν πλέον πυρκαϊαί.

Τὰ λιπαρὰ ἐλαία δὲν εἶναι πτητικὰ καὶ διὰ τοῦτο δὲν δύνανται νὰ
ἀποσταλαχθῶσι. Ἐὰν τὰ ἐλαία θερμαίνωνται εἰς νερατίνην μέχρι ἀναξέ-
σεως, ἕως νὰ φθάσωσιν δηλαδὴ εἰς 251 — 260°P, τότε αἱ πτητικαὶ ὕλαι
αἱ συναζόμεναι εἰς τὸ δοχεῖον εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ
ἐλαίου· διότι εἰς αὐτὸ σχηματίζεται ὕδωρ, ὀξικὸν ὀξύ, στεατικὸν καὶ
ἐλαιῶδες ὀξύ, ὕδρογονὸν ἀνθρακοῦχον ἀέριον, ἀνθρακικὸν ἀέριον, ἐλαιογό-
νον ἀέριον καὶ ἐλαίον τι πτητικὸν πολὺ καύσιμον. Ἡ ἀποσύνθεσις αὕτη
ἀποτελεῖται ἐντελεστέρα, ὅταν τὸ ἐλαίον ἀναμιγνυόμενον μὲ πυρώδη σώ-
ματα, ὡς μὲ ἄμμον ἢ μὲ τεθλασμένας κεραμίδας, ἀποστάζεται.

Τὸ ἐκ τῶν λιπαρῶν ἐλαίων ἀποτελούμενον ῥευστὸν εἶναι πολὺ δυσώδες
καὶ ἐμπυρευματικὸν τὴν ὁσμὴν, καὶ εἶναι γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα oleum
philosophorum ἐλαίον τῶν φιλοσόφων.

Ἐὰν τὸ λιπαρὸν ἐλαίον σταλάζεται ἐπὶ διαπύρου σιδηροῦ ἐλάσματος
εἰς κλεισμένην συσκευὴν, μεταβάλλεται κατὰ μέγα μέρος εἰς δι-
τοῦδρογονο-ἀνθρακοῦχον ἀέριον τὸ ὁποῖον μεταχειρίζεται εἰς τὸν ἀε-
ροφωτισμὸν. σώματά τινα ἀπλᾶ καὶ καύσιμα διαλύονται εἰς τὰ λιπαρὰ
ἐλαία· τὸ θεῖον π. χ. διαλύεται εἰς 4 μέρη ζέοντος ἐλαίου δίδον εἰς αὐτὸ
πηκτὴν καὶ ἰξώδη σύστασιν καὶ βαθύφαιον χρῶμα· ἡ μάζα αὕτη, ἐὰν κα-

τασκευασθῇ με ζέον λινέλαιον καλεῖται βάλσαμον θειικόν *balsamum sulphuris* ἢ *corpus pro balsamo sulphuris*.

Τὸ διάλυμα τούτου τοῦ ἐνθείου λινελαίου εἰς ἔλαιον ἀνίσου ἐπονομάζεται *Balsamum sulphuris anisatum* ἐπωτερικῶς μεταχειριζόμενον, καὶ τὸ εἰς τερμίνθινον ἔλαιον διάλυμα *Bals sulphuris terebinthinatum*, χρησιμεύει εἰς τὴν κτηνοῦατρικὴν.

Ἐὰν διαλυθῇ ὀλίγον θεῖον εἰς ἔλαιον λιπαρὸν καὶ θερμὸν καὶ ἀποψυχρανθῇ, πηγνυται ἐν μέρει τὸ θεῖον εἰς κρυστάλλους ὀκταέδρους· τὰ λιπαρὰ ἔλαια ὡς τῶν ἀμυγδάλων, τῶν ἐλαιῶν καὶ τοῦ μήκωνος διαλύουσι εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν 2,8 καὶ εἰς θερμοκρασίαν τοῦ ζέοντος ὕδατος 4 τοῖς 0/0 φωσφόρου. Τοιαῦτα φώσφορον ἐμπεριέχοντα ἔλαια ἔχουν τὴν ὁσμὴν τοῦ φωσφόρου καὶ φωτοβολοῦσιν εἰς σκοτεινὸν μέρος. Τὸ σελήνιον διαλύεται ὀλίγον εἰς τὰ λιπαρὰ ἔλαια μεταδίδον εἰς αὐτὰ ἐρυθρῶδες χρῶμα, τὸ ἰσθὺς καθὼς καὶ τὸ χλώριον διαλύονται εἰς τὰ λιπαρὰ ἔλαια, καὶ διὰ τῆς διαλύσεως ταύτης σχηματίζεται ὑδριωδικὸν καὶ ὑδροχλωρικὸν ὄξύ.

Τινὰ τῶν ἰσχυροτέρων ὀξέων ἀποσυνθέτουσι τὰ λιπαρὰ ἔλαια. Τὸ ἄκρατον θειικόν ὄξύ εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν ἀναμιγνυόμενον κατ' ὀλίγον με λιπαρὸν ἔλαιον σχηματίζει φαιὸν καὶ πυκνὸν ὑγρὸν, πρὸ τίνος καιροῦ ὀξυνὸς σάπων ὀνομαζόμενον, τὸ ὁποῖον ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ ὕδατος, εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἐνοῦται τὸ ὕδωρ με τὸ θειικόν ὄξύ καὶ ἀποχωρίζεται τὸ ἔλαιον εἰς ἀλλοιωμένην κατάστασιν.

Ἐὰν ὅμως τὸ θειικόν ὄξύ θερμανθῇ με τὰ λιπαρὰ ἔλαια, ἀποτελεῖται ἀμοιβαία ἀποσύνθεσις, ἀναπτύσσεται δηλαδὴ θειῶδες καὶ ἀνθρακικὸν ἀέριον, ἡ δὲ μάζα ἀνθρακοῦται ἔπειτα καὶ συγχρόνως σχηματίζεται τεχνητὴ βυρσοδεψικὴ ὕλη· ἐὰν τὰ λιπαρὰ ἔλαια ἐνωθῶν με ὀλίγον νιτρικόν ὄξύ κεκραμένον καὶ θερμανθῶν, μεταβάλλονται εἰς μάζαν ῥητινώδη καὶ ἀνθρακώδη, εἰς στεατικόν, ὀξυλικὸν καὶ ὀξικόν ὄξύ κ. τ. λ.

Αἱ ἀλκαλοεῖδεῖς βάσεις τῶν ἀλάτων καὶ τινὰ ὀξειδωμένα μέταλλα ἀποσυνθέτουσι τὰ λιπαρὰ ἔλαια καθὼς καὶ τὰ ὀξέα καὶ σχηματίζουν στεατίνων καὶ ἐλαιῶδες ὄξύ, καὶ ἐλαιοζάχαριν καὶ τὰ προαχθέντα ὀξέα ἠνωμένα με τὰ ἀλκάλια σχηματίζουν σάπωνας περὶ τῶν ὁποίων θέλομεν ὁμιλήσῃ μετὰ ταῦτα.

Ἐὰν τὰ λιπαρὰ ἔλαια ἀναμιχθῶν με ῥευστὴν ἀμμωνίαν σχηματίζουν τὸ δι' ἀμμωνίας ἀλειμμα *Linimentum volatile* ἐκ τοῦ νεαρῶς κατασκευασθέντος ὑγροῦ δύναται γὰρ χωρισθῇ τὸ ἔλαιον ἀμετάβλητον, μετὰ

τινα ὁμως καιρὸν ἀποσυντίθενται τὰ ἔλαια διὰ τῆς ἀμυωνίας καθὼς καὶ τὰ στερεὰ ἀλκάλια.

Τὰς πλείον ἀκριβεῖς ἐξετάσεις περὶ τῆς συνθέσεως λιπαρῶν τινων ἐλαίων ὀφείλομεν εἰς τοὺς K. K. Gay Lussac, Thenard καὶ Saussure, διὰ τῶν δοκιμῶν των ἐλάβαμεν τὰ ἐφεξῆς ἀποτελέσματα.

	ἄνθραξ	ὕδρογόνον	ὀξυγόνον
ἔλαιον τοῦ λίνου	66,01	— 11,53	— 12,64
» τῶν καρῶν	79,77	— 10,57	— 9,12
» κίκινον	74,18	— 11,03	— 14,79
» τῶν ἐλαίων	77,11	— 13,36	— 9,43
» ἀμυγδάλινον	77,40	— 11,10	— 10,83
κηρὸς λευκὸς	81,79	— 12,67	— 5,54

Εἷς τινα τῶν ἐλαίων τούτων, καθὼς εἰς τὸ ἔλαιον τῶν καρῶν, καὶ ἀμυγδάλων εὐρήκεν καὶ ὁ K. Saussure ἕως $\frac{1}{2}$ τοῖς 0/0 νιτρογόνον.

Ἐκ τοῦ καταλόγου ἐξάγεται ὅτι τὰ πλείον δίστηκτα ἔλαια ἐμπεριέχουν τὴν μεγαλητέραν ποσότητα ἄνθρακος καὶ τὴν ὀλιγωτέραν ὀξυγόνου καθὼς λ. χ. ὁ κηρὸς, τὸ δὲ ἔλαιον ἐμπεριέχει τὴν μεγαλητέραν ποσότητα ὀξυγόνου, καθὼς τὸ κίκινον ἔλαιον.

Ἄν καὶ τὰ λιπαρὰ ἔλαια ἦναι ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, δύνανται ὅμως νὰ καθαρισθῶσιν ἀπὸ τινος φυτικῆς οὐσίας, ἐν ἀνακινούντῃ συνεχῶς μὲ ὕδωρ. Τὰ λιπαρὰ ἔλαια εἶναι ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, δύνανται ὅμως νὰ ἀναμιχθῶσιν εὐκολώτερα μὲ τὸ ὕδωρ, προστιθεμένου ἀραβικοῦ κόμμεως, οὕτως ἀποτελεῖται εἶδος γάλακτος, γα. *λάκτωμα* Emulsio καλούμενον.

Εἰς τὸ ψυχρὸν οἰνόπνευμα δὲν διαλύονται τὰ λιπαρὰ ἔλαια, ἐξαιρουμένου τοῦ κικίνου ἐλαίου, εἰς ζέον οἰνόπνευμα εἶναι ὀλίγον μόνον διαλυτὰ, ἀποχωρίζονται δὲ πάλιν διὰ τῆς ψύξεως τοῦ διαλύματος· εἰς τὸν αἰθέρα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν.

Ἀμυγδάλινον ἔλαιον.

Oleum amygdalarum.

Τοῦτο ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἐκ θλίψεως τῶν γλυκέων καὶ πικρῶν ἀμυγδάλων. Εἶναι ὑπωχρον ἄοσμον, ἡδὺ τὴν γεῦσιν καὶ 0, 918 εἰδικῆς βαρύτητος εἰς θερμοκρασίαν—10° ἀποτίθεται ἐξ αὐτοῦ στεατίνη ὕλη, καὶ εἰς τὴν

—21° πήγνυται εἰς μάζαν ὁμοιάζουσαν τὸ βούτυρον· ταγγίζει εὐκόλως καὶ σύγκειται κατὰ τὸν K. Braconnot ἐξ 24 στεατίνης, καὶ 76 ἐλαιώδους ὕλης, ἥτις δὲν χάνει τὴν ρευστὴν σύστασιν μῆτε διὰ τοῦ ἰσχυροτάτου ψύχους.

Τὸ ἀμυγδαλίον ἔλαιον διαλύεται εἰς 25 ψυχροῦ καὶ 6 ζέοντος οἴνου πνεύματος, εἶναι εὐδιάλυτον καὶ εἰς τὸν αἰθέρα, χρησιμεύει εἰς τὴν ἱατρικὴν καὶ εἰς τοὺς ὀρολογοποιούς.

**E.laior τῶν ἐλαιῶν.*

Τὸ ἔλαιον τοῦτο ἀπολαμβάνεται ἐκθλιβομένου τοῦ σαρκώδους μέρους τῶν ὠρίμων καρπῶν τῆς ἐλαίας *Olea europaea*· καὶ ἐὰν μὲν ἐκφλιφθῶσιν ἄνευ θερμότητος ἐξάγεται ἔλαιον εἰς καθαρωτάτην κατάστασιν, ἐὰν δὲ διὰ θερμότητος, ῥυπαρὸν ἔλαιον, καὶ ἂν τέλος διὰ τῆς ζέσεως τοῦ ὑπολείμματος, ἔλαιον κατωτέρας ποιότητος. Ἐκ τούτων τὸ μὲν πρῶτον καλεῖται *parthénior E.laior*, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον *Oleum provinciale*, seu *comune κοινὸν ἔλαιον*. Τὸ ἔλαιον τοῦτο ἔχει ὀσμὴν ἰδιαιτέραν καὶ χρῶμα ὠχρὸν ἢ πρασινίζον, εἶναι τὸ πλέον παχύρρευστον, ἐξαίρουμένου τοῦ κικίνου ἐλαίου, ἡ εἰδικὴ βαρύτης του εἶναι 0,919, ἀποψυχρανθὲν μέχρι 6° P ἀποθέτει στεατίνην ὕλην, τὸ δὲ ἔλαιον μεταβάλλεται εἰς λευκὴν παχεῖαν μάζαν.

Τὸ ἔλαιον τοῦτο εὐρίσκεται πολλάκις μεμιγμένον μὲ τὸ τοῦ μήκωνος καὶ τοῦ ῥαβάνου. Πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς νοθεύσεως πρέπει νὰ διαλυθῶσι κατὰ τὸν K. Poutet εἰς τὸ ψῦχος 6 μέρη ὑδραργύρου εἰς 7 $\frac{1}{2}$ — μέρη νιτρικοῦ ὀξέος 1350 εἰδικῆς βαρύτητος· ἐν μέρος τοῦ διαλύματος τούτου मिγνύεται μὲ 48 μέρη τοῦ ἐξεταζομένου ἐλαίου, τὸ ὅποιον ἀνακινεῖται πολλάκις· ἐὰν τὸ ἔλαιον ᾖναι καθαρὸν, μεταβάλλεται μετὰ 24 ὥρας εἰς πηκτὴν μάζαν, ἐὰν ἐμπεριέχῃ ὅμως ἄλλα ἔλαια, τότε χωρίζονται ταῦτα ἀπὸ τὴν πεπυκνωμένην μάζαν· τὸ ἔλαιον σύγκειται ἐξ 28 στεατίνης καὶ 27 ἐλαιώδους ὕλης. Τὸ ἔλαιον χρησιμεύει ὡς τροφή, εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐξωτερικῶς καὶ ἐσωτερικῶς, πρὸς κατασκευὴν τῶν ἐμπλάστρων, τοῦ σάπωνος κτλ. Οἱ ὀρολογοποιοὶ τὸ καθαρίζουν, ἐμβάλλοντες εἰς μὲ ἔλαιον πεπληρωμένας φιάλας ἐλάσματα μολύβδου καὶ ἐκθέτοντες αὐτὰς εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἡλίου, ἑωσοῦ δὲν ἀποτίθενται πλέον λευκαὶ κροκίδες ἐπὶ τοῦ μολύβδου, ἔπειτα μεταγγίζεται τὸ καθαρὸν καὶ ἄχρουν ἔλαιον.

Ἐλαιον τοῦ Ραφάνου.

Olenm Napi.

Τὸ ἔλαιον τοῦτο ἐκθλίβεται ἐκ τῶν σπερμάτων διαφόρων εἰδῶν ῥαφάνου *Brassica Napus, oleracea*. Ἡ καλλιτέρα ποιότης αὐτοῦ *ἔλαιον κόλσα* καλουμένη ἐκθλίβεται ἐκ τῶν σπερμάτων τοῦ *Brassica campestris*, καὶ δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς φωτισμὸν χωρὶς προηγουμένου νὰ καθαρισθῇ.

Τὸ ῥαφανέλαιον εἶναι ὠχρὸν, ἔχει ὁσμὴν ἰδιαίτεράν, ἐμπεριέχει κατὰ τὸν K. Braconot 46 τοῖς $\frac{9}{10}$ στεατίνης ὕλης καὶ πυκνοῦται εἰς 4° ἕως 6° R. Μεταχειρίζεται συχναίς εἰς τὸν διὰ λύχνων φωτισμὸν, πρέπει ὅμως νὰ καθαρισθῇ πρότερον ἀπὸ τὰ ἑτερογενῆ συστατικά του, τὰ ὁποῖα ἀσβολοῦντα ὀλγοστεύουσιν τὴν καθαρότητα τῆς φλογός, καὶ δὲν εἶναι τόσοσὺν κατάλληλον πρὸς φωτισμὸν πρὶν καθαρισθῇ. Αὗται αἱ ἑτερογενεῖς ὕλαι εἶναι τὸ χλωρόφυλλον, λεύκωμα, βλενωδὴ μύρια καὶ ὠχρὰ χρωματιστικὴ ὕλη εἰς τὸ ὕδωρ διαλυτὴ· τινὲς ἐξ αὐτῶν τῶν ὑλῶν δύνανται νὰ ἀποχωρισθῶσι διὰ τῆς ἀνακινήσεως τοῦ ἐλαίου μὲ ὕδωρ.

Διὰ νὰ γένῃ τὸ ἔλαιον τοῦ ῥαφάνου ἐπιτήδειον πρὸς φωτισμὸν, πρέπει νὰ ἀνακινηθῇ κατὰ τὸν K. Thenard $\frac{3}{4}$ ὥρας μὲ 2 μέρη ὡς πρὸς τὸ βάρος τοῦ θειικοῦ ὀξέος· αἱ ἑτερογενεῖς ὕλαι κατακρημνίζονται δι' αὐτοῦ εἰς μέλαινας κροκίδας, καὶ τὸ ἔλαιον βάφεται μελανοπράσινον, ἔπειτα ἀνακινεῖται ἀδιακόπως μὲ διπλάσιον ὄγκον ὕδατος καὶ τίθεται τινὰς ἐβδομάδας εἰς θερμὸν δωμάτιον ἔχον θερμοκρασίαν 30° P, διὰ νὰ ἀποτεθῶσιν τόσοσὺν τὸ μέλαν ἵζημα ὅσον καὶ τὸ ὕδωρ. Τὸ μεταγγιζόμενον ἔλαιον χύνεται ἀκολούθως εἰς μεγάλον ξύλινον ἀγγεῖον, τὸ ὁποῖον ἔχει πυθμένα διατρυπημένον καὶ μὲ θρυαλλίδας ἐκ βύσσου σκεπασμένον, τοῦτο τὸ ἀγγεῖον ἐντίθεται εἰς ἄλλο ὡσαύτως κατεσκευασμένον, καὶ τοῦτο πάλιν εἰς τρίτον, ὥστε τὸ ἔλαιον διυλίζόμενον συνάζεται τέλος εἰς τὸ τελευταῖον ἀγγεῖον καθαρὸν.

Ἐλαιον τῶν φηγῶν. Oleum Fagi.

Κατασκευάζεται ἐκ τῶν βαλανῶν τῆς φηγοῦ *Fagus sylvatica*, εἶναι χρο-

σοειδές, ὀλίγον παχύρρευστον, μαλακὸν καὶ σχεδὸν ἄοσμον, πυκνοῦται εἰς τὴν 17° καὶ χρησιμεύει εἰς τὰ μαγειρεῖα, καὶ πρὸς φωτισμόν.

Ἑλαιον τῶν λεπτοκαρῶν.

Oleum Avellanae.

Ἐκθλίβεται ἐκ τῶν κίρκων τῶν λεπτοκαρῶν· εἶναι παχύρρευστον, ὑπόχρον, ἄοσμον καὶ μαλακὸν τὴν γεῦσιν καὶ εἰς τὴν 19° πήγνυται μεταβαλλόμενον εἰς ὠχροῦσκον μάζαν. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πολλὰ λιπαρὰ ἔλαια, τὰ ὁποῖα ἐκθλίβονται ἐκ διαφόρων σπερμάτων καθὼς τὸ ἐκ τῶν πυρήνων τῆς σταφυλῆς καὶ τὸ ἐκ τινος ῥίζης *Cyperus esculentus*, τὸ ἐκ τῶν σπερμάτων τῆς νικοτιάνης *Nicotiana Tabacum*, τὰ ἐκ τινων εἰδῶν πεύκης *Pinns Abies, sylvestris* καὶ ἄλλων φυτῶν. Τὰ πλείοτερα τῶν ἐλαίων τούτων χρησιμεύουν πρὸς φωτισμόν.

Ξηραινόμενα λιπαρὰ ἔλαια.

Τὰ ξηραινόμενα ἔλαια ἐμπεριέχουν ἐκτὸς τῆς ξηραينوμένης ἐλαιώδους ὕλης καὶ ὕλην τινὰ ὠχρὰν, θλένναν φυτικὴν, κόλλαν καὶ λεύκωμα, τὸ ὅποιον μάλιστα ἐπιταχύνει τὴν ταγκίασιν τῶν ἐλαίων τούτων.

Λινέλαιον. Oleum Lini.

Ἐκθλίβεται ἀπὸ τὰ τεθλασμένα σπέρματα τοῦ λίνου *Linum usitatissimum*. Τὸ εἰς τὸ ψῦχος ἐκπιεζόμενον ἔλαιον εἶναι ὠχρόν, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν θερμανθέντων σπερμάτων κίτρινον. Τὸ λινέλαιον ἔχει ὀσμὴν καὶ γεῦσιν ἰδιαιτέραν, εἰδικὴν βαρύτητα 0,939, εἰς τὴν 20° γίνεται σχεδὸν ὠχρόν χωρὶς νὰ πυκνοῦται ἢ νὰ ἀποτίθεται ἐξ αὐτοῦ ἡ στεατίνη ὕλη. Διὰ τοῦ ἀκράτου νιτρικοῦ ὀξέος δύναται νὰ ἀναφλεχθῇ. Μετὰ τῶν ἀλκαλίων σχηματίζει μαλακωτάτους σάπωνας· διαλύει ὀλίγον τὸν ὀξειδωμένον μόλυβδον καὶ χαλκόν, καθὼς καὶ τὸ λευκὸν ἀρσενικόν. Εἶναι διαλύσιμον εἰς 40 μέρη ψυχροῦ, εἰς 5 ζέοντος οἶνοπνεύματος καὶ εἰς 1, 6 αἰθέρος.

Τὸ εἰς τὸ ψῦχος ἐκθλιβόμενον ἔλαιον μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἰατρικὴν ἐσωτερικῶς, τὸ δὲ διὰ τῆς θερμότητος εἶναι χρήσιμον εἰς τὴν χρωματιστικὴν πρὸς κατασκευὴν τῶν διαφόρων δι' ἐλαίου γανωμάτων. Διὰ νὰ καθαρισθῇ πρὸς χρῆσιν τῶν ζωγράφων, ἀναμιγνύεται τὸ ἔλαιον μὲ ὕδωρ

έωσοῦ πύση ἀπὸ τοῦ νά θολόνεται τὸ ὕδωρ διὰ τῶν κατακρημνιζομένων λευκῶν κροκίδων· ἔπειτα ἐκτίθεται τὸ μεταγγιζόμενον ἔλαιον εἰς τὸν ἥλιον διὰ νά γένη ἄχρουν. δύναται ἐπίσης νά διυλισθῇ διὰ διαπύρων ἀνθράκων, δι' ὧν ἀποχρωματίζεται ὅλως διόλου. Διὰ νά χρησιμεύσῃ εἰς γάνωμα πρέπει νά βράζῃ διὰ πρᾶου πυρὸς ὥρας τινὰς εἰς πῆλινον ἀγγεῖον ἀλειμμένον, ἀποῦ μιχθῇ πρότερον μὲ ὀλίγον λιθάργυρον καὶ θεϊκὸν ψευδάργυρον. Τὸ τοιοῦτον γάνωμα ἐμπεριέχει ὀλίγον ὀξειδωμένον μόλυβδον διαλελυμένον καὶ ἀποξηραίνεται ταχέως, ἐὰν ἐξαπλωθῇ εἰς λεπτάς στιβάδας. Ἐὰν τὸ λινέλαιον διὰ πρᾶου πυρὸς συνεχῶς θερμαίνεται, γίνεται γλίσχρον καὶ ἐλαστικὸν καθὼς τὸ ἐλαστικὸν κόμμι· εἰς αὐτὴν τὴν κατάστασιν δύναται νά διαλυθῇ εἰς τερμίνθινον ἔλαιον καὶ δίδει γάνωμα μὲ μεγάλην ταχύτητα ἀποξηραίνόμενον.

Πρὸς κατασκευὴν τῆς τυπογραφικῆς μελάνης ζέεται τὸ λινέλαιον εἰς μεγάλους λέβητας, ἔπειτα ἀνάπτεται καὶ παραλείπεται οὕτω κκιρὸν τινα, ἐνῶ ζέει ἐμβάπτεται εἰς αὐτὸ πολλάκις πεφρυγμένους ἄρτος, ὅστις καθὼς λέγεται συντείνει εἰς τὸ νά μὴν ὠχροῦται ἡ μελάνη ἐπὶ τοῦ χάρτου· ἀποῦ δὲ τὸ ἔλαιον λάβῃ τὴν ἀπαιτουμένην σύστασιν, ψυχραίνεται ταχέως διὰ τῆς ἐγγώσεως τοῦ λέβητος εἰς τὴν γῆν, καὶ ἀκολούθως προστίθεται πευκίνη αἰθάλη διὰ νά λάβῃ ἡ μάζα τὸ ἀνγκαῖον μέλαν χρῶμα. Ἐὰν τὸ γάνωμα ἀναμιχθῇ μετ' ἄλλων χρωμάτων καὶ μετὰ διαφόρων ὀξειδίων τῶν μετάλλων, ἀπολαμβάνονται διάφοροι τυπογραφικαὶ μελάναι.

**Ελαιον τῆς καννάβεως. Oleum canabis.*

Τὸ ἔλαιον τοῦτο ἐκθλίβεται ἐκ τῶν σπερμάτων τῆς καννάβεως *Canabis sativa*. Τὸ νεαρὸν ἔλαιον εἶναι ὑποπράσινον, γίνεται δὲ ὑπόχρουν διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ φωτός, ἔχει τὴν ὁσμὴν τῆς καννάβεως, μαλακὴν γεῦσιν καὶ εἰδικὴν βαρύτητα 0,926 καὶ πήγνυται ὀλίγους βαθμοὺς ὑπὸ τὸ 0· εἶναι πολὺ εὐδιάλυτον εἰς τὸ ζέον οἰνόπνευμα, ψυχροῦ δὲ ἀπαιτοῦνται 30 μέρη. Μὲ τὰ ἀλκάλια σχηματίζει σάπωνας πολὺ μαλακοὺς. Μεταχειρίζεται μάλιστα πρὸς κατασκευὴν τῶν πρασίνων μαλακῶν σαπῶνων καὶ τῶν γανωμάτων.

**Ελαιον τῶν καρῶν.*

Oleum nucum Juglandium.

Ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἐκθλίψεως τῆς σαρκὸς τῶν καρῶν. Εἶναι

ώχρον, μεταβάλλεται δὲ εἰς ὑπόχρον διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ φωτός, εἶναι ἄοσμον, μαλακόν, 0,926 εἰδικῆς βαρύτητος καὶ γίνεται στερεόν εἰς τὴν 16° P. Ξηραίνεται πολὺ ταχέως, καὶ διὰ τοῦτο μεταχειρίζεται καθὼς τὸ καθαρὸν λινέλαιον εἰς τὴν λεπτὴν ζωγραφίαν, μὲ τὰ ἀλκάλια δίδει μαλακοὺς σάπωνας.

Μηκωρέλαιον. Oleum Papaveris.

Τοῦτο τὸ ἔλαιον ἐκθλίβεται ἐκ τῶν σπερμάτων τοῦ μήκωνος *Papaver somniferum*. Εἶναι ὑπόχρον, λεπτόρευσον, σχεδὸν ἄοσμον καὶ ἄχυμον καὶ σερροῦται εἰς τὴν 18° P. Λευκαίνεται εὐκόλως διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἡλίου, δὲν ξηραίνεται τόσον ταχέως, καθὼς τὸ ἔλαιον τοῦ λίνου καὶ τῶν καρύων. Μὲ τὰ ἀλκάλια σχηματίζει μαλακοὺς σάπωνας. Εἶναι διαλύσιμον εἰς 25 μέρη ψυχροῦ καὶ 6 μέρη ζέοντος οἰνοπνεύματος καὶ εὐδιάλυτον εἰς τὸν αἰθέρα. Τὸ νεκρὸν ἔλαιον χρησιμεύει καὶ ὡς τροφή.

Κροτώριον ἔλαιον. Oleum crotonis.

Τὰ σπέρματα τοῦ κρότωνος *Croton tiglium* ἐμπεριέχουσι περισσότερον ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ βάρους των ἔλαιον, τὸ ὁποῖον ἀπολαμβάνεται καὶ διὰ τῆς ἐκθλίψεως καὶ διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος. Ὀλίγαι σταγόνες αὐτοῦ ἐνεργοῦν πολὺ δραστηκῶς καὶ διὰ τοῦτο μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ὡς ἐν τῶν δυνατωτέρων δραστηκῶν μέσων. Εἶναι ὡχρὸν, παχύρρευστον, ἀηδὲς τὴν ὀσμὴν καὶ δριμύτατον τὴν γεῦσιν. Φαίνεται ὅτι ἐμπεριέχει ἐκτὸς τῆς δριμείας ὕλης καὶ μαλακὸν τι ἔλαιον, καθότι ἐὰν τὰ δι' αἰθέρος ἐκ τῶν σπερμάτων ἐκχυλιζόμενον ἔλαιον κατεργασθῇ μὲ οἰνόπνευμα, διαλύονται παρ' αὐτοῦ $\frac{2}{3}$ δριμέος τινὸς ἐλαίου, ἐνῶ τὸ ἀδιάλυτον εἶναι μαλακὸν ἔλαιον. Ἡ εἰς τὸ κροτώριον ἔλαιον ἐμπεριεχομένη δριμεία ὕλη εἶναι, ὡς φαίνεται, ἰδιαιτέρον ὀξύ, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τοὺς K. Pelletier καὶ Caventou κατὰ τὰ 1816 ἐκατασκευάσθη ἐκ τῶν κροτωνίων σπερμάτων, καὶ ἐκαλέσθη *ιατρορικὸν ὀξύ*, ἔπειτα δὲ ἔλαβε ἀπὸ τὸν K. Brandes τὸ ὄνομα *κροτώριον ὀξύ*. Πρὸς κατασκευὴν τούτου τοῦ ὀξέος μεταβάλλεται τὸ κροτωνίων ἔλαιον διὰ τοῦ καλίου εἰς σάπωνα. Ὁ εἰς τὸ ὕδωρ διαλύμενος σάπων ἀποσυντίθεται διὰ τρυγικοῦ ἢ θειικοῦ ὀξέος καὶ τὸ διῦλισθὲν ὑγρὸν ἀποσταλάζεται, εἰς τὴν ἀπόσταξιν ταύτην ἀπολαμβάνεται ὀξινὸν ῥευστὸν καὶ βαρύοσμον, τὸ ὁποῖον ἀφοῦ ἐξουδετερω-

θῆ μὲ διάλυμα τῆς βαρείας, ἐξατμίζεται μέχρι γαρεοῦ, ἐκ δὲ τοῦ ἐπιμέ-
νοντος ἀλκωδούς φυράματος ἐξάγεται τὸ ὀξύ διὰ τῆς ἀποστάξεως μὲ
φωσφορικὸν ὀξύ. Τὸ δοχεῖον εἰς τὸ ὁποῖον σταλάζει καὶ ἐπιπυκνῶται
τὸ ὀξύ πρέπει νὰ ἔχῃ τοῦλάχιστον 5° θερμοκρασίαν.

Τὸ κροτώνιον ὀξύ εἶναι πολὺ πτητικόν, κρυσθλώσιμον διὰ τοῦ ψύχους,
δριμύτατον τὴν ὁσμὴν καὶ γεῦσιν, προσβάλλει τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ
τὴν ρίνα καὶ ἐνεργεῖ ὡς δηλητήριον εἰς μικρὰς δόσεις. Διὰ τῆς οὐδε-
τερώσεως μὲ ἀλλοῖα φθείρεται ἡ ὁσμὴ του. Τὰ κροτώνια ἄλλα εἶναι
ἐν μέρει διαλύσιμα καὶ ἐν μέρει ἀδιάλυτα, τὸ διάλυμα τῆς κροτωνικῆς
ἀμμωνίας κατακρημνίζει ἐκ τοῦ ὑποξειδωμένου θειικοῦ σιδήρου ἴζημα
ὑπωχρον, ἐκ τῶν ἀλάτων τοῦ ἀργύρου χρυσοειδές, ἐκ δὲ τῶν τοῦ μολύβδου
καὶ χαλκοῦ λευκόν. Ἀμφίβολον εἰσέτι εἶναι ἂν τὸ κροτώνιον ὀξύ ᾖναι
ιδιαιτέρας φύσεως· κατὰ τὰς δοκιμὰς τοῦ K. Caventou φαίνεται ὅτι εἶναι
ἔνωσις ὕλης τινὸς πτητικῆς μὲ ὀξύ πτητικόν.

Kίκινον ἔλαιον. Oleum Ricini.

Τὸ κίκινον ἔλαιον ἐκθλίβεται ἐκ τῶν ἐκλεπισμένων καὶ τεθλασμένων
σπερμάτων τοῦ κικίνου φυτοῦ *Ricinus comunis*, εἶναι ὑπωχρον, γλίσχρον,
παχύρρευστον, ἄσμον καὶ ἡδὺ τὴν γεῦσιν, μετ' ὀλίγον δὲ ταγγίζει
καὶ τότε προξενεῖ ἐρεθισμόν εἰς τὸν φάρυγγα· ἡ εἰδικὴ αὐτοῦ βαρύ-
της εἶναι 0,969. Ξηραίνεται κατ' ὀλίγον εἰς τὸν ἀέρα, καὶ συνιστᾷ εἰς
τὴν 18° μάζαν διαφανῆ καὶ ὠχράν. Διὰ τῆς θερμῆς ἐκτείνεται παρὰ πολὺ
καὶ ἀναΐζει εἰς τὴν 265°. εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ εἰς
τὸν αἰθέρα· ἀναμιγνύμενον μὲ ἰσοβαρὲς λειψυδρον οἶνόπνευμα δια-
λύεται ἔντελως, καὶ οὕτως ἐπιμένουσιν τὰ ἑτερογενῆ λιπαρὰ ἔλαια τὰ
μετ' αὐτοῦ συμμεμιγμένα.

Τὸ κίκινον ἔλαιον φαίνεται ὅτι σύγκειται ἐκ τριῶν διαφορῶν εἰδῶν στέ-
ατος, τὰ ὁποῖα μεταβάλλονται εἰς τόσα διάφορα ὀξέα, ὅταν τὸ ἔλαιον
υποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν ἢ μεταβληθῇ διὰ τοῦ καλίου εἰς σάπωνα.

Πρὸς προαγωγὴν τῶν διαφορῶν τούτων ὀξέων ἐνοῦνται 8 μέρη τοῦ
κικίνου ἐλαίου μὲ διάλυμα ἐκ 2 μερῶν καυστικοῦ καλίου καὶ 4 ὕδατος
καὶ προάγουν σάπωνα, ὅστις σχηματίζει διαφανῆ καὶ εἰς τὸ ὕδωρ διαλύ-
σιμον μάζαν, καὶ διακρίνεται ἀπὸ τοὺς λοιποὺς διὰ τῆς πικρᾶς του
γεύσεως. Ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦ ρηθέντος σάπωνος ἀποσυντεθῇ δι' ὕδρο-
χλωρικοῦ ὀξέος, ἀποχωρίζεται ἐρυθρόφαιον ἔλαιον συνιστάμενον ἐκ τριῶν

όξέων, ἐξ ὧν τὸ ἐν ἀποτίθεται εἰς στερεὰν κατάστασιν, ἐὰν ἀποψυχρανθῇ μέχρι τῆς 15 ἢ 18°. Ἐὰν τὸ οὕτως ἀποκρινόμενον ὀξύ τοῦτο διαλυθῇ εἰς ζέον οἰνόπνευμα καὶ ἀποψυχρανθῇ, κρυσταλλοῦνται μαργαριτοειδῶς λαμπρῶνται ἀγκίδες, αἵτινες εἶναι τὸ στεατοκικινικὸν ὀξύ, τὸ δὲ ἐπιμένον ἐλαιῶδες ῥευστὸν πῆγνυται εἰς τὴν 6° P, χωρὶς ν' ἀποτεθῶσιν κρύσταλλοι, ἡ μάζα αὕτη συνίσταται ἐκ δύο ὀξέων ἐκ τοῦ κικίνου ὀξέος *Acide ricinique* καὶ τοῦ ἐλαιοκικίνου ὀξέος *Acide oleoricinique*.

Στερεὰ ἔλαια.

Τὰ εἰς τὰ φυτὰ ἀπαντώμενα στερεὰ ἔλαια ἐμπεριέχουν πάντοτε ἐκτός τῆς στεατίνης ὕλης καὶ ὀλίγην ἐλαιώδη, ἀλλὰ ἡ πρώτη ὑπερτερεῖ πάντοτε ὡς πρὸς τὸ ποσόν. Κατασκευάζονται δὲ καὶ ταῦτα διὰ τῆς ἐκθλίψεως, ἀλλ' ἀπαιτεῖται νὰ θερμαίνωνται τὰ ἐκλεπισθέντα καὶ συνθλιφθέντα σπέρματα καθὼς καὶ αἱ πλάκες τοῦ πιεστήρος.

**Elaior ἢ βούτυρον κακάϊνον.*

Oleum seu Butyrum Cacao.

Τὰ ἐκλεπισθέντα καὶ λειοτριβηθέντα σπέρματα τοῦ κακάου *Theobroma Cacao* θερμαίνόμενα ἐγκλείονται εἰς σάκκον καὶ ἐκθλίβονται. Πρὸς ἀποχώρησιν τῶν εἰς τὸ ληφθὲν ἔλαιον ἐμπεριεχομένων ἑτερογενῶν ὑλῶν διυλίζεται τὸ ἔλαιον διὰ χάρτου, ἀλλὰ διὰ νὰ μένη εἰς ῥευστὴν κατάστασιν πρέπει νὰ γένῃ ἡ ἐργασία αὕτη εἰς θερμὸν τόπον, ἢ διὰ ἰδιαιτέρας συσκευῆς, ἥτις σύγκειται ἀπὸ χωνίων ἐκ κασσιτερωμένου σιδήρου καὶ περιβεβλημένον μὲ ἄλλο χωνίον εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ζέον ὕδωρ. Τὸ ἔλαιον δύναται νὰ πορισθῇ καὶ ἐὰν τὰ εἰς πόλτον μεταβληθέντα σπέρματα τοῦ κακάου ζεσθῶσι μὲ ὕδωρ. Εἶναι ὠχρολευκόν, εὐθρυπτόν, ἔχει ὀσμὴν τοῦ κακάου, γλυκεῖαν γεῦσιν καὶ σύστασιν τοῦ προβατείου στέατος καὶ εἰδικὴν βαρύτητα 0,91. Δύναται νὰ διατηρηθῇ πολὺν καιρὸν χωρὶς νὰ ὑπόκειται εἰς ταγήσιας. Μὲ τὰ ἀλκάλια δίδει μαλακοὺς σάπωνας. Διαλύεται εἰς τὸ ψυχρὸν καὶ εἰς τὸ ζέον οἰνόπνευμα. Μεταχειρίζεται μόνον εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς.

**Elaior μοσχοκαρύου. Oleum Nucistae.*

Κατασκευάζεται ἐκ τῶν μοσχοκαρύων *Nuces moschatae* διὰ τῆς

ἐκθλίψεως, εἶναι ῥαβδωτόν, ὠχροφαῖον καὶ ἔχει τὴν ὁσμὴν καὶ γεῦσιν τῶν μωσχοκαρύων· κατὰ τὸν K. Schrader 16 οὐγγίαι τοῦ ἐλαίου σύγκεινται ἐξ 7 στεατίνου ἐλαίου, $8 \frac{1}{2}$ ὠχροῦ βουτυρώδους καὶ ἐκ $\frac{4}{9}$ πτητικῶ ἐλαίου, εἰς τὸ ὅποσον ἀποδίδεται ἡ εὐωδία τοῦ ἐλαίου τούτου· εὐρίσκεται πολλάκις τεχνητὸν ἔλαιον, τὸ ὅποσον γίνεται ὅταν ἐκθλιφθῶσι τὰ τεθλασμένα καὶ μὲ ζωϊκὸν στέαρ κατεργασμένα μωσχοκάρυα, τὸ τοιοῦτον δὲ γενοθευμένον ἔλαιον δὲν διαλύεται εἰς 4 μέρη ζέοντος οἶνοπνεύματος καθὼς τὸ ἀληθές.

Ἑλαιον τῆς δάφνης. Oleum Lauri.

Κατασκευάζεται ἐκ τῶν νεαρῶν καρπῶν τῆς δάφνης *Laurus nobilis* διὰ τῆς ἐκθλίψεως ἢ διὰ τῆς μὲ ὕδωρ ζέσεως των, εἶναι βουτυρώδες τὴν σύστασιν, πράσινον τὸ χρῶμα καὶ ἔχει τὴν ἰδιαιτέραν ὁσμὴν τῶν δαφνίδων. Τὸ οἶνοπνευμα διαλύει ἐξ αὐτοῦ ἔλαιόν τι πτητικὸν καὶ χλωρόφυλλον καὶ ἐπιμένει λευκὴ καὶ στεατίνη μάζα. Εἰς τὸν αἰθέρα διαλύεται ἄνευ ὑπολείμματος ὁ αἰθέρ το διαλύει ἐξ ὁλοκλήρου· διὰ τῆς τέχνης πολλάκις προάγεται ἐάν αἱ τεθλασμένοι δαφνίδες κατεργασθῶσι μὲ βούτυρον καὶ τὸ ἐκθλιβόμενον ἔλαιον βαφῇ ἀκολούθως μὲ χλωρόφυλλον. Ἐξ μέρη οἶνοπνεύματος διαλύουν ὀλίγον ποσὸν τοῦ τοιούτου τεχνητοῦ ἐλαίου.

Τὸ ἔλαιον τῆς δάφνης μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐξωτερικῶς.

Φοινίκειον ἔλαιον. Ol. Palmae.

Ἐκθλίβεται ἐκ τῶν καρπῶν τῆς *Avoira Elais* καὶ ἐξ ἄλλων διαφόρων εἰδῶν φοινίκων. ἔχει βουτυρώδη σύστασιν, χρυσεῖον χρῶμα καὶ ὁσμὴν τὴν τῶν ἴων· τήκεται εἰς τὴν 29° P καὶ σύγκειται ἐκ 37 στεατίνης καὶ 6 ἐλαιώδους ὕλης· ταγγίζει πολλὰ εὐκόλως καὶ τότε λαμβάνει λευκὸν χρῶμα. Κατασκευάζονται ἐξ αὐτοῦ στερεοὶ σάπωνες.

Τὸ φοινίκειον ἔλαιον ἔχει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὀξινωποὺς χαρακτῆρας, οἷτινες ἀποδίδονται ἐπὶ τινος ἰδιαιτέρου ἀσθενοῦς ὀξέος τὸ ὅποσον δύναται νὰ ἐξαχθῇ ἐκ τοῦ ἐλαίου διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος, ἂν καὶ τὸ ἐπιμένον ἔλαιον ἀναλαμβάνῃ τὰ αὐτὰ χαρακτηριστικά. Τοῦτο τὸ ὀξὺ λέγεται φοινίκειον ὀξύ. ὥσαύτως προάγεται ἐάν τὸ ἔλαιον τοῦτο εἰς ἡν ὑποτίθεται βάσις *Palmin* ὀνομασθεῖσα, κατεργασθῇ διὰ καλίου.

Ὁμοιον τοῦ ἐκτεθέντος ἐλαίου εἶναι τὸ ἐξαγόμενον διὰ τῆς ζέσεως

των κόκκων τῆς *Myrica cerifera*. ὠσαύτως ἀπολαμβάνεται, κηρώδης τις ὕλη, ἐὰν ὁ φλοιὸς τοῦ φοίνικος *Ceroxylon Andicola* ζεσθῇ, μετὰ ταῦτα δὲ διαλυθεῖς εἰς ὕδωρ ἐκθλιφθῇ. Τὸ ἔλαιον τοῦτο ἐὰν διαλυθῇ εἰς ζέον οἰνόπνευμα καὶ ἀφεθῇ σχηματίζει κρυστάλλους, οἵτινες εἶναι ἰδιαιτέρα ὕλη *Ceroxylin* καλουμένη.

Στερεὸν ἔλαιον ἀποχωρίζεται καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τοῦ *Galactodendron utile*. Τὸ δένδρον τοῦτο φυόμενον εἰς τὰ ὀρεινότερα μέρη τῆς Ἀμερικῆς παρέχει, ἀφοῦ καθαρισθῇ ἀπὸ τὸν φλοιὸν, γαλακτωδὲς ῥευστὸν, ὁμοιάζον κατὰ τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικὰ μετὰ τοῦ βοῦτου γάλακτος. Τὸ ῥευστὸν τοῦτο ἐμπεριέχει σφαιρίδια συνιστάμενα ἐκ κηροῦ καὶ φυτικοῦ λευκώματος. Ἐὰν τὸ ῥευστὸν τοῦτο ζέεται σχηματίζεται ὑμὴν καθὼς τὸ ἄνθος τοῦ γάλακτος καὶ ἐν αὐτῷ ἀποχωρίζονται σταγόνες ἐλαίου, το ὅποῖον ἀποψυχραίνονμενον πήγνυται.

Ἐλαιον τῆς κοφέας. Ol. Coffeae.

Ἐὰν τὰ τεθλασμένα σπέρματα τῆς κοφέας κατεργασθῶσι μὲ ζέον οἰνόπνευμα καὶ τὸ διῦλισθὲν ὑγρὸν ἀποψυχρανθῇ ἕως τῆς 6°, χωρίζεται μέρος τοῦ διαλελυμένου ἐλαίου. Εἶναι λευκὸν βουτυρώδες τὴν σύστασιν, ἄοσμον, ταγγίζει εὐκόλως καὶ τήκεται μετὰ 375.

Κηρός. Cera. Cerin.

Ὁ κηρὸς ἀπαντᾷται ὡς περικάλυμμα διαφόρων φύλλων τοῦ μήκανος, καὶ μάλιστα τῶν καρπῶν τῆς *Myrica cerifera*, *Croton sebiferum* κ.τ.λ. κατ' ἐξοχὴν δὲ ἐξάγεται ἀπὸ τὸν κηρὸν τῶν μελισσῶν· εἶναι ὠχρὸν καὶ ἔχει ὀσμὴν ἰδιαιτέραν, ἐὰν ταχῇ εἰς θερμαινόμενον ὕδωρ καὶ ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἡλίου λευκαίνεται καὶ ἀποβάλλει καὶ τὴν ὀσμὴν καὶ τὸ χρῶμα του. Πρὸς τοιαύτην λεύκανσιν χύνεται ὁ τετηγμένος κηρὸς ἐπὶ ξυλίνου κυλίνδρου εἰς ψυχρὸν ὕδωρ περιστρεφόμενον· ὁ οὕτω πυκνωθεὶς κηρὸς, ὅστις ἔχει ταινιῶν σχῆμα, ἐξαπλόνεται ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἡλίου εἰς δύκτια καὶ πολλάκις δι' ὕδατος ἐπινοτιζόμενος λευκαίνεται· ἔπειτα ἀφοῦ τηχθῇ χύνεται πάλιν εἰς τύπους· ἐὰν λευκανθῇ διὰ χλωρίου ἀποκαθίσταται ὁ κηρὸς πάντοτε ἰζώδης καὶ ἐμπεριέχει πρὸς τοῦτοις καὶ ὀλίγον χλωρίον.

Ὁ οὕτως ἀπολαμβανόμενος κηρὸς εἶναι λευκός, διαφανής, ἄοσμος καὶ

ἄχυρος. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης του εἶναι 0,966 καὶ διὰ τοῦτο ἐπιπλέει τόσον ἐπὶ τοῦ ψυχροῦ ὥς καὶ ἐπὶ τοῦ θερμοῦ ὕδατος· εἰς θερμοκρασίαν 50° R τήκεται, γίνεται δὲ εὐκαμπτος καὶ μαλακὸς εἰς τὴν 24°. Εἰς κατωτέραν ὁμῶς θερμοκρασίαν εἶναι σκληρὸς καὶ εὐθρυπτος. Τὸ ζέον οἰνόπνευμα διαλύει κατ' ὀλίγον $\frac{1}{10}$ αὐτοῦ καὶ τὸ διάλυμα κατακρημνίζεται πάλιν διὰ τῆς ἀποψύξεως εἰς τὸν πυθμένα. Ἡ οὐσία αὕτη, ἥτις φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ ἀληθὴς κηρὸς ὠνομάσθη ἀπὸ τὸν K. John *Κηρίνη Cerin*, τὸ δὲ μετὰ τὴν ζέσιν ἐπιμένον, τὸ ὁποῖον εἶναι $\frac{1}{10}$ τοῦ βάρους τοῦ κηροῦ λέγεται μυρικίνη *Myricin*. Μὲ τὰ καυστικὰ ἀλκάλια ὁ κηρὸς σχηματίζει πολλὰ σκληροὺς καὶ εἰς τὸ ὕδωρ δυσδιαλύτους σάπωνας. Διὰ τῆς ἀποστάξεως ἀποσυντίθεται καὶ σχηματίζει ξινά, παχέα καὶ λεπτόρρευστα ἀποτελέσματα, γνωστὰ ὑπὸ τὸ ὄνομα ἔλαιον τοῦ κηροῦ καὶ πνεῦμα τοῦ κηροῦ *Oleum seu Spiritus Cerae*. Ὁ κηρὸς μὲ ἄλλας οὐσίας ἀναμειγμένους εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν ἰατρικὴν ἐξωτερικῶς, εἰς πολλὰς τέχνας, καθὼς καὶ πρὸς κατασκευὴν τῶν λαμπάδων κ.τ.λ.

Περὶ τοῦ σάπωνος καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ παραγομένων.

Ἐάν ρευστὰ ἢ στερεὰ λιπαρὰ ἔλαια κατεργασθῶσι μὲ διάλυμα τοῦ καυστικοῦ καλίου ἢ τοῦ νάτρου ἀποτελοῦνται εἰς τὸ ὕδωρ εὐδιάλυτοι ἐνώσεις, αἵτινες καλοῦνται σάπωνες.

Λέγεται, ὅτι οἱ Γαλάται ἐφεύρον τὴν τέχνην τῆς σαπωνοποιίας, ὁ Πλίσιος ἀναφέρει αὐτὰ ὑπὸ τὸ ὄνομα *Sapo*, λέξις ἥτις φαίνεται ὅτι κατάγεται ἀπὸ τὴν παλαιὰν Γερμανικὴν *Sape*. Οἱ σάπωνες ἐθεωροῦντο πολὺν καιρὸν ὡς ἀπλῶς χημικαὶ ἐνώσεις τῶν λιπαρῶν ἐλαίων μετὰ τῶν ἀλκαλίων· εἰς τοὺς νεωτέρους ὁμῶς χρόνους ἀπεδείχθη ὅτι τὰ ἔλαια ἐνούμενα μετὰ τῶν βάσεων καθὼς καὶ μετὰ τοῦ ὀξειδωμένου μόλυβδου μεταβάλλονται ὡς πρὸς τὴν σύνθεσίν των· ἐπειδὴ, ἐάν ἀποχωρισθῶσιν ἀπὸ τὰς βάσεις διὰ τῶν ὀξέων γίνονται εὐδιάλυτα εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ δύνανται τότε νὰ ἐνοῦνται ταχύτερον μὲ τὸν ὀξειδωμένον μόλυβδον, παρὰ πρὸ τῆς ἐνώσεώς των μετὰ τῶν βάσεων. Ἀλλ' ἡ ἀληθὴς θεωρία τοῦ σχηματισμοῦ τῶν σαπῶνων ἐγνωρίσθη διὰ τῶν εἰς διάστημα ἑνδεκα ἐτῶν πολυαριθμῶν καὶ ἀκριβῶν δοκιμῶν τοῦ K. Chevreuil. Ὁ χημικὸς οὗτος ἀνεκάλυψεν ὅτι τὰ λιπαρὰ ἔλαια μεταβάλλονται διὰ τῆς ἐνεργείας τῶν βάσεων εἰς ἰδιαιτέρα ὀξέα, καὶ μάλιστα εἰς γράτινον καὶ ἐλαιῶδες ὄξύ, τὰ ὁποῖα ἐγόνονται μὲ τὰς βάσεις· ὅθεν οἱ σάπωνες πρέπει

νά θεωρῶνται ὡς ἄλατα. Συγχρόνως σχηματίζεται ἡ παρὰ τοῦ Scheele εὑρεθεῖσα γλυκεῖα ὕλη τῶν ἐλαίων *Principium dulce oleorum* ἡ ὁποία ὁμῶς μένει ἐλευθέρα καὶ δὲν ἐνόνεται μὲ τὰς ἄλλας ὕλας. Ἐὰν 2 μέρη ἐλαίου τῶν ἐλαίων ἀναμιχθῶσι μὲ καυστικὸν καλίον ἢ νάτρον διαλελυμένον εἰς δύο μέρη ὕδατος καὶ κατεργάζονται 24 ἕως 48 ὥρας τότε σχηματίζεται ἐκ τοῦ ἐλαίου καὶ τῆς ἀλκαλοειδοῦς βάσεως σάπων, ὅστις ἐπιπλέει εἰς τὸ ὕδατῶδες ῥευστόν. Ἐὰν ὁ ἀπὸ τὸ ὑγρὸν μεταγ-γιζόμενος καὶ διὰ τῆς ἀποπλύσεως δι' ὕδατος καθαριζόμενος σάπων διαλυθῇ εἰς ὕδωρ καὶ ἀναμιχθῇ μὲ ἀλικὸν ὀξύ, ἀποχωρίζεται ἐλαίον τε στερεώτερον τὴν σύστασιν καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ἐπιπλέον· τὸ ἐλαίον τοῦτο δὲν ἔχει πλέον τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ πρὸς κατασκευὴν τοῦ σάπωνος μεταχειριζομένου ἐλαίου, ἀλλὰ διαφέρει ἀπὸ αὐτὸ ὅχι μόνον κατὰ τὴν σύστασιν, ἀλλ' ἀκόμη καὶ διότι διαλύεται ἐξ ὀλοκλήρου εἰς τὸ ζέον οἰνόπνευμα καὶ κατακρημνίζεται ἐκ τοῦ ψυχροῦ διαλύματος εἰς εἶδος στιλπνῶν ἀγγίδων. Διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ οἰνοπνεύματος ἀποχωρίζε-ται ἔτι περισσότερον τοῦ στεατίνου ὀξέος, καὶ τέλος ἐπιμένει στέαρ τι ῥευστόν καὶ ξινόν, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ ἐλαιῶδες ὀξύ. Ἔνεκα τούτου σχηματί-ζονται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἀλκαλοειδοῦς βάσεως ἐπὶ τοῦ ἐλαίου τοῦλά-χιστον δύο ὀξέα διαφέροντα ἀπ' ἄλληλα, τὸ στεατίνον καὶ τὸ ἐλαιῶδες ὀξύ, ἄνευ σχηματισμοῦ ὀξικοῦ καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξέος· συγχρόνως ὁμῶς παράγεται μικρὰ ποσότης τῆς γλυκεῖας ὕλης, ἥτις εὑρίσκεται εἰς διαλελυμένην κατάστασιν εἰς τὴν ὕδατῶδη ἀλκαλοειδῇ ἀλουσίαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας πλέει ὁ σχηματισμένος σάπων, διὰ νὰ χωρισθῇ ἡ γλυκεῖα αὐ-τὴ ὕλη τοῦ ἐλαίου πρέπει νὰ ἐξουδετερωθῇ ἀκριβέστατα τὸ ἀλκαλοειδὲς ὑγρὸν μὲ κεκραμένον θεϊκὸν ὀξύ καὶ ἀφοῦ ἐξατμισθῇ μέχρι συστάσεως σερapiοῦ κατεργάζεται μὲ οἰνόπνευμα, τὸ ὁποῖον ἐνῶ καταβυθίζει τὸ θεϊ-κὸν καλίον, διαλύει τὴν γλυκεῖαν ταύτην ὕλην τοῦ Scheele.

Πρὶν ὁμιλήσωμεν περὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ σάπωνος πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὰ ὀξέα, τὰ ὁποῖα σχηματίζονται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀλκαλίων ἐπὶ τῶν ἐλαίων, στεατῶν κ.τ.λ. καὶ τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχονται εἰς αὐτά. Τοιαῦτα εἶναι·

Τὸ στεατίνον ὀξύ.

Σχηματίζεται τοῦτο διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀλκαλίων, τῶν ἀλκαλοει-δῶν γαιῶν, καθὼς καὶ τοῦ ὀξειδωμένου ψευδαργύρου καὶ τοῦ μολύβδου εἰς τὰ ἐλαία ἢ εἰς τὰ στέατα.

Διὰ νὰ κατασκευασθῇ κατὰ τὸν τρόπον τῶν K. K. Chevreuil καὶ

Braconot διαλύεται σάπων κατεσκευασμένος, από προβάτειον στέαρ και κάλιον εις 6 μέρη ζέοντος ύδατος και τὸ σχηματισθὲν διάλυμα μιγνύεται με ψυχρὸν ύδωρ ἕωσὺ ἀποβάλλῃ τὴν γλισχρότητά του. Τὸ διάλυμα ἀποσυντίθεται διὰ φωσφορικοῦ ἢ τρυγικοῦ ὀξέος, διὰ τοῦ ὁποίου χωρίζονται τὸ στεάτινον και τὸ ἐλαιῶδες ὀξύ, ἐπιπλέοντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ύγροῦ. Τὰ οὕτως ἀποχωρισθέντα και με πολὺ ύδωρ ἀποπλυθέντα ὀξέα ζέονται με 6 μέρη ύδατος, προστιθεμένης ἀκόμη και διαλύσεως τοῦ καλίου, μεχριστοῦ νὰ διαλυθῶσι τὰ ὀξέα· ἀφοῦ δὲ τὸ ύγρὸν ἀναμιχθῇ με 40 περίπου μέρη ψυχροῦ ύδατος ἐκτίθεται ὀλίγον καιρὸν εις θερμοκρασίαν 12 ἕως 15°, εις ἣν σχηματίζεται καταθύθισμα συνιστάμενον ἐκ στεατίνου καλίου με ὑπερτεροῦν ὀξύ ἐκ τοῦ ὁποίου διὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δύναται ν' ἀποχωρισθῇ τὸ στεάτινον ὀξύ.

Τὸ στεάτινον ὀξύ εἶναι ἄχρυμον και ἄοσμον, και κρυσταλλοῦται εις εἶδος λεπίδων ἢ βελονῶν λευκῶν, στιλπνῶν, λιπαρῶν και εὐθρόπτων. Καταθύθίζεται εις τὸ ψυχρὸν ύδωρ, ἐπιπλέει δὲ εις τὸ ζέον. Τήκεται μετὰ τὴν 75° πρὸς ὥχρουν και ἐλαιῶδες ύγρὸν, τὸ ὁποῖον πηγνυται πάλιν εις τὴν 70° εις εἶδος στιλπνῶν ἀγγίδων. Εἶναι ἀδιάλυτον εις τὸ ζέον ύδωρ εὐδιάλυτον εις τὸ ζέον λειψυδρον οἰνόπνευμα και τὸν αἰθέρα, και πυκνοῦται διὰ τῆς ψύξεως. Τὸ ζέον διάλυμα τοῦ στεατίνου ὀξέος εις οἰνόπνευμα κοκκινίζει τὸ τοῦ καγκαμίνου ἐμβρεγμα. Τὸ στεάτινον ὀξύ καίει εις τὸν ἀέρα καθὼς ὁ κηρός. Τὸ κρυσταλλωμένον ὀξύ ἐμπεριέχει 3—4 τοῖς $\frac{1}{10}$ ύδωρ, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ χωρισθῇ ἀπ' αὐτοῦ διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ ὀξέος με ὀξειδωμένον μύλυθον. Τὸ στεάτινον ὀξύ σύγκειται ἐξ

Ἄνθρακος 80, 145

Ὄξυγόνου 7, 377

Ἵδρογόνου 12, 478

100.

Ἐνοῦται με τὰς θάσεις και σχηματίζει διαλυτὰ και ἀδιάλυτα ἄλατα, τὰ ὁποῖα ἀποσυντίθενται διὰ τῶν περισσοτέρων ὀξέων και τὸ ἐπιπολάζον στεάτινον ὀξύ μεταβάλλεται διὰ τῆς θερμότητος εις ἐλαιῶδες ύγρὸν.

Στεάτινον κάλιον. Ἐὰν ἐν μέρος στεατίνου ὀξέος θερμανθῇ με ἐν μέρος καυστικοῦ καλίου διαλελυμένου εις 10 μέρη ύδατος, γίνεται τὸ οὐδέτερον στεάτινον κάλιον, τὸ ὁποῖον σχηματίζει μετὰ τὴν ψύξιν χονδρώδεις και ἀδιαφανεῖς κρυστάλλους. Ἐὰν καθαρισθῇ διὰ τῆς ἐκθλίψεως

μεταξὺ ἐμπορικοῦ χάρτου καὶ διὰ τῆς διαλύσεως εἰς ζέον οἰνόπνευμα, φαίνεται ὡς στιλπναὶ λεπταὶ λεπίδες. Εἶναι ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα καὶ δὲν τήκεται εἰς θερμοκρασίαν τοῦ ζέοντος ὕδατος· ἐνθούμενον μὲ 10 μέρη ὕδατος σχηματίζει βλεννώδη μάζαν, ἥτις κατὰ μέγα μέρος ἀποσυντίθεται σχηματιζομένου στεατίνου καλίου ὀξέως.

Στεάτινον νάτρον. Ἐάν θερμανθῶσι 20 μέρη στεατίνου ὀξέος μὲ 13 μέρη νάτρου διαλελυμένου πρότερον εἰς 300 μέρη ὕδατος, σχηματίζεται τὸ οὐδέτερον στεατίνον νάτρον.

Στεάτινος ἀμμωνία. Τὸ στεατίνον ὀξὺ ἀπορροφᾷ ἀμμωνιακὸν ἀέριον καὶ συγχρόνως σχηματίζεται ἄλλας στερεὸν, πτητικὸν, ἄοσμον καὶ ὀλίγον ἀλκαλοειδὲς τὴν γεῦσιν.

Αἱ ἐνώσεις τοῦ στεατίνου ὀξέος μὲ τὴν βαρεΐαν, τὴν στροντιάνην καὶ τὴν τίτανον εἶναι κόνεις λευκαί, εὐτηκτοί, ἄοσμοι, ἀδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, ἀπολαμβάνονται δὲ διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ ἀναζέοντος διαλύματος τοῦ στεατίνου καλίου μὲ τὸ διάλυμα τῆς ἀλικῆς βαρεΐας, στροντιανῆς καὶ τιτάνου. Ἐάν ἡ στεατίνη τίτανος, ἡ μίγμα συνιστάμενον ἐξ ἐνὸς τιτάνου καὶ τεσσάρων στεατίνου ὀξέος ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, ἐξάγεται ὕδωρ καὶ στεατνώδης τις μάζα, ἥτις λέγεται Stearon.

Ὁ Στεάτινος μολύβδος καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ διὰ μετὰλλων στεατίνων ἄλλα ἀπολαμβάνονται εἰς οὐδετέραν κατάστασιν διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ νιτρικοῦ μολύβδου εἰς ζέον διάλυμα στεατίνου καλίου· εἶναι κόνεις λευκαί, ἀδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ καὶ διὰ τῆς πυρακτώσεως τήκονται.

Μαργαρώδες ὀξὺ.

Acidum margaricum.

Ὀνομάσθη οὕτως ἕνεκα τῆς στιλπνότητός του, ἥτις εἶναι ὅμοια τῆς τῶν μαργαριτῶν. Ἐάν τὸ χοίρινον, προβάτειον, βόειον, ἢ καὶ τὸ ἀνθρώπινον στέαρ διὰ καυστικῆς ποτάσεως μεταβληθῶσιν εἰς σάπωνας, προάγεται τὸ ῥηθὲν ὀξὺ ἠνωμένον μετὰ τῆς ποτάσεως ἐκ τῆς ὁποίας ἀποχωρίζεται διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. Εἰς καθαρὰν κατάστασιν σχηματίζει λαμπρίζουσας ἀγκίδας. Ἐάν τὸ μαργαρώδες ὀξὺ συμμιχθῇ μὲ $\frac{1}{4}$ τιτάνου καὶ τὸ μίγμα ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, ἀποστάζεται ἐλαιῶδες τι ῥευστὸν Margaron ἐπονομαζόμενον καὶ ἐπιμένει ἀνθρακικὴ τίτανος.

¶ Ἡ βάσις τοῦ μαργαρώδους ὀξέος, ἥτις εὑρίσκεται ἡνωμένη μετὰ τῆς στεατίνης καὶ ἐλαίνης εἰς τὰ πλείονερα στέατα δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ἐξ αὐτῶν, ἐὰν αὐτὰ κατεργασθῶσι δι' αἰθέρος, διότι δι' αὐτοῦ διαλύεται ἡ ὕλη αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς δι' αἰθέρος διαλύσεως δύναται νὰ ληρῇ διὰ τῆς αὐτομάτου ἐξατμίσεως.

Ἡ *Μαργαρίνη* ἡ μαργαρώδης ὕλη ἐνοῦται καὶ μετὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος πρὸς ἰδιαίτερον ὀξύ *Μαργαροθειϊκὸν* ὀξύ καλούμενον, τὸ ὅποιον ἀπολαμβάνεται, ἐὰν μέρος κοινοῦ ἐλαίου ἀναμιχθῇ μὲ $\frac{1}{2}$ θειικοῦ ὀξέος καὶ ἀναταρασσόμενον ἀφελῇ 24 περίπου ὥρας. Ἐὰν ἀκολούθως ἀναμιχθῇ μετὰ τοῦ τριπλασίου ὄγκου ὕδατος ἐπιπλέει τὸ ληφθὲν ὀξύ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας εἰς εἶδος σεραπίου. Ὡσαύτως ἐνοῦται ἡ βάσις μετὰ τοῦ ὕδρογόνου, καὶ οὕτως προάγεται τὸ ὕδρομαργαρώδες ὀξύ.

Φθειράγχινον ὀξύ.

Τὸ ὀξύ τοῦτο ἐξάγεται, ἐὰν τὸ ἐκ τῶν σπερμάτων τῆς φθειράγχης ἐξαγόμενον δι' αἰθέρος λιπαρὸν ἔλαιον μεταβληθῇ διὰ τοῦ καλίου εἰς σάπωνα, καὶ ὁ ληφθεὶς σάπων διὰ τρυγικοῦ ὀξέος ἀποσυντεθῇ. Ἐὰν τὸ ἀποχωριζόμενον ὀξύ ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν ἀπολαμβάνεται ὀξινὸν στάλαγμα, τὸ ὅποιον κορεσθὲν μὲ διάλυσιν βαρείας καὶ ἐξατμισθὲν μέχρι στερεοῦ σχηματίζει τὴν *φθειραγχίνην βαρεΐαν*, ἥτις ἐὰν τὸ ῥηθὲν ἄλλας ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν, προστιθεμένων 6 μερῶν φωσφορικοῦ ὀξέος παρέχει τὸ φθειράγχινον ὀξύ, τὸ ὅποιον ἔχει ὁσμὴν ταγγίζοντος βουτύρου· τήκεται εἰς τὴν 20°, εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα, καὶ κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος βελονῶν μαργαροειδῶν τὴν στιλπνότητα.

Ἐλαιῶδες ὀξύ.

Acidum oleosum.

Τὰ κυρίως ἔλαια σύγκεινται κατὰ μέγα μέρος ἐξ ἐλαιώδους ὀξέος, τὸ ὅποιον σχηματίζεται εἰς μεγάλην ποσότητα, ἐὰν τὰ ῥευστὰ στέατα καὶ μάλιστα τὰ ξηραίνόμενα μεταβληθῶν εἰς σάπωνα. Πρὸς κατασκευὴν τούτου τοῦ ὀξέος κατεργάζεται ὁ δι' ἐλαίου τοῦ λίνου, ἡ καννάβεως, διὰ καλίου κατασκευασθεὶς σάπων μὲ ψυχρὸν λειψυδρον οἶνόπνευμα, τὸ ὅποιον

διαλύει ἐξ αὐτοῦ τὸ ἐλαιῶδες κάλιον, χωρὶς διόλου νὰ διαλύῃ τὸ στεατίνον. Τὸ διυλιζόμενον διάλυμα ἐξατμίζεται, καὶ ἀφοῦ συμμιχθῇ μὲ ὕδωρ, προστίθεται εἰς αὐτὸ ζέον ἀκόμη τρυγικὸν ἢ ἀλικὸν ὀξύ. Τὸ δι' αὐτῶν ἀποχωριζόμενον ἐλαιῶδες ὀξύ, συνάγεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ὡς κίτρινον ἐλαιον. Τὸ ἐλαιῶδες ὀξύ δύναται νὰ κατασκευασθῇ, καὶ ἐκ τοῦ κραιοῦ σάπωνος, ἀποσυντιθεμένου δηλαδὴ δι' ἀλικοῦ ὀξέος· τὰ τοιοῦτοτρόπως ἀποχωριζόμενα καὶ μὲ ζέον ὕδωρ ἀποπλυνόμενα ὀξέα, τὸ ἐλαιῶδες δηλ. καὶ στεατίνον ὀξύ, διαλύονται εἰς ἰσοβαρὲς ζέοντος οἰνοπνεύματος. Μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τοῦ διαλύματος χωρίζεται τὸ ἐλαιῶδες ὀξύ ἀπὸ τὸ στεατίνον διὰ τῆς ἐκθλίψεως.

Τὸ ἐλαιῶδες ὀξύ εἶναι ὥχρον καὶ ταγγίζον τὴν γεῦσιν καὶ ὀσμὴν. Ὀλίγους βαθμοὺς ὑπὸ τὸ 0 πῆγνυται εἰς εἶδος βελονῶν. Κοκκινίζει τὸ τοῦ καγκαμίνου ἔμβρεγμα καὶ δύναται νὰ ἐξαχνισθῇ διὰ τῆς θερμότητος κατὰ μέγα μέρος. Εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύεται δὲ εἰς οἶνόπνευμα 0,822 εἰδικῆς βαρύτητος. Διαλελυμένον εἰς τὸ οἶνόπνευμα καταβυθίζεται διὰ τοῦ ὕδατος, καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον δύναται νὰ καθαρισθῇ ἀπὸ τὴν βαφικὴν κιτρίνην ὕλην. Διὰ τῆς πυρώσεως εἰς τὸν ἀέρα ἀναφλέγεται καὶ καίει καθὼς τὸ στέαρ. Ἕχει 0,898 εἰδικὴν βαρύτητα καὶ ἐμπεριέχει 3—8 μέρη ὕδατος. Εἰς λεῖψυδρον κατὰστατιν σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	81, 32
Ὄξυγόνου	7, 59
Ἵδρογόνου	11, 09

100.

Αἱ ενώσεις τοῦ ἐλαιώδους ὀξέος μὲ τὰς βάσεις διακρίνονται εὐκόλως ἀπὸ τὰς τῶν στεατίνων ἀλάτων· τὰ ἐλαιώδη ἄλατα εἶναι ὀλίγον κρυσταλλώσιμα, πλέον διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἶνόπνευμα παρὰ τὰ στεατίνα, καὶ κατασκευάζονται διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ εἰρημένου ὀξέος εἰς τὰς διαφόρους βάσεις ἢ διὰ τῆς διπλῆς ἀποσυνθέσεως λ. χ. διὰ ἀποσυνθέσεως τῆς ἐλαιώδους ποτάσεως διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ χαλκοῦ ἢ σιδήρου.

Διὰ τῆς ἀποστάξεως τῆς ἐλαιώδους τιτάνου ἐξάγεται ἐλαιὸν τι ἰδιαιτέρον *Oleon* λεγόμενον.

Ἡ βάση τοῦ ἐλαιώδους ὀξέος καλεῖται *Olein*, ἥτις ἀπολαμβάνεται ἐὰν λίπος τι διαλυθῇ εἰς ζέον οἶνόπνευμα, ἐκ τοῦ ζέοντος διαλύματος

ἐναποτίθεται μετὰ τὴν ἀπόφυξιν ἡ στεατώδης ὕλη, ἐνῶ ἡ ἐλαιώδης Olein μένει διαλελυμένη. Ἡ ἐλαιώδης αὕτη ὕλη ὑπόκειται εἰς διαφόρους ἀποσυνθέσεις διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν διαφόρων ὀξέων. Ἐάν λ. χ. ἐλαία κατὰ μέγα μέρος ἐξ ἐλαιώδους ὕλης συνιστάμενα κατεργασθῶσι διὰ τοῦ νιτρικοῦ καὶ νιτρώδους ὀξέος τὰ ἐλαία πηγνυνται καὶ κιτρινίζουν· ἐάν τὸ κίτρινον τοῦτο μίγμα διαλυθῇ εἰς ζέον οἰνόπνευμα 0,833 εἰδικῆς βαρύτητος χρωματίζεται αὐτὸ κίτρινον, καὶ ἐκ τοῦ διαλύματος ἀποτίθενται ἀγγίδες τεφρόχρους, καλούμεναι *ἐλαϊδίνη* *Elaidin*.

Ἡ ὕλη αὕτη ἐάν μεταβληθῇ εἰς σάπωνα διὰ τοῦ καυστικοῦ νάτρου μεταβάλλεται εἰς ἰδιαιτέρον ὀξύ λεγόμενον *ἐλαϊδινικόν*.

Τὸ ἐλαιῶδες ὀξύ σχηματίζει μετὰ τοῦ ὕδρογόνου ἰδιαιτέρον ὀξύ *ὕδρελαιῶδες ὀξύ* καὶ μετὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος τὸ *θειελαιῶδες ὀξύ*. Ἐάν τὸ *ὕδρελαιῶδες ὀξύ* καθὼς τὸ ἐλαϊδινικόν ἢ καὶ τὰ ἅλατά των συνεχῶς ἀποστάζωνται ἐλαϊὰ τινα ἀπολαμβάνονται καλούμενα *Elaen* καὶ *Oleen* τὰ ὅποια ἐνοῦνται μετὰ τοῦ χλωρίου καὶ ἄλλων στοιχείων πρὸς ἰδιαιτέρας ἐνώσεις.

Χρῆσις. Ἡ χρῆσις τῶν στεατικῶν ὀξέων εἶναι τὴν σήμερον ἀρκετὰ ἐκτεταμένη πρὸς κατασκευὴν λαμπάδων ψευδῶς καλουμένων τοῦ *Spermacete* αἵτινες κατασκευάζονται δὲ ὡς ἐξῆς. Τὸ προβάτιον καὶ βόειον στέαρ διὰ συνεχοῦς ζέσεως, ἢ διὰ διόδου ἀτμῶν μεταβάλλεται διὰ τῆς καυστικῆς τιτάνου εἰς μαργαρώδη καὶ στεατώδη τίτανον. Τὰ ἅλατα ταῦτα ἀκολούθως ἀποχωρίζονται διὰ θειικοῦ ὀξέος κεκραμένου, καὶ τὰ εἰς τὴν θέρμην εἰς ῥευστὴν κατάστασιν ἐπιπολάζοντα ὀξέα ἀποπλυνόμενα καλῶς δι' ὕδατος, ἀφίονται εἰς ψύχος πρὸς κρυστάλλωσιν τοῦ στεατινοῦ ὀξέος, τὸ ὅποιον ἐκθλιβόμενον ἀπὸ τὸ μὴ κρυσταλλώσιμον ἐλαιῶδες ὀξύ, τήκεται καὶ ἐγχύνεται εἰς τύπους ἐντὸς τῶν ὁποίων εὐρίσκονται αἱ θρυαλλίδες. Τοιαῦται λαμπάδες φαίνονται ὑποδιαφανεῖς, λευκότεραι καὶ εἶναι καλλήτεραι τῶν ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ κήτους (*Spermaceti*)· τὸ δὲ ἀποχωριζόμενον ἐλαιῶδες ὀξύ μεταβάλλεται ἀκολούθως διὰ ζέσεως μὲ νάτρον εἰς μαλακὸν τινα σάπωνα χρήσιμον πρὸς πλύσιν.

Σάπωνες.

Οἱ σάπωνες εἶναι μίγματα ἐλαιῶδων καὶ στεατικῶν ὀξέων κατὰ διαφόρους ἀναλογίας. Ὅσον περισσότερον στεατικὸν ὀξύ σχηματίζεται ἐκ τοῦ μεταχειριζομένου στέατος, τόσον στερεώτερος γίνεται ὁ σάπων· ὅσον δὲ περισσότερον ἐλαιῶδες ὀξύ, τόσον μαλακώτερος· ἐκείνοι μόνον

τῶν ὁποίων ἡ θάσις εἶναι ἀλκαλοειδὴς διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ· ἐκ τῆς ἐνώσεως τῶν λιπαρῶν ὀξέων μὲ τὰς ἀλκαλικὰς θάσεις ἀποτελοῦνται δύο εἶδη σαπῶνων μαλακοὶ καὶ στερεοί. Τὸ νάτρον δίδει ἐν γένει στερεοὺς σάπωνας, τὰ δὲ κυρίως λιπαρὰ ἔλαια, καθὼς τὸ ἔλαιον τῶν ἐλαίων καὶ τὰ λοιπὰ ζωϊκὰ στέατα, σκληροτέρους σάπωνας παρὰ τὰ ξηραίνόμενα ἔλαια, καθὼς τὸ ἔλαιον τοῦ λίνου, τῶν καρῶν καὶ τῆς καννάβεως. Ὄθεν μαλακώτατοι σάπωνες εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι ὁλοκλήρως σύγκεινται ἐξ ἐλαϊώδους καλίου, σκληρότατοι δὲ οἱ ἐκ στεακτίνου νάτρου συγκείμενοι. Κοινῶς διαίρουσιν οἱ σάπωνες κατὰ τὴν σύστασιν εἰς δύο κύρια εἶδη, ξηροὺς ἢ λευκοὺς καὶ μαλακοὺς ἢ πρασίνοὺς. Ὁ ξηρὸς σάπων κατασκευάζεται εἰς τὴν Ἰταλίαν, τὴν Γαλλίαν, τὴν Ἰσπανίαν καὶ τὴν Κρήτην ἐκ τοῦ κοινοῦ ἐλαίου, εἰς δὲ τοὺς βορείους τόπους, καθὼς εἰς τὴν Γερμανίαν, τὴν Ἀγγλίαν κ.τ.λ. μάλιστα ἐκ τοῦ προβατείου ἢ τοῦ χοιρείου στέατος διὰ τοῦ νάτρου.

Σάπωνες διὰ νάτρου ἢ σκληροὶ σάπωνες.

Δι' ἀρκετοῦ ὕδατος κεκραμένον καυστικὸν νάτρον βάλλεται εἰς εὐρύχωρον χάλκινον λέβητα, καὶ ἀφοῦ προστεθῇ κατὰ μικρὸν ὀλίγον κοινὸν ἔλαιον ζέσται ἀδιακόπως ἀνακινούμενον τὸ μίγμα. Ἡ ἐνωσις γίνεται μετ' ὀλίγον καιρὸν ὑπὸ τὸν σχηματισμὸν εἶδους τιῶς γαλακτώματος. Ἀκολούθως προστίθεται συνεχῶς καὶ κατὰ μικρὸν διάλυσις νάτρου καὶ ἔλαιον· ἡ μάζα εἶναι ἀνάγκη νὰ μένῃ πάντοτε παλτώδης καὶ ὁμογενής, δηλ. μήτε νὰ ἀποτίθεται εἰς τὸν πυθμένα τοῦ λέβητος ἀλousία, μήτε νὰ ἐπιπλῇ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἔλαιον· ἀφοῦ προστεθῇ ὅλον τὸ ποσὸν τοῦ ἐλαίου εἰς τὸν λέβητα, προστίθεται κατ' ὀλίγον πυκνότερα διάλυσις νάτρου, δι' ἧς σχηματίζεται ἐντελῶς ὁ σάπων, ὁ ὁποῖος κατ' ὀλίγον συνάζεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Ἡ ἐπιμένουσα ἀλousία δὲν χρησιμεύει πλέον εἰς τὴν σαπωνοποιάν καὶ ἐμπεριέχει οὐδέτερα ἄλατα, ὀλίγον ἀνθρακικὸν καὶ καυστικὸν νάτρον καὶ τὴν γλυκεῖαν ὕλην τοῦ Scheele κτλ. Μετὰ τὴν ἀπόσβεσιν τοῦ πυρὸς μεταγγίζεται ἡ ἀλousία καὶ ὁ σάπων ἐπιμένει σχεδὸν ξηρὸς. Ἀκολούθως ἐπιχύνεται νέα ἀλousία ἐπὶ τοῦ σάπωνος, καὶ ἀφοῦ ἀναρθῇ πάλιν τὸ πῦρ, προστίθεται κατὰ μικρὸν περισσοτέρα ἀλousία παρὰ ὅση ἀπαιτεῖται πρὸς διάλυσιν τοῦ ἐλαίου. Ὁ οὕτω σχηματισθεὶς σάπων χυνόμενος εἰς τύπους ἀποξηραίνεται. Διὰ τὴν σαπωνοποιάν δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ἀντὶ τοῦ νάτρου ἡ διάλυσις τοῦ καλίου· πρέπει δὲ νὰ προσε-

θῆ ὥρισμένον ποσὸν λειοτριβημένου ἄλικου νάτρου (κοινοῦ ἄλατος), διὰ τοῦ ὁποίου ἀποσυντίθεται ὁ διὰ τοῦ καλίου σχηματισθεὶς σάπων, εἰς σάπωνα διὰ νάτρου καὶ εἰς ἄλικόν κάλιον, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται εἰς τὴν ἐπιμένουσαν ἁλουσίαν διαλελυμένον.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι λευκός, ἔχει ἰδιαιτέραν ὁσμὴν, εἶναι βαρύτερος τοῦ ὕδατος, ὀλίγον ἀλκαλοειδὴς τὴν γεῦσιν, εἰς λεπτὰ τμήματα διαφανὴς καὶ μεταβάλλει τὸ χρῶμα τοῦ τῆς κροκοφύλλης χάρτου εἰς ἐρυθρόφαιον. Τήκεται εἰς τὸ πῦρ, ἐξοιδαίνεται καὶ ἀποσυντίθεται· εἰς τὸν ἀέρα ἀποξηραίνεται χωρὶς νὰ σκεπασθῇ μὲ ἀλατώδη ὑμένα εἶναι πλέον εὐδιάλυτος εἰς τὸ ζέον παρά εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ. Ἡ διάλυσις θολοῦται σχεδὸν δι' ὅλων τῶν ὀξέων, ἐπεὶδὴ αὐτὰ ἐνούμενα μὲ τὸ νάτρον ἀποχωρίζουν τὸ ἐλαϊώδες καὶ τὸ στεάτινον ὀξύ. Ἀποσυντίθεται σχεδὸν δι' ὅλων τῶν ἀλάτων τῶν τοῦ νάτρου καὶ τοῦ καλίου, διότι τὸ ὀξύ τοῦ ἄλατος ἐνοῦται μὲ τὸ νάτρον, ἡ δὲ βάσις τοῦ ἄλατος μὲ τὰ λιπαρὰ ὀξέα. Ἔνεκα τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ σάπωνος διὰ τῶν ουδέτερων ἀλάτων εἶναι ὄχι μόνον τὸ καλούμενον σκληρὸν ὕδωρ, ἀλλὰ καὶ τὸ θαλάσσιον ἄχρηστον πρὸς πλύσιν. Εἰς τὸ θαλάσσιον καὶ τὸ σκληρὸν ὕδωρ δύναται νὰ διαλυθῇ ὁ σάπων, εἰάν προστεθῇ νάτρον, δι' οὗ ἀποχωρίζεται ἱζημα ἐκ τιτάνου καὶ μαγνησίας. Τὰ ἱαματικά ὕδατα ἀποσυνθέτουν τοὺς σάπωνας ἐξ αἰτίας τοῦ εἰς αὐτὰ ἐμπεριεχομένου ἀνθρακικοῦ ὀξέος.

Ὁ σάπων εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ οἰνόπνευμα, καὶ μάλιστα εἰς τὸ ζέον· ἡ ὅσον ἔνεστι πυκνὴ διάλυσις μεταβάλλεται μετὰ τὴν ψύξιν εἰς πηκτὴν, ἥτις εἶναι διαφανὴς ὅταν μεταχειρισθῇ σάπων διὰ στέατος. Διάφορα εἶδη σκληρῶν σαπώνων εὐρίσκονται ἀγοραῖα. 1) Ὁ λευκός, ἡ ὁ καλούμενος *ισπανικὸς* ἡ *κρητικὸς* σάπων, κατασκευάζεται ἐκ κοινοῦ ἐλαίου καὶ νάτρου, 2) Ὁ πεποικιλμένος κατασκευάζεται ὑπὸ τὸ ὄνομα σάπων τῆς Βενετίας ἐκ κοινοῦ ἐλαίου καὶ νάτρου, ἐμπεριέχει δὲ οὗτος καὶ ἔνθειον σίδηρον διαλελυμένον, ἐπεὶδὴ συμμιγνύεται μὲ θεικὸν σίδηρον διὰ τοῦ ὁποίου, ἀποχωριζομένου τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀποτελοῦνται αἱ πεποικιλμέναι φέδες. 3) Ὁ σάπων διὰ στέατος κατασκευάζεται εἰς ὅλην τὴν Γερμανίαν ἐκ τοῦ προβατείου στέατος, εἶναι λευκός, σκληρὸς καὶ μεταχειρίζεται συχνότατα πρὸς πλύσιν τῶν λινῶν ὑφασμάτων. 4) *Διαγαγεῖς* σάπωνες κατασκευάζονται διὰ στέατος τῶν νεφρῶν καὶ καθαρωτάτου νάτρου· διαλύονται ταῦτα εἰς ζέον οἰνόπνευμα καὶ ἀφοῦ ἡ διάλυσις διύλισθῇ ἐξατμίζεται καὶ χύνεται εἰς τύπους.

Πρὸς ἱατρικὴν χρῆσιν κατασκευάζονται σάπωνες ἐκ 2 μερῶν ἀμυγδα-

λίνου ελαίου και 1 μέρους αλουσίας τοῦ νάτρου. Ὡσαύτως κατασκευάζονται σάπωνες ἐκ τοῦ φοινικικοῦ ελαίου και τοῦ καυστικοῦ νάτρου.

Ὁ ἀμυγδαλινος σάπων κατασκευάζεται, ἐὰν ἴσῃ ποσότης σάπωνος δι' ελαίου και σάπωνος διὰ στέατος διαλυθῶσιν εἰς ἓν μέρος γαλακτώματος ἐκ πικρῶν ἀμυγδάλων και ῥοδίνου ὕδατος.

Σαπωνώδεις σφαῖραι κατασκευάζονται, ἐὰν σάπων ἀναμιχθεῖς με' ὀλίγον ὕδωρ ταχῆ διὰ πύργου πυρὸς, και προσθεθέντος ἀμύλου τὸ μίγμα πλασθῇ εἰς σφαῖρας. Οἱ σάπωνες δύνανται νὰ ἀποκατασταθῶσιν εὐοσμοὶ διὰ τῆς προσθήκης διαφόρων πτητικῶν ελαίων.

Μαλακοὶ σάπωνες.

Οἱ μαλακοὶ σάπωνες ἔχουν βάσιν τὸ κάλιον και κατασκευάζονται διὰ τινος ελαίου λιπαροῦ ξηρανομένου, και διὰ τοῦτο σύγκεινται κατὰ τὸ πλεῖστον ἐξ ελαιώδους καλίου. Ὁ πράσινος ἢ ὁ γλίσχρος και ἰζώδης σάπων ἀπολαμβάνεται ἐκ τοῦ ξηρανομένου και ὀλίγην στεατίνην ὕλην ἐμπεριέχοντος ελαίου τῆς καννάβεως και ἐκ καλίου, εἰς τὸ ὅποιον πολλάκις προστίθεται και ἰνδικὸν διὰ νὰ λάβῃ πράσινον χρῶμα. Μετ' ὀλίγον καιρὸν χωρίζονται ἐκ τοῦ πρασίνου σάπωνος λευκοὶ χονδρώδεις κρύσταλλοι τοῦ ἀλικοῦ καλίου. Ὁ πράσινος σάπων ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ ελαιώδους καλίου σχεδὸν ὅλα τὰ εἰς τὴν ἀκάθαρτον αλουσίαν ἐμπεριέχοντα ἄλατα, τὴν σχηματιζομένην γλυκεῖαν ὕλην και ὀλίγον ποσὸν ἐλευθέρου καλίου. Διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ ἐκτὸς τῶν εἰς αὐτὸ ἐτερογενῶν ἀλάτων και εἰς τὸ οἰνόπνευμα· σύγκειται ἐκ

Καλίου	9, 5
Λιπαρῶν ὀξέων	44, 0
Ὑδατος	46, 5

100.

Οἱ διὰ καλίου και νάτρου σάπωνες μεταχειρίζονται συχνότατα μάλιστα πρὸς πλύσιν και γνάψιν τῶν λινῶν ὑφασμάτων, καθὼς και πρὸς ἱατρικὴν χρῆσιν· ὁ μαλακὸς σάπων ὡς πλέον εὐδιάλυτος και πλέον ἀλαλοειδὴς ἀπὸ τὸν σκληρὸν σάπωνα μεταχειρίζεται πρὸς κάθαρσιν χονδρῶν ὑφασμάτων, ὁ δὲ σκληρὸς πρὸς πλύσιν τῶν λεπτῶν λινῶν τῆς βύσσου και τοῦ μεταξίου.

Ὁ σάπων μεταχειρίζεται πρὸς πλῆσιν διὰ τὰς ἐξῆς δύο ιδιότητας· 1) διότι διαλύει τὰς λιπαρὰς ὕλας ἐκ τῶν ὑφασμάτων, καὶ τὰς ἀποκατασταίνει διαλυτὰς εἰς τὸ τοῦ σάπωνος διάλυμα· 2) διότι ἀφίνει εὐκόλως μέρος τοῦ ἀλκαλίου του, τὸ ὁποῖον διαλύει τοὺς ρύπους ἐκ τῶν ὑφασμάτων καὶ τοὺς ἀποχωρίζει. Ἐνεκα δὲ τῆς κατὰ μικρὸν ἀποβολῆς τοῦ ἀλκαλίου μεταβάλλεται ὁ σάπων εἰς ὀξινὸν ἢ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτον στεάτινον ἀλκάλιον, τὸ ὁποῖον διὰ συνεχοῦς πλύσεως ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὰ ὑφάσματα. Ἡ κατὰ μικρὸν ἀποχώρησις τῶν ἀλκαλίων ἐκ τῶν σαπώνων εἶναι προτιμητέα ἀπὸ τὴν χρῆσιν τῶν ἀλκαλίων, τὰ ὅποια ἀφ' ἑαυτοῦ των μόνον δὲν εἶναι τόσον ἐπιτήδεια πρὸς κάθαρσιν τῶν λίνων, ὅσον οἱ σάπωνες· ἐπειδὴ τὰ ἀνθρακικὰ ἀλκάλια διαλύουν ὀλίγον μόνον τὰς λιπαρὰς καὶ ρυπαρὰς ὕλας, τὰ δὲ καυστικὰ ἀλκάλια βλάπτουν σημαντικὰ διὰ τῆς συνεχοῦς ἐπιφόρης των τὰ ὑφάσματα. Τὰ ἀνθρακικὰ ἀλκάλια, ἐὰν εἰς μεγάλην θερμοκρασίαν ἐκτεθῶσιν εἰς ὕδατώδεις ἀτμούς, τότε ἀποβάλλουσι τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ δύνανται νὰ χρησιμεύσωσιν ἀντὶ τοῦ σάπωνος.

Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν τὰ μὲ ἀνθρακικὸν νάτρον βεβρεγμένα λινὰ ὑφάσματα ἐκτίθενται εἰς θερμούς ἀτμούς τοῦ ὕδατος· τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ ἐξάγεται κατὰ μικρὸν ἐκ τοῦ νάτρου, τὸ ὁποῖον ἐνεργεῖ ἐπ' αὐτῶν ὥς καὶ τὸ διάλυμα τοῦ σάπωνος, σχηματίζον μὲ τὸ εἰς τὰ λινὰ ἐμπεριεχόμενον λίπος καὶ μὲ τὰς ἄλλας ρυπαρὰς ὕλας εὐδιάλυτόν τινα ἔνωσιν.

Γαϊώδεις καὶ μεταλλικοὶ σάπωνες.

Οἱ διὰ τιτάνου, βαρείας καὶ στρουτιανῆς σάπωνες ἀποτελοῦνται, ἐὰν διάλυμα τοῦ σάπωνος ἀναμιχθῇ μὲ τὰς ἐνώσεις τῶν ῥηθειῶν γαιῶν δι' ἀλικοῦ ὀξέος· οὕτως ἀποτελοῦνται λευκὰ ἰζήματα ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Ὁ σάπων διὰ μαγνησίας γίνεται κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, διαφέρει δὲ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διότι τίθεται διὰ πρᾶου πυρὸς καὶ σχηματίζει μετὰ τὴν φύξιν μάζαν διαφανῆ, εὐθρυπτον καὶ διαλυτὴν εἰς τὰ λιπαρὰ ἔλαια καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Ὁ σάπων διὰ ψευδαργύρου δύναται νὰ κατασκευασθῇ διὰ τῆς μίξεως τοῦ θεϊκοῦ ψευδαργύρου μὲ διάλυμα τοῦ σάπωνος· οὕτω κατακρηνίζεται μάζα ὡχρόλευκος, ταχέως ξηραίνομένη καὶ εὐθρυπτος. Ἐὰν ζέωνται 2 μέρη ὀξειδωμένου ψευδαργύρου μὲ 3 μέρη χοιρείου στέατος, ἀποτελεῖται σάπων, ὅστις μετὰ τὴν 100° γίνεται ῥευστός.

Τὰ ἄλατα τοῦ μαγγανησίου, βισμούθου, ὕδραργύρου, καὶ ἀργύρου καταβυθίζονται διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ σάπωνος μὲ λευκὸν χρῶμα.

Ὁ σάπων διὰ χαλκοῦ, ὁ ὁποῖος κατακρημνίζεται διὰ τῆς ἐνώσεως διαλελυμένου ἁλτός τινος τοῦ χαλκοῦ μετὰ διαλύματος τοῦ σάπωνος, εἶναι, πράσινος, μετὰ τὴν ἀποξήρανσιν εὐθρυπτος, εὐκτῆτος καὶ διαλυτὸς εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὰ λιπαρὰ ἔλαια.

Οἱ K. K. Thenard καὶ ὁ Arcet ἐπρότειναν ὅτι ὁ διὰ τοῦ χαλκοῦ σάπων δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς πράσινον χρωματισμὸν τῶν ἐκ γύψου ἀναγλύφων.

Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἀποσυντίθεται ὁ διὰ λινελαίου καὶ καυστικῷ νάτρου κατεσκευασμένος σάπων διὰ τινος διαλύματος συνισταμένου ἐκ 4 μερῶν θειικοῦ χαλκοῦ καὶ 1 θειικοῦ σιδήρου. Ἀφοῦ ἀποπλυθῇ καὶ ξηρανθῇ ὁ κατακρημνισθεὶς σάπων διαλύονται 16 μέρη αὐτοῦ εἰς 30 μέρη γανώματος, τὸ ὁποῖον κατασκευάζεται ἐὰν 4 μέρη λινελαίου καὶ 1 μέρος λιθαργύρου ἀναζεσθῶσιν, καὶ μετὰ τὴν διάλυσιν προστεθῶσι 10 μέρη κηροῦ. Μὲ ταύτην τὴν μάζαν ἀλείφονται τὰ μέρη τοῦ μέχρι 90° θερμαινομένου ἐκ γύψου ἀναγλύφου· ὁ γύψος λαμβάνει δι' αὐτῆς ὀρειχάλκινον χρῶμα καὶ μάλιστα ἐὰν πρότερον τὰ ἀντικείμενα ἐντριφθῶσι μὲ μωσαϊκὸν χρυσὸν (ἐνθεῖον κασσίτερον). Τὰ οὕτως ἀλειμμένα ἀνάγλυφα δὲν μεταβάλλονται μήτε διὰ τῆς ἐπιβροῆς τοῦ ἀέρος μήτε διὰ τῆς τοῦ ὕδατος.

Ὁ διὰ μολύβδου σάπων καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ σάπωνος διὰ ὀξικοῦ μολύβδου, εἶναι μάζα λευκὴ, γλίτχρα, κολλώδης διὰ τῆς θερμότητος, καὶ διαφανὴς εἰς τετηγμένην κατὰστασιν.

Τὸ διὰ λιθαργύρου ἔμπλαστρον *Emplastrum diachylon* κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον· 9 μέρη ἐλαίου θερμαίνονται εἰς χάλκινον λέβητα εὐρὺν μέχρι ἀναζέσεως καὶ ἔπειτα προστίθενται κατ' ὀλίγον 5 μέρη λειοτάτου λιθαργύρου. Ἀνακινοῦνται δὲ αὐτὰ ἀδιακόπως καὶ προστίθεται κατὰ μικρὸν θερμὸν ὕδωρ, ἀκολούθως ἐξατμίζεται ἡ μάζα μέχρι συστάσεως ἔμπλαστρου τοιοῦτου, ὥς ἐν μέρος αὐτοῦ τεθῇ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ νὰ γίνεται μαλακὸν ὥς ὁ κηρὸς καὶ νὰ μὴ προσκολλᾶται εἰς τοὺς δακτύλους. Τὸ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον σχηματιζόμενον ἔμπλαστρον εἶναι ὠχρόλευκον, εὐθρυπτον εἰς τὸ ψῦχος, σκληρότατον μετὰ καιρὸν, μαλακοῦται δὲ διὰ πρξου πυρὸς καὶ δύναται νὰ ἐπαλειφθῇ. Εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ὀλίγον μόνον διαλυτὸν εἰς τὸ οἶνόπνευμα· ξηραίνόμενα ἔλαια, καθὼς τὸ ἔλαιον τοῦ λίνου, τῆς καννάβεως καὶ τοῦ μήκωνος δὲν σχηματίζουν μὲ τὸν λιθαργύρον σκληρὸν ἔμπλαστρον.

Εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ἐμπλάστρου μεταβάλλεται τὸ ἔλαιον διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ λιθαργύρου καὶ τοῦ ὕδατος καθὼς καὶ διὰ τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων εἰς λιπαρὰ ὀξέα, σχηματίζονται δηλαδὴ ἐλαιῶδες καὶ στεάτινον ὀξύ, τὰ ὁποῖα ἐνόνονται μὲ μεγάλην ποσότητα ὀξειδωμένου μολύβδου ὑδρομιγοῦς καὶ συγχρόνως σχηματίζεται καὶ ἡ γλυκεῖα ὕλη τοῦ Scheele ἢ ὁποῖα διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ δίδουσα εἰς αὐτὸ ζαχαρώδη γεῦσιν. Ἡ μικρὰ ποσότης ὀξειδωμένου μολύβδου ἢ ὁποῖα διαλύεται εἰς τὸ ὑγρὸν, δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἀπ' αὐτὸ διὰ τοῦ ὑδροθεικοῦ ὀξέος. Ἐκ τούτου ἔπεται ὅτι τὸ διὰ λιθαργύρου ἐμπλαστρον πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἐλαιῶδες καὶ στεάτινον ἅλως μὲ ὑπερτεροῦν ὀξειδιον τοῦ μολύβδου, διαφέρον δὲ ἀπὸ τὸ οὐδέτερον ἅλως τὸ ὁποῖον πορίζεται διὰ τῆς κατακρημνίσεως τοῦ διαλύματος τοῦ σάπωνος διὰ ὀξικοῦ μολύβδου, καθότι εἶναι ἀδιαφανές ἐὰν τηχθῇ, ἐνῶ ἐκεῖνο εἶναι διαφανές.

Αἰθέρια ἔλαια.

Τὰ πτητικὰ ἢ αἰθέρια ἔλαια, ἅτινα καὶ ἀπεσταγμένα ἔλαια καλοῦνται, εὐρίσκονται συχνάκις εἰς διάφορα μέρη τῶν φυτῶν καὶ μάλιστα τῶν βαρυόσμων· τινὰ π. χ. ἐμπεριέχουσι τὸ ἔλαιον εἰς τὰ ἄνθη, ἄλλα εἰς τὰ φύλλα ἢ εἰς τὸ ξύλον, εἰς τὸν φλοιὸν, εἰς τὴν ῥίζαν, εἰς τὰ σπέρματα κτλ. ἐνίοτε εἰς διάφορα μέρη τοῦ φυτοῦ ἀπαντῶνται διάφορα ἔλαια· ἡ Πορτογαλλία *Citrus aurantium* ἐμπεριέχει ἰδιαιτέρον ἔλαιον εἰς τὰ ἄνθη, ἄλλο εἰς τὰ φύλλα καὶ ἄλλο εἰς τὰ λεπίδια τοῦ περικαρπίου. Ὁ Κ. Boerhave ὑπέθεσε τὰ αἰθέρια ἔλαια συγκεῖμενα ἐξ οὐσίας τινὸς ῥητινώδους καὶ ἐξ ὕλης πολὺ πτητικῆς καὶ μόλις ἐπιδεκτικῆς σταθμίσεως, τὴν ὁποίαν ὠνόμασε *Aroma*, *Spiritus Rector* καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ἀπέδιδε τὴν ὁσμὴν τῶν περισσοτέρων ὀργανικῶν ὑλῶν. Τώρα ὅμως ἀπεδείχθη ὅτι ἡ ὁσμὴ τῶν φυτῶν προέρχεται ἀπὸ τὰ εἰς αὐτὰ ἐμπεριεχόμενα αἰθέρια ἔλαια, τὰ ὁποῖα μολυβδόχον ἅλως ὅμως σχηματίζονται καὶ διὰ τῆς αὐτομάτου ἀποσυνθέσεως τῶν ὀργανικῶν σωμάτων. Ἐὰν π. χ. τὰ φύλλα τῆς *Gentiana centauræa*, *Conium maculatum*, *Fumaria officinalis* κτλ. καὶ ἄλλων φυτῶν μὴ ἐμπεριεχόντων ἔλαιον βραχῶσι μὲ ὕδωρ καὶ ὑποβληθῶσιν εἰς ἀπόσταξιν, ἀπολαμβάνονται αἰθέρια ἔλαια. Καὶ τὰ οὕτω σχηματισθέντα ἔλαια ὡς προαχθέντα διὰ τῆς ζυμώσεως λέγονται *Fermentolea*, οὕτως τὸ ἐκ τοῦ *Fumaria* λέγεται *Fermentoleum fumariae* κ. τ. λ.

Τὰ περισσότερα εἰς τὰ φυτὰ εὐρίσκόμενα πτητικὰ ἔλαια ἐξάγονται διὰ

τῆς ἀποστάξεως. Πρὸς τοῦτο τὰ νεαρὰ ἢ τὰ ξηρὰ φυτὰ βάλλονται μετ' ὀκταπλοῦν ὕδωρ εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος καὶ ἐξακολουθεῖ ἡ ἀπόσταξις, ἐνὸς τοῦ ὕδωρ ἐμπεριέχει ἀκόμῃ ἔλαιον· ἐὰν τὸ ἔλαιον ᾖ ἐλαφρότερον τοῦ ὕδατος καὶ ἐπιπλέῃ ἐπ' αὐτοῦ, δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ διὰ τῶν συνήθως ἐν χρήσει χωνίων. Τὰ δὲ ἔλαια τὰ ὁποῖα εἶναι βαρύτερα τοῦ ὕδατος καὶ ἐπομένως δύναται νὰ συναχθῶσιν εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου ἀποχωρίζονται διὰ ἰδιαιτέρου τινὸς χωνίου· δύναται ὅμως νὰ ἀποκατασταθῇ τὸ ὕδωρ βαρύτερον καὶ ἀπὸ αὐτά, ἐὰν εἰς αὐτὸ διαλυθῇ ἄλας· μετ' ὀλίγον ἐπιπλέει τὸ ἔλαιον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ καὶ δύναται νὰ χωρισθῇ ὡς καὶ τὰ εἰδικῶς ἐλαφρότερα. Ἄν καὶ τὰ αἰθέρια ἔλαια δὲν ᾖναι τόσοι πτητικὰ καθὼς τὸ ὕδωρ, μ' ὅλον τοῦτο ἀποχωρίζονται διὰ τῶν ὑδατωδῶν ἀτμῶν καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διὰ τῆς φύξεως, τὸ δὲ ὕδωρ ἐμπεριέχει τόσοι μέρος αὐτοῦ, ὅσον δύναται νὰ διαλύσῃ.

Τινὰ αἰθέρια ἔλαια καὶ μάλιστα τὸ περγάμινον καὶ τὸ τῶν μηδικῶν μίλων ἀπολαμβάνονται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Οἱ καρποὶ περιστρέφονται εἰς χωνία τὰ ὁποῖα εἰς τὴν ἐσωτερικὴν τῶν ἐπιφάνειαν ἔχουν ἐξοχάς, τὸ δὲ ἐξαχόμενον ἔλαιον συναίχεται εἰς τὰς πρὸς τοῦτο φιάλας. Διάφορα βαρύσμηκα ἄνθη π. χ. τὰ τοῦ ἰασμίνου ἐμπεριέχουν ἔλαιον τόσοι πτητικόν, ὥστε δὲν δύναται νὰ ἐξαχθῇ μήτε διὰ τῆς ἐκθλίψεως· πρὸς κατασκευὴν τῶν λοιπῶν μεταχειρίζονται διάφορον τρόπον· ἀγγεῖα ἐκ κασσιτερωμένου σιδήρου κατεσκευασμένα πληροῦνται μετ' στιβάδας τοιούτων ἀνθέων τὰ ὁποῖα κεῖνται ἐπὶ ὑφασμάτων μαλλίνων μετ' ἀμυγδαλίον ἔλαιον θεβρεγμένων καὶ μετὰ ταῦτα καλῶς σκεπάζονται. Μετὰ 24 ὥρας ἐκβάλλονται τὰ ἄνθη καὶ ἀντικαθίστανται διὰ νεαρῶν· τοῦτο δὲ ἐπαναλαμβάνομεν ἑωσοῦ τὸ λιπαρὸν ἔλαιον ἀποκατασταθῇ ἀρκετὰ εὖοσμον· ἔπειτα τίθενται τὰ ὑφάσματα εἰς οἰνόπνευμα, καὶ ἀφοῦ ἐκπιεσθῶσιν ἀποσάζεται τοῦτο τὸ ἐξ οἰνοπνεύματος καὶ εὐδύμου ἐλαίου μίγμα διὰ ἐλαφροτάτου πυρὸς, δι' οὗ τὸ οἰνόπνευμα συναποσάζεται κεκορεσμένον μετ' αἰθέριον ἔλαιον εἰς τὸ δοχεῖον.

Χαρακτηριστικά, Ὅλα τὰ αἰθέρια ἔλαια εἶναι πτητικὰ ἔχουν δὲ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ὀσμήν σφοδράν, ἡδεῖαν καὶ ἀρωματικὴν, γεῦσιν δριμύειαν, ἐν γένει εἶναι λεπτόρευστα καὶ ὑγρά κατὰ τὴν σύστασιν, ὅχι δὲ γλίσχα· ἀποκαθιστῶσι τὸ δέρμα τραχὺ, εἶναι πολὺ διάφορα ὡς πρὸς τὸ χρῶμα· τὰ περισσότερα εἶναι κίτρινα ἢ ἄχρνα, καὶ τινὰ μόνον πράσινα, κόκκινα ἢ κυανὰ. Τὰ περισσότερα εἶναι εἰδικῶς ἐλαφρότερα ἀπὸ τὸ ὕδωρ· τινὰ δὲ καταβυθίζονται εἰς τὸ ὕδωρ, καθὼς τὸ ἔλαιον τῶν καρυοφύλλων,

τοῦ κινναμώμου, τῆς σμύρνας, τοῦ σασαφρίνου ξύλου, τοῦ κρόκου, τῆς κοχλεαρίδος, τοῦ σινάπεως, τοῦ σκορόδου κτλ.

Ἡ εἰδικὴ βαρύτης τῶν πτητικῶν ἐλαίων κεῖται μεταξὺ 0,847 καὶ 1,096· κἀνὲν τῶν αἰθερίων ἐλαίων δὲν θράζει ὑπὸ τὸν βαθμὸν τοῦ ζέοντος ὕδατος, τὰ περισσότερα ζέουσι μετὰ τὴν 160°, τινὰ δὲ χρειάζονται ἀκόμη ὑψηλοτέραν θερμότητα· δύνανται μὲν νὰ ἀποσπασθῶσιν ἀφ' ἐκυτῶν ἂν καὶ ἐν μέρει ἀποσυντίθενται καὶ προστιθεμένου ὕδατος ἀποσπάζονται χωρὶς νὰ μεταβληθῶσι. Ἀναφλέγονται εὐκόλως καὶ καίουν μὲ φλόγα πολὺ λαμπρὰν καὶ ἀσβολώδη.

Ἐὰν διοχετευθῶσι διὰ πεπυρωμένων φαρφουρίων σωλήνων, ἀποσυντίθεται ἐξ ὁλοκλήρου, ἐξ αὐτῶν σχηματίζονται καύσιμα ἀέρια καὶ ἐναποτίθεται εἰς τὸν σωλῆνα στιλπνὸς καὶ πορώδης ἀνθράξ.

Ἐὰν ἐκτεθῶσιν εἰς μικρὰν θερμοκρασίαν χάνουν ἐν μέρει τὴν ρευστὴν αὐτῶν σύστασιν καὶ στερεοῦνται κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον. Ἐκ τῶν ἐλαίων ἄλλα μὲν ἔχουν στερεὰν σύστασιν εἰς συνήθη θερμοκρασίαν, καθὼς τὸ ἔλαιον τῶν ρόδων τὸ τῆς ἱριδος ρίζης, τὸ τῆς ἐλενίου ρίζης κτλ. ἄλλα δὲ πῆγνυνται καὶ εἰς μεγαλύτερον ψῦχος καθὼς τὸ ἔλαιον τοῦ ἀνίσου καὶ τοῦ μαράθρου· διὰ τῆς ἐκθλίψεως δύναται νὰ χωρισθῇ ἐκ τοῦ πηχθέντος μέρους ρευστόν τι ἔλαιον. Ἐπειδὴ τὰ αἰθέρια ἔλαια ἔχουν ἐν γένει μεγάλην ὁμοιότητα μὲ τὰ λιπαρά, ἐνόμισάν τινες ὅτι σύγκεινται καθὼς καὶ τὰ λιπαρά ἐκ τοῦ στέχτος καὶ ἐκ ρευστοῦ τινος ἐλαίου καὶ διὰ τοῦτο ὠνόμασαν αὐτὰ ἀναλόγως τὸ μὲν στεαροπτήνην τὸ δὲ ἐλαιοπτήνην.

Ἐὰν τὸ διὰ τῆς ἀποψύξεως πεπηγμένον αἰθέριον ἐκθλιφθῇ μεταξὺ ἐμπορικῷ χάρτου ἐναποτίθεται ἡ στεαροπτήνη εἰς καθαρὰν κατάστασιν, ἡ δὲ ἀπὸ τὸν χάρτην ἀπορρόφηθεῖσα ἐλαιοπτήνη δύναται νὰ ἐξαχθῇ διὰ τῆς ἀποσταλάξεως τοῦ χάρτου μὲ ὕδωρ. Πολλὰ αἰθέρια ἔλαια ἐναποθέτουσι μετὰ καιρὸν ὀλίγην στεαροπτήνην εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἀγγείου· καὶ ἡ τοιαύτη στερεὰ μάζα ὠνομάσθη καφουρά, μόνον ὅτι δὲν ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς. Τὰ αἰθέρια ἔλαια ἀποκαθίστανται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος πυκνότερα καὶ βαθύχροα, χάνουσι τὴν ὁσμὴν των καὶ τέλος μεταβάλλονται εἰς ῥητινώδη μάζαν, ἐπειδὴ ἀπορροφῶν ὀξυγόνον ἐκ τοῦ ἀέρος καὶ ἐκλύουν ὀλίγον ἀνθρακικὸν ἀέριον, χωρὶς νὰ σχηματίζωσι ὕδωρ. Κατὰ τὸν K. Saussure νεαρόν ἔλαιον τοῦ φυτίου ἀπορρόφᾷ μετὰ 4 μῆνας τόσον ὀξυγόνον ὥστε ὁ ὄγκος του γίνεται 52 μεγαλύτερος καὶ σχηματίζει ἀντ' αὐτοῦ ἓνα ὄγκον μόνον ἀνθρακικοῦ ἀερίου· ἔλαιον τὸ ὁποῖον ἔγινε παχύρρευστον διὰ τοῦ ἀέρος, ἐμπεριέχει ῥητίνην διαλυμένην, ἡ ὁποία

δύναται νὰ χωρισθῇ διὰ νέας ἀποστάξεως· διὰ τοῦτο τὰ αἰθέρια ἔλαια πρέπει νὰ φυλάττωνται εἰς ἀγγεῖα καλῶς κλεισμένα καὶ εἰς σκοτεινὸν μέρος.

Τὰ αἰθέρια ἔλαια ἂν ἀναμιχθῶσι μὲ ὕδωρ, διαλύονται ὀλίγον εἰς αὐτὸ καὶ μεταδίδουν τὴν ὁσμὴν καὶ τὴν γεῦσίν των. Τὰ σταλάγματα *Aquae destillatae* εἶναι διαλύσεις ἐλαίου αἰθερίου ἐξαχθέντος διὰ τῆς ἀποστάξεως φυτοῦ τινος ἀρωματικοῦ καὶ ὕδατος.

Τὰ νεαρὰ ἀποσταλάγματα ἔχουν ὁσμὴν ἐμπυρευματικὴν, ἡ ὁποία ὅμως χάνεται μετ' ὀλίγον, ἐὰν φυλάττωνται εἰς λαγνούς ἐλαφρῶς κλεισμένας εἰς ψυχρὸν καὶ σκοτεινὸν μέρος· μετὰ καιρὸν δὲ φθείρονται καὶ μάλιστα ὅταν ᾖναι ἐκτεθειμένα εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ φωτός καὶ τοῦ ἀέρος καὶ τὸ εἰς αὐτὰ διαλελυμένον ἔλαιον μεταβάλλεται εἰς ρητίνην, ἥτις προσάγεται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Τινὰ ἀποσταλάγματα ἐμπεριέχουν ἴχνη ὀξικοῦ ὀξέος, ἄλλα ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας καθὼς π. χ. τὸ τῆς φιλυρίας, τὸ τοῦ ὑσσώπου, τὸ τῆς θριδακίνης κτλ.

Τὰ αἰθέρια ἔλαια εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ οἶνόπνευμα μάλιστα εἰς τὸ λείψυδρον. Δι' αὐτῶν τῶν διαλυμάτων γίνονται τὰ εὖοσμα ὑγρὰ καθὼς *Eau de cologne*, *Eau de Lavande* καὶ ἐν γένει τὰ οἶνοπνευματώδη ἀρωματικά ὕδατα.

Τὰ μὲ οἶνόπνευμα μεμιγμένα αἰθέρια ἔλαια θολοῦνται διὰ τοῦ ὕδατος τὸ ὁποῖον ἐνόνεται μὲ τὸ οἶνόπνευμα καὶ οὕτως ἀποχωρίζεται τὸ ἔλαιον. Διὰ νὰ γνωρισθῇ ἡ νόθευσις αὕτη καλῆτερα καθὼς καὶ τὸ ποσὸν τοῦ μετὰ τοῦ ἐλαίου ἀναμεμιγμένου οἶνοπνεύματος, συμμιγνύεται τὸ ἐξεταζόμενον ἔλαιον μὲ ὕδωρ εἰς ὑέλινον σωλῆνα διηρημένον εἰς βαθμούς· ἐὰν τὸ ἐξεταζόμενον ἔλαιον ἐμπεριέχῃ οἶνόπνευμα, τὸ μετρούμενον ὕδωρ κατέχει μεγαλύτερον ὄγκον, τὸ δὲ μετρούμενον ἔλαιον μικρότερον παρ' ὅτι εἶχεν, ἐπεὶδὴ τὸ οἶνόπνευμα ἐνοῦται μὲ τὸ ὕδωρ ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀκολουθῶς τὸ ποσὸν τοῦ ἐλαίου ἐπιπολάζει. Ἄλλος τρόπος διὰ νὰ γνωρίζωμεν ἐὰν αἰθέριον ἔλαιον ἀνερμίχθῃ μὲ οἶνόπνευμα εἶναι ὁ ἑξῆς. Εἰς μικρὸν ὑέλινον ἀγγεῖον χύνονται 12 σταγόνες ἐλαίου, εἰς αὐτὸ προσθέτομεν μικρὸν σφαιρίδιον μεταλλικοῦ καλίου. Ἐὰν αὐτὸ διατηρηθῇ 12—15 στιγμὰς ἐντὸς τοῦ ἐλαίου, τότε τὸ ἔλαιον δὲν ἐμπεριέχει οἶνόπνευμα ἢ τοῦλάχιστον μόνον ἕως 4 τοῖς 0/0, ἐὰν δὲ τὸ κάλιον ἀφανισθῇ εἰς διάστημα 5 στιγμῶν, τὸ ἔλαιον ἐμπεριέχει πλεόν τῶν 4 τοῖς 0/0· ἐὰν δὲ ἐξαλειφεται ἐντὸς μιᾶς στιγμῆς, τότε ἐμπεριέχει 25 καὶ περισσότερον οἶνοπνεύματος.

Τὰ αἰθέρια ἔλαια διαλύονται εἰς τὰ λιπαρὰ ἔλαια· ὅσα δὲ εἶναι μὲ αὐτὰ

ἀναμεριγμένα ἐναποθέτουν εἰς τὸν χάρτην σπῖλωμα λιπαρὸν, διαφανὲς καὶ ἔμμονον. Ἡ νόθευσις τῶν αἰθερίων ἐλαίων μὲ ἄλλα πτητικὰ ἔλαια κατωτέρας ποιότητος δύναται νὰ γνωρισθῇ δυσκόλως, καὶ ὄχι δι' ἄλλου μέσου, παρὰ διὰ τῆς ὁσμῆς ἢ ὁποῖα ἐκλύεται, ὅταν τὰ ἔλαια τρίβωνται εἰς τὴν θερμὴν χεῖρα.

Τὰ αἰθέρια ἔλαια διαλύουν μάλιστα διὰ τῆς θερμότητος τὸν φώσφορον, μετὰ δὲ τὴν ψύξιν κατακρημνίζεται πάλιν ἐν μέρει ἐξ αὐτῶν. Τὰ μὲ φώσφορον μεμιγμένα ἔλαια φωτοβολλοῦσιν εἰς σκοτεινὸν μέρος.

Καὶ τὸ θεῖον διαλύεται διὰ τῶν αἰθερίων ἐλαίων, ἀλλ' εἰς ὀλίγην μόνον ποσότητα· τὸ διὰ τῆς θερμότητος διαλελυμένον θεῖον συμπήγνυται πάλιν διὰ τῆς ψύξεως εἰς εἶδος πρισματικῶν κρυστάλλων. Ἐὰν τὸ θεῖον ζεσθῇ μὲ τὰ πτητικὰ ἔλαια, σχηματίζει μάζαν φαιὰν, ἰξώδη, δυσώδη, ἢ ὁποῖα καλεῖται *βάλσαμον διὰ θεοῦ balsamum sulphuris*.

Τὰ αἰθέρια ἔλαια ἀπορρόφῳσι χλώριον καὶ μεταβάλλονται δι' αὐτοῦ εἰς οὐσίαν τινὰ ῥητινώδη μὲ ἀλικὸν ὀξύ ἡνωμένην.

Αἰθέρια τινὰ ἔλαια ἀναφλέγονται, ἐὰν τεθῶσιν εἰς τὸ χλώριον· ἐὰν π. χ. λινὸν ὕφασμα μὲ τερμίνθινον ἔλαιον ἐμβρεγμένον ἐγκλεισθῇ εἰς λάγνηνον χλώριον ἐμπεριέχουσαν, ἀναφλέγεται ἐξαίφνης καὶ ὦν μὲ λαμπρὰν φλόγα. Καὶ τὸ ἰώδες διαλύεται διὰ τῶν αἰθερίων ἐλαίων, δι' ὧν σχηματίζεται ἰδριωδικὸν ὀξύ.

Τὰ ἄκρατα ὀξέα ἀποσυνθέτουν τὰ αἰθέρια ἔλαια κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον· ἐὰν δὲ ἀναμιχθοῦν μὲ θεϊκὸν ὀξύ θερμαίνονται, ἀνάπτουν, ἐκλύουν θεϊῶδες ἀέριον καὶ σχηματίζουν πυκνὴν καὶ φαιὰν μάζαν, σαπωνώδη, διαλυτὴν εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς τὸ οἶνοπνευμα καὶ εἰς τὰ ἀλκάλια· διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ψυχροῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν αἰθερίων ἐλαίων σχηματίζεται ὀλίγη σκυτοδεψικὴ ὕλη.

Ἄκρατον νιτρικὸν ὀξύ ἐγχυνόμενον εἰς αἰαίως εἰς ἀγγεῖον ἐμπεριέχον θερμὸν αἰθέριον ἔλαιον ἀποσυνθέτει αὐτὸ μὲ τόσην ταχύτητα, ὥστε τὸ ἀναφλέγει καὶ μάλιστα ὅταν τὸ νιτρικὸν ὀξύ μιγνύεται πρότερον μὲ $\frac{1}{3}$ ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος. Ἐὰν τὰ αἰθέρια ἔλαια ζέωνται μὲ νιτρικὸν ὀξύ, λαμβάνουν ὠχρὸν ἢ φαιὸν χρῶμα καὶ μεταβάλλονται εἰς ῥητίνην, τὸ δὲ νιτρικὸν ὀξύ ἀποσυντίθεται εἰς νιτρογόνον ὀξειδίδιον καὶ τέλος σχηματίζεται ὀξαλικὸν ὀξύ.

Αἰθέρια τινὰ ἔλαια θερμαινόμενα μὲ ἀλικὸν ὀξύ λαμβάνουν φαιὸν χρῶμα, τινὰ δὲ πήγνυνται πρὸς φαιὰν μάζαν.

Τὰ αἰθέρια ἔλαια ἀπορρόφῳσι μεγάλην ποσότητα ἀλικοῦ ὀξέος ἀερίου,

τὰ δὲ μὴ ἐμπεριέχοντα ὀξυγόνον μεταβάλλονται δι' αὐτοῦ ὡς πρὸς τὴν σύστασιν των· ἀλλὰ περὶ τούτου θέλομεν ὁμιλήσει εἰς τὸ τερμίνθινον καὶ τὸ τῶν μηδικῶν μήλων. Τὰ αἰθέρια ἔλαια ἐνόησαν καὶ μὲ πολλὰ φυτικά ὀξέα καθὼς μὲ τὸ ὀξικόν, ὀξαλικόν, ἐλαιῶδες, στεάτινον ὀξὺ κ. τ. λ. Μετὰ τῶν ἀλκαλίων δὲν δύνανται, νὰ ἐνωθῶσιν ἐξαιρουμένου τοῦ ἐλαίου τῶν καρυοφύλλων· τινὲς νομίζουν ὅτι τὸ τερμίνθινον ἔλαιον συνιστᾷ μὲ τὸ κάλιον εἶδος σάπωνος, ὁ ὁποῖος μετεχειρίζετο ἑκπαλαι εἰς τὴν ἱατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνημα *Sapo terebinthinatus starkey* καὶ κατεσκευάζετο διὰ τῆς ἀνακινήσεως καυστικοῦ καλίου χυτοῦ μὲ ὀλίγην ποσότητα τερμίνθινου ἐλαίου εἰς θερμὸν σιδηροῦν ὄλμον, ἑωσοῦ ἡ μάζα ἐλάμβανε τὸ σχῆμα τοῦ σάπωνος· μετὰ ταῦτα παρετήρησαν τινὲς, ὅτι κατασκευάζεται πολὺ ταχύτερον, ἐὰν μεταχειρισθῇ τερμίνθινον ἔλαιον ἀλλ' ἐνωθὲν διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος· τὴν σήμερον συντίθεται ὁ σάπων οὗτος ἐκ θερμαινομένης τερεβινθίνης καὶ καλίου, ἐπειδὴ ἀποδείχθη ὅτι ὁ σάπων δὲν εἶναι ἄλλο, εἰμὴ ἐνωσις τοῦ ῥητινώδους τερμίνθινου ἐλαίου μὲ τὸ κάλιον.

Τὸ ἀμμωνιακὸν ἀέριον ἀπορρόφᾶται παρὰ τῶν αἰθερίων ἐλαίων· τὸ τοῦ τιφύου ἔλαιον ἀπορρόφᾷ 47 πλάσιον ἀμμωνίας· τὰ ὀξειδία τῶν μετὰλλων, τὰ ὁποῖα μεταδίδουν εὐκόλως τὸ ὀξυγόνον των, καθὼς ἡ κοκκίνη ὑποστάθμη τοῦ ὕδραργύρου, τὸ ἄμμιον κτλ. ἀποκαθιστῶνται εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν, ἐὰν ζέωνται μὲ τὰ αἰθέρια ἔλαια, τὸ δὲ ὀξυγόνον τῶν ὀξειδίων σχηματίζει μὲ τὰ ἔλαια ῥητίνην.

Διάφοροι φυτικάι βάσεις διαλύονται παρὰ τῶν αἰθερίων ἐλαίων π. χ. τὸ μόρφιον, τὸ στρύχνιον κτλ. ἐὰν τὰ αἰθέρια ἔλαια συμμιχθῶσι μὲ ζάχαριν, πορίζονται αἱ ἐλαιοζαχάρεις αἱ ὁποῖαι μεταχειρίζονται εἰς τὴν ἱατρικὴν.

Τὰ αἰθέρια ἔλαια μεταχειρίζονται μάλιστα εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς· εἶναι χρήσιμα πρὸς διάλυσιν τῶν λιπαρῶν σπιλωμάτων καὶ πρὸς κατασκευὴν τῶν γανωμάτων.

Ὡς πρὸς τὰ συστατικά των δύνανται νὰ διαιρεθῶσι τὰ αἰθέρια ἔλαια εἰς δύο κλάσεις 1) εἰς ὀξυγονοῦχα καὶ 2) εἰς μὴ ὀξυγονοῦχα.

Μεταξὺ τῶν διαφόρων αἰθερίων ἐλαίων τὰ ἐξῆς εἶναι τὰ κυριώτερα καὶ χρησιμώτερα.

Τὸ τοῦ ἀνίσου ἔλαιον *oleum anisi* ἀποσταλάζεται ἐκ τῶν σπερμάτων τοῦ ἀνίσου *Pimpinella anisum*.

Τὸ τοῦ μαράθρου ἔλαιον *Oleum foeniculi* ἐκ τῶν σπερμάτων τοῦ

μαράθρου *anethum foeniculi*. Εἶναι σχεδὸν ἄχρουν, πηγνύεται ὑπὸ τὴν 6^ο καὶ μεταβάλλεται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς μαλακὴν κιτρίνην ῥητίνην. Ὁ K. Krotthuss διΐσχυρίζεται ὅτι σχηματίζεται βενζοϊκὸν ὀξύ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς αὐτὸ τὸ αἰθέριον ἔλαιον καὶ εἰς ἄλλα τινά.

Τὸ ἔλαιον τοῦ καρύου *oleum carvi* ἀποσταλάζεται ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ *carum carvi*, χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν διαφόρων οἶνοπνευματωδῶν ποτῶν.

Τὸ ἔλαιον τοῦ λευκοδένδρου *oleum cajeputi* ἀποσταλαζόμενον ἐκ τῶν φύλλων τοῦ *Melaleuca Leucadendron* εἶναι πράσινον καὶ ἐκτεθὲν εἰς τὸν ἥλιον γίνεται ὠχρόν. Μεταχειρίζεται κατὰ τῆς ὀδονταλγίας.

Τὸ ἔλαιον τῆς ἀρκεύθου *oleum Iuniperi* ἀποσταλάζεται ἐκ τῶν λειοτριβηθέντων σφαιριδίων τῆς ἀρκεύθου *Iuniperus comunis*. Διαλυόμενον εἰς τὸ οἶνόπνευμα σχηματίζει ποτόν τι γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Genievre*. Τὸ ἔλαιον τοῦτο εἶναι πολὺ διουρητικόν· ἡ ἐσωτερικὴ του χρῆσις μεταδίδει εἰς τὸ οὖρος τὴν τῶν ἔων ὁσμὴν.

Τὸ ἔλαιον τοῦ διόσμου *ol. menthae piperitae* κατασκευάζεται διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν φύλλων τοῦ *mentha piperita*.

Ἐλαιον λιθανωτίδος *ol. anthos* ἐξάγεται, ἀποσταλαζομένων τῶν φύλλων *Rosmarinus officinalis*.

*Ἐλαιον τυφίου *Ol. lavandulae*· ἐκ τῶν φύλλων τοῦ τυφίου *Lavandula spica*. Διαλυόμενον εἰς τὸ οἶνόπνευμα προάγει εὖοσμον ῥευστὸν *Eau de lavande* λεγόμενον.

Ἐκ τῶν φύλλων τῆς ἀψινθίας πόας *Herba absynthii* ἐξάγεται τὸ *oleum absynthii*.

*Ἐλαιον τῶν ἀνθέων τῆς πορτογαλίας *Oleum florum aurantium* ἐξάγεται διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν νεαρῶν ἀνθῶν τῆς πορτογαλίας. Τὸ εἰς τὸ ὕδωρ διάλυμά του λέγεται συνήθως ἀνθόνερο *aqua naphae*.

Ἐκ τῶν ἀνθῶν τῶν χαμαιμήλων *flores chammomillae* ἐξάγεται διὰ τῆς συνήθους ἀποστάξεως ἔλαιόν τι, τὸ ὁποῖον διαφέρει τῶν ἄλλων διὰ τὸ κυανοῦν τοῦ χρώμα, τὸ ὁποῖον ἀποβάλλει, ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων. Τὸ εἰς ὕδωρ διάλυμα τοῦ ἐλαίου λέγεται *aq. chammomillae*.

Ἐκ τῶν ῥιζῶν τῆς ἀγρίας νάρδου ἀποστάζεται τὸ τῆς νάρδου ἔλαιον *Oleum valerianae*.

Τὸ *Περγάμιον* ἔλαιον ol. bergamottae ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἐκ-
θλίψεως τῶν φλοιῶν τῶν καρπῶν *Citrus aurantium*.

Τινὰ τῶν αἰθερίων ἐλαίων εἶναι βαρύτερα τοῦ ὕδατος· τὰ κυριώτερα ἐξ
αὐτῶν εἶναι τὸ σασσάφρινον ἔλαιον ἀπολαμβάνομενον διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν
λειοκεκορμένων ῥιζῶν τοῦ *Laurus sassafras*. Διὰ τοῦ ἀκράτου νιτρικοῦ ὀξέος
ἀναφλέγεται καὶ φυλαττόμενον πολὺν καιρὸν ἐναποθέτει στεαρποπτήνην.

Τὸ ἔλαιον τοῦ κρόκου ἀποστάζεται ἐκ τῶν στιγμαμάτων τοῦ κρόκου. ἔχει
τὸ τοῦ κρόκου χρῶμα καὶ φυλαχθὲν ὑπὸ ὕδωρ μεταβάλλεται μετὰ καιρὸν
εἰς κρυσταλλώσιμον μάζαν.

Τὸ ἔλαιον τοῦ κινναμώμου oleum cinamomi ἐξάγεται ἐκ τοῦ φλοιοῦ
τοῦ κινναμώμου καθὼς καὶ ἐκ τῶν καρπῶν flores cassiae διὰ τῆς ἀποστά-
ξεως· εἶναι κιτρινωπὸν, καὶ ἀποθέτει πολὺν καιρὸν φυλαττόμενον ὠχροῦς
κανονικοῦς κρυστάλλους· συνισταμένους ἐξ ἰδιαίτερου τινὸς ὀξέος, τοῦ
κινναμωμικοῦ ὀξέος καὶ ῥητίνης. Ἐάν οἱ κρύσταλλοι διαλυθῶσιν εἰς ζέον
ὕδωρ καὶ τὸ διυλιζόμενον διάλυμα ἀποψυχρανθῇ, κρυσταλλοῦται τὸ κιννα-
μωμικὸν ὀξύ εἰς εἶδος λαμπρίζουσων βελονῶν.

Ἐάν τὸ ἔλαιον τοῦ κινναμώμου ἐκτεθῇ καιρὸν τινα εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ
χλωρίου μεταβάλλεται εἰς στερεάν μάζαν, ἥτις καλεῖται Chorocī-
nose καὶ κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος λευκῶν βελονῶν. Τὸ ἔλαιον τοῦτο
ἐνοῦται μετὰ τῆς ἀμμωνίας. Ἐάν ἀναταραχθῇ μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος
σχηματίζεται κρυσταλλώσιμος ἔνωσις ἐκ νιτρικοῦ ὀξέος καὶ τοῦ ἐλαίου.
Διαλυόμενον εἰς τὸ ὕδωρ ἢ εἰς τὸ οἶνόπνευμα παρέχει τὸ εἰς τὴν ἱατρικὴν
μεταχειριζόμενον ὕδωρ τοῦ κινναμώμου aqua cinamomi.

Τὸ ἔλαιον τῶν καρυοφύλλων ἀποστάζεται ἐκ τῶν ἀνθέων τοῦ *Eugenia*
caryophyllata· κατ' ἀρχὰς εἶναι ὠχρὸν, μετ' ὀλίγον δὲ μεταβάλλεται εἰς κί-
τρινον καὶ φαιόν. Ἐάν τὸ μετὰ τοῦ ἐλαίου ἀποσταζόμενον ὕδωρ φυλαχθῇ, ἀπο-
τίθεται ἐξ αὐτοῦ εἰς εἶδος μαργαριτοειδῶς λαμπρίζοντων φυλλιδίων ὅλη τις
καφουρά τῶν καρυοφύλλων *Eugenin* καλεσθεῖσα. Ἡ ἰδιαίτερα ὕλη αὕτη θά-
φεται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος καθὼς καὶ τὸ καρυοφύλλον ὀξύ αἰμοβαφές.

Ἐάν τὸ ἔλαιον τῶν καρυοφύλλων ἀποσταχθῇ μὲ διόλυσιν τοῦ καλίου,
ἀποσταλάζει καθαρὸν τι ἔλαιον, τὸ δὲ καρυοφύλλον ὀξύ ἐνούμενον
μετὰ καλίου ἐπιμένει εἰς τὸ ἀποστατικὸν σκεῦος. Ἐάν τὸ ὑπόλειμμα
τοῦτο ἐπιχυθῇ μετὰ φωσφορικοῦ ὀξέος καὶ ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν, ἐξά-
γεται ὠχρὸν καὶ καθαρὸν ἔλαιον, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ καρυοφύλλο-
νον ὀξύ, τὸ ὁποῖον ἐνούμενον μετὰ τῶν διαφόρων θάσεων ἀποτελεῖ τὰ κα-
ρυοφύλλα ἄλατα.

Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος βάφεται αἵματοβαφές· θερμαινόμενον σχηματίζει ὀξαλικὸν ὀξύ, τὸ ὁποῖον ἐὰν φυλαχθῇ πολὺν καιρὸν ἀποθέτει ἄλλην τινὰ ὕλην καρυοφυλλίνην *Caryophyllin* ὀνομαζομένην.

Ἐλαιον τοῦ σινάπεως Ol. sinapis. Ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς μεθ' ὕδατος ἀποστάξεως τῶν λειοτετριμμένων σπόρων τοῦ σινάπεως, ἀφοῦ πρότερον ἐκθλιφθῇ τὸ λιπαρὸν ἔλαιον· τὸ πτητικὸν ἔλαιον ἔχει πολλὰ διαπεραστικὴν ὁσμὴν καὶ δριμύειαν γεῦσιν ὁμοίαν τοῦ σινάπεως. Τεθὲν ἐπὶ τῆς ἐπιδερμίδος προάγει φλεγμονὴν καὶ σχηματίζει μὲ μεγάλην ταχύτητα φλυκταίνας· διαλύεται ὑπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἐὰν μὲ τὸ ὕδωρ τοῦτο βραχὲν ὕφασμα τεθῇ ἐπὶ τῆς ἐπιδερμίδος, προάγονται μετ' ὀλίγας στιγμὰς φλυκταίνας.

Τὸ νιτρικὸν καθὼς καὶ τὸ νιτροδχαλικὸν ὀξύ· ἐνεργοῦσιν ἐπὶ τοῦ ἐλαίου καὶ σχηματίζουνσιν ἐξ αὐτοῦ μέγα μέρος θεϊκοῦ ὀξέος. Ἐὰν τὸ ἔλαιον θερμανθῇ μετὰ τῶν ἀλκαλίων, ἐκλύεται ἀμμωνία καὶ πρὸς τούτοις σχηματίζονται θειοῦχα καὶ ἐνθειοκυανικὰ ἀλκάλια.

Τὸ ἔλαιον ἀπορρόφᾳ μέγα ποσὸν ἀμμωνίας καὶ ἡ τοιαύτη ἔνωσις εἶναι κρυσταλλώσιμος. Ὑπὸ τοῦ καλίου ἀποσυντίθεται τὸ ἔλαιον εἰς τὴν θερμότητα ἐκपुरσοκροτοῦν. Ἐὰν τὰ σπέρματα τοῦ σινάπεως στερηθέντα τοῦ λιπαροῦ ἐλαίου διὰ τῆς ἐκθλίψεως κατεργασθῶσι διὰ λειψύδρου οἰνοπνεύματος, ἐξάγεται ἰδιαιτέρα ὕλη εἰς κρυσταλλώσιμον κατὰστασιν *Sinapin* καλουμένη. αὕτη ἀποσυντίθεται ὑπὸ διαφόρων ὀξέων καὶ ἀλκαλίων καὶ διὰ τῶν τελευταίων σχηματίζεται ρευστὸν, τὸ ὁποῖον ἔχει τὰ τοῦ ἐνθειοκυανικοῦ ὀξέος χαρακτηριστικά.

Κατὰ τὰς νεωτέρας ἐξετάσεις ἀνεκλύφθη εἰς τὸ σπέρμα τοῦ σινάπεως καὶ ἄλλη τις ὕλη *sinapisin* καλουμένη, ἥτις εἶναι τὸ αἷτιον τῆς δριμύειας γεύσεως, ἐὰν τὸ σίναπι ἀναμιχθῇ μεθ' ὕδατος. Ἡ ῥηθεῖσα ὕλη ἐξάγεται ἐκ τοῦ δι' ὕδατος ἀποτελουμένου ἐκχυλίσματος δι' αἰθέρος καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλύματος κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος λευκῶν ἀγκίδων. Ἐὰν τὸ οἰνοπνευματώδες διάλυμα ἐκτεθῇ εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, σχηματίζεται ἰδιαιτέρον ὀξύ τὸ *ἐνθειον σιναιπικὸν ὀξύ*. Εἰς τὸ λευκὸν σίναπι ἀνεκαλύφθη ἄλλη τις ὕλη *Erucin* καλουμένη.

Τὸ αἰθέριον ἔλαιον τοῦ σινάπεως ἐμποδίζει τὴν ὀξείαν ζύμωσιν· ἐὰν π. χ. ὀλίγαι σταγόνες τούτου προστεθῶσιν εἰς γλεῦκος, διατρεῖται πολυλούς μῆνας χωρὶς νὰ εἰσαχθῇ ζύμωσις.

Τὸ ἔλαιον τοῦ *ράφανου* ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς δι' ὕδατος ἀποστάξεως τῶν λειοτριβημένων ῥιζῶν τῆς ἀγρίας ῥαφανίδος *Cochlearia armoracia*,

Εἶναι κίτρινον, ἔχει δυνατὴν ὀσμὴν, ἥτις προξενεῖ δακρύρροϊαν καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιδερμίδος διεγείρει φλυκταίνας.

Τὸ ἔλαιον τοῦ σκορόδου ἐξάγεται κατὰ τὸν συνήθη τρόπον τόσον ἐκ τῆς πόας, καθὼς καὶ ἐκ τῶν βολβῶν τοῦ σκορόδου *Alium cepa* καὶ *Alium sativum*. ἔχει πολλὰ διαπεραστικὴν ὀσμὴν καὶ δριμεῖαν γεῦσιν, καὶ ἐπιτεθὲν ἐπὶ τῆς ἐπιδερμίδος διεγείρει δυνατὸν καύσωνα.

Ὅμοιον μὲ τὰ ἔλαια ταῦτα ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἀποστάξεως καὶ ἐκ τῆς πόας τῆς κοχλιαρίδος· τὸ διάλυμα τοῦ ἐλαίου τούτου εἰς τὸ οἶνόπνευμα μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Spiritus cochleariae*.

Ῥόδινον ἔλαιον *Oleum rosarum*. ἀποστάζεται συνήθως εἰς τὴν ἀνατολὴν ἐκ τῶν πετάλλων τῶν ἀνθέων τοῦ *Rosa centifolia*. Ἐκ τῶν ἄλλων εἰδῶν τοῦ ῥόδου ἀπολαμβάνεται τόσον μικρὰ ποσότης, ὥςτε δὲν συμφέρει ἢ κατασκευὴ τοῦ ἐλαίου κατ' οὐδένα λόγον.

Εἰς τὴν Ἰνδίαν λέγεται ὅτι κατασκευάζεται τὸ ῥοδίνον ἔλαιον στιβάζοντες τὰ πέταλλα τῶν ῥόδων μετὰ τῶν πολλὰ ἐλαιούχων σπόρων τινὸς εἶδους *Digitalis Gengeli* καλουμένου ἐντὸς λιθίνων καὶ εὐρυστόμων φιαλῶν· οἱ σπόροι ἀφίονται καιρὸν τινα εἰς συνάφειαν μετὰ τῶν ῥόδων· ἐξαγοῦνται διὰ τῆς ἀπορρόφησεως τοῦ ὕδατος καθὼς καὶ τοῦ ῥοδίνου, ἐλαίου, μεθ' οὗ τὸ τῶν σπόρων ἔλαιον κορέννεται· ἀκολουθῶς ἐκθλίβονται οἱ σπόροι, καὶ τὸ ἐκθλιβόμενον μίγμα ἀποτίθεται ἡσύχως· τὸ ἐπιπολάζον ἔλαιον ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὰς κατωτέρας στιβάδας διὰ ἐκ βύσσου θρυαλλίδος καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀποχωρίζεται τὸ αἰθέριον ἔλαιον ἀπὸ τὸ λιπαρὸν διὰ τῆς ἀποστάξεως μεθ' ὕδατος. Εἶναι ὡχρὸν, ἔχει δυνατὴν ὀσμὴν ἀλλ' εὐάρεστον, βικίως ὁσφραινόμενον προξενεῖ κεφαλαλγίαν καὶ καύσωνα· διὰ σμικρᾶς ἀποψύξεως ἀποθέτει τὴν στεατῶδη ὕλην εἰς εἶδος κρυσταλλωσίων φυλλιδίων.

Μεταχειρίζεται πρὸς προαγωγὴν διαφόρων εὐόσμων μιγμάτων, καὶ τὸ διάλυμά του εἰς ὕδωρ εἶναι τὸ *Aqua rosarum*.

Ἐκ τοῦ ῥοδίνου ξύλου *Convolvulus scoparia* ἀποστάζεται ἔλαιον κίτρινον κατ' ἀρχάς, ἐρυθρίζον μετὰ τινα καιρὸν καὶ ἔνεκα τῆς ῥοδίνης ὀσμῆς του μεταχειρίζεται πρὸς νόθευσιν τοῦ ἀληθοῦς ῥοδίνου ἐλαίου, τὸ ὁποῖον ὅμως δι' αὐτῆς τῆς νοθεύσεως ἀποβάλλει τὸ ἰδίωμα τοῦ πηγνυσθαι καὶ οὕτως γνωρίζεται ἡ νόθευσις.

Τερμίνθιον ἔλαιον *oleum terebinthinac* ἀποστάζεται ἐκ τῆς τερμινθίνης, ἥτις εἶναι βάλαμον σταλάζον ἐκ τοῦ τεμνομένου στελέχους τοῦ

λάρικος. Τὸ ἀγοραῖον ἔλαιον ἐμπεριέχει συνήθως ποσὸν τι ῥητίνης, ἐξ ἧς καθαρίζεται διὰ τῆς ἀποστάξεως. Εἶναι ὥχρον, πολλὰ λεπτόρρευστον, καὶ 0,870 εἰδικῆς βαρύτητος· εἰς τὴν 156°P ζεεὶ καὶ ἀποψυχραινόμενον μέχρι 27° ἀποθέτει τὴν στεατώδη ὕλην εἰς κρυστάλλους. Ἐκτιθέμενον εἰς τὸ τῆς ἀτμοσφαιρας ὀξυγόνον μεταβάλλεται εἰς ῥητινώδη ὕλην κολοφώνιον. Τὸ ἄκρατον νιτρικὸν ὀξύ ἀποσυνθέτει τὸ ἔλαιον μετὰ μεγάλης ταχύτητος καὶ τὸ ἀναφλέγει· τὸ χλώριον ἐπίσης ἐπιφέρει ἀποσύνθεσιν· ἐὰν τερμίνθινον ἔλαιον τεθῇ εἰς φιάλην πλήρη χλωρίου, ἀναφλέγεται. Τὸ ἰώδες διαλύεται εἰς μεγάλην ποσότητα εἰς τὸ ἔλαιον· ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι τὸ διαλελυμένον ἰώδες δὲν ἐξιχνεύεται διὰ τῶν συνήθων ἀντιδραστηρίων. Διὰ τοῦ καυστικοῦ καλίου μεταβάλλεται εἰς σαπώνινωδη μάζαν *Sapo terebinthinatus*.

Ἐὰν ξηρὸν ὕδροχλωρικὸν ἀέριον διοχετευθῇ εἰς ἰσχυρῶς ἀποψυχραινόμενον τερμίνθινον ἔλαιον μεχριστοῦ τὸ ἀέριον δὲν ἀπορρόφᾶται, καὶ τὸ οὕτω κεκορεσμένον ἔλαιον τεθῇ εἰς ψυχρὸν τόπον, ἀποχωρίζονται κρύσταλλοι δυνάμενοι νὰ ἀποχωρισθῶσιν ἐκ τῆς ρευστῆς ἐνώσεως δι' ἐκθλίψεως. Ἡ στερεὰ αὕτη μάζα κρυσταλλοῦται εἰς λευκὰ πρίσματα, ἔχει ὁσμὴν ὡς τὴν τῆς συνήθους καφουράς καὶ καλεῖται *τεχνητὴ καφουρά*. Ἐὰν ἡ καφουρά αὕτη ἀποσταχθῇ ἐπανειλημμένως ἐπὶ ἐγγλωρίου τιτάνου, γεννᾶται ὕδωρ καὶ ἰδιαιτέρον ἔλαιον τὸ ὁποῖον καλεῖται *Dadyl*. Ἐὰν δὲ ἡ ρευστὴ ἐνωσις ὑποβληθῇ εἰς τοιαύτας ἀποστάξεις, ἐξάγεται ὡσαύτως ἔλαιον καλούμενον *Peucyl*.

Ἡ χρῆσις τοῦ τερμινθίνου ἐλαίου εἶναι ἐκτεταμένη· χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν διαφόρων γανομάτων, πρὸς διάλυσιν τῆς κοπᾶλης καὶ ἄλλων ῥητινῶν. Ὡσαύτως μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς, ἰδίως δὲ εἰς τὴν κτηνοϊατρικὴν.

Ἀμυγδάλινον ἔλαιον· διὰ τῆς μεθ' ὕδατος ἀποστάξεως τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων ἀπολαμβάνεται ἔλαιον, τὸ ὁποῖον ὅμως δὲν ὑπάρχει εἰς τὰ ἀμύγδαλα, ἀλλὰ σχηματίζεται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ εἰς αὐτὰ ἐμπεριεχομένου λευκώματος ἐπὶ ἰδιαιτέρας τινὸς κρυσταλλωσίμου ὕλης τῆς ἀμυγδαλίνης διὰ τῆς βοηθείας τοῦ ὕδατος. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἀποχωρίζονται τὰ λειοτριβημένα ἀμύγδαλα διὰ ψυχρᾶς ἐκθλίψεως ἀπὸ τὸ λιπώδες ἔλαιον καὶ τὸ ἐπιμένον μέρος ἀναμειγνύμενον καὶ κατεργαζόμενον με ὕδωρ ὑποβάλλεται ἀκολούθως εἰς ἀπόσταξιν.

Τὸ ἀπολαμβανόμενον ἔλαιον εἶναι χρυαίον τὸ χρῶμα θαρύτερον τοῦ ὕδατος καὶ ἔχει ἰδιαιτέραν ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ ὕδροκυανικοῦ ὀξέος καὶ ἐνεγ

κα τούτου εἶναι εἰς ἄκρον δηλητήριον. Τὸ ἐνυπάρχον ὑδροκυανικὸν ὀξύ δὲν ἀποχωρίζεται ἐκ τοῦ ἐλαίου τούτου δι' ὕδατος, ἀλλὰ διὰ καυστικοῦ καλίου. Ἐάν τὸ διάλυμα τοῦ ἐλαίου εἰς τὸ ὕδωρ ἀναμιχθῇ μὲ διάλυσιν τοῦ νιτρικοῦ ὀξειδωμένου ἀργύρου εἰς τὴν ἀμμωνίαν, δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ τὸ ἐμπεριεχόμενον κυάνιον, ὃ δὲ ἄργυρος καταβυθίζεται ὡς κυανοῦχος ἄργυρος.

Ὅμοια τοῦ ῥηθέντος ἐλαίου ἀπολαμβάνονται διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν φύλλων τῶν κερασίων, τῶν *Prunus Laurus cerasus*, *Prunus padus* καὶ τῶν λειοτριβηθέντων καρπῶν τῶν κερασίων κτλ. Τὰ εἰρημένα ἔλαια ἐμπεριέχουν ὑδροκυανικὸν ὀξύ, εἶναι πολὺ δηλητήρια, καὶ ἀπορρόφῶντα ὀξυρόνον σχηματίζουν *benzoiḱon* ὀξύ.

Εἰς τὴν ἱατρικὴν μεταχειρίζονται τὰ δι' ὕδατος ἀποτελούμενα ἀποσταλάγματα τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων, τῶν τοῦ δαφνοκεράσου φύλλων ὑπὸ τὸ ὄνομα *Aqua amygdalarum*, *Aqua laurocerasi*, ὡς ἀντισπασμωδικὰ καὶ ἀντιφλογιστικὰ ἱάματα. Ἐάν εἰς ὅσον ἐνιστι κεκορεσμένην διάλυσιν αἰθερίου ἐλαίου τῶν ἀμυγδάλων προσεθῇ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ καὶ τὸ ῥευστὸν ἐξατμισθῇ μέχρι ξηροῦ, εὐρίσκονται εἰς τὸ ὑπόλειμμα ἐκτὸς ὑδροχλωρικῆς ἀμμωνίας καὶ ὕλη τις καλουμένη *Benzamid* καὶ *ἀμυγδάλινον* ὀξύ, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἐκχυλισθῇ διὰ τῆς μετ' αἰθέρος κατεργάσεως· ἐξατμισθέντος τοῦ αἰθέρος ἐπιμένει τὸ ὀξύ, δυνάμενον δι' ἐπανειλημμένης διαλύσεως καὶ ἐξατμίσεως νὰ ληφθῇ εἰς εἶδος λευκῶν κρυστάλλων. Τὸ καθαρὸν ὀξύ ἔχει ὀξεῖαν καὶ ὀλίγον στυπτικὴν γεῦσιν, ἀναφλεγόμενον καίει μὲ ἐρυθρὰν φλόγα. Ἐάν κατεργασθῇ μὲ νιτρικὸν ὀξύ ἄκρατον, γεννᾶται ἐξ αὐτοῦ μυρμηκικὸν καὶ *benzoiḱon* ὀξύ, τὸ τελευταῖον τῶν ὁποίων δύναται νὰ κατακρημνισθῇ δι' ὕδατος· ἐάν ἀναμιχθῇ μὲ ὀξειδίον τοῦ μαγγανησίου καὶ ἀποσταχθῇ, ἐκλύεται ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ ἔλαιον τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων· μετὰ τῶν διαφόρων ἀλκαλίων, ἢ ὀξειδίων τῶν μετάλλων προάγονται τὰ ἀμυγδάλινα ἅλατα.

Εἰς τὴν τάξιν τῶν στερεῶν πτητικῶν ἐλαίων κατατάττομεν τὰ ἐξῆς ἔλαια ἀπολαμβανόμενα διὰ τῆς ἀποστάξεως.

Asarin, *Asarit* καφουρά τοῦ *ασάρου*· ἐξάγεται, ἐάν ἡ ξηρὰ ῥίζα ἀποσυχθῇ μὲ 8 μέρη ὕδατος μεχρισοῦ ἀπολαμβάνωνται 3 μέρη. Ἡ ὕλη αὕτη κρυσταλλοῦται ἐν μέρει εἰς τὸν ῥύγχον τῆς ἀποστακτικῆς συσκευῆς, ἐν μέρει εἰς τὸ δοχεῖον καθὼς καὶ εἰς τὸ ἀποψυχραίνόμενον ῥευστόν· ἐσωτερικῶς ἐνεργεῖ ἡ ὕλη αὕτη ὡς ἐμετικόν.

Helenin ἀπολαμβάνεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ ἐλενίου *Inula Helenium*

διὰ τῆς μεθ' ὕδατος ἀποστάξεως εἰς εἶδος κιτρίνου ἐλαίου, τὸ ὁποῖον ἔχει περισσοτέραν εἰδικὴν βαρύτητα ἀπὸ τὸ ὕδωρ καὶ πῆγνυται· ἐὰν βάμμα τοῦ ἐλενίου τεθῇ πρὸς κρυστάλλωσιν, σχηματίζει πρισματικούς ἢ κυβικούς κρυστάλλους.

Betulin Ἐμπεριέχεται εἰς τὴν ἐπίδερμίδα τοῦ φλοιοῦ τῆς *Betula alba*. Ἐὰν ὁ φλοιὸς οὗτος κατ' ὀλίγον θερμανθῇ, ἐξέρχεται ἡ ῥηθεῖσα ὕλη εἰς εἶδος δενδροειδῶν σχημάτων, ὡσαύτως ἐὰν τὸ δι' οἶνοπνεύματος βάμμα τοῦ φλοιοῦ τούτου ἐξατμισθῇ μέχρι συστάσεως σερapiίου, σχηματίζονται χόνδροι τῆς ὕλης ταύτης.

Nicotianin Εἰς αὐτὴν τὴν πτητικὴν καὶ κρυσταλλώσιμον ὕλην ἀποδίδεται ἡ ἰδιαιτέρα ὁσμὴ τῶν τῆς νικοτιάνης φύλλων· ἐξάγεται διὰ τῆς μετ' ὕδωρ ἀποστάξεως τῶν φύλλων. Ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἀποσταλάγματος ἐπιπλέει λιπώδης τις ὕλη ἔχουσα τὴν ἀρωματικὴν ὁσμὴν τοῦ καπνοῦ εἰς ἔξοχον βαθμὸν.

Anemonin Ἐὰν ἐν μέρος τῆς προσφάτου πτάας *Anemone pulsatilla*, *pratensis*, *nemorosa*, μετ' 6 μέρη ὕδατος ἀποσταχθῇ ἀπολαμβάνεται ἀποστάλαγμα, τὸ ὁποῖον τεθὲν εἰς ψυχρὸν τόπον ἀποθέτει μετὰ τινὰς ἐβδομάδας κρυστάλλους τῆς ἀνεμωνίνης. Ἡ ὕλη αὕτη σχηματίζει ἀγκίδας, κατ' ἀρχὰς δὲν δεικνύει γεῦσιν, μετὰ τινα δὲ καιρὸν διεγείρει καυστικὸν αἶσθημα καὶ ἀναισθησίαν ἐπὶ τῆς γλώσσης, ἥτις μόλις μετὰ ἀρκετὰς ἡμέρας ἐξαλείφεται.

Διὰ τῆς ἐπιρροῆς ἀκράτου ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καθὼς καὶ τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων προάγεται διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ ὕδατος ἰδιαιτέρον ὀξύ τὸ ἀνεμωνικόν ὀξύ. Τοῦτο τὸ ὀξύ ἀπολαμβάνεται, ἐὰν διάλυμα τῆς βαρείας κατεργασθῇ μετὰ τῆς ἀνεμωνίνης πρὸς ἐντελῆ κόρον· ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλύματος ἀποχωρίζεται ἡ βαρεῖα διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Μετὰ τῶν βάσεων ἐνούμενον παρέχει τὰ ἀνεμωνικά ἅλατα.

Ἡ ἀνεμωνίνη ἐνεργεῖ ὡς δηλητήριον ἐρεθίζουσα καὶ φλογίζουσα τὴν ἐπίδερμίδα. Διαλυθεῖσα εἰς τὸ ὕδωρ χρησιμεύει εἰς τὴν ἰατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα *aqua ranunculi albi*· τοῦτο τὸ διάλυμα ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἀποστάξεως 1 μέρους *anemone nemorosa* μετ' 6 μέρη ὕδατος· διεγείρει αἰσθητὴ φλεγμονὴν εἰς τὴν ἐπίδερμίδα καὶ ἐξαλείφει τὰς ἐφηλίδας.

Τοιαῦτα δριμύα ἀποσταλάγματα λαμβάνονται καὶ ἐξ ἄλλων φυτῶν ὡς *Ranunculus acris*, *Flamula lingua*, *Rhus*, *Arum maculatum*, *Polygonum Hydropiper*, τὰ ἐξ αὐτῶν τῶν φυτῶν διὰ τῆς ἀποστάξεως ἀπολαμβάνόμενα ἔλαια διεγείρουσιν ἐρεθισμόν καὶ φλεγμονὴν εἰς τὴν ρίνα, δα-

κρύρροιν και έντριβομένα εις την έπιδερμίδα προάγουσιν φλυκταίνας· ή δριμεία αύτη ύλη εξαλείφεται άμα ξηρανθή τò φυτόν, ή εάν τò άποστάλαγμα άφεθή εις άνοικτὴν φιάλην, ή εάν ή απόσταξις αποτελεσθῇ εις άποστακτικὰς φύσσας μὴ καλῶς περιεχρισμένας. Τὰ λιπαρὰ έλαια έκχυλίζουν την δριμείαν ύλην, εκ τού ύδατος, αύτη δέ φλογίζει την έπιδερμίδα, διεγείρει πταρμόν δακρύρροιν και ένεργεί έσωτερικῶς ὡς δηλητήριο.

Έτερον στεαρόπτηνον ύπάρχει εις τούς φακούς τινὸς φυτοῦ *Dipterix odorata* καλουμένου, εξαγεται δέ εξ αὐτῶν διὰ τῆς δι' αἰθέρος εκχυλίσεως, μετὰ την εξαίτησιν έπιμένει στεαρόπτηνον εις είδος κρυστάλλων *Tonka stearopten* καλουμένων. Ο φακὸς τοῦ φυτοῦ τούτου εκτιθέμενος εις τὸν καπνὸν μεταδίδει εις αὐτὸν εὐώδη ὁσμὴν.

Καφουρά. *Camphora*.

Η καφουρά άγνωστος εις τούς Έλληνας και εις τούς Ρωμαίους μετεκομίσθη κατ' άρχὰς από τούς Άραβας εις την Εὐρώπην. Εύρίσκεται εις ὅλα τὰ μέρη είδους τινὸς δάφνης *Laurus camphora* λεγομένης και εις τὸ στέλεχος δένδρου τινὸς *Dryobalanops camphora* καλουμένου· και τὰ δύο ταῦτα δένδρα φύονται εις την Ιαπωνίαν.

Εκ τοῦ *Laurus camphora* εξαγεται ή καφουρά διὰ τῆς άποστάξεως· αἱ ρίζαι, τὸ στέλεχος και οἱ κλόνιοι τούτου τοῦ δένδρου συγκόπτονται και θερμαίνονται, προστιθεμένου ύδατος, εις σιδηρὰ άγγεία σκεπασμένα με άμβικα, έωσοῦ εξαχνισθῇ ὅλη ή καφουρά, ήτις προσκολλάται ὡς υποκίτρινα βολάρια επί τοῦ άμβικος, και οὕτω φέρεται ὡς καφουρά άγοραία *camphora cruda* εις την Εὐρώπην ὅπου καθαρίζεται εις μεγάλας ύελίνας σικύας διὰ δευτέρας άποστάξεως προστιθεμένης τιτάνου, κρητίδος ή άργίλλου, και καλεῖται *camphora Raffinata*.

Εις τὸ δένδρον *Dryobalanops camphora* φυόμενον μάλιστα εις τὰ τῆς Σουμάτρας δάση, άπαντᾷται ή καφουρά έν τῷ μέσῳ τοῦ στελέχους. Οἱ κάτοικοι συνάγουσιν εξ αὐτοῦ την καφουράν κατὰ τὸν έφεξῆς τρόπον. Συναθροίζονται περι τὰ δάση τὰ ὁποῖα μέλλουσι νὰ διερευνήσωσι εκτελοῦντες διαφόρους θρησκευτικὰς συνηθείας ὡφελίμους, καθὼς νομίζουν, πρὸς την καλήν έκβασιν τοῦ επιχειρήματός των, έπειτα εισέρχονται εις τὸ δάσος, ὅπου αναγνωρίζουσιν εύκόλως διὰ τῆς κρούσεως τὰ δένδρα τὰ την καφουράν έμπεριέχοντα. Λέγεται δέ ὅτι μεταξὺ εκατὸν δένδρων

πολλάκις εύρίσκεται μόνον ἐν ἐμπεριέχον καφουράν. Σχίζουσι λοιπὸν τὰ δένδρα, ἐκ δὲ τῆς ἐκροῆς πολλοῦ ἐλαίου τῆς καφουράς συμπεραίνουσιν ὅτι ἐμπεριέχεται εἰς αὐτὰ καὶ πολλὰ στερεὰ καφουρά. Πρὸ δὲ τῆς πωλήσεως πλύνουσιν αὐτὴν πολλάκις εἰς ὕδωρ, εἰς τὸ ὅποιον εἶναι διαλελυμένος σάπων, πρὸς ἀποχώρησιν τῶν ἑτερογενῶν καὶ ἀμμοῶν μορίων. Ἡ ἀποπλυνομένη καφουρά κοσκινίζεται διὰ τριῶν κοσκίνων διαφόρου μεγέθους, καὶ αἱ διάφοροι αὗται καφουραὶ ἐνοῦμεναι εἰς προσδιορισμένην ποσότητα τίθενται εἰς κιβώτια καὶ φέρονται εἰς τὴν ἀγορὰν τῆς Κίνας. Δένδρον μεσαίου ὕψους δίδει ἕως δέκα ὁκάδας καφουράς. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς καφουράς συμφωνοῦσι πολὺ μὲ τὰ τῶν αἰθερίων ἐλαίων, διακρίνεται δὲ ἀπὸ αὐτὰ, καθότι εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν εἶναι στερεὰ καὶ δὲν μεταβάλλεται εἰς ῥητίνην διὰ τοῦ τῆς ἀτμοσφαίρας ὀξυγόνου, ἢ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος.

Πωλεῖται κοινῶς εἰς πλακοῦντας περιφερεῖς, ἄνωθεν κυρτοῦς κάτωθεν κοίλους, εἰς τὸ κέντρον πολλάκις τρυπημένους, χιονολέκους, χονδρῶδεις, κρυσταλλώδεις, ὑποδιαφανεῖς καὶ εὐθραύστους· ἔχει ὁσμήν διαπεραστικὴν φθάνουσιν καὶ εἰς μεγάλα διαστήματα, ἀρωματικὴν οὐχὶ δὲ ἀηδῆ. Μασσωμένη μαλάττεται, ἔχει γεῦσιν δριμύτην διεγείρουσαν ἐπὶ τῆς γλώσσης πρῶτον μὲν θερμὴν, καὶ μετὰ ταῦτα ψυχρὴν, ὀλίγον πικράν· εἰς τὸν ἀέρα ἐξαχνίζεται κατ' ὀλίγον.

Ἐάν θερμανθῇ μέχρι τῶν 110° P, λαμβάνει ῥευστὴν ἐλαιώδη σύστασιν καὶ ἀρχομένη νὰ ζεῇ ἀναθαιμιάται εἰς εἶδος λευκῶν ἀτμῶν πυκνουμένων εἰς ψυχρὸν μέρος. Εἰς τὸ ὕδωρ δὲν διαλύεται σχεδὸν διόλου, ἐνῶ αὐτὸ λαμβάνει τὴν ὁσμήν καὶ τὴν γεῦσιν τῆς. Διὰ τῆς ζαχάρεως μᾶλλον δὲ τοῦ κόμμεως ἢ τοῦ κόκκου τῶν ὠν δύναται νὰ συμμιχθῇ μὲ μεγαλητέραν ποσότητα ὕδατος. Ἐάν μικρὰ τμήματα καφουράς τεθῶσι ἐπὶ ὕδατος λαμβάνουν ζωηρὰν περιστροφικὴν κίνησιν ἐξηγουμένην διὰ τοῦ σχηματισμοῦ ἐλαίου τινός, ὅπερ ἐκτεινόμενον ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἐξατμίζεται.

Ἡ καφουρά εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ οἶνόπνευμα, προστεθέντος δὲ ὕδατος καταβυθίζεται πάλιν ἀμεταβλητος ἐκ τοῦ διαλύματός της· ὀλίγα σταγόνες οἶνοπνεύματος ἀποτελοῦσιν αὐτὴν ἱκανὴν νὰ μεταβληθῇ εἰς κόνιν λεπτοτάτην. Ὁ θεϊκὸς αἶθρ, τὰ λιπαρὰ καὶ πτητικὰ ἔλαια διαλύουσιν τὴν καφουράν. Τὸ θεϊκὸν ὀξύ ἄκρατον διαλύει εὐκόλως εἰς μὲν μετρίαν θερμοκρασίαν ἰσοβαρὴ ποσότητα καφουράς, εἰς μεγαλητέραν δὲ θερμότητα καὶ τὸ τριπλοῦν αὐτῆς, σχηματίζον καστανόχρουν ῥευστὸν, ἐξ οὗ νεαροῦ ὄντος καταβυθίζεται δι' ὕδατος ἢ καφουρά, ἀλλὰ

μέ τον καιρόν ἡ καφουρά μεταβάλλεται διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, καὶ ἀντὶ
νὰ ἐκλυθῇ θειῶδες ὀξύ σχηματίζεται ἔλαιόν τι ὅμοιον μέ τὸ τοῦ ἡδυόσμου.
Τὸ νιτρικόν ὀξύ διαλύον αὐτὴν τὴν μεταβάλλει ἐν μέρει. Ἐὰν ἀποσταχθῇ
μέ νιτρικόν ὀξύ καὶ τὸ ἀποσταζόμενον νιτρικόν ὀξύ ἐπιχυθῇ πολλάκις
εἰς τὴν κερατίνην ἑωσὺ παύσουν ἀπὸ τὸ νὰ ἐξέρχονται νιτρώδεις ἀτμοί,
σχηματίζεται τὸ καφουρικόν ὀξύ πηγνύμενον εἰς κρυστάλλους βελονοει-
δεῖς στίλβοντας ὡς ὁ ἀργυρος.

Τὸ ἀλικόν ὀξύ ἀέριον καὶ τὸ ὀξικόν ὀξύ ἄκρατον διαλύουσι τὴν καφου-
ράν, ἀπλοῦν δὲ ὄξος τὴν διαλύει δυσκόλως· εἰς τὰ ἀλκάλια εἶναι ἀδιάλυ-
τος, ἀπορρόφα δὲ τὴν ἀεροειδῆ ἀμμωνίαν. Μὲ τὸν φωσφόρον καὶ τὸ θεῖον
δύναται νὰ συντακῇ, εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸν ἐνθεῖον ἀνθρακκ, ἡ δὲ διά-
λυσις αὕτη δύναται νὰ συμμιχθῇ μέ οἰνόπνευμα εἰς πάσας τὰς ἀναλο-
γίας ὅχι δὲ μέ τὸ ὕδωρ· ἐὰν ἡ καφουρά διοτοχευθῇ διὰ σωλῆνος ἐμπε-
ρίχοντος τίτανον διάπυρον, ἀποσυντίθεται ἡ καφουρά εἰς ἰδιαιτέρον
ἔλαιον *camphoron* καλούμενον καὶ ὕδωρ.

Ἀναφλέγεται εὐκόλως καὶ καίει ἐπὶ τοῦ ὕδατος μέ φλόγα πολὺ κα-
οαράν, ἀσβολώδη καὶ ἄνευ ὑπολείμματος. Εἰς τὸ ὀξυγόνον καίει μέ
φλόγα πολὺ λαμπράν, καὶ ἐξ αὐτοῦ σχηματίζονται ἀνθρακικόν, ὀλίγον
καφουρικόν ὀξύ καὶ ὕδωρ, ἐπιμένοντος καθαροῦ πορρώδους ἀνθρακος.

Ἡ καφουρά σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	79, 19
Ὑδρογόνου	10, 58
Ὄξυγόνου	10, 23

100.

Τινὲς χημικοὶ παρεδέχθησαν εἰς τὴν καφουράν ἰδιαιτέραν ἔνωσιν ἐξ
ὕδρογόνου καὶ ἀνθρακος συνισταμένην ὡς βάσιν αὐτῆς καὶ τὴν καλοῦ-
σιν *Camphogen*.

Τὴν μεταχειρίζονται μάλιστα εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξω-
τερικῶς εἰς εἶδος κόνεως ἢ διαλελυμένην εἰς οἰνόπνευμα, εἰς αἰθέρα, ἢ
εἰς λιπαρά ἔλαια.

Ῥητίνη. *Resina*.

Αἱ ῥητῖναι εὐρίσκονται εἰς πολλὰ φυτὰ εἰς μικρὰν ὅμως ποσότητα.
Τινὲς ῥητῖναι σταλάζουσιν αὐτομάτως ἐκ τῶν φυτῶν, ἡ ῥέουσιν ἀπὸ τὰς

εχισμάς αὐτῶν, προάγονται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῶν αἰθερίων ἐλαίων διὰ τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς, ἄλλαι δὲ ἐξάγονται ἐκ τῶν φυτῶν διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος.

Αἱ ῥητίναι δὲν εἶναι κρυσταλλώσιμοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὑελοσιδεῖς, ἄχρως, πολλάκις δὲ κίτριναι, φαιαί, ἢ ὑπερύθραι, σκληραὶ καὶ εὐθρυπτοί, μὴ ἀγωγοὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, ἡλεκτρίζονται ἀρνητικῶς, ἐὰν τριφθῶσι. Εἰς καθαρὰν κατάστασιν εἶναι ἄσμοι καὶ ἄχυμοι, ἐὰν δὲ ἐμπεριέχουν αἰθέρια ἔλαια, ἢ ἑτερογενεῖς οὐσίας ἔχουσιν ὁσμὴν καὶ γεῦσιν. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης των εἶναι 1,93—2,002, εἶναι δυσδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ. Τινὲς ἐνοῦνται μὲ τὸ ὕδωρ καὶ τότε θεωροῦνται ὡς ὑδρομιγεῖς. Διαλύονται ἐν μέρει εἰς τὸ οἰνόπνευμα, τὸ διάλυμά των κοκκινίζει τὸ τοῦ καγκαμίνου βάμμα ὅχι δὲ τὸ τῶν ἴων σεράπιον, καὶ ἐξ αὐτοῦ καταβυθίζονται πάλιν διὰ τοῦ ὕδατος. Εἶναι διαλύσιμοι εἰς τὸν ἔνθειον ἄνθρακα, εἰς τὸν αἰθέρα, καὶ εἰς τὰ πτητικὰ ἔλαια, δύνανται νὰ συντακῶσι μὲ τὰ λιπαρὰ ἔλαια καὶ διαλύονται ἐν μέρει εἰς αὐτά. Διὰ τῆς θερμότητος τήκονται πρὸς παχύρρευστον ὑγρὸν, εἶναι εὐανάφλεκτοι καὶ καίουσι μὲ λαμπρὰν ἀσβολοῦσαν φλόγα, ἥτις ἀναθυμιά ἰδιαιτέραν ὁσμὴν μετὰ πολλῆς αἰθάλης. Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως ἐξοιδαίνονται ἐκπνέουσαι εὐανάφλεκτα αἲρια, ὀλίγον ἀνθρακικὸν αἲριον καὶ ὀξινὸν ὕδωρ ἐμπεριέχον ὀξικὸν ὀξύ, ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, καὶ ἀλλοιωμένην ῥητίνην, πρὸς τούτοις σχηματίζεται ἔλαιόν τι ἐμπυρευματικὸν καὶ ῥητίνη· τὸ μίγμα τοῦτο καλεῖται συνήθως πίσσα ῥευστὴ ἐμπυρευματική.

Αἱ ῥητίναι ἔχουσιν ὀλίγην συγγένειαν πρὸς τὰ ὀξέα. Τὸ ἄκρατονθεικὸν ὀξύ τὰς διαλύει διὰ τῆς θερμότητος, ἐκλυομένουθειώδους αἲριου, ἐπιμένει δὲ ἄνθραξ καὶ τεχνητὴ σκυτοδεψικὴ ὕλη.

Τὸ θερμὸν νιτρικὸν ὀξύ διαλύει τὰς ῥητίνας, ἐκλυομένου νιτρογονοξειδίου, καὶ ἐκ τοῦ διαλύματος δύνανται νὰ καταβυθισθῶσι πάλιν διὰ τῶν ἀλκαλίων. Διὰ συνεχῶς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπιρροῆς σχηματίζεται κοκκώδης, πικρὰ καὶ ῥητινώδης ὕλη, τεχνητὴ σκυτοδεψικὴ ὕλη καὶ πολλάκις ὀξαλικὸν ὀξύ. Ῥητίναι τινὲς διαλύονται μὲν διὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος ἀλλὰ εἰς πολλὰ μικρὰν ποσότητα.

Πρὸς τὰς θάσεις τῶν ἀλάτων ἔχουσιν αἱ ῥητίναι πολὺ μεγαλητέραν συγγένειαν, καὶ αἱ ἐνώσεις αὐτῶν μὲ τὰς θάσεις δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ἅλατα. Διαλύονται εἰς ἀλουσίαν τοῦ καλίου καὶ τοῦ νάτρου, διὰ τῶν ὁποίων ἀποτελοῦνται σχεδὸν οὐδέτεροι μὴ κρυσταλλώσιμοι σά-

πωνες, ἐκλύουσι καὶ ἐκ τῶν ἀνθρακικῶν ἀλκαλίων τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ.
Τινὲς ἐνέμεινον, ὅτι αἱ ῥητίναι ἀποσυντίθενται διὰ τῆς τῶν ἀλκαλίων ἐπιρ-
ροῆς, ὡς καὶ τὰ λιπαρὰ ἔλαια, καὶ σχηματίζουσι σάπωνας· ἀλλὰ κα-
τὰ τὰς δοκιμὰς τοῦ K. Unverdorben αἱ ῥητίναι οὐδεμίαν πάσχουσιν ἀπο-
σύνθεσιν, ἀλλὰ ἐνοῦνται ὡς ἀσθενῇ ὀξείᾳ μὲ τὰ ἀλκάλια.

Τὸ ἀμμωνιακὸν ἀέριον ἀπορρόφᾶται ἀπὸ τὴν λειοτριβημένην ῥητίνην,
καὶ ἐξ αὐτῶν σχηματίζεται ἑνωσις οὐδετέρα ὀλίγον διαλυτὴ εἰς τὸ ὕδωρ.
Αἱ ῥητίναι ἐνόνονται καὶ μὲ τὰ ὀξειδωμένα μέταλλα. Αἱ ῥητίναι διαι-
ροῦνται εἰς δύο κλάσεις 1) εἰς ῥητίνας σκληρὰς, μὴ ἐμπεριεχούσας αἰθέ-
ριον ἔλαιον καὶ σκληρορρόητίνας καλουμένας, καὶ 2) εἰς ῥητίνας μαλακὰς,
ἔλαιον πτητικὸν ἐμπεριεχούσας καὶ μαλακορρόητίνας ὀνομαζόμενας.

Αἱ σκληρορρόητίναι εἶναι εὐδιάλυτοι εἰς τὸ οἰνόπνευμα, σκληραὶ εἰς με-
τρίαν θερμοκρασίαν, εὐθρυπτοὶ, στιλπναὶ τὴν θραῦσιν καὶ ἀδιάλυτοι εἰς
τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸν αἰθέρα.

Κολοφώνιον. *Colophonium*.

Ἐάν ἡ ἐκ τῶν διαφόρων εἰδῶν πεύκης ρέουσα τερεβινθίνη ἀποσταχθῇ
μὲ ὕδωρ, ἕως οὗ δὲν ἐξάγεται τερμίνθινον ἔλαιον, ἐπιμένει μαλακὴ ἀδια-
φανὴς μάζα, γνωστὴ ὑπὸ τὸ ὄνομα *Terebinthina cocta*, ἐψημένη τερε-
βινθίνη· ἡ μάζα αὕτη τεθεῖσα ἀκολούθως εἰς τὸν αἶρα, διὰ τὴν ἐξατμισθῇ
τὸ εἰς αὐτὴν ἐμπεριεχόμενον ὕδωρ καὶ αἰθέριον ἔλαιον, ἐπιλείπει τὸ κολο-
φώνιον εἰς καθαρὰν κατὰστασιν.

Τὸ κολοφώνιον σύγκειται κατὰ τὸν K. Unverdorben ἐκ τριῶν δια-
φόρων ὀξέων πεύκινον, ὄρειον καὶ κολοφωνικόν, τὰ ὅποια σχηματίζ-
ονται διὰ τῆς τήξεως τοῦ κολοφωνίου καὶ ἐξάγονται ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς
δι' οἰνοπνεύματος διαλύσεως· τὰ ῥηθέντα ὀξέα φαίνονται βαθμοὶ τῆς ὀξει-
δώσεως τῶν ἐνυπαρχουσῶν εἰς αὐτὸ θάσεων. Διὰ τῆς ἐνώσεως τῶν
ὀξέων τούτων μετὰ τῶν διαφόρων θάσεων σχηματίζονται διάφορα κρυ-
σταλλώσιμα ἄλατα καλούμενα πεύκινα, κολοφωνικά καὶ ὄρεια.

Ἐάν τὸ κολοφώνιον ταχῇ, προστεθέντος ὕδατος, καὶ τὸ ὕδωρ ἐξατμι-
σθῇ πάλιν διὰ συνεχοῦς ἀνακινήσεως, ἀποτελεῖται μάζα ὑπόξανθος τὸ
χρῶμα, ὑποδιαφανὴς καὶ εὐθρυπτος, καλουμένη λευκὴ ῥητίνη ἢ βουργ-
γουνδικὴ πίσσα (*Resina alba, Pix Burgundica*).

Ἐάν τὸ κολοφώνιον ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, ἐξάγεται ἐξ αὐτοῦ
φαῖον καὶ πυκνὸν ἔλαιον, *Besinen* καλούμενον, καὶ ὕδωρ. Ἐάν τὸ κολο-

φώνιον, ἀναμιχθὲν μὲ ὀκταπλασίαν τίτανον, ἀποσταχθῇ, σχηματίζονται δύο ῥευστὰ καλούμενα *Resinon* καὶ *Resineon*. Τὸ κολοφώνιον εἶναι χρήσιμον πρὸ πάντων εἰς τὴν ἰατρικὴν ἐξωτερικῶς, εἰς τὰ τεχνουργεῖα, προσέτι ὡς ἄλειμμα τῶν πληκτῆρων τῶν βιολίων κ.τ. λ.

Σύγκειται κατὰ τοὺς K. *Gay-Lussac* καὶ *Thenard* ἐξ:

Ἄνθρακος	75, 944
Ἵδρογόνου	10, 719
Ὄξυγόνου	13, 337

100.

Ἡ ῥητίνη δαμαρὰ, πρὸ ὀλίγων χρόνων γνωσθεῖσα, ῥέει ἀπὸ τὸ στέλεχος δένδρου τινὸς *Agathes coranthifolia* λεγομένου. Εἶναι σχεδὸν ἄχρους καὶ διαφανὴς, καθὼς ἡ κοπάλη, μαλακωτέρα ὅμως αὐτῆς, ἔχει τερεβινθινώδη ὀσμὴν, μαλακοῦται διὰ τῆς θερμῆς τῆς χειρὸς, εἶναι εὐτηκτος, κατεργασθεῖσα διὰ ψυχροῦ οἰνοπνεύματος ὑπολείπει ῥητίνην διαλυομένην μόνον εἰς τὸ ζέον οἰνόπνευμα· ἡ ῥητινώδης ὕλη ὠνομάσθη ἀπὸ τὸν *Bran-des Damarin*.

Ἡ εἰρημένη ῥητίνη δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς κατασκευὴν ἀχρῶν γινωμάτων δύο μέρη ῥητίνης διαλυόμενα εἰς 2 $\frac{1}{2}$ ἐλαίου τῆς τερεβινθίνης· παρέχουσι γάνωμα ἄχρουν διὰ εἰκόνας, ἰχθυογραφίας, λιθογραφίας κ. τ. λ. τὸ ὅποιον εἶναι πολὺ διαφανέστερον καὶ διαρκέστερον ἀπὸ τὸ τῆς μαστίχης. Εἶναι προσέτι χρήσιμον εἰς τὰς τέχνας τὸ ἐκ τοῦ λιγελαίου καὶ δαμαρᾶς ποριζόμενον γάνωμα.

Μαστίχη. *Mastix*.

Σταλάζει ἀπὸ τοὺς ἐγχαραττομένους κλόνους τοῦ δένδρου *Pistacia lentiscus*, τὸ ὅποιον καλλιεργεῖται κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν Χίον. Παρίσταται δὲ εἰς στοργγύλα, διαφανῇ, λευκοκίτρινα καὶ στυλπνὰ βωλάρικα.

Ἡ μαστίχη μαλακοῦται μασσωμένη, ἔχει γεῦσιν ὀλίγον ἀρωματικὴν καὶ πικράν, ἐμπεριέχει δὲ δύο εἰδῶν ῥητίνας, διαλυτὸν καὶ ἀδιάλυτον εἰς κεκραμένον οἰνόπνευμα. Ἡ εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλυομένη ῥητίνη κοκκινίζει τὸ τοῦ καγκρινίου ἔμβροσμα καὶ ὁμοιάζει ἐν μέρει μὲ τὸ πεύκιον ὀξύ· ἡ δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτος εἶναι εἰς νεαράν κατάστασιν μαλακῇ, διαφανῇ, πολὺ ἰσώδης, ἀποξηρανθεῖσα δὲ εἶναι κοινιώδης, ὁμοιά-

ζει τὴν κοπάλην καὶ ὠνομάσθη κοινῶς *Masticin*, Μαστιχίνη, Ἡ μαστίχη ἐμπεριέχει πιθανῶς ὀλίγον αἰθέριον ἔλαιον· τὴν μεταχειρίζονται πρὸς διάφορα ἐξωτερικὰ ἰατρικὰ, πρὸς κατασκευὴν τῶν θυμιαμάτων, τῶν γανωμάτων κ. τ. λ.

Σαρδαράχη. Sandarac.

Ῥέει ἐκ τῆς ἀρκεύθου (*Juniperus communis*), *Tuja articulata* καὶ ἄλλων στροβυλοφόρων δένδρων. Ἡ ῥητίνη αὕτη σχηματίζει βωλάρια ὑποκίτρινα, μὴ στρογγύλα οὔτε στιλπνά, καθὼς ἡ μαστίχη, οὔτε εὐμάλακτα μασώμενα, εὐτηκτα δὲ καὶ εὐώδη ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων.

Τὰ ἀλάλια καὶ τὰ ὀξέα ἐνεργοῦσιν ἐπ' αὐτῆς, καθὼς ἐπὶ τῆς ῥητίνης, καὶ χρησιμεύει, καθὼς ἡ μαστίχη, πρὸς κατασκευὴν θυμιαμάτων, γανωμάτων κ. τ. λ.

Ἑλλημορ. Elemi. Ῥέει ἀπὸ τὸν ἐγκοπτόμενον φλοιὸν δένδρου τινὸς τῆς νοτιοῦ Ἀμερικῆς, *Amyris elemifera* καλουμένου. Ἡ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτος ὑποῤῥητίνη, *Elemine* λεγομένη, ἐξαχνίζεται εἰς λεπίδας γλυκείας τὴν γεῦσιν.

Λάκκον. Εἶναι γαλακτόχρους ὀπός, ῥέων ἐκ τῶν εἰς τὴν Ἰνδικὴν φυομένων δένδρων: *Ficus religiosa*, *Ἰερᾶ συκῆ*, *Ficus indica*, *Ἰνδική συκῆ*, καὶ *Aleuritis Laccifera*, ἀλευρίτης λακκοφόρος κτλ. διὰ τοῦ κεντήματος ἐντόμου τινὸς, *Coccus Eicus*· διακρίνονται δὲ αὐτοῦ τρεῖς εἶδη: 1) λάκκον εἰς βάκτρα, *Lacca in baculis*, 2) τὸ εἰς βωλάρια, *Lacca in granis*, 3) τὸ εἰς λεπίδας, *Lacca in tabulis*. Τὸ λάκκον εἰς βάκτρα εἶναι ἡ ἐκρέουσα καὶ ἀποξηρανομένη μάζα, περὶ τὴν ὁποίαν εἶναι περιτετυλιγμένοι οἱ κοπτόμενοι ἀκρέμονες· εἶναι ἐρυθρόφαιον, εὐθρυπτον, στυπτικόν· ἕνεκα τῶν εἰς αὐτὸ ἐμπεριεχομένων ἐντόμων δίδει κόκκινον χρῶμα εἰς τὴν σίελον, καθὼς καὶ τὸ ζέον ὕδωρ.

Ἡ ἐκ τῶν ξυλωδῶν μερῶν ἀπαλλαττομένη μάζα κατακόπτεται εἰς μικρὰ βωλάρια καὶ ζέεται μὲ διάλυσιν ἀνθρακικοῦ νάτρου, τὸ ὁποῖον διαλύει ἐξ αὐτῆς τὸ κόκκινον χρῶμα. Τὰ μετὰ τὴν ζέσιν ἐπιμένοντα βωλάρια εἶναι τὸ λάκκον εἰς βωλάρια, *Lacca in granis*. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ λάκκου εἰς λεπίδας, *Lacca in tabulis*, χύνεται τὸ τηκόμενον καὶ διυλιζόμενον λάκκον ἐπὶ τῶν φύλλων τοῦ δένδρου *Musa paradisiaca*· μετὰ ταῦτα δὲ συνθλίβεται μεταξύ δύο φύλλων, διὰ νὰ λάβῃ τὸ σχῆμα λεπτῶν καὶ πλατέων κομματίων. Εἶναι φαιὸν, διαφανές, εὐ-

θρυπτον, ἄχυμον, ἄοσμον, εὐτήκτον. Ὁ Κ. John ἀνεκάλυψεν εἰς τὸ *λάκκον* ἰδιαιτέραν οὐσίαν ὀνομάσας αὐτὴν *λακκίνην*, *Laccine*.

Τὸ *λάκκον* εἰς βολάρια μεμιγμένον μὲ σμύρναν καὶ κοχλιαριδόπνευμα μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱκτρικὴν πρὸς κάθαρσιν τοῦ στόματος καὶ στερέωσιν τῶν ὀδόντων. Ἐκ τοῦ *λάκκου* εἰς βάκτρα κατασκευάζονται δύο ἐρυθρὰ χρώματα, *Lac Dye* καὶ *Lac-Lac*, περὶ ὧν θέλομεν ὁμιλήσει εἰς τὸ περὶ ἐρυθρῶν χρωμάτων κεφάλαιον.

Τὸ *λάκκον* εἰς λεπίδας μεταχειρίζεται πρὸς συγκόλλησιν τῶν πορφύρων ἀγγείων ἕνεκα τούτου διαπλάττεται τὸ ταχὲν καὶ μὲ λείον πλίνθον μιχθὲν *λάκκον* εἰς κυλίνδρους. Τὰ κολληθησόμενα τμήματα, ἀφοῦ ἀσθενῶς θερμανθῶσιν, ἀλείφονται διὰ αὐτοῦ καὶ ἔπειτα συνάπτονται μέχρις ἐντελοῦς ἀποψύξεως.

Τὸ *λάκκον* εἰς λεπίδας εἶναι τὸ κύριον συστατικὸν τῶν πλειόνων γαυωμάτων καὶ τῶν καλητέρων ποιότητων τοῦ σφραγιστικοῦ κηροῦ. Ὁ ἐρυθροῦς σφραγιστικὸς κηρὸς σύγκειται ἐκ 16 μερῶν *λάκκου* εἰς λεπίδας, 6 τερεβινθίνης τῆς Βενετίας (*λάρικος*), καὶ λείου κιναβάρεως. Τοῦτο τὸ ταχὲν καὶ σχεδὸν ψυχρανθὲν μίγμα πλάσσεται εἰς κυλίνδρους ἢ χύνεται εἰς τύπους ὀρειχαλκίνοις. Πρὸς κατασκευὴν σφραγιστικοῦ κηροῦ κατωτέρας ποιότητος μεταχειρίζονται ἀντὶ τοῦ *λάκκου* ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κολοφώνιον καὶ ἀντὶ κιναβάρεως ἄμμιον καὶ κρητίδα. Ὁ μέλας σφραγιστικὸς κηρὸς βάφεται διὰ κεκαυμένων ὀστέων, ὁ κίτρινος διὰ χρωμικοῦ μολύβδου ἢ ἄλλου τινὸς κιτρίνου μεταλλικοῦ χρώματος, καὶ ὁ κυανὸς διὰ σμάλτου ἢ διὰ τοῦ φωσφορικοῦ κοβάλλου.

Δρακόντιον αἷμα. Sanguis Draconis.

Συλλέγεται ἐκ τῶν ὀρίμων καρπῶν διαφόρων δένδρων τῆς Ἰνδίας, κατ' ἐξοχὴν δὲ ἐκ τοῦ δρακοντίου καλάμου *Calamus Draco* φέρεται κοινῶς πεπλασμένον εἰς σφαιρίδια ἢ εἰς κυλίνδρους καὶ περιτετυλιγμένον μὲ φύλλα τοῦ φοίνικος καὶ μὲ καυλοὺς τοῦ καλάμου. Τὰ τμήματα αὐτοῦ εἶναι βαθύφαια, ἀδιαφανῆ, εὐθρυπτα, ἄοσμα καὶ ἄχυμα, 1,196 εἰδικῆς βαρύτητος, τριβόμενα γίνονται αἱματόχροα καὶ εὐδιάλυτα εἰς τὸ οἶνόπνευμα, εἰς τὸν αἰθέρα, εἰς τὰ λιπαρὰ καὶ αἰθέρια ἔλαια. Τὸ δρακόντιον αἷμα ἀνθρακοῦται διὰ τοῦ ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος, χωρὶς νὰ σχηματίζεται τεχνητὴ σκυτοδεψικὴ ὕλη. Ἐὰν διαλυθῇ εἰς νιτρικὸν ὀξύ καὶ ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσαξιν, λαμβάνει ὠχρὸν χρῶμα, ἐξατμίζονται 6 τοῖς % βενζοϊκοῦ ὀξέος καὶ ἐπι-

μένει τεχνητὴ σκυτοδεσφικὴ ὕλη. Εἰς τὰ καυστικὰ ἀλκάλια καὶ εἰς τὸ τιτάνιον ὕδωρ διαλύεται λαμβάνον ἐρυθροῦν χρῶμα. Ἡ ἐρυθρὰ οὐσία, ἡ καταβυθίζομένη ἐκ τοῦ οἰνοπνευματώδους διαλύματος διὰ τοῦ ὕδατος, καλεῖται ὑπὸ τοῦ K. Melandri Draconin, *Δρακονίνη*. Τὸ δρακόντιον αἷμα εἶναι ἐνίοτε εὐχρηστον εἰς τὴν ἰατρικὴν, κατ' ἐξοχὴν δὲ πρὸς κατασκευὴν τῶν ἐρυθρῶν γανωμάτων, δι' ὧν ἀπομιμεῖται τοῦ μαχαγορικοῦ ξύλου τὸ χρῶμα. Τὸ γάνωμα τοῦτο ἀποτελεῖται κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον· ξύλον σκληρὸν ἐξομαλυνθὲν περιαλείφεται μὲ κεκραμένον νιτρικὸν ὄξύ καὶ ἀφίνεται νὰ ξηρανθῇ· ἔπειτα διαλύονται 3 λόθια λειοτετριμμένου δρακοντίου αἵματος εἰς 3 λίτρας οἰνοπνεύματος, εἰς τὸ ὅποιον ἐμπεριέχεται ἓν λόθιον ὑπανθρακικοῦ νάτρου· μὲ αὐτὸ τὸ διάλυμα διῶλισθὲν περιαλείφεται τὸ οὕτω παρασκευασθὲν ξύλον. Διὰ νὰ μὴν ἐλαττωθῇ δὲ ἡ λαμπρότης δύναται νὰ ἀλειφθῇ ὕστερον τὸ ξύλον μὲ γάνωμα ἐκ λινελαίου κατασκευασθὲν.

Κοπάλη. Copal.

Ἡ κοπάλη ῥεῖ ἀπὸ δύο δένδρα τῆς Ἰνδίας καλούμενα *Rhus copalinus* καὶ *Elaeocarpus copaliferus*· παρουσιάζεται εἰς τμήματα μεγάλα, σχεδὸν ἄχρκα ἢ ὑποκίτρινα, σκληρά, κογχοειδῆ τὴν θραῦσιν, ἄχυμα καὶ ἄοσμα. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης τῆς εἶναι 1,039 — 1,045.

Ἡ κοπάλη τήκεται εἰς τὴν θερμότητα ἐκλυόμενων ἀτμῶν ἀρωματικῶν, διαλύεται ὀλίγον εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἰς δὲ τετηγμένην κατάστασιν εὐκολώτερα εἰς τοὺς ἀτμοὺς τοῦ λειψύδρου οἰνοπνεύματος. Ἐὰν μιχθῇ μὲ αἰθέρα, ἐξοιδαίνεται, εἰς μεγάλην ὅμως ποσότητα αἰθέρος διαλύεται ὅλως διόλου. Ἡ διὰ τοῦ αἰθέρος ἐξογκωθείσα κοπάλη, ἐὰν ἀναμιχθῇ μὲ θερμὸν λειψύδρον οἰνόπνευμα κατὰ μικρὸν καὶ ἀνακινήθῃ, διαλύεται ἐντελῶς πρὸς διαφανὲς ῥευστόν. Εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ τερμίνθινον ἔλαιον καὶ εἰς τὸ πετρέλαιον. Διὰ τοῦ ἀκράτου θειικοῦ καὶ νιτρικοῦ ὀξέος ὑπόκειται εἰς τὰς αὐτὰς τῶν ῥητινῶν ἀλλοιώσεις.

Ἐὰν ἡ λειοτριβημένη κοπάλη ἐπινοτισθῇ μὲ ῥευστὴν καυστικὴν ἀμμωνίαν καὶ κλεισθῇ εἰς λάχνον, σχηματίζει διαφανὴ πηκτὴν, ἥτις μεταβάλλεται δι' ὀλίγου ὕδατος εἰς θολῶδες γλίσχραμα, διὰ δὲ πολλοῦ εἰς γαλακτόχρουν ὑγρόν. Ἡ τῆς ἀμμωνίας πηκτώδης ἔνωσις μὲ τὴν κοπάλην εἶναι διαλυτὴ εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Διὰ τῆς τήξεως τῆς κοπάλης σχηματίζεται ἔλαιόν τι πτητικόν καὶ ὕδωρ, ἡ δὲ ἐν μέρει ἀποσυντεθεῖσα κοπάλη εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ τερμίνθινον ἔλαιον καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Πρὸς κατασκευὴν τῶν διὰ τῆς κοπάλης γανωμάτων τήκεται ἡ εἰς τμήματα χωρισθεῖσα κοπάλη εἰς σικύαν υελίνην τόσον, ὥστε νὰ μὴ λάβῃ φαῖον χροῖμα· ἔπειτα προστίθεται εἰς αὐτὴν κατὰ μικρὸν θερμὸν τερμίνθινον ἔλαιον, καὶ ἀναταράσσεται μὲ αὐτὴν, ἕως οὗ ἀποτελεσθῇ διαφανὴς διάλυσις· ἐὰν δὲ τὸ τερμίνθινον ἔλαιον προστεθῇ διὰ μιᾶς, ἡ κοπάλη πηγνύεται, χωρὶς πλέον νὰ διαλύεται.

Ῥητίνη ἰξώδης ἢ ρευστή.

Τερεβινθίνη. *Terebinthina*.

Τερεβινθίνη ὀνομάζεται ὁ ἀπὸ διάφορα εἶδη ἐλατῶν (*Abies*) ἢ πιτύων (*Pinus*) ῥέων ὁπὸς, ὅστις διὰ τῆς τήξεως καὶ διαλύσεως καθαρίζεται. Αἱ ἀπὸ τὰ διάφορα δένδρα ρέουσαι τερεβινθίαι διαφέρουσι κατὰ τὴν ποιότητα· ἐμπεριέχουσιν ἐν γένει ῥητίνην καὶ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον τερμίνθινον ἔλαιον, εἶναι διαφανεῖς ἢ θολαί, ἄχρους ἢ ὠχραί, πικραὶ καὶ καυστικαὶ τὴν γεῦσιν, ἰδιαίτερας τινὸς ὀσμῆς καὶ παχύρρευστοι· ἐὰν ἀποξηρανθῇ ἡ τερεβινθίνη εἰς τὸν ἀέρα, ἐπιμένει λευκὴ ῥητίνη. Διὰ τῆς ἀποστάξεως μὲ ὕδωρ ἐξάγεται τερεμίνθινον ἔλαιον, διὰ τῆς ἀποστάξεως δὲ τῆς τερεβινθίνης ἄνευ προσθέσεως ὕδατος ἐξάγεται πτητικὸν ἔλαιον καὶ ὀλίγον ὀξικὸν ὀξύ, συγχρόνως ἐξαχνίζονται θελονοειδεῖς κρύσταλλοι, τοὺς ὁποίους νομίζουσι τινὲς ἠλεκτρικὸν ὀξύ. Διὰ τῆς θερμότητος διαλύεται ἡ τερεβινθίνη εἰς ρευστὴν καυστικὴν ἀμμωνίαν, ἥτις σχηματίζει παχὺ καὶ φαῖον ὑγρὸν. Ἡ διὰ καλίου διάλυσις τῆς τερεβινθίνης ἐπιλείπει μετὰ τὴν ἐξάτμισιν μάζαν οὐδετέραν, πικράν, καυστικὴν καὶ εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ.

Ἡ τερεβινθίνη ἐμπεριέχει κατὰ τὸν K. Unverdorben δύο πτητικὰ ἔλαια, πολὺ πεύκινον καὶ ὀλίγον ὄρειον ὀξύ, ῥητίνην τινὰ ἀδιάλυτον εἰς τὸ πετρέλαιον, πικράν ἐκχυλισματικὴν ὕλην καὶ πολλάκις ἔχνη ἠλεκτρικοῦ ὀξέος.

Αἱ διάφοροι τερεβινθίαι εἶναι χρήσιμοι εἰς τὴν ἰατρικὴν καὶ εἰς πολλὰς τέχνας, πρὸς κατασκευὴν τῶν γανωμάτων κ. τ. λ. Ἐκ τῶν τερεβινθινῶν ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἀποστάξεως τὸ τερμίνθινον ἔλαιον, ἡ λευκὴ ῥητίνη καὶ τὸ κολοφώνιον. Ἐκ τῶν τερεβινθινῶν καθυρωτέρα εἶναι ἡ *Terebinthina veneta*, ἐκρέουσα ἐκ τῆς *Pinus larix* καὶ *Pinus maritima*.

Ρευστή πίσσα (Pix liquida).

Ἀποῦ ἐκ τῶν παλαιῶν στελεχῶν τῆς ἐλάτης καὶ τῆς πίτυος παύσκει πλέον νὰ ἐκρέη τερεβινθίνη, τότε αἱ ξυλῶδεις αὐτῶν ῥίζαι λειοτμηθεῖσαι καίονται εἰς ἰδιαιτέρας καμίνους. Ἡ εἰς τὸ ξύλον ἐμπεριεχομένη τερεβινθίνη ἀποσυντεθεῖσα ῥέει διὰ σωλῆνος εἰς λάκκους. Ἡ ὕλη αὕτη καλεῖται *ρευστή πίσσα*, εἶναι μελανόφαιος, παχύρρευστος, ἰξώδης, ἀπὸδης, ἐμπυρευματική τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ὁσμὴν. Συνίσταται ἀπὸ ὄξος, πυροξυλικὸν καὶ κολοφωνικὸν ὄξύ, καὶ ἀπὸ πολλὰς ἐμπυρευματικὰς ῥητίνας ἠνωμένας μὲ ἐμπυρευματικὸν τερμίνθινον ἔλαιον.

Τὸ ὕδωρ μιγνυόμενον μὲ τὴν ρευστὴν πίσσαν δέχεται ἐξ αὐτῆς τὴν ὁσμὴν καὶ τὸ φαῖον χροῶμα, καὶ πρὸς τοῦτοις διαλύει ὀλίγον πυροξυλικὸν ὄξύ καὶ αἰθέριον ἔλαιον. Τοῦτο τὸ πισσηρὸν ὕδωρ, *aqua Picis*, μεταχειρίζεται ἐνίοτε εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς κατὰ τῆς φθίσεως. Ἡ ρευστή πίσσα εἶναι διαλυτὴ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἰς τὰ λιπαρὰ καὶ αἰθέρια ἔλαια. Δι' αὐτῆς ἀλείφονται αἱ μηχαναὶ, οἱ τροχοί, τὰ ξύλα καὶ σχοινία τῶν πλοίων, διὰ νὰ φαλάττωνται ἀπὸ τὴν ἐπιπόρῃν τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ ὕδατος, καὶ θεωρεῖται ὡς ἀντισηπτικόν.

Πίσσα μέλαινα. Pix nigra.

Ἡ ρευστή πίσσα ἐξατμιζομένη εἰς σιδηροῦς λέβητας μέχρι ξηροῦ, ἐπιλείπει ῥητίνην σκληράν, μέλαιναν, ἰξώδη διὰ τῆς θερμότητος, καὶ ἐμπυρευματικὴν τὴν ὁσμὴν. Ἡ μέλαινα πίσσα κατασκευάζεται, ἐὰν τὰ ὑπολείμματα, τὰ λαμβανόμενα διὰ τῆς καθάρσεως καὶ ἐκθλίψεως τῆς λευκῆς ῥητίνης ἢ τῆς τερεβινθίνης, ὑποβληθῶσιν εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν. Τὸ πύκνινον ἐρυθροῦν ἔλαιον, *Oleum Picis*, ἐξατμιζόμενον ἀποστάζει διὰ πλாகίου σωλῆνος, ἡ δὲ πίσσα μένει εἰς τὸν ἀποστακτικὸν λέβητα.

Ἡ πίσσα σύγεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐξ ἐμπυρευματικῆς ῥητίνης καὶ ὀλίγου κολοφωνίου, μάλα κοῦται εἰς τὴν 33°, τικτεται εἰς ζέον ὕδωρ καὶ διχλύεται διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος καὶ διὰ τῶν ἀλκαλίων. Ἡ πίσσα εἶναι χρήσιμος, ὡς καὶ ἡ ρευστή, εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐξωτερικῶς, καὶ πρὸς ἀεροφωτισμόν.

Αἰθάλη πευκίνη ἢ μέλαν πεύκινον.

Προάγεται διὰ τὰς καύσεως ῥητινωδῶν οὐσιῶν εἰς πῆλιναν ἢ σιδηρὰ ἀγγεῖα ἐντὸς οἰκήματος, τοῦ ὁποίου οἱ τοίχοι εἶναι περιβεβλημένοι μὲ μάλλινον

ύφασμα. Ὁ διὰ τῆς καύσεως τῶν ῥητινῶν ἐκπεμπόμενος μέλας καπνὸς προσκολλᾶται εἰς τὸ ύφασμα, ἐξ οὗ ἔπειτα ἀποτινάσσεται. Τὸ πεύκινον μέλαν εἶναι λεπτὸς ἄνθραξ ἐμπεριέχων πολλὴν ἐμπυρευματικὴν ῥητίνην καὶ ἔνεκα τούτου δὲν δύναται νὰ ἐπινοτισθῇ μὲ ὕδωρ. Ἡ ἐμπυρευματικὴ ῥητίνη δύναται νὰ χωρισθῇ ἐξ αὐτοῦ διὰ ζέοντος οἶνοπνεύματος, κατὰ μέγα μέρος διὰ τοῦ αἰθέρος καὶ ὁλοκλήρως διὰ τῶν ἐλαίων.

Τὸ πεύκινον μέλαν χρησιμεύει κατ' ἐξοχὴν πρὸς κατασκευὴν τῆς τυπογραφικῆς μελάνης. Τὸ τῶν λύχνων μέλαν λαμβάνεται διὰ τῆς καύσεως τοῦ ἐλαίου εἰς λύχνους ὀλίγον μόνον διὰ τοῦ ἀέρος ζωοपुरουμένους καὶ τῶν ὁποίων ὁ καπνὸς ἀποτίθεται εἰς σκέπασμά τι.

Mélar τοῦ *Frankfort*. λέγεται λεπτὸς ἄνθραξ ἀποτελούμενος διὰ τῆς βραδείας ἀνθρακώσεως τῶν στεμφύλων στιβαζομένων εἰς μεγάλας καὶ καλῶς ἐπιποματιζόμενας χύτρας.

Αὐτόρρυτον βάλαμον. Ὑπὸ τὸ ὄνομα αὐτόρρυτον βάλαμον μεταχειρίζονται εἰς τὴν Κίαν πίσσαν εἰς εἶδος γανώματος, ἀποτελουμένην διὰ τῆς ἐκτομῆς τοῦ φλοιοῦ ἀγνώστου τινὸς δένδρου. ἔχει σύστασιν τερεβινθίνης, ἀρωματικὴν ὁσμὴν, στυπτικὴν γεῦσιν καὶ φαῖον χρῶμα. Ἐπὶ τοῦ ὕδατος σταχθὲν ἐξαπλοῦται καὶ ἀποκαθίσταται ἄχρουν καὶ διαφανές. Συνίσταται ἐξ ὠχροῦ πτητικοῦ ἐλαίου, ἐκ βενζοϊκοῦ ὀξέος καὶ κιτρίνης ῥητίνης, εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ οἶνοπνευμα, τὸν αἰθέρα καὶ τὸ τῆς τερεβινθίνης ἔλαιον. Ἐὰν ἀναμιχθῇ μὲ θεϊκὸν ὀξύ κεκραμένον καὶ θερμανθῇ, αἱ ἐσωτερικαὶ πλευραὶ τοῦ ἀγγείου κατακαλύπτονται μετὰ πορφυροῦ ὑμένους, τὸ δὲ ῥευστὸν μένει ἀχρωμάτιστον. Τὸ βάλαμον τοῦτο εἶναι τὸ καλλήτερον γάνωμα, τὸ ὁποῖον γνωρίζεται, ἀναμίγνυται κάλιστα μετὰ τῶν διαφόρων χρωμάτων, παρέχον σκληρὸν καὶ ὥραϊον κάλυμμα.

Ὑπὸ τὸ ὄνομα ῥητίνη *Pasto* μεταφέρεται ἐκ τῆς Ἰνδίας ῥητίνη, ἥτις ἀλαιοφομένη εἰς τὸ ξύλον τὸ ἀποκαθιστᾷ ὕδατοσταγές.

Ἀγνοεῖται εἰσέτι, ἐκ ποίου φυτοῦ ἡ ῥητίνη αὕτη ἐξάγεται, εἶναι πρασινὴ τὰ χρῶμα, θερμαινομένη γίνεται μαλακὴ, εἶναι ἐλαστικὴ, δυναμένη νὰ ἐκτανθῇ εἰς λεπτότατα πλατύσματα, καὶ εἰς τοιαύτην κατὰστασιν κολλᾶται ἐπὶ τῆς τοῦ ξύλου ἐπιφανείας.

Βάλαμον Κοπαϊκόν.

Balsamum copaiuae.

Σταλάζει ἐκ δένδρου τινὸς *Copaifera officinalis* λεγομένου καὶ φουμένου εἰς τὴν νότιον Ἀμερικὴν καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν Βρασιλίαν. Εἶναι

διαυγές, ὑπόχρον, παχύτερον τοῦ ἐλαίου, καυστικὸν καὶ πικρὸν τὴν γεῦσιν, εὐδιάλυτον, εἰς λείψυδρον οἰνόπνευμα· ἀποστλαζόμενον μὲ ὕδωρ δίδει 38 τοῖς % πτητικῷ ἐλαίῳ, εἰς δὲ τὴν κερατίνην ἐπιμένει 52, 75 ῥητίνης ὠχρᾶς καὶ εὐθρύπτου, 1, 66 ῥητίνης φαιᾶς μαλακῆς καὶ ὀλίγη ἐκχυλισματικὴ ὕλη. Τὸ οὕτως ἀποχωριζόμενον ἔλαιον εἶναι ὠχρὸν, λεπτόρρευστον, ἔχει τὴν ἰδιαιτέραν ὁσμὴν τοῦ βαλσάμου, ἀποθέτει στεαροπτήνην διὰ τοῦ ψύχους, διὰ δὲ τῆς διόδου τοῦ αερώδους ἀλικῷ ὀξέος σχηματίζεται τεχνητὴ καφουρά, ἥτις εἶναι ἐξαχνίσεως ἐπιδεκτικὴ. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης του εἶναι 1,09.

Ἡ εἰς τὴν κερατίνην ἐπιμένουσα ῥητίνη εἶναι ὠχρά, εὐθρυπτος, εὐτηκτος, εὐδιάλυτος εἰς τὸν αἰθέρα καὶ τὸ οἰνόπνευμα, ἐπιλείπει ὀλίγην μαλακοῦ ῥητίνην φαιᾶν, ἀδιάλυτον εἰς τὸ πετρέλαιον. Ἐάν τὸ κοπαϊκὸν βάλαμον διαλυθῇ διὰ συνεχοῦς ἀνακινήσεως εἰς τὴν καυστικὴν ἀμμωνίαν καὶ τὸ διάλυμα ἀφελθῇ εἰς ἡσυχίαν καιρὸν τινα, σχηματίζονται κρύσταλλοι, οἵτινες, ὅταν διαλυθῶσιν εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ ἐξατμισθῶσιν, καθαρίζονται. Οἱ κρύσταλλοι οὗτοι εἶναι ἰδιαιτέρον τι ὅξυ, Κοπαϊκὸν ὅξυ καλούμενον. Διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ ὀξέος τούτου μετὰ τῶν βάσεων προάγονται τὰ Κοπαϊκὰ ἅλατα.

Τὸ καθαρὸν Κοπαϊκὸν βάλαμον πρέπει νὰ ᾔηται εὐδιάλυτον εἰς 8 μέρη οἰνοπνεύματος, ἐάν δὲ ἐμπεριέχῃ λιπαρὰ ἔλαια ἐπιπλέουσιν αὐτὰ ἐπὶ τοῦ οἰνοπνευματώδους διαλύματος ἐκτὸς τοῦ κίκινου ἐλαίου. Τὸ κίκινον ἔλαιον μεμιγμένον μὲ βάλαμον δὲν δύναται νὰ ἐξετασθῇ διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος, ἀλλὰ πρέπει ν' ἀνακινήθῃ μὲ διάλυμα τοῦ καυστικοῦ νάτρου, δι' οὗ μεταβάλλεται εἰς παχεῖαν καὶ σαπωνοειδῆ μάζαν, εἰς ἣν τὸ καθαρὸν βάλαμον ἀποχωρίζεται πάλιν, μετ' ὀλίγον ἐπιπολάζον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ γαλακτοχρόου ὑγροῦ. Ἐάν τὸ καθαρὸν βάλαμον ζήται πολὺν καιρὸν μὲ ὕδωρ, ἀφίνει εὐθρυπτον ῥητίνην, τὸ δὲ μὲ κίκινον ἔλαιον μεμιγμένον ἐπιλείπει μαλακὴν λιπαρὰν ῥητίνην.

Τρία μέρη καθαροῦ βαλσάμου ἀνακινούμενα μὲ ἓν καυστικῆς ἀμμωνίας ὑγρᾶς διάλυνται πρὸς καθαρὸν ὑγρὸν. Ἐάν δὲ ἐμπεριέχῃ ἔλαιον συνιστᾷ γαλακτόχρουν ἄλειμμα. Τὸ βάλαμον μεμιγμένον μὲ $\frac{1}{3}$ μαγνησίας ἀποτελεῖ μάζαν εὐπλαστον.

Τὸ Κοπαϊκὸν βάλαμον μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς κατὰ διαφορῶν νόσων τῶν βλενομεμβρανῶν, εἰς τὴν βλεννόροϊαν κ.τ.λ.

Ρητινογαρώματα. Verni ces.

Πολλὰ τῶν προειρημένων ῥητινῶν εἶναι χρήσιμοι πρὸς κατασκευὴν γανωμάτων, διαλυόμενοι εἰς οἰνόπνευμα ἢ εἰς τερμίνθινον ἔλαιον διὰ τῆς προσθήκης ξηρανομένων ἢ μὴ ξηρανομένων λιπαρῶν ἐλαίων. Τὰ γανώματα λοιπὸν εἶναι διαλύματα τῶν ῥητινῶν, τὰ ὅποια ἀλειφόμενα ἐπὶ σωμάτων εἰς λεπτάς στιβάδας τὰ διατηροῦν τόσον ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀέρος καθὼς καὶ τοῦ ὕδατος. Ἐπειδὴ δὲ τὸ διαλυτικὸν μέσον ἐξατμίζεται μετ' ὀλίγον καιρὸν, ἐπιμένει εἰς τὴν ἀλειμμένην ἐπιφάνειαν λεπτὴ καὶ στιλπνὴ λεπίς τῆς διαλυομένης ῥητίνης. Τὰ μὲ ἀκρατον οἰνόπνευμα κατασκευαζόμενα γανώματα ξηραίνονται τάχιστα. Αἱ μὲ οἰνόπνευμα ἐπιχυθεῖσαι ῥητίναι μαλάττονται πρότερον καὶ ἔπειτα προσκολλῶνται εἰς τὸ ἀγγεῖον· πρὸς ἀποφυγὴν τούτου πρέπει νὰ συμμιχθῶσιν αἱ ῥητίναι πρότερον μὲ ὀλίγην τεθλασμένην ὑέλων.

Ὡχρὸν γάνωμα κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Ἐξ μέρη μαστίχης καὶ 3 σανδαράχης λειοτριβηθέντα μιγνύονται μὲ 4 ὑέλου ὡσαύτως λειοτετριμμένης· τεθέντα δὲ εἰς σικύαν θερμαίνονται καὶ ἀνακινεῖνται συνεχῶς· προστίθενται ἔπειτα 3 μέρη τερεβινθίνης τῆς Βενετίας καὶ τὸ μίγμα ἀφίνεται $\frac{1}{2}$ ὥραν εἰς τὸ ζέον ὕδωρ, ἀκολούθως ἀποχύνεται τὸ ὑγρὸν ἀπὸ τὴν ὑποστάθμην καὶ διυλίζεται διὰ βύσσου. Τὸ γάνωμα τοῦτο μεταχειρίζεται μάλιστα πρὸς γάνωσιν διαφόρων σκευῶν.

Πρὸς γάνωσιν τῶν ἐξ ὀρειχάλκου κατεσκευασμένων σκευῶν κτλ. μεταχειρίζονται κοινῶς μίγμα συγκείμενον ἐξ 8 μερῶν σανδαράχης καὶ 8 λάκου εἰς λεπίδας λευκανθέντος διὰ γλωρίου, 4 μαστίχης καὶ 80 οἰνοπνεύματος.

Τὸ διὰ τερεβινθίνης γάνωμα κατασκευάζεται ἐξ 24 μερῶν μαστίχης, 3 λάρικος, 1 κηφουῆς, 10 τεθλασμένης ὑέλου καὶ 72 ἀπείραγμένου τερμινθίνου ἐλαίου· εἶναι χρήσιμον κατ' ἐξοχὴν πρὸς γάνωμα ζωγραφικῶν δι' ἐλαίου καὶ χαλκογραφικῶν.

Πλέον βαθύχρῳα χρώματα λαμβάνονται διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ λάκου εἰς λεπίδας καὶ τοῦ κολοφωνίου εἰς θερμὸν τερμίνθινον ἔλαιον.

Τὰ προειρημένα γανώματα δύνανται ποικίλως νὰ χρωματισθῶσι κατ' ἀρέσκειαν· λαμβάνουν ὡχρὸν χρῶμα διὰ χρυσώπου (Gumi Guttæ) διὰ κροκορρίζης (Radix Curcumæ) καὶ διὰ χρωμικοῦ μολύβδου· κόκκινον χρῶμα λαμβάνουν διὰ σαγαλλίνου ξύλου, διὰ δρακοντίου αἵματος, διὰ ἀνθηροκόκκου (Coccinella) ἢ διὰ κινναβάρους.

Λιπαρόν γάνωμα κατασκευάζεται ἐξ 76 μερῶν κοπάλης, 8 λινελαίου ζεομένου με λιθάργυρον, 16 τερμινθίνου ελαίου. Τὸ ζέον λινέλαιον προστίθεται εἰς τὴν προηγουμένως τακείσαν κοπάλην καὶ ἔπειτα προστίθεται τὸ ἔως τὴν 60° R· θερμαίνοντιον τερμινθίνον ἔλαιον. Τὸ ζέον ἀκόμη γάνωμα διὰ λίνου διυλίζόμενον καὶ εἰς λαγήνους φυλακτόμενον γίνεται μετὰ καιρὸν ὑελοφινές.

Κοιμιόρηται.

Gumiresinae.

Αἱ κοιμιόρηται εἶναι γαλακτώδεις ὁποῖ ρέοντες ἀπὸ διάφορα ἐντερνόμενα φυτὰ καὶ ἀποξηραινόμενοι εἰς τὸν ἀέρα. Σύγκεινται ὅχι μόνον ἐκ κόμμεως καὶ ῥητίνης, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰθερίων ελαίων καὶ ἄλλων οὐσιῶν· παρίστανται ὡς κοιμῆτια σκληρὰ, εὐθραυτα, βιρύτερα τοῦ ὕδατος· σχεδὸν ἅπασαι αἱ κοιμιόρηται εἶναι ἀδιαφανεῖς, βαρύτεροι, δριμεῖαι τὴν γεῦσιν, διαφέρουσι μετὰ τῶν ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, εἶναι διαλύσιμοι ἐν μέρει εἰς τὸ οἰνόπνευμα, καθὼς καὶ εἰς τὸ ὕδωρ, ἐντελῶς δὲ εἰς κεκραμένην διάλυσιν τῆς ποτάσης. Τριβόμεναι με ὕδωρ συνιστοῦν γαλάκτωμα. Αἱ πλέον συχναὶ εἶναι.

Τὸ ἀμμωνιακὸν κόμμι, *Ammoniacum*. Τοῦτο ῥέει ἐκ τοῦ *Heracleum gummiferum*, φυτοῦ σκιαδοφόρου, καὶ συνίσταται ἀπὸ βωλάρια ἢ δάκρυα ὑπωχρα ἢ ἀπὸ πλακοῦντας φαιοκιτρίνους. ἔχει ἰδιαιτέραν ὀσμὴν καὶ δριμεῖαν πικρὰν γεῦσιν, εἰδικὴν βαρύτητα 1,207. Εἰς τὸ ψυχρὸς δύνάται νὰ λειοτριβηθῇ, μαλακοῦται δὲ διὰ τῆς θερμῆς χειρός. Τριβόμενον με ὕδωρ σχηματίζει πολὺ λευκὸν γαλάκτωμα ἐν ἀποσταχθῇ με ὕδωρ, δίδει πτητικὸν ἔλαιον ἄχρουν, ἐπιπλέον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος, τὸ δὲ ἐπιμένον μέρος εἶναι ἄσπρον.

Μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἰατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς, καὶ πρὸς κατασκευὴν διαφόρων ἐμπλάστων.

Τὸ μηδικὸν οὐλίγιον, *Asa foetida*, σταλάζει ἀπὸ τὴν ῥίζαν, σχισθεῖσαν πλαγίως κατὰ τὸ ὑπὲρ τὴν γῆν μέρος, σκιαδοφόρου τινὸς φυτοῦ *Ferula asa foetida* καλουμένου. Εἶναι ῥοδόχρουν ἢ ἐρυθρὸν, ἔχει ὀσμὴν σκοροδίου ναυτιώδη καὶ πολλὰ διαπεραστικὴν, καὶ γεῦσιν δριμεῖαν καὶ πικράν. Ἀπὸ τὸ ψυχρὸς γίνεται εὐθρυπτον, δι' ὀλίγης δὲ θερμῆς μαλακόν. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης του εἶναι 1,327. Διὰ τῆς ἀποσταλάξεως ἐξατμίζεται

έλαιον ὠχρόν, ἐλαφρόν καὶ βαρύσμον. Τὸ ἔλαιον τοῦτο ἐμπεριέχει κατὰ τὰς ἀναλύσεις τοῦ K. Zeise θεῖον, καὶ ἐὰν κατὰ σχηματίζεται θειῶδες ὀξύ. Ἡ εἰς τὸ σίλφιον ἐμπεριεχομένη ῥητίνη εἶναι βαθύφαιος, εὐθρυπτος, κογχοειδὴς τὴν θραῦσιν, πικρά καὶ σκορώδης τὴν γεῦσιν, εὐτηκτος, δυναμένη νὰ λευκανθῇ διὰ τοῦ χλωρίου. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος λαμβάνει χρυσιζόν χροῶμα· εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διαλύσιμος εἰς τὸν αἰθέρα, τὸ δὲ ἀδιάλυτον μέρος τῆς εἶναι ῥητινώδες, εὐθρυπτον, εὐτηκτον, ἄσμον καὶ ἄχυρον.

Τὸ σίλφιον εἶναι χρήσιμον εἰς τὴν ἱατρικὴν ὡς ἀντισπασμωδικόν, καὶ ἡ ἐνέργειά του ἐξαρτᾶται ἀπὸ πτητικόν τι ἔλαιον καὶ ἀπὸ τὴν ῥητίνη· ὅθεν ἂν διὰ τῆς πολυκαιρίας γίνεται ἄσμον, ἀποβάλλει καὶ τὴν τοιαύτην ἐνέργειάν του. Εἰς τὴν Ἰνδίαν ἀλείφουσιν μὲ αὐτὸ τὰ πινάκια διὰ νὰ κατασταίνωσιν τὰ φαγητὰ ἀρωματικά.

Εὐφόρβιον. Σταλάζει ἀπὸ εἰδός τι φλόμου *Euphorbia officinarum*, θαμνίσκου φυομένου εἰς τὴν νότιον Ἀφρικὴν. Σύγκειται ἐκ τμημάτων φαιῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲ ἀκάνθας διατρυπημένων καὶ μὲ σπέρματα μεμιγμένων. Εἶναι σχεδὸν ἄσμον, κατ' ἀρχὰς ἀσθενὲς τὴν γεῦσιν, ἔπειτα δὲ πυρῶδες, κυστικὸν καὶ ναυτιῶδες· λειοτριβημένον φέρει πταρμόν, καὶ φλεγμονὴν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὴν ῥίνα. Ἐμπεριέχει κατὰ τὸν K. Pelletier 60,8 ῥητίνης, 14,4 κηροῦ, 2,0 βασσορίνης, 1,8 μηλικοῦ καλίου, 12,2 μηλικῆς τιτάνου, 8,0 πτητικοῦ ἐλαίου καὶ ὕδατος· ὁ K. Brandes ἀνεκάλυψε καὶ ἐλαστικὸν κόμμι, *Cautschouk*.

Ἡ εἰς αὐτὸ ἐμπεριεχομένη ῥητίνη, ἐπεὶ εἶναι τὸ κύριον συστατικόν του καὶ δύναται νὰ ἐκχυλισθῇ διὰ οἰνοπνεύματος, ἐκαλέσθη *Euphorbia*. Εἶναι ἐρυθρόφαιος, διαφανὴς, εὐθρυπτος, κυστικὴ τὴν γεῦσιν καὶ εὐτηκτος. Τήκεται διὰ τῆς θερμότητος, χωρὶς νὰ ἐξοιδουῖται, ἐξάγουσα μόνον ὀλίγην εὐώδη ὁσμὴν ὡς τὴν τῆς βενζόνης, διαλύεται εἰς τὸ οἶνοπνευμα, εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ τερμίνθινον ἔλαιον. Μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐξωτερικῶς ὡς ἐκδώριον.

Χρύσωπον. *Gumi Guttæ*. Τὸ δένδρον, ἐκ τοῦ ὁποίου σταλάζει τὸ χρύσωπον, φύεται εἰς τὴν Ἰνδίαν καὶ λέγεται *Mangostana Cambogia* ἢ *Garcinia Cambogia*· παρίσταται ὡς τεράχια μεγάλα, βαθύξανθα, στιλπνὰ τὴν θραῦσιν, ἅτινα λειοτριβούμενα γίνονται χρυσωπὰ, ἄσμα, ὑπόγλυκα καὶ ὀλίγον δριμέα τὴν γεῦσιν. Κατὰ τὸν K. John ἐμπεριέχει 80 ὠχρὰς ῥητίνης καὶ 20 κόμμεως. Ἡ διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος διαλελυμένη ῥητίνη

εἶναι ὑακινθίνη, διαφανής, λειοτριβουμένη δὲ ὥχρᾳ, ἥ μὲ ὕδωρ μεμιγμένη κόνις λευκαίνεται διὰ τοῦ χλωρίου, εἰς καυστικὸν κάλιον διαλύεται μὲ ἐρυθρόφαιον χρῶμα. Ἡ οὐδετέρα διάλυσις κατὰ κρημνίζεται διὰ τοῦ ἀλικοῦ κασσιτέρου μὲ ὠραῖον ὥχρῳ χρῶμα, διὰ τοῦ θειικοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου μὲ φαιόν, διὰ τοῦ νιτρικοῦ χαλκοῦ μὲ πράσινον. Ἡ ὥχρᾳ ῥητίνη ἀποχωρίζεται ἐντελῶς διὰ τοῦ αἰθέρος ἀπὸ τὸ κόμμι. Τὸ χρύσωπον εἶναι πολὺ δραστικὸν καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐσωτερικὸν ἱατρικόν, καθὼς καὶ ὡς ὑδρόχρωμα εἰς τὴν ζωγραφίαν.

Σμύρα, Myrrha. Λαμβάνεται εἰς τὴν ἄνω Αἴγυπτον καὶ εἰς τὴν Νοβίαν ἐκ τοῦ δένδρου *Balsamodendron Myrrha*· εἶναι δὲ τμήματα ἄμορφα, εὐθρυπτα, ἐρυθρόφαια, πικρὰ καὶ ἀρωματικά· ἐξοιδαίνεται διὰ τῆς θερμῆς χωρὶς νὰ τήκεται. Κατὰ τὸν K. Brandes ἐμπεριέχει 2,60 πτητικοῦ ἐλαίου, 22,24 μαλακοῦ ῥητίνης πικρᾶς, εὐδιάλυτου εἰς τὸν αἰθέρα, 5,56 ῥητίνης ἀχύμου, διαλυτῆς εἰς τὸν αἰθέρα, 54,88 κόμμεως μὲ ἔχνη ἀλάτων, 9,30 βασσορίνης, μηλικόν, ὄξιόν, βενζοϊκόν καὶ θειικόν ὀξύ· ἠνωμένα μὲ τίτανον καὶ κάλιον. Ἡ ῥητίνη τῆς σμύρας εἶναι ὠχρόφαιος, εὐθρυπτος, εὐτηκτος, πικρὰ καὶ ἀρωματική, εὐδιάλυτος εἰς τὰ ἀλκάλια. Τὸ κόμμι τῆς εἶναι κόνις, ἥτις παράγει ἀμμωνίαν διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως καὶ σχηματίζει μὲ τὸ ὕδωρ γλίσγραμμα πυκνότερον ἀπὸ τὸ ἀραβικὸν κόμμι· ζεόμενον μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος δὲν σχηματίζει ἰζῶδες, ἀλλὰ μόνον ὄξαικόν ὀξύ.

Τὸ αἰθέριον ἔλαιον τῆς σμύρας εἶναι κατ' ἀρχὰς ἄχρουν, λεπτόρρευσον, βαρύτερον τοῦ ὕδατος καὶ ἔχει τὴν δυνατὴν ὁσμὴν τῆς σμύρας. Ἡ σμύρα μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς.

Αἰβανός, Olibanum. Πέει ἐκ δένδρου τινός, εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἐγχωρίου καὶ *Boswellia serrata* λεγομένου. Εἶναι ὑπόξανθος, ὑποδιαυγής, εὐθρυπτος, πικρὸς τὴν γεῦσιν, καίόμενος ἐκπέμπει εὐωδίαν, λειοτριβοῦμενος δίδει κόνιν λευκὴν, ἥτις συνιστᾷ μὲ τὸ ὕδωρ γαλακτόχρουν ὑγρόν. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης τοῦ 1,221, διὰ τῆς ἀποστάξεως ἐξάγεται αἰθέριον ἔλαιον. Κατὰ τὸν K. Braconot σύγκειται ἐκ 5 πτητικοῦ ἐλαίου, 53 ῥητίνης, 30 κόμμεως, καὶ 6 βασσορίνης. Ὁ λίβανος μεταχειρίζεται ὡς ἱατρικὸν ἐξωτερικῶς, κατ' ἐξοχὴν δὲ ὡς θυμίαμα.

Κομμυῖ ῥητίνη τοῦ *ιεροξύλου*. Σταλάζει αὐτομάτως ἢ διὰ τῆς ἀφελύσεως τοῦ *Guajacum officinale*, δένδρου εἰς τὰς δυτικὰς Ἰνδίας φυομένου. Δύναται δὲ νὰ ἐξαχθῇ καὶ ἐκ τοῦ ῥιניσμένου ξύλου διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος. Ἡ ἀγοραία ῥητίνη παρίσταται εἰς τμήματα μεγάλα, ἄμορφα,

πράσινα ἢ φαιοπράσινα, ὑποδιαυγῆ καὶ εὐθρυπτα, ταῦτα τριβόμενα εἶναι ὑπόλευκα, πρασινίζουν δὲ ἔπειτα διὰ τοῦ φωτός, εἶναι ἀρωματικά τὴν ὁσμὴν, γλυκόπικρα καὶ δριμύα τὴν γεῦσιν, τήκονται εὐκόλως εἰς τὸ πῦρ καὶ εὐωδιάζουν. Ἡ ῥητίνη τοῦ ἱεροξύλου ἐμπεριέχει κατὰ τὸν K. Buchner 50 ῥητίνης, 16,5 φλοιοῦ τοῦ ξύλου, 5,1 κόμμεως εὐδιαλύτου εἰς τὸ ὕδωρ καὶ 2 ἐκχυλισματικῆς ὕλης δριμύεις, διαλυτῆς εἰς τὸ ὕδωρ. Ἡ κομμωμένη ῥητίνη συνιστᾷ εἰς τὸ ὕδωρ διαλυομένη πρασινίζον γαλάκτωμα. Τὸ ῥητινώδες μέρος τῆς διαφέρει ἀπὸ πάσας τὰς ἄλλας ῥητίνας, καθότι ἀπορροφᾷ εὐκολώτερον τὸ ὀξυγόνον καὶ μεταβάλλει συγχρόνως καὶ τὸ χρῶμα. Ὁ διὰ τοῦ βάμματος τῆς ῥητίνης ἐπινοτιζόμενος χάρος λαμβάνει εἰς τὸ ὀξυγόνον καὶ εἰς τὸν ἀέρα διὰ τῆς ἐπιπόροῦς τοῦ ἀδιαιρέτου ὡς καὶ τοῦ ἰώδους φωτός πράσινον χρῶμα, δὲν μεταβάλλεται δὲ διὰ τῆς ἐρυθρᾶς ἀκτίνος μήτε εἰς τὸ ἀνθρακικὸν ἀέριον. Τὸ πράσινον χρῶμα μεταβάλλεται εἰς ὠχρόν, ἐν τεθῇ εἰς τὴν ἐστίαν ἐρυθρᾶς ἀκτίνος.

Τὸ φαιὸν διάλυμα τοῦ βάμματος τῆς ῥητίνης ὑπόκειται εἰς τὰς μεταβολὰς τοῦ χρώματος διὰ πολλῶν ἄλλων ὑλῶν. Τὸ δι' ὕδατος κεκραμένον νιτρικὸν ὀξύ, κατ' ἐξοχὴν ἐν ἐμπεριέχῃ νιτρῶδες ὀξύ, καθὼς καὶ τὸ χλωρίον, κυανίζουσιν τὸ φαιὸν διάλυμα· λαμβάνει δὲ βαθυκυανοῦν χρῶμα ἰδίως διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου. Ὁμοίως λαμβάνει κυανοῦν χρῶμα διὰ πολλῶν ὀργανικῶν ὑλῶν, καθὼς διὰ τοῦ σιταμύλου, ἐξ αἰτίας τῆς εἰς αὐτὸ ἐμπεριεχομένης φυτοκόλλας, καθότι διὰ καθαροῦ ἀμύλου δὲν κυανίζεται· δίδει ὡσαύτως κυανοῦν χρῶμα τὸ τοῦ ἱεροξύλου βάμμα εἰς τὸ γλίσχρασμα τοῦ ἀράδικου κόμμεως καὶ εἰς πολλὰς νεαρὰς ῥίζας. Τοιαύτην μεταβολὴν τοῦ χρώματος ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἄθραστον γάλα.

Διὰ τοῦ ἀρχαίου θεϊκοῦ ὀξέος διαλύεται ἡ ῥητίνη τοῦ ἱεροξύλου μὲ βαθύ ἐρυθροῦν χρῶμα. Ἐν τὸ τοῦ ἱεροξύλου βάμμα ἐνωθῇ μὲ νιτρικὸν ὀξειδωμένον χαλκὸν καὶ συγχρόνως μὲ ὑδροκυανικὸν ὀξύ, κατακρημνίζεται ὑδροκυανικὸς ὑποξειδωμένος χαλκὸς καὶ τὸ ὑγρὸν λαμβάνει πράσινον, κυανοῦν, καὶ τέλος φαιὸν χρῶμα.

Διὰ τῶν διαλυμάτων τοῦ καλίου καὶ τοῦ νάτρου διαλύεται ἡ ῥητίνη μὲ καθαρὸν φαιὸν χρῶμα, καὶ εἰς τὰ ποριζόμενα διαλύματα ἀποτελοῦσι τὸ θεϊκόν καὶ τὸ ἀλικὸν ὀξύ κρῆστα ἰζήματα, διαλυτὰ εἰς ζέον ὕδωρ. Καὶ τὰ ἀνθρακικὰ ἀλάλια διαλύουσι τὴν ῥητίνη· ἐν δὲ ἡ τοῦ ἱεροξύλου ῥητίνη εἶναι νενοθευμένη μὲ κολοφώνιον, τότε μένει τὸ διὰ τοῦ καλίου διάλυμα θολόν. Τὸ διὰ τοῦ καλίου διάλυμα κατακρημνίζει τὴν βαρεῖαν ἐκ τῆς ὀξικῆς βαρεῖας μὲ ὑπέρυθρον, καὶ τὴν τίτανον μὲ υποκίτρινον

χρῶμα. Με τὸν ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον σχηματίζει ἡ ρητίνη τεφρόχρουν ἔνωσιν.

Ἡ τοῦ ἱεροξύλου κομμυρρήτίνη εἶναι πολὺ ἐνεργητικὸν ἱατρικόν. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ρητίνης πρὸς τὸ ὀξυγόνον, τὸ χλώριον καὶ πρὸς πολλὰς ὀργανικὰς οὐσίας ἐπαρακίνησαν τοὺς χημικοὺς νὰ τὴν θεωρήσωσιν ὡς ἰδιαιτέρας φύσεως ρητίνην, καὶ ὁ Κ. Brandes τὴν ὠνόμαζε Guajacin· ἡ ρητίνη αὕτη ἀποτίθεται ἐνίοτε ἐκ τοῦ βάμματος εἰς εἶδος λαμπρίζοντων κρυστάλλων.

Αὐτορρύτια βάλαμα.

Βάλαμα ὀνομάζομεν ἐκεῖνας τὰς αὐτορρύτους ρητίνας, αἵτινες ἐμπεριέχουν ἐκτὸς τῶν αἰθερίων ἐλαίων μεγάλην ποσότητα βενζοϊκοῦ ὀξέος καὶ ἄλλας οὐσίας. Εἶναι δὲ ταῦτα ἢ ῥευστὰ καὶ ἱξώδη, ἢ στερεὰ, ἔχουν τὴν ἰδιαιτέραν εὐωδὴν ὁσμὴν τοῦ βενζοϊκοῦ ὀξέος, τὸ ὅποιον ἐξαχνίζεται ἐξ αὐτῶν διὰ τῆς θερμότητος.

Ῥευστὰ βάλαμα.

1) Βάλαμον περουβικόν, Balsamum peruvianum. Ἐξάγεται ἐκ δένδρου τινὸς Myroxylon peruiferum καλουμένου, καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν νέαν Γρανάταν φυομένου. Ὑπάρχουν τρία εἶδη αὐτοῦ, τὸ αὐτομάτως σταλάζον λευκὸν περουβικόν ἢ ἰνδικόν καλούμενον, τὸ ἀπεξηραμμένον καὶ εἰς εἶδος μικρῶν κολοκυνθῶν μεταφερόμενον, Opobalsamum siccum, καὶ τὸ μέλαν περουβικόν, Balsamum peruvianum nigrum.

Τὰ δύο πρῶτα εἶναι ἐρυθροκίτρινα, διαφανῆ, ἀρωματικὰ τὴν ὁσμὴν καὶ δριμύα τὴν γεῦσιν κατὰ τὸν Κ. Tromsdorf ἐμπεριέχουσιν 88 ξηρᾶς ρητίνης, 42 αἰθερίου ἐλαίου καὶ 12 βενζοϊκοῦ ὀξέος.

Τὸ μέλαν βάλαμον ἐκτίθεται διὰ ἰδιαιτέρας ξηρᾶς ἀποστάξεως τοῦ ξύλου· εἶναι παχύρρευστον, ὅχι δὲ ἱξώδες, θαθύφαιον, εἰς μεγάλην ποσότητα μελανίζον, εὐωδέστατον, πικρὸν καὶ δριμύ. Διὰ τῆς ἐπιφόρης τοῦ ἀέρος δὲν στερεοῦται, ἀλλ' ἀποθέτει μετὰ τινα χρόνον κρυστάλλους τοῦ βενζοϊκοῦ ὀξέος. Εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ λεῖψυδρον οἰνόπνευμα καὶ χρειάζεται τοῦλάχιστον 5 μέρη οἰνοπνεύματος, 0,85 εἰδικῆς βαρύτητος καὶ τὸ διάλυμα δὲν εἶναι ἐντελῶς καθαρόν. Κατὰ τὸν Κ. Stolze ἐμπεριέχει 69 ἐλαίου, 20,7 ρητίνης εὐδιαλύτου φαΐας, 24 ρητίνης δυσδιαλύτου, 6,4 βενζοϊκοῦ ὀξέος καὶ 0,6 ἐκχυλισματικῆς ὕλης.

Διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς ἐρυθρόφαιον καὶ παχὺ μίγμα. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος σχηματίζεται ὑδροκυανικὸν ὀξύ, διὰ δὲ τῆς ἐξατμίσεως ἐπιμένει τεχνητὴ σκυτοδεσφικὴ ὕλη. Τὸ καυστικὸν κάλιον συνιστᾷ μὲ τὸ ἔλαιον τοῦ βαλσάμου ρευστὸν σάπωνα καὶ μὲ τὴν ῥητίνην μάζαν ἰξώδη φαιάν.

Τὸ διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τῆς ἀνθρακικῆς ποτάσεως, ὡς καὶ τὸ ὕδωρ, διαλύουσιν ἐκ τοῦ βαλσάμου κινναμωμικὸν ὀξύ, ἐνῶ ἡ ἐμπεριεχομένη ῥητίνη, Cinnamein ἢ Peruvín, καταβυθίζεται· διὰ τῆς κατεργάσεως τῆς ὕλης ταύτης μὲ οἰνόπνευμα καὶ ἀποφύξεως τοῦ διαλύματος ἀποτίθενται κρύσταλλοι, οἵτινες εἶναι ἀλλοίωσις τῆς ῥητίνης *Metacinnamein*.

Ὡς οἱ κρύσταλλοι θερμανθῶσι μετὰ τιτάνου ὑδρομιγοῦς σχηματίζεται ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν τοῦ ὑδρογόνου κινναμωμικὴ τίτανος. Τὸ αἰθέριον ἔλαιον ἐξάγεται διὰ τῆς ἀποστάξεως τοῦ βαλσάμου· εἶναι ἄχρουν λεπτόρρευστον καὶ εὐώδες καθὼς τὸ βάλαμον. Ἡ ῥητίνη εἶναι καθύφαιος, ἄοσμος, ἄχυμος, εὐτηκτος, καὶ ὁμοιάζει κατὰ τὰ χημικὰ χαρακτηριστικά μὲ τὴν ῥητίνην τῆς βενζόνης. Τὸ βάλαμον μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς.

Βάλαμον τολουτάϊκον, Balsamum toluatanum. Πέει ἐκ δένδρου τινὸς εἰς τὴν νότιον Ἀμερικὴν φυομένου, Myroxylon toluiferum. Εἶναι ὠχρόφαιον, ἔχει σύστασιν τερεβινθινώδη, ὁσμήν βενζοϊκὴν καὶ γεῦσιν ἀρωματικήν. Τὸ εἰς τὸν ἀέρα συμπηγνύμενον, καθὼς εὐρίσκεται κοινῶς ἀγοραῖον, λέγεται καὶ Orobalsamum siccum· ἀποσταζόμενον μὲ ὕδωρ διδὲι πτητικὸν ἔλαιον καὶ βενζοϊκὸν ὀξύ, ἡ δὲ ῥητίνη ἐπιμένει. Διαλύεται εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἰς τὸν αἰθέρα, εἰς τὰ πτητικὰ ἔλαια καὶ εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον· εἶναι χρήσιμον καθὼς καὶ τὸ περουβικὸν βάλαμον ἐσωτερικῶς.

Μελιτύραξ, *Styrax liquida*. Εἶναι ὁπὸς ἐκτεκόμενος ἀπὸ τοῦς κλάδους δένδρου τινὸς εἰς τὴν βόρειον Ἀμερικὴν φυομένου καὶ Liquidambar *Styraciflua* λεγομένου· ἔχει τὴν σύστασιν τῆς τερεβινθίνης, εἶναι γλίσχρος, ἀδιαφνής, τεφρώδης, πρασινίζων, εὐώδης, ἔχει ἀρωματικὴν ὁσμήν, διαλύεται εἰς τὸ οἰνόπνευμα μὲ φαιὸν χρῶμα καὶ ἀποθέτει 0,9 ἑτερογενῶν οὐσιῶν. Χρησιμεύει κατ' ἐξοχὴν ὡς θυμίαμα.

Στερεὰ βάλαμα.

Βενζόη Benzoe ἢ Asa duleis. Πέει ἐκ δένδρου τινὸς εἰς τὴν ἰνδικὴν φυομένου *Styrax Benzoe*. Παρουσιάζεται ὡς τεμάχια μεγάλα εὐθρυ-

πτα, υπόφαια, λευκοὺς κόκκους ἐμπεριέχοντα, εὐώδη· τήκεται δι' ὀλίγης θερμότητος, δι' ἧς ἐξαχνίζεται βενζοϊκὸν ὀξύ· διαλύεται εἰς τὸ οἰνόπνευμα ὅχι δὲ εἰς τὰ ἔλαια. Ὁ K. Buchholz καὶ ὁ K. Stolze ἀναλύσαντες τὴν βενζόην εὗρον 12,5 μέχρι τῶν 19,0 βενζοϊκοῦ ὀξέος, 80 ῥητίνης, ἀρωματικὴν ἐκχυλισματικὴν ὕλην καὶ ὀλίγον αἰθέριον ἔλαιον. Ἡ βενζόη ἐμπεριέχει δύο εἴδη ῥητίνης, τὸ μὲν εὐδιάλυτον τὸ δὲ ἕτερον ἀδιάλυτον εἰς τὸν αἰθέρα. Ἡ εὐδιάλυτος ῥητίνη εἶναι ὑπωχρος, εὐθρυπτος, εὐτηκτος, καὶ εὐώδης. Διαλυομένη εἰς ἄκρατον θειϊκὸν ὀξύ σχηματίζει ὑγρὸν βαθύ ἐρυθροῦν μὴ κατακρημνιζόμενον διὰ τῆς προσθέσεως μήτε τοῦ ὕδατος μήτε τῶν ἀλκαλίων.

Τὸ τῆς ῥητίνης εἰς οἰνόπνευμα διάλυμα δίδει εἰς τὸ διάλυμα τοῦ ἀλικοῦ σιδήρου ἀνοικτὸν πράσινον χρῶμα. Ἡ ῥητίνη εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ἄκρατον ὀξικὸν ὀξύ, κατακρημνίζεται δὲ πάλιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ ὕδατος.

Ἡ βενζόη, διαλυομένη εἰς οἰνόπνευμα καὶ μιγνυομένη μὲ ὕδωρ δίδει λευκὸν γαλακτώδες ὑγρὸν, τὸ ὁποῖον εἶναι γνωστὸν ὡς κοσμητικὸν ἱατρικὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα *parthénion* γάλα *Lait de vierge*. Ἡ βενζόη προσέτι χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν τοῦ βενζοϊκοῦ ὀξέος καὶ πρὸς θυμιάσιν καὶ κατασκευὴν διαφόρων εὐωδῶν μιγμάτων.

Στύραξ *Styrax Calamita*. Σταλάζει ἐκ τοῦ ἀφελκομένου στελέχους τοῦ *Styrax officinalis* δένδρου εἰς τὰ μεσημβρινὰ μέρη τῆς Εὐρώπης, εἰς τὴν Αἰθιοπίαν καὶ εἰς τὴν Ἀσίαν εὐρισκομένου. Πωλεῖται εἰς θρόμβους κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον μεγάλους, ὀλίγον μαλακοὺς, ἔξωθεν φαιούς, ἔνδον βαθυζάνθους, χονδρώδεις, καὶ εὐωδιάζοντας ὡς ἡ βενζόη, ἐμπεριέχουν ἐκτὸς τοῦ βενζοϊκοῦ ὀξέος ἔλαιόν τι αἰθέριον, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἐξαχθῇ ἐν μέρει διὰ τῆς ἀποστάξεως μὲ ὕδωρ· ὁ στύραξ προστίθεται εἰς θυμιάματα.

Ῥητίνη ἐκχυλισματικὴν ὅλην ἐμπεριέχουσα.

Ἀλόη Aloe· οἱ πολὺοποι θάμνοι ἐξ ὧν ἡ *αλόη* ῥέει ἢ ἐκχυλίζεται λέγονται *Aloe soccotrina*, *spicata*, *perfoliata* κτλ. ἐγχώριοι εἰς τὰ μεσημβρινὰ μέρη τῆς Ἀφρικῆς· διακρίνονται δύο εἴδη ἀλόης *Aloe soccotrina* καὶ *Aloe hepatica*. Ἡ πρώτη εἶναι φαιὰ, στίλβουσα ὡς ἡ πίσσα, διαφανής, εὐθρυπτος, ἡ δὲ ἄλλη ἡπατοειδής, ὀλίγον μόνον στιλπνὴ καὶ διαφανής.

Ἡ ἀλόη ἔχει ὁσμὴν ἰδιαιτέραν καὶ γεῦσιν πικροτάτην διαλύεται σχεδὸν ἐντελῶς εἰς τὸ ζέον ὕδωρ· ἀποπλυνομένη μὲ ψυχρὸν ὕδωρ ἕως τοῦ παύσῃ ἀπὸ τοῦ νά τὸ χρωματίζῃ ὠχρὸν, ἐπιλείπει οὐσίαν ἰξώδη, γλίτχραν, πολὺ ὁμοιάζουσαν μὲ τὴν ῥητίνην καὶ ἡ ὁποία δὲν διαλύεται πλέον εἰς τὸ ζέον ὕδωρ.

Ἡ *aloe succotrina* ἐμπεριέχει 32 ῥητίνης καὶ 68 πικρᾶς ἐκχυλισματικῆς ὕλης.

Ἡ ἀλόη μεταχειρίζεται συχνάκις εἰς τὴν ἱατρικὴν, κατ' ἐξοχὴν ἡ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ διαλελυμένη καὶ ἔπειτα ἐξατμιζομένη ὑπὸ τὸ ὄνομα *Extractum Aloes aquosum*.

Σκαμμωνία Scamonium. Εἶναι ὁ εἰς τὸν ἀέρα συμπηγνόμενος ὁπὸς σταλάζων ἐκ τῆς ἀφελκομένης ρίζης ἐτησίου τινὸς φυτοῦ *Convolvulus Scamonia* εἰς τὴν ἀνατολὴν καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν Συρίαν ἐγχωρίου. Δύο εἶδη σκαμμωνίας εὐρίσκονται, τὸ μὲν Ἀλλεπικόν, τὸ δὲ Σμυρναῖον. Τὸ πρῶτον συνίσταται ἀπὸ τεμάχια πορώδη, τερρόχροα, εὐθρυπτα καὶ εὐτηκτα, τὰ ὁποῖα διαλυόμενα εἰς ὕδωρ σχηματίζουν γαλάκτωμα πρασινίζον· ἐκτὸς τῶν ἑτερογενῶν μερῶν ἐμπεριέχει 60 ῥητίνης 2 πικρᾶς ἐκχυλισματικῆς ὕλης καὶ 3 κόμμεως· ἡ σκαμμωνία εἶναι δραστικόν.

Ἐλαστικὸν κόμμι Kaoutschonk. Ἐπειδὴ τὸ ἐλαστικὸν κόμμι ἐνομίσθη ἄλλοτε μὲν κόμμι ἄλλοτε δὲ ῥητίνη, ὠνομάσθη ἄλλοτε *Gumi elasticum* ἄλλοτε *Resina elastica*. Διαφέρει δὲ τόσον ἀπὸ τὰς οὐσίας ταύτας ὥστε πρέπει νὰ τὸ θεωρήσωμεν ὡς ἰδιαιτέραν ὕλην.

Τὸ ἐλαστικὸν κόμμι ἐγίνε γνωστὸν εἰς τὴν Εὐρώπην διὰ τοῦ *K. La Condamine* εἰς τὰ 1736. Εἶναι ὁπὸς λευκὸς ῥέων ἐκ τοῦ ἀφελκομένου στελέχους διαφόρων δένδρων εἰς τὴν Γουϊάναν καὶ τὴν Βρασιλίαν φουμένων, μάλιστα ἐκ *Siphonia elastica*, *Ficus indica*, *Hevea guianensis* κτλ.

Πωλεῖται εἰς ῥευστὴν κατάστασιν, συχνότερα δὲ εἰς ξηρὰν καὶ εἰς σχῆμα λαγήνων διαφόρου μεγέθους. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ὁ γαλακτώδης ὁπὸς ἀλείφεται ἐπὶ τύπων κατεσκευασμένων ἐξ ἀργίλλου καὶ ἀκολούθως ἀποξηραίνεται πλησίον ἀσβολοῦντος πυρὸς, δι' οὗ λαμβάνει μελανόφαιον χρῶμα· ἀφοῦ ἀποξηρανθῇ ἀλείφεται πάλιν μὲ τὸν ῥευστὸν ὁπὸν, καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπαναλαμβάνεται, ἕως τοῦ ἡ λάγηνος λάβῃ τὸ ἀπαιτούμενον πάχος· μετὰ τὴν ἀποξήρανσιν ἐγχύνεται εἰς τὴν λάγηνον ὕδωρ, δι' οὗ διαλύεται ἡ ἀργίλλος.

Κατὰ τὸν *K. Faraday* ἐμπεριέχει ὁ εἰς κλεισμένας λαγήνους φυλατ-

τόμενος ὁπὸς καθυροῦ ἐλαστικοῦ κόμμεως 31,70, κηροῦ καὶ πικρᾶς ὕλης 7,13, οὐσίας τινὸς διαλυτῆς εἰς τὸ ὕδωρ, ἀδιάλυτον δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα 2,90, λευκώματος διαλυτοῦ 1,90, ὕδατος καὶ ὀξικοῦ ὀξέος καὶ ἀλάτων 56,37.

Ὁ ῥευστὸς ὁπὸς πηγνύται διὰ τῆς θερμότητος ἕνεκα τοῦ εἰς αὐτὸ ἐμπεριεχομένου λευκώματος, τὸ ὁποῖον ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὸ ἐλαστικὸν κόμμι ἐπιπλέον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑδατώδους ὑγροῦ. Ὁ ὁπὸς πηγνύεται καὶ ἐὰν προστεθῇ οἰνόπνευμα διὰ θερμοκρασίας μεγαλητέρας τοῦ ζέοντος ὕδατος τήκεται ἐπιλείπον ἰζῶδες ὑγρὸν, τὸ ὁποῖον μετὰ τὴν ψύξιν μῆτε πυκνοῦται μῆτε ἔχει πλέον ἐλαστικότητα· ἐὰν ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσαξιν ἀπολαμβάνονται τὰ συνήθη προϊόντα τῆς τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν ἀποσυνθέσεως καθὼς καὶ τρία ἔλαια Kautschin, Kautschen καὶ Heveen καλούμενα· ἀναθυμιᾷ ἕνεκα τοῦ ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένου λευκώματος ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν. Εἰς τὸ φῶς τοῦ λύχνου ἀναφλέγεται καὶ καίει μὲ φλόγα ἰσχυρῶς ἀσβολώδη. Εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ οἰνόπνευμα, διαλυτὸν εἰς τὸν αἰθέρα· πρὸς διάλυσιν τοῦ ἐλαστικοῦ κόμμεως διὰ τοῦ αἰθέρος πρέπει νὰ διαβραχῇ διὰ ζέοντος ὕδατος καὶ νὰ κατακοπῇ εἰς λεπτὰ κομμάτια.

Τὸ σχεδὸν ἄχρουν διάλυμα θολοῦται διὰ οἰνοπνεύματος καὶ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ αἰθέρος ἐπιμένει τὸ κόμμι εἰς ἀμετάβλητον κατάστασιν· εἰς ἀπεσταγμένον πετρέλαιον ἐξοιδοῦται λαμβάνον ὄγκον 30 πλάσιον, διαλύεται δὲ ἐν μέρει καὶ εἰς τὸ ζέον πετρέλαιον, τὸ δὲ ἐξάτμιζόμενον διάλυμα διαμένει ἐπὶ πολὺ ἰζῶδες. Διαλύεται καὶ εἰς τὸ ἀπεσταγμένον ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον τῶν λιθινθράκων, τὸ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν ἐπιμένον ἐλαστικὸν κόμμι εἶναι ἰζῶδες καὶ ἔχει ἀηδὴ ὀσμὴν. Ἡ διάλυσις τοῦ ἐλαστικοῦ κόμμεως εἰς τὸν ἔθειον ἀνθρακα εἶναι πάντοτε θολή καὶ φαίνεται ὅτι ὑπόκειται εἰς μεταβολὴν τινα· μερικὰ ἔλαια, καθὼς τὸ τερεβίνθινον ἔλαιον, τὸ ἔλαιον τοῦ λιθάνου κτλ. διαλύουν τὸ κόμμι, τὸ δὲ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ ἐλαίου ἐπιμένον εἶναι ἰζῶδες καὶ ὄχι ἐλαστικόν. Τὸ ἄκρατον θεικὸν ὀξύ καὶ τὸ καυστικὸν κάλιον ἐνεργῶν ὀλίγον μόνον ἐπὶ τοῦ κόμμεως. Τὸ νιτρικὸν ὀξύ μεταβάλλει αὐτὸ εἰς ὠχρὸν, τὸ δὲ ἄκρατον ζέον νιτρικὸν ὀξύ τὸ διαλύει μὲ βαθύχαιρον χρῶμα ὑπὸ ἔκλυσιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ νιτριγόνου. Κατὰ τὰς ἀναλύσεις τοῦ K. Faraday τὸ καθαρὸν ἐλαστικὸν κόμμι δὲν ἐμπεριέχει ὀξυγόνον ἀλλὰ σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	87,2
Ἵδρογόνου	12,8

Ἐπειδὴ τὸ ἐλαστικὸν κόμμι δὲν μεταβάλλεται διὰ τοῦ ἀέρος, μήτε διὰ τῶν περισσοτέρων ὀξέων, μήτε διὰ τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων μεταχειρίζεται μὲ ἐπιτυχίαν ὡς κόλλα διὰ τὰς χημικὰς συσκευὰς καὶ σωλῆνας. Αἱ λάγνηοι τοῦ ἐλαστικοῦ κόμμεως δύνανται νὰ μεταχειρισθῶσι καὶ πρὸς ἀποταμίευσιν τῶν ἀερίων· πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ μαλακοῦνται πρότερον διὰ ζέοντος ὕδατος καὶ νὰ ἐκτείνονται κατ' ὀλίγον ἐμφυσῶντες εἰς αὐτάς. Κοινῶς μεταχειρίζεται πρὸς ἐξάλειψιν ἐκ τοῦ χάρτου τῶν διὰ μολύβδου γραμμάτων. Ἐκ τοῦ δικλύμητός του εἰς τὸν αἰθέρα, εἰς τὸ τερεβινθινὸν ἔλαιον ἢ εἰς τὸ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον τῶν λιθανθράκων ἢ ἐκ τοῦ γαλακτώδους ὁποῦ κατασκευάζονται καθετῆρες καὶ ἄλλοι εὐκαμπτοὶ σίφωνες.

Δι' αὐτοῦ κατασκευάζονται εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ ὕδατοστεγῇ ὑφάσματα ἀλειφόμενα διὰ τῶν τοῦ ἐλαστικοῦ κόμμεως διαλυμάτων.

Εἰς διάφορα φυτὰ π. χ. εἰς τὸν μήκωνα *Papaver Somniferum*, εἰς τὴν θρυδακνίην (*Lactuca sativa*) κ. τ. λ. εὐρέθῃ οὐσία ἀναλογίαν τινα ἔχουσα μὲ τὸ ἐλαστικὸν κόμμι. Εἶναι ὑπόχρος καὶ μεταβάλλεται εἰς φαιὸν διὰ τοῦ ἀέρος, ἐλαφρότερα τοῦ ὕδατος, σκληρὰ καὶ εὐθρυπτεῖς εἰς τὸ ψῦχος, εἰς δὲ τὴν θέρμην ἤττον ἐλαστικὴ τοῦ ἐλαστικοῦ κόμμεως.

Τὸ εἰς τὴν Ἀγγλίαν εὐρισκόμενον ὀρυκτῶδες ἐλαστικὸν κόμμι εἶναι φαιὸν, διαφανές, 0,926 εἰδικῆς βαρύτητος, ὀλιγώτερον ἰσῶδες καὶ ἐλαστικὸν ἀπὸ τὸ ἐλαστικὸν κόμμι, καὶ ἔχει ὁσμήν ἀσφαλτώδη. Τὸ Γαλλικὸν εἶναι μελανόφαιον, ἀδιαφανές, ἐλαφρότερον τοῦ ὕδατος, πολὺ ἰσῶδες καὶ ἐλαστικόν. Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως ἐξαχνίζεται ἐξ αὐτοῦ ἔλαιον τι ὠχρὸν καὶ ἐμπυρευματικόν· καὶ ὁ αἰθὴρ διαλύει οὐσίαν τινα ὑπόχρον, ἰσῶδη καὶ ἐλαστικὴν, καὶ ἐπιλείπει μάζαν μελαιναν καὶ φαιάν.

Περὶ τῶν φυτικῶν χρωμάτων καὶ τῆς βαφικῆς.

Ὅτι τὸ φῶς τοῦ ἡλίου δύναται νὰ διαιρεθῇ εἰς ἑπτὰ διάφορα χρώματα, περὶ τούτου διελάβαμεν ἤδη καὶ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀρκετὰ ἀποδεδειγμένον. Τὰ ἑπτὰ ταῦτα κύρια χρώματα εἶναι τὸ ἐρυθροῦν, τὸ ὠχρὸν, τὸ χρυσοειδές, τὸ πράσινον, τὸ κυανοῦν καὶ τὸ ἰώδες, ἐξ αὐτῶν τὸ μὲν ἐρυθροῦν διαθλάται ἀσθενέστερα, τὸ δὲ ἰώδες ἰσχυρότερα.

Ἐὰν τὰ διὰ τῆς διαθλάσεως ἀναλυθέντα ἑπτὰ χρώματα διέλθωσι διὰ τινος υἑλίνου πρίσματος, ἐνοῦνται καὶ ἀποτελοῦν τὸ λευκὸν φῶς.

Ἐὰν τὸ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας σώματός τινος προσπίπτον φῶς, ἀντα-

νακλᾶται χωρὶς νὰ ἀναλυθῇ, μᾶς φαίνεται τὸ ἀντικείμενον λευκόν. Ὅθεν τὸ λευκόν δὲν εἶναι ἰδιαιτέρον χρῶμα, ἀλλὰ ἀποτελεσμα πάντων τῶν χρωμάτων καὶ πάντων τῶν τοῦ φωτὸς ἀκτίνων.

Ἰπὸ τὸ ὄνομα χρωματισμὸν ἐννοοῦμεν τὸ κατασκευάζειν τὴν ἐπιφάνειαν τινὸς σώματος ἐπιτηδεῖαν πρὸς ἀντανάκλασιν μέρους τῶν χρωματισμένων ἀκτίνων, ἢ μὲ ἄλλας λέξεις, ἡ τέχνη τοῦ χρωματισμοῦ συνίσταται εἰς τὸ νὰ μεταβάλλωμεν δι' ὑλῶν τινων τὸ φυτικὸν ἢ ζωϊκὸν ὕφασμα ὡς τὸ τοῦ λίνου, τῆς μετᾶξης κ. τ. λ. οὕτως, ὥστε νὰ μὴν ἀντανκλᾶται ἡ ἀκτις πλέον ὡς λευκὴ καὶ ἀδιάλυτος, ἀλλὰ διαλελυμένη ἢ χρωματισμένη. Ἐνεκα τούτου τὰ χρώματα εἶναι ὄχι ὑλικά, ἀλλὰ ἀποτελέσματα τοῦ φωτός, διότι αὐτὸ προσβάλλον τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος πάσχει ἀλλοιώσιν τινα εἰς τὴν σύνθεσίν του, καὶ ἐπαμένως φαίνεται εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ὄχι πλέον λευκόν, ἀλλὰ χρωματισμένον.

Ὁ σκοπὸς τῆς βαφικῆς ἐν γένει εἶναι νὰ ἐκχυλίσωμεν διὰ διαφορῶν καταλλήλων μέσων ἐκ φυτικῶν καὶ ζωϊκῶν ὑλῶν τὰς χρωματιστικὰς ὕλας καὶ νὰ τὰς ἐπιθέσωμεν καὶ στερεώσωμεν ἐπὶ τῶν σωμάτων. Ἐνεκα τούτου ἡ βαφικὴ θεμελιούται ἐπὶ χημικῶν κανόνων.

Ἡ θεωρία τῆς βαφικῆς τέχνης διαιρεῖται εἰς τέσσαρα διάφορα καὶ κύρια μέρη.

Τὸ α'. διαλαμβάνει περὶ τῆς γνώσεως καὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν κυριωτέρων χρωματιστικῶν ὑλῶν.

Τὸ β'. περιέχει τὴν προπαρασκευὴν τῶν ὑφασμάτων διὰ νὰ ἀποκατασταθῶσιν ἱκανὰ πρὸς τὴν μετὰ τῶν χρωμάτων ἔνωσην.

Τὸ γ'. τὰς γνώσεις καὶ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν στυμάτων.

Καὶ τὸ δ'. τὰς πρὸς χρωματισμὸν ἀπαιτουμένας προπαρασκευὰς καὶ πράξεις.

Περὶ ὀργανικῶν χρωμάτων.

Τὰ ὀργανικὰ χρώματα ἢ αἱ χρωματιστικαὶ ὕλαι ἀπαντῶνται εἰς τὰ διάφορα τῶν φυτῶν μέρη, εἰς τὰς ῥίζας, τοὺς κλόνους, τοὺς σπόρους κτλ. Τὰ ὀργανικὰ χρώματα εἶναι διαφορῶν εἰδῶν, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐρυθρά, καὶ πράσινα. Αἱ χρωματιστικαὶ ὕλαι ὑπάρχουσι πολλάκις ἠνωμένοι μετὰ ἄλλας οὐσίας, οὕτω π. χ. τὰ ὠχρὰ χρώματα εὗρισκονται σχεδὸν πάντοτε ἠνωμένα μετὰ ἐρυθρὰ καὶ τοῦτο εἶναι τὸ σημαντικώτερον κώλυμα πρὸς κατασκευὴν καὶ ἀποχώρησιν τῶν χρωμάτων.

Μέχρι τοῦδε ὀλίγαι μόνον χρωματιστικαὶ ὕλαι ἀπεχωρίσθησαν εἰς καθαρὰν κατάστασιν.

Ἄπασαι αἱ χρωματιστικαὶ οὐσίαι εἶναι στερεαὶ ὡς πρὸς τὴν σύστασιν των, κατὰ μέγα μέρος ἄχυμοι καὶ ἄοσμοι, μεταβάλλουσι τὴν ζωηρότητα των διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς ὑγρᾶς ἀτμοσφαίρας καὶ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων, τινὲς ἐξ αὐτῶν ἀποβάλλουσι πολὺ τυχέως τὸ χρῶμα των, ὡς ἡ τῆς κροκορρίζης χρωματιστικὴ ὕλη. Τοιαύτην μεταβολὴν προξενεῖ ἰδίως ἡ θερμότης 150° ἕως 200° R μὲ ὑγρασίας.

Πολλαὶ χρωματιστικαὶ ὕλαι εἶναι διαλύσιμοι εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ὀλίγαι εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἰς τὸ νάφθα καὶ τὰ ἔλαια. Τὰ διαλυτικὰ μέσα δέχονται τὴν χρωματιστικὴν ὕλην, οὕτω λ. χ. χρωματίζεται τὸ ὕδωρ ὠχρὸν διὰ τοῦ ὠχροῦ ξύλου, θάφεται ἐρυθρὸν διὰ τοῦ ἐρυθροῦ ξύλου.

Ἐὰν τὸ διαλυτικὸν μέσον ἐμπεριέχῃ ὀξύ ἢ βάσιν λαμβάνουν τὰ χρώματα ἀλλοιώσιν τινα, καὶ τὸ ἀλκάλιον ἢ τὸ ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τῆς χρωματιστικῆς ὕλης.

Τὸ χλωρίον φθείρει τὰ χρώματα ἀνεῦ ἐξαιρέσεως καὶ εἰς συνήθη θερμοκρασίαν. Τὸ τοῦ καγκαρμίνου βάμμα τὸ πλέον εὐμετάβλητον τῶν χρωμάτων φθείρεται διὰ τοῦ χλωρίου μὲ τὴν αὐτὴν ταχύτητα ὡς καὶ τὸ χρῶμα τοῦ Ἰνδικοῦ.

Ὡσαύτως τὸ θειῶδες ὀξύ λευκκίνει καὶ μερικὰ χρώματα μετὰ τῶν ὁποίων ὁμως ἐνοῦται πρὸς σχηματισμὸν λευκῶν ἐνώσεων.

Ἄπασαι σχεδὸν αἱ γαῖαι καὶ τὰ ὀξειδία τῶν μετάλλων ἔχουσι τὴν ιδιότητα νὰ ἐνοῦνται μετὰ τῶν εἰς τὸ ὕδωρ, διαλελυμένων χρωματιστικῶν ὑλῶν καὶ νὰ σχηματίζωσι μετ' αὐτῶν ἀδιαλύτους ἐνώσεις καλουμένας λάκκας. Αἱ ἐνώσεις αὗται κατασκευάζονται, ἐὰν τὰ διαλύματα τῶν χρωματιστικῶν ὑλῶν ἀναμιχθῶσι μετὰ τῆς στυπτηρίας, μετὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ κασσιτέρου κτλ. καὶ καταβυθισθῶσι δι' ἀνθρακικῶν ἀλάτων· ὁμοίως πορίζονται αἱ λάκκαις διὰ τῆς ἀμέσου ἐνώσεως τῶν χρωμάτων μετὰ διαφόρων γαιῶν, ἐξόχως δὲ μετὰ τῆς ὑδρομιγοῦς ἀργίλλου.

Περὶ τῶν ἐρυθρῶν χρωμάτων.

Τὰ κυριώτερα ἐρυθρὰ χρώματα κατασκευάζονται ἐκ τῆς τοῦ ἐρυθροδάνου ῥίζης, τοῦ καμπεχιανοῦ ξύλου, τοῦ σαγαληνοῦ κοκκίνου ξύλου, τῆς ἀγγούσης ῥίζης καὶ τοῦ ψευδοῦς κρόκου.

Ἐρυθρόδαρον. Τὸ ἐρυθρόδαρον εἶναι ῥίζα φυτοῦ τινος διετοῦς· εἰς τὴν

Ἀνατολὴν, εἰς τὴν Ταρταρίαν καὶ εἰς τὰ μεσημβρινὰ μέρη τῆς Εὐρώπης
 φυομένου καὶ *Rubia tinctorum* καλουμένου. Αἱ ῥίζαι ἀφοῦ ξηρανθῶσι μετα-
 βάλλονται εἰς λεπτὴν κόνιν. Ἡ κατρχὰς λαμβανομένη κόνις ὡς ἐμπεριέ-
 χουσα μικρὰς ῥίζας καὶ κλόνους εἶναι γνωστὴ ὑπὸ τὸ ὄνομα *πίτυρα* τοῦ
ἐρυθροδάνου. Διὰ δευτέρως λειοτριβήσεως ἀποχωρίζεται τὸ περὶ τὴν ἐντε-
 ριόνην εὐρισκόμενον μέρος ἐκ τοῦ ὁποίου σχηματίζεται τὸ καλῆτερον εἶδος.
 Διὰ τρίτης δὲ συντρίψεως λειοῦται τὸ ξυλῶδες μέρος καὶ ἡ ἐντεριώνη
 τῆς ῥίζης καὶ τοῦτο εἶναι τὸ χειρότερον εἶδος *φελλῶδες ἐρυθρόδανον*
 κολούμενον. Τὸ ἐκ τῆς Ἀνατολῆς μεταφερόμενον ἐρυθρόδανον, γνωστὸν
 ὑπὸ τὸ ὄνομα *Αλίζαρι*, προτιμᾶται ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα εἶδη. Τὸ ἐρυθρόδανον
 τῆς Ὀλλάνδας, Γαλλίας καὶ Γερμανίας εἶναι δευτερεύοντα.

Τὸ ἐρυθρόδανον ἐμπεριέχει δύο χρώματτα, ὡχρὸν καὶ ἐρυθρὸν, τῶν
 ὁποίων τὸ πρῶτον καλεῖται *Ξανθίνη Xanthin*, τὸ δὲ ἄλλο *Alizarin*.
 Πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ ἐρυθροῦ χρώματος πράττουσιν ὡς ἀκολούθως.

Ἐν μέρος ἐρυθροδάνου κατεργάζεται μετὰ 3 μερῶν ψυχροῦ ὕδατος
 καὶ μετὰ δέκα λεπτὰ ἐκθλίβεται τὸ ῥευστὸν· τὸ ἐκθλιβόμενον ῥευστὸν
 πήγνυται καὶ μεταβάλλεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς ἐρυθρόφαιον ῥευστὸν
 ἢ εἰς πήκτωμα. Τὸ ῥευστὸν ἐμπεριέχει μόνον ὀλίγον ἐρυθρὸν χρῶμα,
 μεγαλῆτερον δὲ ποσὸν ἐμπεριέχει τὸ πήκτωμα ἐκ τοῦ ὁποίου δύναται
 νὰ ἐκχυλισθῇ κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Πρὶν ξηρανθῇ ἐντελῶς ζέεται
 διὰ οἰνοπνεύματος λειψύδρου, ὅσον ἀπικνίεται διὰ νὰ προσλάβῃ τὸ
 οἰνόπνευμα ἐρυθρὸν χρῶμα. Τὸ ἐρυθρῶς χρωματισμένον οἰνόπνευμα ἀπο-
 στάζεται ἕως νὰ μείνῃ τὸ $\frac{1}{3}$ καὶ τότε ἀναμιγνύεται μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος,
 δι' οὗ ἀποτελεῖται κατακρήμνισμα, τὸ ὁποῖον ἀποπλύνεται μὲ ὕδωρ, μεχρι-
 σοῦ τὸ ὕδωρ δὲν καταβυθίζεται διὰ τοῦ διαλύματος τῆς βαρεῖας γῆς. Τὸ
 ἀποπλυθὲν κατακρήμνισμα ξηραίνόμενον καὶ θερμαίνόμενον εἰς σικύαν διὰ
 πρᾶου πυρὸς ἐξαχνίζει τὴν ἐρυθρὰν βαφικὴν ὕλην εἰς εἶδος μικρῶν ἐρυ-
 θρῶν κρυστάλλων, οἵτινες εἶναι ἄχυμοι, ἄοσμοι, ἀδιάλυτοι εἰς τὸ ψυχρὸν
 ὕδωρ, ὀλίγον δὲ διαλύσιμοι εἰς τὸ βραστὸν· διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος δια-
 λύονται μὲ ἐρυθρὸν, διὰ δὲ τοῦ νάφθα μὲ χρυσεῖον χρῶμα. Ἡ ὕλη
 αὕτη καλεῖται *Αλίζαρίνη Alizarin*, καὶ ἐμπεριέχει ἀνθρακικὴν ὕλην,
 ὑδρογόνον καὶ ὀξυγόνον. Ὁ Robiquet καὶ Kolin ἐξεχύλισαν ἐκ τοῦ ἐρυθρο-
 δάνου καὶ ἄλλην τινὰ ραδόχρουν ὕλην, τὴν ὁποίαν καλοῦσι *Πουρπουρί-
 νην Purpurin*.

Πρὸς κατασκευὴν δὲ τῆς ὕλης ταύτης κατεργάζεται ἡ διὰ ψυχροῦ
 ὕδατος ἐκχυλισθεῖσα ῥίζα τοῦ ἐρυθροδάνου μετὰ διαλύματος στυπτηρίας.

Τὸ ἐρυθρόν ῥευστὸν ἀναμιγνύεται ἀκολούθως μετὰθειϊκοῦ ὀξέος, δι' οὗ ἀποτελεῖται κατὰκρήμνισμα, τὸ ὁποῖον ἐξαχνίζομενον ἐντὸς σωλῆνος ἐκπέμπει τὴν πορφυρίνην.

Ἐπειδὴ μέχρι τοῦδε αἱ δύο αὗται βαφικαὶ ὕλαι, δηλ. ἡ ἀλιζαρινή, καὶ ἡ πορφυρίνη μόνον εἰς ὀλίγην ποσότητα ἐκτασκειάσθησαν, δὲν ἐδυνήθησαν νὰ ἐφαρμοσθῶσιν εἰς τὰ βαφεῖα, ἀλλ' ἐντοσούτῳ ἀπεδείχθη δι' ἀρκετῶν δοκιμῶν, ὅτι ἀμφοτέραι αὗται δύνανται νὰ μεταχειρισθῶσι πρὸς κατὰσκευὴν ἀξιολόγων χρωμάτων ἐπὶ διαφόρων ὑφασμάτων. Ἡ εἰς τὸ ἐρυθρόδανον ἐμπεριεχομένη ξανθὴ βαφικὴ ὕλη, ἣτις λέγεται *Ξανθίνη*, δύνανται νὰ ἐξαχθῇ διὰ τῆς ἐκχυλίσσεως τῆς εἰρημένης ῥίζης διὰ βραστοῦ οἰνοπνεύματος καὶ διὰ τῆς ἐξατμίσεως μέχρι ξηροῦ.

Τὸ ἐρυθρόδανον εἶναι ἐν τῶν πλέον ἀνεξιτήλων χρωμάτων καὶ μεταχειρίζεται διὰ τοῦτο εἰς τὴν βαφικὴν πρὸς ἐρυθρόν χρωματισμὸν καὶ πρὸς προαγωγὴν τῶν διαφόρων φαιῶν χρωμάτων. Ἐπίσης χρησιμεύει πρὸς κατὰσκευὴν λάκκου τινός, τὸ ὁποῖον ἀπολαμβάνεται κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. 400 μέρη λειοτριβημένου ἐρυθροδάνου ἐγκλεισθέντα εἰς λινὸν σάκκον κατεργάζονται μετὰ θερμοῦ ὕδατος, μεχριστοῦ τὸ ὕδωρ δὲν προσλαμβάνει πλέον ἐρυθροῦν χροῶμα. Τὰ μετὰ τὴν ἀπόπλυσιν ἐπιμένοντα εἶναι ὡς ἔγγιστα 60 μέρη. Τὸ ἐρυθροῦν ῥευστὸν ζεόμενον εἰς κασσιτέρινον λέβητα ἀναμιγνύεται μετὰ διαλύματος 50 μερῶν καθαρᾶς στυπτηρίας, καὶ ἀφοῦ τὸ ῥευστὸν τοῦτο ἀποψυχρανθῇ ἀποτίθεται βαθυ-ερυθροῦν λάκκον. Ἐὰν ἀκολούθως εἰς τὸ ῥευστὸν προστεθῇ διάλυμα ἀνθρακικῆς ποτάσεως καταβυθίζεται ἀνοικτότερον λάκκον, τὸ ὁποῖον διὰ προσθήκης περισσοτέρας ἀνθρακικῆς ποτάσεως ἀποκαθίσταται ἔτι ἀνοικτότερον. Τὰ οὕτω προαχθέντα ἰζήματα εἶναι ἐνώσεις τῆς βαφικῆς ὕλης τοῦ ἐρυθροδάνου μετὰ ἀργίλλου.

Ἐκ τοῦ ἐρυθροδάνου προάγεται ἕτερον λάκκον *Purpurin* λεγόμενον κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. Τὸ διὰθειϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου ἀνθρακωθέν ἐρυθρόδανον καὶ ἀποπλυνθὲν, ζέεται μὲ 50 μέρη ὕδατος καὶ 6 στυπτηρίας, καὶ ἡ πρᾶξις αὕτη ἐπαναλαμβάνεται πολλάκις μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τοῦ ζέοντος διαλύματος ἀποτίθεται τὸ λάκκον.

Ἐρυθρόν ξύλον τῆς Βρασιλίας.

Lignum Fernambuci.

Διάφορα εἶδη μεγάλων δένδρων ἐκ τοῦ γένους *Caesalpinia* παρέχουσι

τὸ εἰρημένον ξύλον, πρὸ πάντων δὲ τὸ *Caesalpinia Sapan*, *crista* καὶ *vesicaria*, δένδρα φυόμενα εἰς Ἰαμαϊκὴν καὶ Βρασιλίαν.

Τὸ τῆς Βρασιλίας ξύλον διακρίνεται ἀπὸ τὸ Καμπεχινὸν ξύλον, καθότι ἔχει βαθύτερον χρῶμα, καὶ καθότι καταβυθίζεται τὸ ἀφέψημά του διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, τοῦ ἀλικοῦ κασσιτέρου καὶ τοῦ τιτανίου ὕδατος.

Τὸ τῆς Βρασιλίας ξύλον ἐμπεριέχει ἰδιαιτέραν ἐρυθρὰν ὕλην κατασκευαζομένην κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Τὸ ὑδατῶδες ἔμβρεγμα τοῦ λειοτριβημένου ξύλου ἐξατμίζεται μέχρι ξηροῦ διὰ νὰ ἐκλυθῇ τὸ ἐμπεριεχόμενον ὀξικὸν ὀξύ· μετὰ ταῦτα ἀναδιλύεται τὸ ὑπόλειμμα εἰς ὕδωρ καὶ ἀνακινεῖται μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου πρὸς ἀφαίρεσιν τοῦ ἤδη ἐλευθέρου ὀξέος· καὶ ἀφοῦ ἐξατμισθῇ ἐκ δευτέρου κατεργάζεται τὸ ὑπόλειμμα δι' οἰνοπνεύματος. Τὸ διῦλιζόμενον καὶ ἐξατμιζόμενον οἰνοπνευματῶδες ρευστὸν, ἀναλύεται εἰς ὕδωρ καὶ εἰς τὸ διάλυμα τοῦτο προστίθεται διάλυσις ζωϊκῆς πηκτῆς μεχριστοῦ νὰ μὴν καταβυθίζεται πλέον ἐξ αὐτοῦ θυρσοδεψικὴ ὕλη. Ἀκολουθῶς ἐξατμίζεται τὸ διαλυθὲν ρευστὸν καὶ ἀναλύεται εἰς οἰνόπνευμα διὰ νὰ ἀποχωρισθῇ ἡ εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα προστεθεῖσα πηκτὴ. Διὰ τῆς ἀποξηράνσεως τοῦ ρευστοῦ τούτου λαμβάνομεν τέλος τὴν ἐρυθρὰν ὕλην εἰς καθαρὰν κατάστασιν. Ἡ οὕτω κατασκευαζομένη ἐρυθρὰ ὕλη ἐκκλέσθη παρὰ τοῦ *Chevreul Bresilin Βρασιλίνη*, καὶ κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος μικρῶν χρυσοειδῶν ἀγκίδων, αἵτινες εἶναι διαλύσιμοι εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Τὸ ὑδατῶδες διάλυμα εἶναι ὑπέρυθρον, μεταβάλλεται εἰς πορφυροῦν διὰ τῆς προσθήκης τῶν ἀλκαλίων καὶ ὠχροῦται διὰ τῶν ὀξέων. Διὰ τῶν πρωτοξειδίων τοῦ μολύβδου καὶ κασσιτέρου σχηματίζονται πορφυραὶ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτοι ἐνώσεις.

Τὸ ὑδατῶδες ἀφέψημα τοῦ ξύλου τῆς Βρασιλίας εἶναι ἐρυθρὸν, καὶ ἀναμιγνύμενον μετὰ τινοῦ ὀξέος ἀποτελεῖται ἐρυθρὸν κατακρήμνισμα, ἐνῶ τὸ ρευστὸν γίνεται ὠχρόν. Διὰ τῆς ὑγρᾶς ἀμμωνίας λαμβάνει τὸ ἀφέψημα πορφυροῦν χρῶμα καὶ ἀποτελεῖται τοιοῦτον κατακρήμνισμα. Διὰ τῶν ἀνθρακικῶν ἀλκαλίων χρωματίζεται τὸ ἀφέψημα ἀνοικτο-ερυθρὸν, σχηματιζόμενον ἐρυθροῦ κατακρήμνισματος.

Ἡ στυπτηρία ἀποτελεῖ εἰς τὸ ἀφέψημα ἐρυθρὸν κατακρήμνισμα, τὸ ρευστὸν ἀποβάλλει ὕλοτελῶς τὸ χρῶμά του, καὶ ἡ ὑδρομυγῆς ἀργιλλος χρωματίζεται ὁμοίως ἐρυθρά.

Ὁ ὀξικὸς μολύβδος προάγει εἰς τὸ ἀφέψημα βαθυ-ερυθρὸν κατακρή-

μνισμα, τὸ ὑποξειδίου τοῦ κασσιτέρου χρωματίζεται ἰώδες, καὶ τὸ ὀξειδίου τοῦ κασσιτέρου ροδόχρουν· ἐὰν τὸ ἀρέψῃμα τοῦ εἰρημένου ξύλου ἀναμιχθῇ μετὰ θειώδους ὀξέος ἢ καὶ μετὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὀξέος, ἐνοῦται ἡ ἐρυθρὰ βαφικὴ ὕλη μετ' αὐτῶν πρὸς ἄχρουν τινὰ ἔνωσιν, ἐκ τῆς ὁποίας ὁμοῦς διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέως ἀκράτου καὶ διὰ τῶν ἀλκαλίων δύνανται νὰ ἐπανεέλθῃ τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα.

Τὸ εἰρημένον ξύλον μεταχειρίζεται ἐξόχως πρὸς κατασκευὴν διαφόρων ἐρυθρῶν χρωμάτων, τὰ δὲ ἀποτελούμενα χρώματα εἶναι εὐμετάβλητα. χρησιμεύει καὶ πρὸς κατασκευὴν τῆς κοκκίνης μελάνης, ἣτις προάγεται, ἐὰν 16 μέρη τοῦ ξύλου τούτου ζέωνται μίαν ὥραν μετὰ τὸ ἀρκοῦν ὕδωρ καὶ ἔπειτα προστεθῇ ἐν μέρει· λειοτριβημένου ἀνθηροκόκου· εἰς τὸ διαλυθὲν ῥευστὸν προστίθεται τρυγὸς καὶ στυπτηρίας ἀνὰ δύο μέρη, ὑδροχλωρικοῦ κασσιτέρου καὶ κόμμεως ἀνὰ ἕξ μέρη. Τὸ ῥευστὸν ὅλον ἐξατμίζεται, ἕως νὰ μείνῃσι μόνον μέρη 16 καὶ ἀκολούθως προστίθενται ὄξους μέρη ὀκτώ.

Τὸ λάκκον σφαιροειδὲς *Lacca in globulis*, καθὼς καὶ ἄλλα τοιαύτης φύσεως λάκκα ὡς τὸ *Lacca vienensis* ἐμπεριέχουσι τὴν ἐρυθρὰν ὕλην τοῦ εἰρημένου ξύλου· ἀποτελοῦνται δὲ, ἐὰν τὸ ἀρέψῃμά του κατεργασθῇ δι' ἀργίλλου ἢ διὰ λείας ἀνθρακικῆς τιτάνου, ἢ ἐὰν τὸ μετὰ στυπτηρίας λαμβανόμενον ἀρέψῃμα τοῦ ἐρυθροῦ ξύλου καταβυθισθῇ δι' ἀνθρακικῆς ποτάσης.

Καμπεχιανὸν ξύλον.

Τὸ ξύλον τοῦτο ἀπολαμβάνεται ἐκ δένδρου τινὸς εἰς τὰ θερμότερα μέρη τῆς Ἀμερικῆς φυομένου καὶ καλουμένου *Haematoxylon Campechianum*. Εἶναι σκληρὸν, βαρὺ, ἐρυθρὸν, ὑπόστυφον καὶ ὑπόγλυκον τὴν γεῦσιν. Διὰ τοῦ θραστοῦ ὕδατος ἐκχυλίζονται ἐκ τοῦ καμπεχιανικοῦ ξύλου τὰ διαλύσιμα μέρη, εἰς δὲ τὸ ἀποτελούμενον ἀρέψῃμα ἐμπεριέχονται ἐρυθρὰ βαφικὴ ὕλη *Αἱματίνη* καλουμένη, νιτρογονοῦχος ὕλη, αἰθέριον ἔλαιον, ὑδροχλωρικὴ καὶ ὀξικὴ πότασσα, ὀξικὴ τίτανος, γύψος, ἀργίλλος καὶ ἔχνη ὀξειδίου σιδήρου καὶ μαγγανησίου. Πρὸς ἐκχύλισιν τῆς βαφικῆς ὕλης ἐκχυλίζεται τὸ πρόσφατον ξύλον μᾶλλον ὠχρὸν ἢ ἐρυθρὸν ὄν, δι' ὕδατος εἰς θερμοκρασίαν 60 ἢ 70°. Τὸ διυλισθὲν ῥευστὸν ἐξατμίζεται μέχρι ξηροῦ καὶ τὸ ἐπιμένον κατεργάζεται διὰ ψυχροῦ οἰογονεύματος 0,842

ειδικῆς θαρύττητος, δι' οὗ ἀποχωρίζεται ἐρυθρόφαιος βυρσοδεψικὴ ὕλη, καὶ ἡ βαφικὴ ὕλη. Τὸ ῥευστὸν πρέπει νὰ ἔχῃ φαῖον καὶ ὄχι κιτρινοειδὲς χρῶμα, ἐξατμίζεται διὰ πρᾶξου πυρὸς μεχριστοῦ λάβῃ πυκνότητά τινα· προστεθέντος δὲ ὀλίγου ὕδατος ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἐξατμισίς, καὶ μετὰ παρέλευσιν τινῶν ἡμερῶν κρυσταλλοῦται ἡ αἱματίνη. Οἱ κρύσταλλοι ἀποχωρισθέντες ἀπὸ τοῦ ῥευστοῦ καθαρίζονται δι' ἀποπλύσεως καὶ ἀναδιαλύσεως.

Ἡ αἱματίνη συνίσταται ἀπὸ μικρὰ λαμπρίζοντα ἐρυθροκίτρινα λεπίδια καὶ ἀπὸ σφαιρίδια ἔχοντα ὑπόπικρον καὶ στυπτικὴν γεῦσιν. Λειοτριφθεῖσα ἐπὶ τινος ὑελίνου ἐλάσματος φαίνεται ἐρυθροκίτρινος, διερχομένου τοῦ φωτός, λευκὴ δὲ ἀντανακλωμένου. Ἐν οἰνόπνευμα σταλαχθῇ ἐπὶ τῆς αἱματίνης, τὴν μεταβάλλει εἰς ὠχρὰν ἀντανακλωμένου τοῦ φωτός, εἰς πορφυράν δὲ διερχομένου. Ἐμπεριέχει ὀλίγον ποσὸν νιτρογόνου καὶ διὰ τοῦτο τὰ διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως ληφθέντα ἐμπεριέχουσιν ἀμμωνίαν.

Ἡ αἱματίνη ἀπαιτεῖ 1000 μέρη ὕδατος πρὸς διάλυσίν της, τὸ βραστὸν ὕδωρ τὴν διαλύει μετὰ πορφυροῦ χρώματος, τὸ ὅποιον μετὰ τὴν ἀπόψυξιν γίνεται χρυσοειδές, διαλύεται εὐκολώτερα εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα καὶ τὸ διάλυμα εἶναι ὠχροφαιον. Τὸ διάλυμα τῆς αἱματίνης ὠχροῦται διὰ τοῦθειϊκοῦ ὀξέος κεκραμένου, καθὼς καὶ διὰ πάντων σχεδὸν τῶν ἄλλων ὀξέων, διὰ δὲ τοῦθειϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου μεταβάλλεται εἰς ἐρυθρόν. Τὸ βορικὸν ὀξύ χρωματίζει τὸ διάλυμα τῆς αἱματίνης πορφυροῦν καθὼς τὰ ἀλάλια. Ἄψασαι αἱ εἰς τὸ ὕδωρ διαλελυμένα ἀλκαλικά βάσεις χρωματίζουν τὸ διάλυμα τῆς αἱματίνης κυανοῦν. Τὸ διάλυμα τῆς τιτάνου καὶ τῆς θειαίας ἀποτελοῦσιν εἰς τὴν διάλυσιν τῆς αἱματίνης κυανὰ κατακρημνίσματα.

Αἱ ἐνώσεις ὡσχύτως τῆς αἱματίνης μετὰ τῆς ὑδρομιγοῦς ἀργίλλου, μετὰ τῆς μαγνησίας, τοῦ ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου, χαλκοῦ, σιδήρου, μολύβδου καὶ στίμμεως ἔχουσι κυανοῦν χρῶμα. Αἱ ἐνώσεις αὗται δύνανται νὰ μεταχειρισθῶσι καὶ πρὸς χρωματισμὸν τῶν μαλλίνων ὑφασμάτων, τὰ ὅποια λαμβάνουσι δι' αὐτῶν ὠραῖον κυανοῦν χρῶμα. Τοῦτο τὸ κυανοῦν χρῶμα διακρίνεται ἀπὸ τοῦ Ἰνδικοῦ, καθότι μεταβάλλεται διὰ τῶν ὀξέων εἰς ὠχρὸν καὶ ἐρυθρόν, τὸ ὅποιον δὲν συμβαίνει εἰς τὰ διὰ τοῦ Ἰνδικοῦ χρωματισμένα ὑφάσματα.

Τὰ ὕδατῶδη διαλύματα τῶν γαιωδῶν ἀλάτων ἀποσυντίθενται διὰ τῆς διαλύσεως τῆς αἱματίνης καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποτελοῦνται πορφυρὰ καὶ ἰώδη καταβυθίσματα.

Εἰς τὴν καθαρὰν τῆς κατάστασιν μεταχειρίζεται ἡ αἱματινὴ μόνον ὡς δοκιμαστήριον πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν ἐλευθέρων ὀξέων, ἀλκαλίων καὶ γαιωδῶν ἀλάτων.

Ἡ καθαρὰ βαφικὴ ὕλη δύναται νὰ προαχθῇ, ἐάν εἰς τὸ ἀφέψημα τοῦ ξύλου τούτου προστεθῇ ὀλίγον ὑδροχλωρικόν ὄξι καὶ ἐμβαπτισθῇ εἰς αὐτὸ πλάτυσμα ἢ ῥάβδος ψευδαργύρου. Μετ' ὀλίγον ἄρχεται τὸ χρῶμα ν' ἀλλοιοῦται, γίνεται φαῖον, κίτρινον, καὶ ἐκ τοῦ ἀφεψήματος ἀποχωρίζεται πλῆθος μικρῶν τετροχρόων κρυττάλλων, οἵτινες θεωροῦνται ὡς ἀποξηιδωθείσα βαφικὴ ὕλη, ἀναλκμδάνουσα τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα διὰ τῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς-

Πρὸς βαφὴν μεταχειρίζονται μόνον τὸ ἀφέψημα τοῦ Καμπεχιανοῦ ξύλου, εἰς τὸ ὁποῖον φυσικὰ εὕρεσκειται διχλελυμένη ἡ αἱματινὴ.

Τὸ ἀφέψημα ἢ μόνον τὸ ἔγχυμμα μεταβάλλεται διὰ τῶν αὐτῶν δοκιμαστηρίων διὰ τῶν ὁποίων ἀλλοιοῦται τὸ διάλυμα τῆς αἱματινῆς, καταβυθίζεται δὲ καὶ διὰ τῆς διακελυμένης πηκτῆς ἔνεκα τῆς ὑπαρχούσης εὐρσοδεψικῆς ὕλης.

Τὸ καμπεχιανὸν ξύλον χρησιμεύει πρὸς κυανοῦν καὶ ἰώδη χρωματισμόν, εἶναι δὲ συγχρόνως ἐν τῶν σημαντικωτέρων μέσων διὰ τὰ μελανὰ χρώματα.

Ξύλον Σαγάλινορ ἐρυθροῦ.

Lignum Santali rubrum.

Ξύλον δένδρου τινὸς εἰς τὴν Ἰνδικὴν καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν Ταπρο-
βάνην ἐγχωρίου, καὶ *Pterocarpus Santalinum* λεγομένου, μεταφέρεται εἰς
τμήματα ἐπιμήκη, πυκνά, ἐρυθρά, ἐξωθεν πολλάκις πλέον θαθύχροα καὶ
ὑπόστυφα τὴν γεῦσιν. Τὸ ξύλον τοῦτο διαφέρει τοῦ καμπεχιανοῦ, καθότι
δὲν μεταδίδει τὸ ἐρυθρὸν του χρῶμα εἰς τὸ βραστὸν ὕδωρ.

Ἡ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτος ἐρυθρὰ χρωματιστικὴ ὕλη διαλύεται εὐκό-
λως εἰς τὸ ζέον οἰνόπνευμα, τὸ δὲ ἐρυθροῦν τοῦτο χρῶμα ἐπιμένει,
ἀφοῦ ἀποσταχθῇ τὸ οἰνόπνευμα. Ὁμοίως δύναται νὰ ἐκχυλισθῇ ἡ ἐρυθρὰ
ὕλη, κατεργαζομένου τοῦ ξύλου μετὰ τῆς ῥευστῆς ἀμμωνίας, δι' ἧς ἐκχυ-
λίζεται. ἐάν δὲ τὸ διάλυμα τοῦτο ἀνמיχθῇ μετὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ
ὀξέος, καταβυθίζεται ἡ εἰρημένη ἐρυθρὰ ὕλη τοῦ Σαγαλινοῦ ξύλου.

Ὁ Pelletier ἐξεχύλισε τὴν ὕλην ταύτην διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος καὶ

τὴν ἐπωνόμασεν Σανταλίνην Santalin· εἶναι ἐρυθρόφαιος, ὁμοιάζει μὲ μαλακὴν τινα ῥητίνην, τήκεται εἰς θερμότητα 100° R. Τὸ ψυχρὸν ὕδωρ διαλύει μόλις $\frac{1}{5}$ αὐτῆς, διὰ ζέοντος ὕδατος σχηματίζεται θολὸν βευστὸν, τὸ ὁποῖον ζεόμενον διὰ ὕδατος ὑπόκειται εἰς ἀλλοίωσιν τινα. Τὸ οἰνόπνευμα τὴν διαλύει εὐκόλως· εἰς ὀλίγην ποσότητα διαλυομένη λαμβάνει ὠχρὸν χρῶμα, εἰς μεγαλητέραν δὲ ποσότητα ἐρυθροῦν.

Διαλύεται ὡσαύτως παρὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος μετὰ ἐρυθροῦ χρώματος, καὶ τὸ διάλυμα ἔχει στυπτικὴν γεῦσιν, θολοῦται διὰ τοῦ ὕδατος καὶ κατακρημνίζεται διὰ τῆς πηκτῆς. Τὰ δι' ὕδατος κεκρυμμένα διαλύματα τῶν ἀλκαλίων διαλύουσι τὴν ἐρυθρὰν ὕλην μὲ ἰσῶδες χρῶμα.

Τὸ δι' οἰνοπνεύματος διάλυμα καταβυθίζεται διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου μετὰ πορφυροῦ, διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου μετὰ ἰώδους, καὶ διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου μετὰ ἐρυθροῦ χρώματος.

Εὐκολώτερα διαλύεται ἡ Σανταλίνη εἰς τὸν αἰθέρα παρὰ εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Εἰς τὴν βαφικὴν δὲν εἶναι χρήσιμον τὸ Σαγάλινον ξύλον, ἐπεὶ δὴ ἡ χρωματιστικὴ αὐτοῦ ὕλη δὲν διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ. ἀλλὰ μόνον χρησιμεύει πρὸς χρωματισμὸν τινῶν οἰνοπνευματωδῶν βευστῶν, καθὼς καὶ πρὸς ἐρυθροῦν χρωματισμὸν τοῦ ξύλου.

Ἀρχούσης ρίζα.

Radix Alcanae.

Εἰς τὸν φλοιὸν τῆς ρίζης τοῦ ἐτησίου, φυτοῦ *Achusa tinctoria* εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀγρῶν καὶ εἰς τοὺς δρόμους ἀπαντωμένου, ἐμπεριέχεται ἐρυθρὰ, εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτος βαφικὴ ὕλη, ἥτις δύναται νὰ ἐξαχθῇ διὰ τῆς ἐκχυλίσσεως τοῦ εἰρημένου φλοιοῦ διὰ βραστοῦ οἰνοπνεύματος λειψύδρου. Ἐὰν τὸ ἀποτελούμενον βευστὸν ἐξατμιζόμενον κατεργασθῇ διὰ τοῦ αἵθερος καὶ τὸ δι' αὐτοῦ βευστὸν ἐξατμισθῇ, ἀπολαμβάνεται ἡ βαφικὴ αὕτη ὕλη καλουμένη *Pseudo-Alkanin* ψευδο-αλκανίνη. Ὁ Pelletier ἐκχυλίζει τὴν λειοτριβημένην ρίζαν μετὰ αἵθερος, καὶ λαμβάνει οὕτως διὰ τῆς ἐξατμίσεως τὴν ἐρυθρὰν ὕλην.

Ἡ ὕλη αὕτη εἶναι ἐρυθρόφαιος, ῥητινώδης τὴν θραῦσιν, ἀμετάβλητος εἰς τὸν ἀέρα, μαλάσσεται εἰς τὸ ὕδωρ, τήκεται εἰς τὴν 60° καὶ ἐκλύει διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως ἀμμωνίαν. Εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι ἀδιάλυτος,

διαλύσιμος δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὰ πτητικὰ ἔλαια, τὰ ὅποια δι' αὐτῆς λαμβάνουσιν ὠραῖον ἐρυθροῦν χρῶμα. Εἰς τὸ θεϊκὸν ὄξύ διαλύεται ὑπὸ τὸ χρῶμα τοῦ ἀμεθύστου καὶ καταβυθίζεται ἐκ τῆς διαλύσεως ταύτης διὰ τοῦ ὕδατος. Εἰς τὰ ἀλκάλια διαλύεται ἡ βαφικὴ ὕλη μετὰ κυανοῦ χρώματος καὶ ἐκ τῆς διαλύσεως ταύτης καταβυθίζεται μετὰ ἐρυθροῦ χρώματος, ἀφοῦ ἐξουδετερωθῇ τὸ διάλυμα διὰ τῶν ὀξέων. Τὸ διάλυμα τῆς ἀλκαλίνης λευκαίνεται διὰ τῶν τοῦ φωτὸς ἀκτίνων. Ἐάν τὸ δι' οἰνοπνεύματος διάλυμα ζέσται με ὕδωρ, μεταβάλλεται τὸ ἐρυθροῦν χρῶμα εἰς κυανοπράσινον, καὶ ἡ ἐρυθροβαφικὴ ὕλη ἀποσυντίθεται, καὶ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ ῥευστοῦ ἐπιμένει βαθυκυανοῦν φύραμα διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ. Τὸ διάλυμα τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου ἀποτελεῖ εἰς τὸ διάλυμα τῆς βαφικῆς ὕλης πορφυροῦν, ὃ δὲ ὀξικὸς μόλυβδος κυανοῦν καὶ τὸ διάλυμα τῆς ἄχνης τοῦ ὑδραργύρου κρεοβαφὲς κατακρήμνισμα.

Ἡ ρίζα τῆς ἀγχούσης δὲν δύναται νὰ μεταχειρισθῇ εἰς τὴν βαφικὴν, ἐπειδὴ ἡ βαφικὴ αὐτῆς ὕλη δὲν διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ, μεταχειρίζεται δὲ μόνον πρὸς χρωματισμὸν τῶν λιπαρῶν ἐλαίων καὶ τῶν διαφόρων μιγμάτων ἐλαίου, κηροῦ κτλ. τὰ ὅποια λαμβάνουσιν πολλὰ ζωηρὸν, ὅχι ὁμῶς ἀνεξίτηλον ἐρυθρὸν χρῶμα.

Κρόκος ψευδής. Τὰ ἄνθη φυτοῦ τινος εἰς τὴν Ἀνατολὴν, τὴν Οὐγγαρίαν καὶ εἰς ἄλλα μέρη τῆς Γερμανίας καλλιεργουμένου συνάζονται καὶ ξηραίνονται, ἀφοῦ ἀποβληθῇ ἡ γύρις. Τὸ φυτὸν τοῦτο λέγεται *Carthamus tinctorius*.

Τὰ ἄνθη ταῦτα ἐμπεριέχουσιν ἐκτὸς διαφόρων ἄλλων ὕλων καὶ δύο βαφικὰς ὕλας, ὠχρὰν καὶ ἐρυθράν. Ἡ ὠχρὰ βαφικὴ ὕλη εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ δύναται νὰ ἐκχυλισθῇ διὰ συνεχοῦς ἀποπλύσεως τῶν ἀνθῶν μετὰ ψυχροῦ ὕδατος. Ἀφοῦ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ δὲν δέχεται πλέον ὠχρὸν χρῶμα, ἐκθλίβονται τὰ ἄνθη ἰσχυρῶς καὶ κατεργάζονται μίαν περίπτου ὥραν μετὰ διάλυμα ἀνθρακικῆς σόδας συνισταμένης ἐξ ἑνὸς μέρους ἀνθρακικῆς σόδας καὶ 8 μερῶν ὕδατος. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἐνοῦται τὸ νάτρον μετὰ τῆς εἰς τὰ ἄνθη ἐπιμενούσης ἐρυθρᾶς βαφικῆς ὕλης πρὸς ὠχρὸν τι ῥευστὸν, τὸ ὅποιον ἀποχωρίζεται διὰ τῆς ἐκθλίψεως ἀπὸ τὰ ἄνθη.

Πρὸς ἀποχώρησιν τῆς ὕλης ταύτης, ἥτις Καρθαμίνη ἢ *Καρθαμικὸν* ὄξύ λέγεται ἕνεκα τοῦ ιδιώματος νὰ παρέχη μετὰ τῶν βάσεων καὶ ἰδίως μετὰ τοῦ νάτρου κρυστάλλωσίμους ἐνώσεις, ἀναμιγνύεται τὸ ὠχρὸν τοῦτο

ρευστόν μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος ἢ μετὰ ὀξους, τὸ ὁποῖον ἐνοῦται μόνον μετὰ τοῦ νάτρου καὶ οὕτω καταβυθίζεται ἡ καρθαμίνη· ἥτις ἀποπλυθεῖσα καὶ ξηρανθεῖσα παρουσιάζεται εἰς εἶδος βαθυ-ερυθρᾶς κόνεως. Ἡ Καρθαμίνη εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὰ κεκραμένα ὀξέα, ὀλίγον μόνον διαλύεται εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα, εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὰ λιπαρά καὶ πτητικὰ ἔλαια, εἰς τὰ ἀνθρακικὰ ἀλκάλια διαλύεται πρὸς ὠχρὸν ρευστόν, καὶ ἐὰν κορεσθῇ τὸ ἀνθρακικὸν νάτρον μετὰ τῆς ἐρυθρᾶς βαφικῆς ὕλης κρυσταλλοῦται ἡ ἔνωσις εἰς εἶδος ὠχρῶν λαμπρίζουσιν ἀγκίδων συνισταμένων ἐκ καρθαμινικῆς σόδας.

Ἡ βαφικὴ αὕτη ὕλη μεταχειρίζεται πρὸς βαφὴν τῆς μετάξης μετὰ ῥοδοχρόου χρώματος, τὸ ὁποῖον εἶναι μὲν ὠραιότατον, ὅχι ὅμως ἀνεξίτηλον, καὶ ὀλίγον μόνον καιρὸν ἀντέχον εἰς τὰς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνας. Ἐὰν ἡ βαφικὴ ὕλη ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ διὰ τοῦ νάτρου διαλύματος διὰ ὀξους καὶ ἀλειφθῇ ἐπὶ μεταλλικοῦ ἐλάσματος, λαμβάνει, ἀφοῦ ξηρανθῇ, ὠχρὰν μεταλλικὴν σχεδὸν λαμπρότητα καὶ ἡ ἐπιφάνειά της φαίνεται ὠχρά. Ἀναμειγνυομένη μετὰ λείας τιτάνου καὶ πλαττομένη πρὸς φύραμα, σχηματίζει ἐρυθρὸν ἔντριμμα, γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα Rouge vegetal.

Περὶ τῆς ὠχρᾶς βαφικῆς ὕλης θέλωμεν ὁμιλήσει εἰς τὸ περὶ τῶν ὠχρῶν χρωμάτων κεφάλαιον.

Orseille.

Διάφορα εἶδη λειχήνων, καθὼς λειχὴν ὀρινός Lichen Roecella ἐκ τῶν Καναρίων νήσων, Lichen parellus, dealbatus, tartareus, deustus κτλ. δίδουσιν, ἐὰν ὑποβληθῶσιν εἰς διαφόρους πράξεις, βαφικὰς ὕλας ἐρυθρουμένας παρὰ τῶν ὀξέων καὶ πορφυρίζουμένας διὰ τῶν ἀλκαλίων. Ἐὰν λειοτριβημένοι λειχήνες καὶ ἰδίως ὁ ὀρινός λειχὴν ἀναμειχθῇ μετὰ οὖρους, ἢ μετὰ δι' ὕδατος κεκραμένης ἀμμωνίας, καὶ τὸ φύραμα τοῦτο ἐκτεθῇ εἰς σῆψιν, προάγεται τὸ χρῶμα τὸ ὁποῖον γνωρίζεται ὑπὸ τὸ ὄνομα Orseille. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν κατασκευάζεται τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος χρῶμα ἐκ τινος ἄλλου λειχήνος καλουμένου Lichen tartareus, εἰς δὲ τὴν Γαλλίαν πρὸς κατασκευὴν τοῦ χρώματος τούτου εἶναι χρήσιμος λειχὴν καλούμενος Variollaria orsina. Οἱ εἰρημένοι λειχήνες καταβρέχονται εἰς ξύλινον κάδον μὲ οὖρος, καὶ μετὰ παρέλευσιν τριῶν ἡμερῶν προστίθεται τίτανος ἐσθεςμένη καὶ τὸ φύραμα ἀνακινεῖται συνεχῶς. Λέγεται δὲ ὅτι προσθέτουσιν σττυπηρίαν καὶ ἀρσενικὸν εἰς μικρὰν ποσότητα.

Τὴν εἰς τὰ ῥηθέντα μίγματα ἰδιαιτέραν βαφικὴν ὕλην καλοῦσιν *Έρυθρίνην Erytrin*, καθότι ἐνυπάρχει εἰς ἄχρουν κατάστασιν, καὶ ὑπὸ διαφόρων περιστατικῶν λαμβάνει ἐρυθρὸν χρῶμα. Ἐξ αὐτῶν τῶν μιγμάτων δύναται νὰ ἐξχθῇ ἡ ὕλη αὕτη ἢ διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος, ἢ διὰ τῆς ἀμμωνίας καὶ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ οἰνοπνεύματος κρυσταλλοῦται ἡ ἐρυθρίνη. Ἐὰν τὸ διάλυμα τῆς ἐρυθρίνης εἰς οἰνόπνευμα ζέεται καὶ ῥόν τινα, μεταβάλλεται ἡ ἐρυθρίνη εἰς λευκὴν οὐσίαν, κρυσταλλώσιμον εἰς μεγάλους κρυστάλλους καὶ ὀνομαζομένην *Pseudo-Erytrin* *ψευδὴς ἐρυθρίνη*· ἡ ἐρυθρίνη διαλύεται ὑπὸ τῶν ἀνθρακικῶν καὶ καυσικῶν ἀλκαλίων, καὶ ζεσθεῖσα μεταβάλλεται εἰς ὑπόστυφον καὶ πικρὰν μάζαν *Έρυθρόπικρον* καλουμένην.

Εἰς κυριωτέραν ἀλλοίωσιν ὑπόκειται ἡ ἐρυθρίνη, ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὴν σύγχρονον ἐπιρροὴν τοῦ ἀέρος, ἢ τοῦ ὀξυγόνου καὶ τῆς καυστικῆς ἀμμωνίας. Τὸ ῥευστὸν λαμβάνει χρῶμα φαιὸν, ἀκολούθως ἐρυθροῦν, αἰμοβαφές καὶ τέλος κιτρινίζον, καὶ εἰς τὸ διάλυμα ἐμπεριέχεται ἐκτὸς τῆς ἐρυθρίνης καὶ ἐτέρα ξανθὴ βαφικὴ ὕλη.

Persio, Cudbear εἶναι πολτώδη φυράματα ἐμπεριέχοντα ἀρκετὴν ποσότητα ἐρυθρίνης. Τὸ πρῶτον ἀπολαμβάνεται ἐὰν ὁ λειχὴν τὸ *Parmellia Rocella* μεταβληθῇ εἰς λεπτὴν κόκκιν καὶ ἀναμιχθὲν μὲ οὖρος ἀφεθῇ εἰς σήψιν. Ἡ διὰ τῆς σήψεως ἐκλυομένη ἀμμωνία διαλύει τὴν ἐρυθρὰν βαφικὴν ὕλην καὶ πρὸς ἐμπόδισιν τῆς προόδου τῆς σήψεως προστίθεται ἀλκάλιον τι καὶ διὰ τοῦ ἀρκοῦντος ποσοῦ οἴνου δίδεται ἀκολούθως ἡ ἀπαιτουμένη σύστασις.

Εἰς τὴν Ἀγγλίαν μεταχειρίζεται τὸ *Cudbear* πρὸς αὔξησιν τῆς διὰ τοῦ Ἰνδικοῦ διδομένης λαμπρότητος, καθὼς καὶ πρὸς μεταβολὴν τοῦ διὰ τοῦ ἐρυθροδάνου ὥχροῦ χρώματος εἰς πλέον ῥοδόχρουν. Τὸ μάρμαρον λαμβάνει διὰ τοῦ *Orseille* χρῶμα ὥχρον ἀνεξίτηλον. Εἰς τὴν βαφικὴν εἶναι χρήσιμον πρὸς παραγωγὴν τῶν ἰοειδῶν, ἀμεθυστοειδῶν, καὶ πορφύρων χρωμάτων ἐπὶ τῶν μαλλίνων ὑφασμάτων.

ὑπὸ τὸ ὄνομα *Chica* ὑπάρχει βαφικὴ ἐρυθρὰ ὕλη, δι' ἧς φυλαί τινες τῶν Ἰνδῶν βάφουσι τὸ δέρμα των. Τὸ χρῶμα τοῦτο ἐξάγεται ἐκ τοῦ *Bignonia chica* διὰ τῆς ζέσεως τῶν φύλλων μεθ' ὕδατος, καὶ ἐκ τοῦ ληφθέντος ἀφεψήματος ἀποτίθεται ἡ ἐρυθρὰ βαφικὴ ὕλη· εἰς τὴν Ἰνδικὴν ἀναμιγνύουσι τὴν ῥηθεῖσαν βαφικὴν ὕλην μετὰ λίπους *Κροκοδείλου* τινὸς *Crocodilus acutus* καὶ οὕτως ἀλείφουσιν τὸ δέρμα.

Οἱ καυλοὶ τῆς *κνίδος Urtica dioica* ἐμπεριέχουσιν τὸ φθινόπωρον,

ἀφοῦ μαρανθῶσι τὰ φύλλα, βαφικὴν τινα ἐρυθρὰν ὕλην, ἥτις χρησιμεύει πρὸς βάψιν τῆς μετάξης, ἀφοῦ προλαβόντως στυφθῇ ἡ μετάξη διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ κασσιτέρου, λαμβάνει ρόδινον βαθύ καὶ ἀνοικτο-ερυθροῦν χρῶμα.

Καρμῆνιον.

Ἄν καὶ τὸ χρῶμα τοῦτο ἐξάγεται ἐκ διαφορῶν ἐντόμων, μόλον τοῦτο εἶναι φυτικῆς καταγωγῆς καὶ ἔνεκα τούτου θέλομεν τὸ περιγράψει ἐνταῦθα.

Τὸ καρμῆνιον κατασκευάζεται ἐκ τῆς ξηρανθείσης θήλεος ἐντόμου τινὸς εὐρίσκομένου εἰς τοὺς Κάκτους, φυτοῦ εἰς τὸ Μεξικὸν φυομένου. Τὸ ἐντομον τοῦτο καλεῖται ἀνθροκόκκος, *Coccinella septempunctata*, τοῦ ὁποῦ τὰ θήλεα πρὶν ὠοτοκῆσθαι συνάζονται καὶ τοποθετοῦνται εἰς μικρὰς θήκας ἐπὶ τῶν ῥηθέντων φυτῶν.

Τὸ ἐντομον ἀποθνήσκει, ἀποξηραίνεται καὶ μεταβάλλεται μετὰ τὴν ὠοτοκίαν εἰς σκληρὸν κάλυμμα, τὸ ὁποῖον περιέχει καὶ προφυλάττει τὰ ἐντὸς αὐτοῦ ὠά. Ἀφοῦ τὰ ὠά ἐπωασθῶσι, ἐξέρχονται ἀγγελιδῶν νεογνὰ ἔντομα καὶ κατασκευάζουσι τὸ φυτὸν, ὅπου ὑπόκεινται εἰς τὰς μεταμορφώσεις. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ καρμηνίου ἐκχυλίζεται πρῶτον ὁ λειοτριβημένος ἀνθροκόκκος διὰ θερμοῦ αἰθέρος πρὸς διάλυσιν τοῦ ἐνυπάρχοντος λίπους. Τὸ μετὰ τὴν ἐκχύλιν ἐπιμένον μέρος ζεταὶ συνεχῶς μὲ οἰνόπνευμα 0,820 εἰδικῆς βαρύτητος, καὶ τὸ διῦλίζομενον ῥευστὸν ἀφαιρῶν εἰς αὐτόμακτον ἐξάτμισιν δίδει μικροὺς κρυστάλλους, οἵτινες ἔχουσιν ὠραῖον ἐρυθρὸν χρῶμα, καὶ συνίστανται ἐκ καρμηνίου, λίπους καὶ ἄλλων ζωϊκῶν ὑλῶν. Ἐάν οἱ κρύσταλλοι οὗτοι κατεργασθῶσι διὰ οἰνοπνεύματος λειψύδρου, διαλύεται τὸ καρμῆνιον, ἐπιμένοντος τοῦ λίπους καὶ τῆς φαιᾶς ἐκχυλισματικῆς ὕλης. Τὸ μεταγχιζόμενον οἰνοπνευματῶδες ῥευστὸν ἀναμιγνύεται μὲ τόσον αἶθéra, ὅσον ἐμεταχειρίσθη προλαβόντως οἰνόπνευμα· διὰ τῆς προσθήκης τοῦ αἰθέρος θολοῦται τὸ ῥευστὸν καὶ κατ' ὀλίγον ἀποτίθεται τὸ καρμῆνιον εἰς καθαρὰν κατάστασιν, τὸ δὲ λίπος μένει διαλελυμένον καθὼς καὶ ὅποιαδήποτε ἄλλη ὠχρὰ ζωϊκὴ ὕλη.

Τὸ καρμῆνιον ἔχει τὰ ἐφεξῆς χαρακτηριστικά. Παρουσιάζεται εἰς εἶδος κρυσταλλωδῶν σφαιριδίων λαμπριζούσης ἐρυθρότητος, εἶναι ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα καὶ τήκεται εἰς θερμοκρασίαν 50°, εἰς δυνατωτέραν θερμότητα ἐξοιδούται καὶ ἐκλύει πολὺ ἐλαιον, ὀξινωπὸν τι ὕδωρ, ὅχι ὅμως ἀμ-

μωνίαν. Διὰ τοῦ ἰώδους ἢ τοῦ χλωρίου ὠχροῦται, καὶ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἀποσυντίθεται μὲ ταχύτητα. Εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι εὐδιάλυτον, ὀλιγώτερον διαλύσιμον εἰς τὸ οἶνόνπνευμα, ἀδιάλυτον εἰς τὰ πτητικὰ καὶ λιπαρὰ ἔλαια, καθὼς καὶ τὸν αἰθέρα. Τὸ εἰς ὕδωρ διάλυμά του ἀφίνει, ἐὰν ἐξατμισθῇ, σεράπιον ἐξ οὗ ἀποτίθενται κρύσταλλοι.

Διὰ τῶν ὀξέων χρωματίζεται τὸ ὑδατῶδες διάλυμα κατ' ἀρχὰς μετὰ ζωηροῦ ἐρυθροῦ χρώματος, καὶ ἀκολούθως μετὰ ὠχροῦ χωρὶς νὰ ἀποσυντεθῇ τὸ καρμίνιον διὰ τῆς τρυγῆς καὶ τῆς ὀξάλικῆς ποτάσεως χρωματίζεται τὸ διάλυμα πορφυροῦν, τὰ ἀλκάλια ἐξ ἐναντίας μεταδίδουσιν εἰς τὸ ρευστὸν ἰώδες χρῶμα, χωρὶς ὅμως νὰ σχηματισθῇ καταβύθισμα· διὰ δὲ τοῦ τιτανίου ὕδατος ἀποτελεῖται καὶ ἰώδες καταβύθισμα.

Διὰ συνεχοῦς ἐπιφόρης τῶν ἀλκαλίων ἐπὶ τοῦ καρμινίου ἀποσυντίθεται τὸ καρμίνιον καὶ μεταβάλλεται εἰς ὠχρόν. Διὰ τῆς προσφάτως καταβύθισθαισης ἀργίλλου ἀποχρωματίζεται τὸ ὑδατῶδες διάλυμα τοῦ καρμινίου καὶ διὰ τῆς ἐνώσεως τῆς ἀργίλλου μετὰ τῆς βαφικῆς ὕλης σχηματίζεται ὠραῖον ἐρυθρὸν χρῶμα, τὸ ὅποιον γίνεται ἰώδες, ἐὰν θερμανθῇ. Διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου λαμβάνει τὸ διάλυμα πορφυροῦν χρῶμα, χωρὶς νὰ ἀποτελῇται καταβύθισμα. Ὁ ὀξικός μόλυβδος, ὁ ἀλικὸς ὑποξειδωμένος κασσίτερος καὶ ὁ νιτρικὸς ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος ἀποτελοῦσιν ἰώδες, ὁ δὲ νιτρικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος πορφυροῦν καταβύθισμα.

Ἄν καὶ τὸ καρμίνιον δὲν ᾖναι χρήσιμον εἰς τὴν καθαρὰν του κατάστασιν, εἶναι ὅμως τὸ κυριώτερον συστατικὸν τῶν διαφόρων ἐρυθρῶν χρωμάτων.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ καρμινίου κατεργάζεται ἐν μέρος λειοτριβημένων ἀνθροκόκκων μὲ 60 μέρη ὕδατος θερμοῦ, τὸ διάλυμα θερμὸν ἐτι δὲ ἀναμιγνύεται μὲ $\frac{1}{16}$ στυπτηρίας. Οὕτως ἀποχωρίζεται τὸ καρμίνιον μετὰ τινὰς ἡμέρας, καὶ μεταγγιζομένου τοῦ ἐπιπολάζοντος ὑγροῦ, ξηραίνεται εἰς σύσκιον καὶ θερμὸν τόπον. Ἄλλα εἶδη καρμινίου ἀποτελοῦνται διὰ προσθήκης τρυγῆς καὶ διαλύματος ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου εἰς ἀφέψημα τοῦ ἀνθροκόκκου.

Ἐκ τοῦ ἀπὸ τὸ καρμίνιον μεταγγιζομένου ρευστοῦ κατασκευάζεται, ἀφοῦ προστεθῇ στυπτηρία καὶ ἔπειτα καταβυθισθῇ διὰ ποτάσεως, τὸ *λάκκον* τοῦ καρμινίου ἢ καὶ *λάκκον* τῆς Φλωρεντίας καλούμενον.

Τὸ καρμίνιον εἶναι ὠραῖον ἐρυθρὸν χρῶμα, χρήσιμον εἰς τοὺς ζωγράφους.

φους· ἐκ τοῦ λάκκου δύναται νὰ διαλυθῇ ἡ βαφικὴ ὕλη διὰ τῆς ἀμμωνιάς, ἡ δὲ ἀργίλλος ἐπιμένει εἰς ἀδιάλυτον κατάστασιν.

ὑπάρχουν καὶ ἄλλα εἶδη ἐντόμων, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουσιν ἐρυθρὰν βαφικὴν ὕλην, ὡς *Coccus Ilicis*, συνήθως *Kermes* καλούμενον, *Coccus Ficus* καὶ *Laccæ*, καθὼς *Coccus polonicus*. Τούτων τῶν ἐντόμων θανατόνουνται τὰ ἄρρενα μετὰ τὴν σύζευξιν, ξηραίνονται καὶ ἀκολούθως ἐξάγεται ἡ βαφικὴ ὕλη κατὰ τὸν προεκτεθέντα τρόπον.

Ἄλλο ἐρυθρὸν χρῶμα ἐμπεριέχεται εἰς τὸ δακρυώδες *λάκκον* καὶ ἀποχωρίζεται, ἐὰν τὸ λάκκον ζήτηται μετὰ διαλύσεως καυστικοῦ νάτρου, δι' οὗ διαλύεται τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα μὲ ἀρκετὸν ποσὸν ῥητίνης. Τοῦτο τὸ βευστὸν ἀνάμειγνυται μετὰ διαλύματος στυπτηρίας καὶ ἡ ἐρυθρὰ ὕλη ἠνωμένη μετὰ ἀργίλλου καὶ ῥητίνης ἀπὸντᾶται ἀγοραῖον ὑπὸ τὸ ὄνομα *Lac-Lac* λάκκον λάκκον. Τοῦτο ὅμως ἐμπεριέχει ἐκτὸς τῆς ἐρυθρᾶς βαφικῆς ὕλης 0,33 ῥητίνης, καὶ 0,27 ἀργίλλου.

Βαφικὴ ὕλη ἀνάλογος ὡς πρὸς τὴν σύνθεσιν μὲ τὸ προεξηρημένον λάκκον εἶναι λάκκον τι μεταφερόμενον ἐκ τῆς Ἰνδίας καὶ ἐκχυλίζομενον ἐκ τοῦ λάκκου δακρυώδους καὶ καλούμενον *Lac Dye*· διαφέρει δὲ ἀπὸ τὸ πρῶτον, καθότι ἔχει ὀλιγωτέραν βαφικὴν ὕλην, καὶ καθότι τὸ χρῶμα δύναται νὰ χρωματίσῃ τὸ ὕδωρ χωρὶς νὰ ᾔηται διαλύσιμον εἰς αὐτό, καὶ ἔνεκα τούτου δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς χρωματισμὸν τῶν ὑφασμάτων.

Τὰ ἐρυθρὰ χρώματα τῶν ἀνθέων, καθὼς τῶν καρυοφύλλων, τῶν ρόδων, τῶν μηκώνων εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον βαθύχρα. Τὰ χρώματα ταῦτα διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ τινα ἐξ αὐτῶν καὶ εἰς τὰ λιπαρὰ ἔλαια, καθὼς τὸ εἰς τὰ ἀνθὴ τοῦ *Hypericum* ἐνυπάρχον ἐρυθρὸν χρῶμα.

Τὰ ὑδατώδη διαλύματα τῆς ἐρυθρᾶς βαφικῆς ὕλης τῶν ἀνθέων λαμβάνουσι ζωηροτέραν ἐρυθρότητα διὰ τῶν ὀξέων καὶ πρασινίζουσι διὰ τῶν ἀλκαλίων· ἔνεκα τούτου καὶ τὸ βάμμα τῶν ρόδων δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς δοκιμαστήριον ἐπὶ τῶν ὀξέων καὶ ἀλκαλίων. Ἀλλ' εἰς τὰ βαφεῖα ὀλίγον ἐφηρμώσθησαν τὰ ῥηθέντα χρώματα τῶν ἀνθέων ὡς πολὺ εὐμετάβλητα.

Ὠχρὰ χρώματα.

Τὰ περισσότερα ὠχρὰ χρώματα δὲν ἐδυνήθησαν μέχρι τοῦδε νὰ ληφθῶσιν εἰς καθαρὰν κατάστασιν, ἀλλὰ μὲ διαφόρους οὐσίας ἠνωμένα·

μεταχειρίζονται εἰς τὴν βαφικὴν καὶ εἰς ἄλλας τέχνας τὸ *κιτρινόξυλον*, ὡχρὸν ξύλον ἢ χρυσοξύλον, τὸ ὁποῖον προάγεται ἀπὸ εἶδος συκαμινέας, *Morus tinctoria*, εἰς τὴν Βρασιλιάν καὶ εἰς τὰς Ἀντίλλας φυομένης. Ἐὰν ῥινίσματα τοῦ ξύλου τούτου ζέωνται μετὰ 10 μέρη ὕδατος $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας, ἀποτελεῖται χρυσίζον ὕγρον, ἐξ οὗ κατακρημνίζεται μετὰ τὴν ψύξιν κιτρίνη κόνις, ἥτις ἐθεωρήθη ὡς ἰδιαίτερα ὡχρὰ οὐσία καὶ ὠνομάσθη *Morin*. Τὸ ἀφέψημα λαμβάνει διὰ τῶν ἀλκαλίων ἐρυθρόχρυσον χρώμα· διὰ δὲ τῆς στυπτηρίας, τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου καὶ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου καταβυθίζονται ἐξ αὐτοῦ ὡχρὰ ἰζήματα.

Εἰς τὰ τμήματα τοῦ ὡχροῦ ξύλου εὐρίσκεται πολλάκις λευκὴ ὀλίγον ῥοδόχρους κόνις, ἀπὸ τὸν *K. Chevreul* λευκὴ *μορίνη* καλουμένη· αὕτη διαλυομένη εἰς τὸν αἰθέρα σχηματίζει κρυστάλλους, οἵτινες λαμβάνουν ὡχρὸν χρώμα, ἐὰν προστεθῶσιν ἀλκάλια, μεταβάλλονται δὲ εἰς ἐρυθροῦς διὰ θειικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου.

Τὸ ὡχρὸν ξύλον χρησιμεύει πρὸς ὡχρὸν ἢ πράσινον χρωματισμὸν τοῦ ἐρίου, τὸ ὡχρὸν ὅμως χρώμα μεταβάλλεται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος, ἐπεὶδὴ ἡ *μορίνη* ἀπορρόφῳσα ὀξυγόνον λαμβάνει ἐρυθρῶδες χρώμα.

Δρυόχρον. Quercitron.

Τὸ ὡχρὸν τοῦτο χρώμα ἐμπεριέχεται εἰς τὸν ἀπὸ τὴν φαιὰν ἐπιδερμίδα ἀποχωριζόμενον φλοιὸν δρυὸς εἰς τὴν θόρειον Ἀμερικὴν ἐγχωρίας, καὶ *Quereus tinctoria* δρυὸς βαφικῆ λεγομένης. Τὸ ἀφέψημα τοῦ φλοιοῦ δὲν θολοῦται διὰ τῆς ἀποψύξεως, μετὰ δὲ τινὰς ἡμέρας καθιζάνει ὡχρὰ κόνις. Τὸ ἀφέψημα εἶναι ὀλίγον ὀξύ, καὶ καταβυθίζεται διὰ τοῦ ζωϊκοῦ πηκτώματος εἰς εἶδος ἐρυθρῶν κροκίδων. Ἡ σκυτοδεψικὴ ὕλη δύναται νὰ χωρισθῇ ἀπ' αὐτὸ διὰ ζωϊκῆς πηκτῆς ἢ διὰ γάλακτος. Τὸ ἀφέψημα λαμβάνει θαυύτερον χρώμα διὰ τοῦ καλίου, καὶ διὰ τῆς ἀμμωνίας, καθὼς καὶ διὰ τῆς βαρείας καὶ τιτάνου, δι' ὧν καταβυθίζεται ἐρυθρώδης ὑποστάθμη. Τοῦτο τὸ χαρακτηριστικὸν διακρίνει τὸ ἀφέψημα τοῦ δρυόχρου ἀπὸ τοῦ τοῦ ὡχροῦ ξύλου.

Τὸ ἀφέψημα τοῦ δρυόχρου κατακρημνίζεται ὡχρὸν διὰ τῶν ἀλάτων τοῦ κασσιτέρου καὶ τοῦ μολύβδου, πράσινον δὲ διὰ τῶν τοῦ σιδήρου. Διὰ τῆς βραδείας ἐξατμίσεως τοῦ ἀφεψήματος σχηματίζεται κρυσταλλώδης μαργαροειδὴς ὕλη, ἥτις ἐμπεριέχει τὴν ἰδιαίτεραν ὡχρὰν ὕλην *Quercitrin* καλουμένην.

Τὸ δρύωχρον ἐνεργεῖ ὡς ὀξύ εἰς τὸν διὰ τιτάνου μεταβεβλημένον δοκιμαστικὸν χάρτην. Εἶναι διαλυτὸν εἰς τὸ οἰνόπνευμα, δυσδιάλυτον δὲ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Τὸ δι' ὕδατος διάλυμα εἶναι ὠχρούλευκον, λαμβάνει ὑποπράσινον χρῶμα διὰ τῶν ἀλκαλίων, καὶ χρυσιζόν διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος. Διὰ τῆς ξηραῖς ἀποστάξεως τήκεται, λαμβάνει φαιὸν χρῶμα καὶ ἐκλύει ὠχροὺς ἀτμοὺς, ἔλαιον, ἀέρια καὶ ὠχρὸν ὑγρὸν, τὸ ὁποῖον φαίνεται ὅτι εἶναι ἀμετάβλητον δρύωχρον.

Τὰ διὰ δρυώχρου βεβαμμένα ὑφάσματα δὲν ἐρυθροῦνται, καθὼς τὰ διὰ ὠχροῦ ξύλου, διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος.

Ἔτερον κίτρινον χρῶμα εὐρίσκεται εἰς ὅλα τὰ ὄργανα καὶ ἰδίως εἰς τὰ πλεσίον τῶν ἀνθέων φύλλα φυτοῦ τινος, τὸ ὁποῖον *Reseda luteola* καλεῖται καὶ τὸ ὁποῖον ἐκρίζουμενον καὶ ἀποξηραίνόμενον εὐρίσκεται ἀγοραῖον ὑπὸ τὸ ὄνομα *Wau*.

Ἐάν 1 μέρος φύλλων μετὰ τῶν σποροθηκῶν καὶ περικαρπίων ζέωνται εἰς 10 μέρη ὕδατος $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας, κατακρημνίζονται μετὰ τὴν ψύξιν τοῦ ἀφεψήματος ὠχραὶ κροκίδες ἐμπεριέχουσαι οὐσίαν λευκὴν κρυσταλλώδη, ὕλην ζωϊκὴν καὶ τὴν ὠχρὰν βαφικὴν ὕλην, ἥτις ἐξαχνίζεται εἰς διαφανεῖς ὠχρολεύκους καὶ βελονοειδεῖς κρυστάλλους. Ἡ ὠχρὰ αὕτη ὕλη, *Luteolin* καλουμένη, εἶναι διαλυτὴ εἰς τὸ ὕδωρ, εὐδιάλυτωτέρα ὅμως εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Αἱ διαλύσεις λαμβάνουν διὰ τοῦ καλίου ὠραῖον πυρρόξανθον χρῶμα, τὸ ὁποῖον μεταβάλλεται διὰ τοῦ καλίου κατ' ὀλίγον εἰς πράσινον καὶ τέλος εἰς φαιὸν διὰ τῆς ἀπορρόφησεως ὀξυγόνου. Διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, τῆς στυπτηρίας, καὶ τοῦ ὀξικοῦ χαλκοῦ ἀποτελεῖται ὠχρὰ ὑποστάθμη. Τὸ μετὰ τὴν ψύξιν διῦλιζόμενον ἀφέψημα εἶναι ὠχρόφαιον, θολοῦται διὰ τοῦ πηκτώματος, λαμβάνει πυρρόξανθον μὲν χρῶμα διὰ τοῦ καλίου, ἐλαιόχρουν δὲ διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου, διὰ δὲ τῶν ἀλάτων τοῦ κασιτέρου καὶ μολύβδου κατακρημνίζεται ὠχρὸν.

Τὰ φύλλα φυτοῦ τινος *Serratula tinctoria*, καθὼς τὰ τοῦ *Genista tinctoria* καὶ τῆς συκαμινέας δύνανται νὰ μεταχειρισθῶσι καθὼς καὶ τὰ προρρήθέντα εἰς τὴν βαφικὴν, ἀλλ' ἡ ἐκ τούτων βαφὴ δὲν εἶναι τόσον ἀνεξίτηλος καθὼς ἡ τῶν πρώτων. Ἐκ τῶν φύλλων τούτων, καὶ ἄλλων φυτῶν κατασκευάζονται ὠχραὶ βαφαὶ καὶ διὰ τὴν ζωγραφικὴν, αἵτινες ἀποτελοῦνται, ἐάν εἰς τὰ μὲ στυπτηρίαν μεμιγμένα ἀφεψήματα τῶν εἰρημένων φύλλων προστεθῇ κρητὶς, ἑωσοῦ ἡ ὠχρὰ ὕλη ἐνωθεῖσα μὲ τὰς γαίας κατακρημνισθῇ εἰς τὸν πυθμένα.

Ωχροὶ κόκκοι. *Graines d'Avignon.*

Οἱ κόκκοι οὗτοι εἶναι ὁ ἀπεξηραμμένος καρπὸς θάμνου τινὸς εἰς τὴν μεσημβρινὴν Γαλλίαν συχνοτάτου. Εἶναι δὲ πράσινοι τὸ χρῶμα, διότι συνάζονται ἄωροι. Τὸ ζέον ὕδωρ διαλύει ἐξ αὐτῶν ὡχρὸν ὕλην καὶ πολλὴν πικρὰν οὐσίαν. Τὸ ἀφέψημα εἶναι ὡχροφαιον, ὀλίγον πρασινίζον καὶ θολούμενον διὰ τῆς ἀποψύξεως. Διὰ τοῦ καλίου καὶ διὰ τῆς ἀμμωνίας λαμβάνει χρυσιζον χρῶμα χωρὶς νὰ ἀποτελεσθῇ καταβύθισμα· ὁμοίως λαμβάνει χρυσιζον χρῶμα διὰ τῶν διαλυμάτων τῆς τιτάνου καὶ τῆς βαρείας, κατακρημνιζομένων ὅμως τινῶν κροκιδῶν. Τὸ ὡχρὸν χρῶμα τῶν ὡχρῶν κόκκων δὲν εἶναι πολὺ ἔμμονον, εἶναι χρήσιμον πρὸς τύπωσιν τῶν ὑπασμάτων καὶ πρὸς διαφόρους λακκοβαφὰς διὰ τοὺς τάπητας.

Orellana. Orlean, Rocou. Anetto. Orellin.

Κατασκευάζεται ἐκ τῶν σπερμάτων δένδρου τινὸς εἰς τὴν μεσημβρινὴν Ἀμερικὴν φυομένου καὶ Bixa Orellana λεγομένου. Τὰ σπέρματα ταῦτα εἶναι περιβεβλημένα μὲ χρυσιζόντα πόλτον, ὁ ὅποιος χωρίζεται ἀπὸ τὰ σπέρματα δι' ἐμβρέξεως εἰς ὕδωρ, διὰ ζυμώσεως καὶ διὰ μηχανικῶν μέσων.

Ὁ ἀποπλυμένος καὶ ἀπεξηραμμένος πόλτος εἶναι ἡ ἀγοραία ὀρελάννα. Ἡ ὡχρὰ ὕλη τῆς ὀρελάννης εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐξάγεται δι' οἰοπνεύματος. Τὸ μέχρι στερεοῦ ἐξατμιζόμενον διάλυμα κατεργάζεται δι' αἰθέρος, ὅστις διαλύει μόνον τὴν ὡχρὴν ὕλην. Ἡ οὕτως ἀποχωρισθεῖσα καὶ διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ αἰθέρος ἔπειτα ληφθεῖσα ὕλη, *Orellin* καλουμένη, εἶναι ἐρυθρόφαιος, μαλακὴ, ἰξώδης, εὐτήκτος, δὲν εἶναι εὐθρυπτος εἰς τὸ ψῦχος, καίει εἰς τὸ πῦρ μὲ λαμπρὰν φλόγα καὶ διαλύεται εἰς τὸ οἰνόπνευμα καθὼς καὶ εἰς τὸν αἰθέρα μὲ ἐρυθρόφαιον χρῶμα. Ἡ διάλυσις τῆς εἰς τὰ ἀλκάλια κατακρημνίζει χρυσιζούσαν ὑποστάθμην, ἐν προστεθῶσιν ὀξέα. Τὸ διὰ τοῦ οἰοπνεύματος κίτρινον διάλυμα λευκαίνεται διὰ τοῦ γλωρίου καὶ λαμβάνει γαλακτόχρουν χρῶμα. Διὰ τοῦ ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος βάφεται κυανοῦν, μεταβάλλεται ὅμως μετ' ὀλίγον εἰς πράσινον καὶ ἰόχρουν.

Ὁ *K. Chevreuil* νομίζει ὅτι ἡ *Orellana* ἐμπεριέχει δύο χρώματα, ὡχρὸν καὶ ἐρυθροῦν. Τὸ μὲν ὡχρὸν εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ τὸ οἰνόπνευμα, δυσδιάλυτον δὲ εἰς τὸν αἰθέρα. Τὸ μὲ στυπτηρίαν ἐστυμμένον ἔριον βάφεται δι' αὐτοῦ ὡχρὸν. Τὸ δὲ ἐρυθροῦν χρῶμα εἶναι δυσ-

διάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, εὐδιάλυτον εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ οἶνόνπνευμα, σχηματίζει μὲ αὐτὰ χρυσιζόντα ὑγρά, καὶ διαλύεται εἰς τὸ κάλιον μὲ βαθυχρυσιζόν χρῶμα. Μόνον ἡ ἐρυθρὰ ὕλη μεταβάλλεται εἰς κυανὴν διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος καὶ κατὰ τοῦτο ὁμοιάζει μὲ τὴν ὠχρὰν βαφικὴν τοῦ κρόκου καὶ μὲ τὴν ὠχρὰν βαφικὴν ὕλην τῆς χολῆς. Διαλύεται προσέτι καὶ εἰς τὰ λιπαρά καὶ αἰθέρια ἔλαια.

Ἡ ὀρελάνα χρησιμεύει κατ' ἐξοχὴν πρὸς βαφὴν τῆς μετάξης εἰς πυρρόζκνητον ἢ χρυσιζουσαν, τὰ δὲ χρώματα δὲν εἶναι τόσον ἀνεξίτηλα.

Ὠχροδὴ τῆς κροκορρίζης. *Curcumin.*

Ἡ κροκορρίζα, *Radix Curcumae*, φύεται εἰς τὴν Ἰνδικήν, εἶναι ἐξωτερικῶς ξανθὴ καὶ ἐσωτερικῶς ὠχρὰ, ἀρωματικὴ, ἐμπεριέχει φαιὰν ἐχυλισματικὴν ὕλην, ἄμυλον, ἔλαιόν τι πτητικόν καὶ τὴν ὠχρὰν ὕλην, ἥτις εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ. Διὰ τὴν ἀποχωρισθῆ ἡ ὠχρὰ ὕλη, πρέπει νὰ κατεργασθῇ ἡ λεῖα ρίζα μὲ ζέον οἶνόνπνευμα, τὸ ὁποῖον διαλύει ταύτην καὶ τὴν ἐχυλισματικὴν ὕλην, ἐπομένως κατεργάζεται τὸ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν ὑπόλειμμα διὰ τοῦ αἰθέρος πρὸς ἀποχωρισμὸν τῆς ὠχρᾶς ὕλης ἀπὸ τὴν ἐχυλισματικὴν. Διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ αἰθέρος λαμβάνεται ἡ ὠχρὰ ὕλη μὲ πολλὰ ὀλίγον πτητικὸν ἔλαιον καὶ μὲ ἀλικὴν τίτανον.

Ἡ ὠχρὰ διάλυσις μεταβάλλεται εἰς φαιὰν δι' ὅλων τῶν ἀλκαλοειδῶν βάσεων, καθὼς καὶ διὰ τοῦ βορικοῦ ὀξέος καὶ διὰ τινων διαλυμάτων τῶν μεταλλικῶν ὀξειδιῶν διὰ δὲ τοῦ ἀλικοῦ κασσιτέρου καὶ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου εἰς καστανόχρουν.

Τὰ ὑφάσματα λαμβάνουν διὰ τῆς κροκορρίζης ὠραῖον μὲν, ὅχι ὁμῶς ἀνεξίτηλον ὠχρὸν χρῶμα. Ἐξ αὐτῆς τῆς κιτρίνης βαφῆς καὶ ἐκ τοῦ ἐρυθροῦ χρώματος κατασκευάζεται τὸ πορφυροῦν χρῶμα. Οἱ Ἰνδοὶ τὴν μεταχειρίζονται διὰ νὰ βάψωσι τὴν ὄρουαν ὠχρὰν. Ἡ βαφὴ αὕτη χρησιμεύει καὶ πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὠχροῦ δοκιμαστικοῦ χάρτου *Charta Curcumae*.

Κροκοκίτρινον ἢ Κρόκειον.

Ὁ κρόκος ἢ τὰ στίγματα τοῦ κρόκου, *Crocus sativus*, φυτοῦ βολβώδους εἰς τὴν Ἀνατολὴν μὲν αὐτομάτως φυομένου, εἰς τινὰ δὲ τῆς Εὐ-

ρώπης μέρη καλλιεργουμένου, ἐμπεριέχει ὡχρὰν ὕλην, ἥτις ἀπολαμβάνεται, ἐὰν τὸ ὑδατῶδες ἐκχύλισμα τοῦ κρόκου κατεργασθῇ δι' οἶνο-
πνεύματος καὶ μετὰ ταῦτα ἐξατμισθῇ· ἐμπεριέχει δὲ εἰς αὐτὴν τὴν
κατάστασιν καὶ ὀλίγον αἰθέριον ἔλαιον, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ
κατὰ τὸν K. Henry, ἐὰν τὸ οἶνοπνευματῶδες ἐκχύλισμα τοῦ κρόκου
διαλυθῇ εἰς ὕδωρ, καὶ προστεθῇ εἰς τὸ ὑγρὸν πρῶτον μὲν κάλιον, ἔπειτα
δὲ ὀξύ τι, δι' οὗ κατακρημνίζεται ἡ ὡχρὰ ὕλη εἰς καθαρωτέραν κατάστασιν.

Τὸ κρόκειον εἰς ξηρὰν κατάστασιν εἶναι ἐρυθρῶδες καὶ διαφανές, τὸ δὲ
ἀπὸ τοῦ ἐλαίου καθαριζόμενον πορφυροῦν εἶναι διαλυτὸν εἰς τὸ οἶνόπνευμα,
καὶ εἰς τὰ λιπαρὰ καὶ αἰθέρια ἔλαια, δυσδιάλυτον δὲ εἰς τὸν αἰθέρα. Ἐὰν ἡ
εἰς τὸ οἶνόπνευμα διάλυσίς του ἐξατμισθῇ μέχρι στερεοῦ, λαμβάνει δι' ὀλί-
γων σταλαγμῶν θεϊκοῦ ὀξέος κυανοῦν χρῶμα, ἀλλὰ ταχέως μετα-
βάλλεται εἰς ἰώδες καὶ τέλος ἀφανίζεται παντελῶς. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ
ὀξέος λαμβάνει πράσινον χρῶμα ταχέως ἐξαλειφόμενον. Ἔνεκα τῶν
τοιούτων πολλῶν μεταβολῶν τοῦ χρώματος διὰ τῶν ὀξέων, ὀνομάζεται
ἡ ὡχρὰ ὕλη τοῦ κρόκου *Πολύχρωμος ὕλη Polychroit*. Τὰ διαλύματά
της καταβυθίζονται ἐρυθρὰ διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου,
ὡχρὰ δὲ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου μετ' ὑπερτερούσης βάσεως. Τὸ εἰς
ὕδωρ ἢ εἰς οἶνόπνευμα διάλυμα λευκαίνεται ἐντελῶς διὰ τοῦ ἡλίου καὶ
διὰ τοῦ χλωρίου.

Ὁ κρόκος εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν ὀφιοποιῖαν καὶ εἰς τὴν ἱατρικὴν, σπανίως δὲ εἰς τὴν ζωγραφικὴν ὡς ὑδατόχρωμα.

Κρήκωχρον. Saflor. Safran d' Allemagne.

Πρὸς κατασκευὴν τῆς ὡχρᾶς ταύτης ὕλης κατεργάζονται τὰ ἄνθη
τοῦ κνήκου, *Carthamus tinctorius*, διὰ ψυχροῦ ὕδατος. Μετὰ τὴν ἐξά-
τμισιν τοῦ καθαροῦ ὑγροῦ ἐπιμένει τὸ κνήκωχρον ὡς στερεὰ μάζα.

Ἐκτὸς τῶν ἐκτεθέντων κιτρίνων χρωμάτων ἐξάγονται καὶ ἄλλα τοιαύτης
φύσεως χρήσιμα εἰς τὰ βαφεία ἐκ τῶν ἐξῆς φυτῶν: *Lichen parietinus*,
Boletus hirsutus, *Evernia vulpina*, ἐκ τῶν ἀνθῶν τοῦ *Narcissus pseu-*
donarcissus, *Tropaeolum majus*. Ἐκ τοῦ *Genista tinctoria* προτέτι ἀπο-
λαμβάνεται διὰ τῆς ἐπιρόοῆς τῆς ποτάσσης καὶ τοῦ οὔρου, χρυσί-
ζον τι χρῶμα. Ὡσαύτως ἐξάγονται κίτρινα χρώματα ἐκ τῶν ἀνθῶν καὶ
τῶν κλόνων τοῦ *Datisca cannabina*, τοῦ *Anthemis tinctoria*, *Caltha*
palustris, *Trifolium pratense*, ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς ἀργίης μηλέας κτλ.

Πράσινα χρώματα.

Εἰς ὅλην τὴν ὀργανικὴν φύσιν ὑπάρχει σχεδὸν ἓν μόνον πράσινον χρῶμα τὸ *χλωρόφυλλον*, τὸ πράσινον δηλαδή τῶν φύλλων, τὸ ὁποῖον ἤδη προανέφεραμεν· ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦτο τὸ πράσινον χρῶμα εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ δὲν δύναται νὰ μεταχειρισθῇ εἰς τὴν βαφικὴν διὰ τοῦτο ὅλαι αἱ πράσιναι βαφαὶ συντίθενται ἐκ τῆς ὠχρᾶς καὶ τῆς κυανῆς. ὑπὸ τὸ ὄνομα δὲ *Ὀποπράσινον* (*Succus viridis*) εὐρίσκεται πρασίνη βαφή, ἥτις κατασκευάζεται, ἐὰν συντρίβωνται οἱ ὠριμοὶ καρποὶ θαμνίσκου τινὸς, *Rhamnus catharticus* λεγομένου, καὶ ὑποβάλλωνται εἰς ζύμωσιν 8 ἡμέρας, ἀκολούθως ἐκθλίβεται ὁ ὀπὸς καὶ ἐξατμίζεται μέχρι ξηροῦ, προστιθεμένης στυπτηρίας καὶ ὑπανθρακικοῦ καλίου. Εἶναι μάζα πρασίνη, διαλυτὴ εἰς τὸ ὕδωρ, ἐρυθροῦται διὰ τῶν ὀξέων, καὶ χρησιμεύει μόνον εἰς τὴν ζωγραφικὴν.

Kyanaī βαφαί.

Κυαναὶ βαφαὶ εὐρίσκονται μὲν εἰς πολλὰ πέταλλα ἀνθέων, καθὼς καὶ εἰς τινὰς καρπούς, π. χ. εἰς τὰ ἄνθη τῶν ἰῶν (*Viola*), εἰς τὰ φύλλα τινῶν εἰδῶν λαχάνων, ἀλλ' ἐπειδὴ αἱ περισσότεραι αὐτῶν μεταβάλλονται εἰς πρασίνοὺς διὰ τῶν ἀλκαλίων καὶ εἰς ἐρυθρὰς διὰ τῶν ὀξέων, μόλις εἶναι ἐν χρήσει εἰς τὴν βαφικὴν.

Τὸ καμπεχικόν ξύλον μεταχειρίζεται ἐνίοτε, προστιθεμένης βάσεως τινος, τὸ δὲ Ἰνδικόν (*Indigo*) εἶναι σχεδὸν ἡ μόνη καὶ ἀξιολογωτάτη κυανὴ βαφικὴ ὕλη ἐκ τῆς τῶν φυτῶν βασιλείας, ἥτις μεταχειρίζεται εἰς τὴν βαφικὴν.

Τὸ Ἰνδικόν. Indigo.

Τὸ Ἰνδικόν ἀπαντᾷται ὡς ὠχρὸς ὀπὸς εἰς τὰ φύλλα διαφόρων φυτῶν, κατ' ἐξοχὴν εἰς *Indigofera tinctoria*, *J. Anil*, *disperma* καὶ *argentea*, εἰς *Nerium tinctorium* (εἶδος πικροδάφνης.), *Isatis tinctoria*, *Asclepias tingens* κτλ. Ἐκ τῆς *Indigofera tinctoria* μάλιστα ἀπολαμβάνεται μεγάλη ποσότης Ἰνδικοῦ κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Τὸ φυτὸν νεαρὸν ἀκόμη ἢ ἀπεξηραμμένον τεμνόμενον τίθεται εἰς πίλους καὶ

καταβρέχεται με ὕδωρ, πιέζεται δὲ με λίθους διὰ νὰ διαμείνῃ ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν· μετ' ὀλίγον ἄρχεται τὸ φυτὸν νὰ ζυμοῦται, ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ αέριου, καὶ τὸ ὕδωρ λαμβάνει ὠχρὸν χρῶμα, ὃ δὲ ἀναδυόμενος ἀφρὸς γίνεται κυανοῦς διὰ τῆς ἐπιφύσης τοῦ αέρος. Μετὰ τινὰς ἡμέρας μεταγγίζεται τὸ ὠχρὸν ὕδωρ ἀπὸ τὰ χόρτα, καὶ ἀφ' οὗ προστεθῇ τιτάνιον ὕδωρ, ἀνακινεῖται τὸ μίγμα ἀδιακόπως εἰς τὸν αέρα, ὥστε γίνεται κυανοῦν καὶ θολῶδες. Τὸ οὕτω κατακρημνιζόμενον ἰνδικόν, καλῶς ἀπολυθὲν, ἀποξηραίνεται.

Τὸ καλῆτερον ἰνδικόν κατασκευάζεται εἰς τὴν Ἀμερικὴν πλησίον τῆς Guatemala, ἐκ τῆς *Indigofera argentea*, καὶ πωλεῖται ὑπὸ τὸ ὄνομα *Guatemala flora*. Ἡ καλῆτέρα ποιότης τοῦ ἀγοραίου ἰνδικοῦ εἶναι μόλις κατὰ τὸ ἥμισυ καθαρὸν ἰνδικόν. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ K. Berzelius ἐμπεριέχει τὸ ἀγοραῖον ἰνδικὸν κυανὴν ὕλην, Indigotine, φυτοκόλλαν, φαιὰν καὶ ἐρυθρὰν ὕλην, καὶ προσέτι εἰς τὰ περισσώτερα τοῦ ἰνδικοῦ εἶδη ὀλίγην ὑπανθρακικὴν τίτανον, μαγνησίαν καὶ ὀξειδωμένον σίδηρον.

Τὸ κυριώτερον ὅθεν συστατικὸν τοῦ ἰνδικοῦ εἶναι ἡ κυανὴ ὕλη, ἡ ὁποία ἐπιμένει, ἀφ' οὗ τὸ ἰνδικὸν ἀποχωρισθῇ ἐκ τῶν εἰρημένων ἑτερογενῶν οὐσιῶν δι' ὕδατος, οἰνοπνεύματος, κεκραμένων ὀξέων καὶ ἀλκαλίων. Ὡσαύτως δύναται νὰ παρασκευσθῇ, ἐν τῷ ἰνδικόν θερμανθῇ εἰς ἀγγεῖον διὰ ἐλαφοῦ πυρός· τότε ἐξαχνίζεται ἡ κυανὴ ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ εἰς εἶδος πορφυρίζουσων ἀγγίδων.

Ἡ κυανὴ ὕλη δύναται νὰ ληφθῇ ὄχι μόνον με κυανοῦν χρῶμα, ἀλλὰ καὶ με λευκόν. Ἀξιοπαρατήρητον δὲ εἶναι ὅτι δύναται νὰ μεταφερθῇ πολ- λάκις ἐκ τῆς κυανῆς καταστάσεως εἰς τὴν λευκὴν, καὶ τάνάπαλιν, χωρὶς νὰ ὑπόκηται εἰς οὐσιώδη τινὰ μεταβολήν. Ἐνεκα τούτου ὁ K. Chevreuil ἐκ τῶν δύο τούτων ὑλῶν τὴν μὲν ὠνόματε λευκὴν ὕλην τοῦ ἰνδικοῦ, τὴν δὲ κυανὴν ὕλην τοῦ ἰνδικοῦ.

Α. Λευκὴ ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ.

Ἀπαντᾷται εἰς τὴν φύσιν ἐπὶ διαφόρων φύλλων, ἀπολαμβάνεται δὲ διὰ τῆς τέχνης· ἀποξειδουμένου τοῦ κυανοῦ ἰνδικοῦ. Πρὸς τούτον τὸν σκοπὸν τίθενται εἰς λάγνηνον 1 μέρος λεῖου ἰνδικοῦ με 2 μέρη κεκαυμένης τιτάνου, ἐμβρέχεται τὸ μίγμα με 15 μέρη ζέοντος ὕδατος, καὶ προστίθεται ἔπειτα τίτανος καὶ $\frac{1}{2}$ θεϊκοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου· ἡ λά-

γηνος καλῶς ἐπιπωματισθεῖσα ἀνακινεῖται συνεχῶς, οὕτω σχηματίζεται θεϊκὴ τίτανος, καὶ ὑποξειδωμένος σίδηρος κατακρημνίζεται εἰς τὸν πυθμένα, ὅστις μεταβάλλεται ἐπομένως εἰς ὀξειδίου διὰ τῆς τοῦ ὀξυγόνου ὑπὸ τοῦ ἰνδικοῦ ἀπορρόρησεως, καὶ τὸ ἀποξειδωμένον καὶ λευκὸν ἰνδικὸν ἐνοῦται μὲ τὴν τίτανον σχηματίζον ὠχρὸν ὑγρὸν. Τὸ ὑγρὸν μετ' ὀλίγον μετοχετεύεται διὰ κυρτοῦ σίφωνος εἰς ἄλλην λάγνην, εἰς τὴν ὁποίαν περιέχεται θερμὸν ὀξικὸν ὀξύ τόσον, ὥστε νὰ ὑπερτερῇ αὐτὸ, καὶ κλείεται ταχέως ἡ λάγνη· τὸ ὀξικὸν ὀξύ σχηματίζει μὲ τὴν τίτανον εὐδιάλυτον ἄλας, καὶ τὸ λευκὸν ἰνδικὸν κατακρημνίζεται εἰς τὸν πυθμένα. Μετὰ 24 ὥρας χωρίζεται τὸ ὑγρὸν ἀπὸ τοῦ ἴζημα διὰ κυρτοῦ σίφωνος, τοῦτο δὲ, ἀποκλεισθέντος τοῦ αἵματος, ἀποπλύνεται διὰ θραστοῦ ὕδατος, ἕως οὗ δὲν ἀπορρέει πλέον ξινόν· ἀκολούθως ἐκθλίβεται μετὰ ξὺ ἐμπορικοῦ χάρτου καὶ ἀποξηραίνεται εἰς ἀερόκενον τόπον ἐπὶ θεϊκοῦ ὀξέος.

Ἡ λευκὴ ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ εἶναι κόνις ὑπόλευκος, ἄσμος, ἄχυμος, δὲν ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ χάρτου τοῦ καγκαμίνου καὶ εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ. Ἐὰν θραχὴ δι' ὕδατος αἶρα ἐμπεριέχοντος, ὀξειδώνεται ταχέως, κατακρημνιζομένη εἰς τὸν πυθμένα ὡς κυανὴ κόνις. Εἶναι διαλυτὴ εἰς τὸ οἶνο-πνεῦμα καθὼς καὶ εἰς τὴν αἰθέρα μὲ ὠχρὸν χρώμα, μεταβαλλόμενον διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ αἵματος εἰς κυανοῦν.

Ἡ λευκὴ ὕλη δὲν ἐνοῦται μὲ τὰ ὀξέα, μὲ τὰ ἀλκάλια δὲ καὶ μὲ τὰς ἀλκαλοειδεῖς γαίας εὐκόλως. Ὅλαι αἷται αἱ ἐνώσεις εἶναι διαλυταὶ εἰς τὸ ὕδωρ μὲ ὠχρὸν χρώμα· εἰς στερεὰν δὲ κατάστασιν εἶναι ἀκόμη ἄγνωστοι· μὲ ὑπερπερὺσαν τίτανον σχηματίζει ἡ λευκὴ ὕλη ἔνωσιν ὠχρὰν ἀδιάλυτον σχεδὸν εἰς τὸ ὕδωρ. Ὅλαι ἀπορρόφουν τὸ ὀξυγόνον, δι' οὗ σχηματίζεται καὶ ἀποχωρίζεται κυανοῦν ἰνδικόν.

Β'. Κυανὴ ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ, ἡ ὀξειδωμένον ἰνδικόν.

Σχηματίζεται, καθὼς εἶδαμεν, διὰ τῆς ἐνώσεως τῆς λευκῆς ὕλης μετ' ὀξυγόνου, δύναται δὲ νὰ ἐξαχθῇ καὶ ἐκ τοῦ ἀγοραίου ἰνδικοῦ διὰ τῆς ἐξαχνίσεως. Ἡ ὕλη αὕτη ἐμπεριέχει μὲν πολλάκις ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, δύναται ὅμως νὰ χωρισθῇ ἐκ τούτου δι' οἶνοπνεύματος. Ἡ διὰ τῆς ἀποκαταστάσεως κατασκευασθεῖσα κυανὴ ὕλη εἶναι κόνις βαθυκυανῆς, ἡ δὲ διὰ τῆς ἐξαχνίσεως σχηματίζει κρυστάλλους τετραγώνους, στιλπνοὺς, πορφυρίζοντας, οἵτινες λεωτριβόμενοι γίνονται βαθυκυανοί. Εἶναι ἄχυμος

ἄσμος καὶ εὐτηκτος. Ἡ ἐξατμισθεῖσα κυανὴ ὕλη σύγκειται κατὰ τοὺς K. le Royer καὶ Dumas ἐξ

Ὄξυγόνου	10,43
Νιτρογόνου	13,81
Ἀνθρακος	73,26
Ἵδρογόνου	2,50

Ἡ κυανὴ ὕλη εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς τὸν ψυχρὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Τὰ διαλύματα τῶν καλίων δὲν ἐνεργοῦν εἰς αὐτήν, ἐὰν δὲ συναφθῶσι μὲ οὐσίας ὀργανικὰς ἢ ἀνοργάνους ἀπορρόφωσιν εὐκόλως τὸ ὀξυγόνον, καὶ τότε τὸ ὑγρὸν πρῶτον μὲν λαμβάνει πράσινον χρῶμα, ἔπειτα δὲ σχηματίζεται λευκὴ ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ ἠνωμένη μὲ τὰ ἀλκάλια. Διὰ δὲ συνεχοῦς ἐπιρροῆς ὀργανικῶν καὶ εἰς ζύμωσιν ὑποκειμένων οὐσιῶν φθείρεται ὁλοκλήρως ἡ βαφικὴ ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ.

Τὸ ἀλικόν, τὸ φωσφορικόν, τὸ ἀρσενικόν ὀξύ κτλ. εἶτε κεκραμένα, εἶτε ἄκρατα δὲν ἐνεργοῦν εἰς τὴν κυανὴν ὕλην, ὅχι δὲ καὶ τὸ κεκραμένον θεικόν ὀξύ, τὸ δὲ ἄκρατον θεικόν ὀξύ ἐνεργεῖ ὡς ἀκολούθως.

Ἐὰν προστεθῇ 1 μέρος λειοτριβημένης κυανῆς ὕλης τοῦ ἰνδικοῦ εἰς 12 μέρη ἀκράτου Ἀγγλικοῦ θειικοῦ ὀξέος, τὸ ὑγρὸν λαμβάνει ὠχρὸν, ἔπειτα πράσινον καὶ τέλος βαθυ-κυανοῦν χρῶμα, χωρὶς νὰ ἐξάγῃται θειῶδες ἀέριον. Εἰς τὴν 80° R ἡ διάλυσις γίνεται ἐντελεστέρα, παρὰ εἰς μετρίκην θερμοκρασίαν. Ὅμοιον διάλυμα πορφυρίζον δὲ κατ' ἀρχὰς δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἐξ 1 μέρους κυανῆς ὕλης καὶ 6 μερῶν Γερμανικοῦ καπνίζοντος θειικοῦ ὀξέος.

Μέχρι τοῦδε ἐνόμιζον οἱ χημικοὶ ὅτι τὸ εἰς θεικόν ὀξύ διάλυμα τοῦ ἰνδικοῦ εἶναι θεικόν ἰνδικόν, ὃ δὲ K. Berzelius ἀνεκάλυψεν ὅτι σύγκειται ἐκ τριῶν διαφόρων ἐνώσεων, δηλαδὴ ἐκ θειικοῦ ἰνδικοῦ, ἐξ ὑποθεικοῦ ἰνδικοῦ, καὶ ἐκ μεταθεβλημένου θειικοῦ ἰνδικοῦ, τὸ ὅποιον ὁ ἴδιος ὀνομάζει πορφυρίζουσα ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ, καὶ πρῶτος τὴν περιέγραψε ὑπὸ τὸ ὄνομα Acidum phoeniceum.

Τὸ θεικόν ἰνδικόν ἢ τὸ ἰνδικόν θεικόν ὀξύ, διαλυτὴ κυανὴ ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ, κατασκευάζεται, ἐὰν τὸ διάλυμα τῆς κυανῆς ὕλης τοῦ ἰνδικοῦ διὰ θερμοῦ διαλύματος ἀνθρακικῆς ποτάσης καταβυθισθῇ, τὸ παραγόμενον ἴζημα ἀποπλυνόμενον καλῶς ξηραίνεται. Τοῦτο τὸ ἴζημα καλεῖται Indigo Carmin, Indigo soluble, ἰνδικόν διαλύσιμον.

Τὸ διϋλυσθὲν κυανοῦν ὑγρὸν ἐμπεριέχει ἰνδικο-θειϊκὸν καὶ ἰνδικο-υπο-θειϊκόν. Ταῦτα τὰ ὀξέα κορεννύμενα μετὰ διχόρων βάσεων παρέχουσι κρυσταλλώσιμα, ἅλατα καλούμενα ἰνδικο-θειϊκὰ ἅλατα, ἐκ τῶν ὁποίων δύνανται δι' ὀξικοῦ μολύβδου καὶ ἐπομένως διὰ ὑδροθειωμένου αερίου νὰ χωρισθῶσι τὰ ὀξέα εἰς καθαρὰν κατάστασιν.

Πορφυρίζουσα ὕλη τοῦ ἰνδικοῦ,

φοινίκειον, πορφυροθειϊκὸν ὀξύ.

Acide Sulfopurpurique.

Τὸ φοινίκειον ἢ πορφυροθειϊκὸν ὀξύ κατεσκευάσθη ὑπὸ τοῦ K. Crum κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. 1 μέρος κεκαθαρμένου ἰνδικοῦ ἀνακινεῖται μὲ 8 μέρη Ἀγγλικοῦ θειϊκοῦ ὀξέος εἰς κελλευσμένην λάγνην, ἕως οὗ τὸ ὑγρὸν λάβῃ ἐλαιώδες χρῶμα· ἀκολούθως συμμιγνύεται μὲ 40 μέρη ὕδατος, δι' οὗ ἀποτελεῖται ἴζημα, τὸ ὁποῖον ἀποπλυνόμενον διὰ ψυχροῦ ὕδατος, ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὸ ὑπερτεροῦν ὀξύ. Τὸ ἴζημα διαλύεται εἰς ψυχρὸν ὕδωρ καὶ ἐξατμίζεται τὸ ὑγρὸν. Τὸ μετὰ τὴν ἐξατμίσιν ἐπιμένον δὲν εἶναι καθαρὸν φοινίκειον, ἀλλ' εἶναι ἀκόμη ἡνωμένον μὲ θειϊκὸν ὀξύ. Ἐὰν ἡ ἐπιρροή τοῦ ἀκράτου θειϊκοῦ ὀξέος εἰς τὸ κεκαθαρμένον ἰνδικὸν ἐξακολουθῇ ἐπὶ πολὺ, ἢ ἐὰν αὐξηθῇ διὰ τῆς θέρμης, δὲν σχηματίζεται διόλου φοινίκειον ὀξύ, ἀλλὰ τὸ ἰνδικὸν διαλύεται ὀλοτελῶς.

Τὸ ἀπεξηραμμένον φοινίκειον ὀξύ εἶναι κυανῶν, διαλυτὸν εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ἀδιάλυτον δὲ εἰς τὸ κεκραμένον θειϊκὸν ὀξύ. Τὸ εἰς ὕδωρ διάλυμα τοῦ φοινικείου θολοῦται, προστιθεμένου διαλυσίμου τινὸς ἁλτος, π. χ. ἁλικοῦ νάτρου, ἁλικῆς ἀμμωνίας, θειϊκῆς μαγνησίας, συπτηρίας κτλ, καὶ πορφυρίζον ἴζημα κατακρημνίζεται.

Ἐκτός τῶν ἐκτεθέντων ὀξέων προάγονται ἀναμφιβόλως, ἐὰν ταῦτα ἀποσυντεθῶν διὰ τῆς ἐπιρροῆς ἀλκαλίων καὶ γαιῶν, νέα ὀξέα ἐμπεριέχοντα μεταβεβλημένην τινὰ τοῦ ἰνδικοῦ ὕλην καὶ μέρος θειϊκοῦ ὀξέος, ταῦτα εἶναι τὸ *φαίδιν*, τὸ *ὠχρὸν*, τὸ *πορφυροῦν*, καὶ τὸ *πράσινον θειϊκόν ὀξύ*. (*Rufin, Flavin, Purpurin*), καὶ *Verdinsulphurique Acide*.

Τὸ δι' ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τοῦ ἰνδικοῦ εἰς θειϊκὸν ὀξύ μεταχειρίζεται εἰς τὴν βαφικὴν, καθὼς καὶ πρὸς προσδιορισμὸν τῆς ποσότητος τοῦ διαλελυμένου χλωρίου, εἴτε καθαροῦ, εἴτε μὲ τίτανον ἡνωμένου.

Ἑνέργεια τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῆς

κυανῆς ὕλης τοῦ ἰνδικοῦ.

Ἰνδικο-νιτρικὸν ὀξύ. Acidum nitroanilicum.

Τὸ νιτρικὸν ὀξύ διαφθείρει τὴν κυανὴν ὕλην καὶ σχηματίζει διαφόρους ὑσείας, κατ' ἐξοχὴν δὲ ἰδιαίτερον ὀξύ καὶ οὐσίαν τινὰ πικράν· ἡ προαγωγὴ ὅμως τούτων τῶν ὑλῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἄκρατον ἢ κεκραμένην κατάστασιν τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος. Τὸ ἰνδικο νιτρικὸν ὀξύ προάγεται, ἐν εἰς ζέον μίγμα ἐξ 1 μέρους καπνίζοντος νιτρικοῦ ὀξέος καὶ 10—15 μερῶν ὕδατος προστίθεται κατὰ μικρὸν λεῖον ἰνδικόν, ἕωσθ' νὰ μὴν ἐκπέμπωνται πλέον αἴρις. Ἀφοῦ διῦλισθῇ τὸ εἰσέτι ζέον ὥχρον ὑγρὸν, πυκνοῦται τὸ εἰς αὐτὸ ἐμπεριεχόμενον ὀξύ τοῦ ἰνδικοῦ διὰ τῆς ψύξεως εἰς κρυστάλλους, οἵτινες διὰ νὰ καθαρισθῶσι ἀπὸ τὸ συγχρόνως σχηματιζόμενον πικρονιτρικὸν ὀξύ, διαλύονται πάλιν εἰς ζέον ὕδωρ, καὶ προστίθεται ἄρτισκεύαστος ἀνθρακικὸς μύλυθος, ἕωσθ' πύξη ἢ ἀνάξεις. Οὕτω προάγονται δύο ἅλατα, ἰνδικονιτρικὸς καὶ πικρονιτρικὸς μύλυθος, τῶν ὁποίων τὸ πρῶτον καταβυθίζεται, τὸ δὲ ἕτερον μένει διαλελυμένον. Ἡ μετὰ τὴν ψύξιν κρυσταλλουμένη ἔνωσις τοῦ μολύβδου μετὰ τὸ ἰνδικονιτρικὸν ὀξύ διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἀποσυντίθεται διὰ κεκραμένου βεϊκικοῦ ὀξέος.

Τούτοις τὸ βρευστὸν ἀποψυχραινόμενον σχηματίζει κρυστάλλους λευκοτάτους, πικροὺς, ατυπτικοὺς, ἐρυθροῦντας ὀλίγον τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην. Ἀναφλέγονται διὰ τοῦ φωτός καὶ καίουν εἰς τὸν ἀέρα μετὰ ὀλίγα πολλὰ αἰθαλώδη, διαλύονται εἰς 1000 μέρη ψυχροῦ ὕδατος, εἶναι δὲ εὐδιάλυτοι εἰς τὸ ζέον ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Τὸ ἰνδικὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τὰς βάσεις, σχηματίζον ἅλατα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὥχρᾳ, ἀναφλεγόμενα διὰ τῆς πυρώσεως ἄνευ πυρσοκρατήσεως καὶ κατακαίόμενα ὡς πυρίτης κόνις. Τὰ διαλύματα τῶν ἁλμάτων τούτων ὡς καὶ τὸ ἴδιον ὀξύ ἐρυθροῦσι τὰ ἅλατα τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου.

Αἱ ἐνώσεις του μετὰ τὰς γαίας καὶ τὰ ἀλκάλια εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διαλυταὶ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ σχηματίζουν ὥχρους ἢ χρυσίζοντας κρυστάλλους.

Ὁ ἰνδικὸς ὀξειδωμένος σίδηρος συνίσταται ἀπὸ κρυστάλλους θαυερροῦς, διαλυτοὺς εἰς τὸ ὕδωρ μετὰ αἵματόχρουν χρῶμα.

Τὸ ἰνδικὸν ὀξύ ἐμπεριέχει κατὰ τὸν K. Ruff 7,61 νιτρογόνου,

Acidum nitroanilicum, nitropicricum. *Άνθρακονιτρον οξύ*

ή πικρά ύλη του Welther.

Εφευρέθη μὲν κατὰ τὸ 1788 ἀπὸ τὸν K. Hausman, ἐξήχθη δὲ ἔπειτα ἀπὸ τὸν K. Welther ἐκ τῆς μετὰξης διὰ νιτρικοῦ ὀξέος. Κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. 12 μέρη νιτρικοῦ ὀξέος 1,43 εἰδικῆς βαρύτητος ζέονται εἰς εὐρύχωρον σικύαν, προστιθεμένου 1 μέρους τετλασμένου ἰνδικοῦ, ἕως οὗ τὸ ὑγρὸν λάβῃ ἐρυθρόφαιον χρῶμα. Μετὰ τὴν ψύξιν σχηματίζονται σκληροὶ κρύσταλλοι, καθαριζόμενοι διὰ τῆς διαλύσεως εἰς ζέον ὕδωρ καὶ διὰ τῆς κρυσταλλώσεως. Οὗτοι διαλυόμενοι πάλιν εἰς ζέον ὕδωρ οὐδετεροῦνται δι' ἀνθρακικοῦ καλίου· τὸ δὲ ἐκ τοῦ οὐδετέρου ὑγροῦ κρυσταλλούμενον καὶ ἔπειτα εἰς ὀλίγον ὕδωρ διαλυόμενον ἄλλας ἀποσυντίθεται δι' ὑπερτεροῦντος νιτρικοῦ ἢ ἀλικοῦ ὀξέος, ἐνῶ τὸ ἀνθρακονιτρικὸν οξύ ἀποχωρίζεται· διὰ τῆς ψύξεως σχηματίζει κρυστάλλους στιλπνοὺς καὶ ὠχροὺς ἢ λεπίδας, ἐρυθρούσας τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην. εἶναι πικρὸν, εὐτηκτον, ἐξαχνίζεται εἰς στιλπνὰς ὠχρολεύκους βελόνας ἢ λεπίδας, εἶναι δυσδιάλυτον εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, εὐδιάλυτον δὲ εἰς ζέον, καθὼς καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα, καὶ δίδει εἰς τὰ ὑφάσματα στερεὸν ὠχρὸν χρῶμα.

Τὸ ἀνθρακονιτρογονικὸν οξύ ἐνοῦται μὲ τὰς βάσεις, τὰ δὲ ἐκ τοιαύτης ἐνώσεως παραγόμενα οὐδέτερα ἅλατα, Carbo- Azotates, εἶναι στιλπνὰ, ὠχρὰ, κρυσταλλώσιμα, πικρὰ, πυρσοκροτοῦντα διὰ τῆς πυρώσεως. Τὸ ἀνθρακονιτρογονικὸν οξύ δὲν ἐρυθροῖ τὰ ἅλατα τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου, αἱ δὲ ἐνώσεις τοῦ ὀξέος μὲ τὰ ὀξείδια τοῦ σιδήρου, τοῦ κοβάλτου καὶ τοῦ ὑδραργύρου εἶναι διαλυτὰ εἰς τὸ ὕδωρ. Ἐμπεριέχει κατὰ τὸν K. Liebig 16,67 νιτρογόνου.

Τινὲς χημικοὶ νομίζουν, ὅτι τὸ ἀνθρακονιτρογονικὸν οξύ εἶναι ἑνωσις τοῦ νιτρικοῦ ἢ τοῦ νιτρῶδους ὀξέος μὲ ὀργανικὴν τινα οὐσίαν· ἐπεὶ δὲ ταῦτα τὸ οξύ σχηματίζει μετὰ τοῦ καλίου δυσδιάλυτον ἄλλας, διὰ τοῦτο μεταχειρίζονται αὐτὸ εἰς τὴν ἀναλυτικὴν χημεῖαν πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν διὰ καλίου ἀλάτων.

Νιτραιμοβαφές οξύ.

'Acidum nitrohaematicum.

Ἐλαβε τὸ ὄνομα τοῦτο καθότι τὰ δι' αὐτοῦ παραγόμενα ἅλατα

ἔχουσιν αἰμοδαφές χρώμα. Τοῦτο τὸ ὄξυ σχηματίζεται, ἐὰν τὸ πικρονιτρικὸν ὄξυ συμμιχθῇ ἀκριβῶς μετὰ τοῦ θειικοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου μεθ' ὕδατος καὶ βαρείας ὑδρομιγοῦς. Διὰ τῆς ἀποξειδώσεως τοῦ πικρονιτρικοῦ ὀξέος ἀποχωρίζεται τὸ ὑποξειδίδιον τοῦ σιδήρου ὡς ὀξειδίδιον, τὸ δὲ νιτραιμοδαφές ὄξυ προάγει μετὰ τῆς βαρείας αἰμοδαφές ἄλλας, ἐξ οὗ διὰ διοχετεύσεως ἀνθρακικοῦ ἀερίου δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἡ βαρεῖα. Τὰ διὰ τοῦ ὀξέος προαγόμενα ἄλατα ἔχουσι βαθύφαιον, ἐνίοτε πράσινον χρώμα.

Kaichämuror kuaroür.

Lacmus. Tournesol.

Τὸ κυανοῦν χρώμα εὐρίσκεται εἰς σχῆμα τετράγωνον, καὶ κατασκευάζεται ἐκ διαφόρων εἰδῶν λειχήνων, ἴσως δὲ ἐκ *Roccella tinctoria* διὰ οὐρους, τιτάνου καὶ καλίου. Ἡ κυανὴ ὕλη τοῦ καγκαμίνου δὲν ἀπεχωρίσθη ἀκόμη εἰς καθαρὰν κατάστασιν, ἀλλὰ πάντοτε ἠνωμένη μετὰ τὰς ἑτερογενεῖς ἐκείνας οὐσίας, τὰς ὁποίας διαλύει τὸ ὕδωρ, ἢ τὸ κεκραμένον οἰνόπνευμα ἐκ τοῦ ἀγοραίου κυανοῦ τούτου χρώματος. Τὸ ψυχρὸν μᾶλλον δὲ τὸ ζεὸν ὕδωρ διαλύουν ἐκ τοῦ κυανοῦ καγκαμίνου τὴν μεγαλύτεραν ποσότητα τῆς βαφικῆς ὕλης, ὥστε μένουσιν μόνον τὰ γαιώδη μέρη. Τὸ κεκραμένον ὕδατῶδες ἔμβρεγμα εἶναι κυανοῦν, διὰ τοῦ διερχομένου φωτὸς ὀλίγον ἐρυθροῦται, δι' ὅλων τῶν ὀξέων γίνεται ἐρυθροῦν, λαμβάνει δὲ πάλιν τὸ κυανοῦν χρώμα διὰ τῆς προσθήκης ἀλκαλίων, χωρὶς νὰ μεταβάλλεται διὰ πλεονασμοῦ αὐτῶν εἰς πράσινον. Ἐὰν τὸ ἔμβρεγμα ἀνακινήθῃ μετὰ ἀέριον τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, ἐρυθροῦται κατ' ἀρχάς, ἀκολούθως λευκαίνεται, καθότι σχηματίζεται ἑνωσίς τις ἄχρους, ἥτις ἐπαναλαμβάνει τὸ κυανοῦν χρώμα διὰ τῶν ἀλκαλίων καὶ ἄνευ τῆς ἐπὶ ῥόης τοῦ ἀέρος.

Τὸ ὕδατῶδες ἔμβρεγμα, καθὼς καὶ ὁ δι' αὐτοῦ χρωματισμένος χάρτης, μεταχειρίζεται ὡς δοκιμαστήριον ἐπὶ τῶν ὀξέων, ὁ δὲ δι' ὀλίγου ποσοῦ ὀξικοῦ ὀξέος ἐρυθρωθεὶς κυανοῦς χάρτης τοῦ καγκαμίνου πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν ἀλκαλίων.

Kuanē bafikē ὕλη τῶν ἀνθέων.

Ἡ εἰς τὰ περισσότερα ἄνθη ἐμπεριεχομένη κυανὴ βαφικὴ ὕλη εἶναι

διαλυτή εἰς τὸ ζέον ὕδωρ, ἀλλὰ δὲν μεταχειρίζεται πρὸς βαφὴν ἐνεκα τῆς ταχείας διαφθορᾶς τῆς. Εἰς τὸ οἰνόπνευμα δὲν εἶναι τόσον διαλυτή καθὼς εἰς τὸ ζέον ὕδωρ. Ἄνθη τινὰ κυανὰ λευκαίνονται, ἐὰν περιβραχῶσι μὲ οἰνόπνευμα, χωρὶς αὐτὸ πολὺ νὰ βαφῇ· τὰ οὕτω λευκανθέντα ἄνθη ἐκτεθέντα εἰς τὸν ἀέρα, λαμβάνουσι πάλιν τὸ κυανοῦν χρῶμα. Αἱ κυαναὶ βαφαὶ τῶν διαφόρων ἀνθέων ἐρυθροῦνται διὰ τῶν ὀξέων, πρασινίζουν δὲ διὰ τῶν ἀλκαλίων.

Ἐκ τοῦ ὁποῦ τοῦ κυανοῦ λαχάνου δύναται τις, καθὼς τὸ κάμνουν πολλάκις οἱ θρυμματουργοί, νὰ προάγῃ τέσσαρα διαφόρως κεχρωματισμένα ὑγρά, δηλαδὴ κυανοῦν, ἐρυθροῦν, πράσινον καὶ λευκόν. Ἐὰν χύσωμεν τὸν ὁπὸν εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον κενὸν καὶ καθαρὸν, μένει ὁ ὁπὸς κυανοῦς, ἐὰν δὲ εἰς ἀγγεῖα πλυθέντα πρότερον μὲ ὀξύ τι, μὲ ἀλκάλιον, ἢ μὲ ἐγγλῶριον κάλιον, λαμβάνει ὁ ὁπὸς τὰ τρία προλεχθέντα χρώματα. Ἡ κυανὴ βαφικὴ ὕλη, ἥτις ἐμπεριέχεται εἰς τὴν ἐπίδερμίδα διαφόρων καρπῶν ἔχει ἀναλογίαν τινὰ μὲ τὴν τῶν κυανῶν ἀνθέων· π. χ. ἡ τῶν μελανῶν συκαμίνων, τῶν ἀκταίων, τῶν μελανῶν συκιῶν κτλ. διαλύεται δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα μᾶλλον, ἢ εἰς τὸ ὕδωρ· ἡ δὲ τῶν ἀκταίων βαφικὴ ὕλη κατακρημνίζεται μὲ βαθύ κυανοῦν χρῶμα διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου.

Προπαρασκευὴ τῶν πρὸς χρωματισμὸν ὑφασμάτων.

Αἱ διάφοροι χρωματίσιμοι ὕλοι εἴτε φυτικά, εἴτε ζωϊκά εἶναι, ὡς τὸ ἔριον, ἡ μετάξι, τὸ λινάριον, ἡ βύσσος ἐμπεριέχουν εἰς τὴν ἀκατέργαστον κατάστασιν των ἑτερογενεῖς οὐσίας ἀνθισταμένας εἰς τὴν μὲ τὰς βαφὰς ἔνωσιν των, ἐκ τῶν ὁποίων πρέπει ν' ἀποχωρισθῶσι πρὸ τοῦ χρωματισμοῦ. Ἡ ἀκατέργαστος μετάξι π. χ. ἐμπεριέχει ὠχρὰν καὶ κομμώδη οὐσίαν, ἥτις εἶναι ἡ αἰτία τῆς στερεότητός της, καὶ πρὸς ἀποχώρησιν τῆς ὕλης ταύτης πρέπει νὰ τεθῇ ἡ μετάξι εἰς θερμὸν ὅχι εἰς βράζον ὕδωρ, ἢ εἰς διάλυσιν σάπωνος. Ἐπειτα πρὸς ἀποχωρισμὸν τῆς ὠχρᾶς ὕλης πρέπει νὰ τεθῇ εἰς σάκκον λινὸν καὶ νὰ ζεσθῇ εἰς ὕδωρ ἐμπεριέχον εἰς 100 μέρη μετάξης μόνον 20 μέρη σάπωνος. Ἐνίοτε εἶναι ἀναγκαῖον νὰ λευκανθῇ ἡ μετάξι, τοῦτο δὲ γίνεται, ἐὰν αὐτὴ ὑγρανθῇσα ἐκτεθῇ εἰς τοὺς ἀτμοὺς τοῦ καίοντος θείου.

Ὡσαύτως τὸ ἀκατέργαστον ἔριον εἶναι περιβεβλημένον μὲ οὐσίαν τινὰ φοιὰν καὶ λιπώδη, ἥτις φυλάττει αὐτὸ ἀπὸ τὴν φθορὰν τοῦ σκόρου. Ἡ

λιπώδης αὕτη ὕλη σύγκειται κατὰ τὸν K. Vauquelin, ὡς οἱ σάπωνες, ἐκ καλίου, ἐξ ἐνώσεως τινὸς μὲ τίτανον, ἐξ ὀλίγης ἀνθρακικῆς, ὀξικῆς καὶ ἀλικῆς τιτάνου, καὶ ἐξ οὐσίας τινὸς ζωϊκῆς, ἐξ ἧς προέρχεται ἡ ἰδιαιτέρα ὁσμὴ τῆς. Διὰ νὰ καθαρισθῇ τὸ ἔριον ἀπὸ τὴν λιπώδη ὕλην ἐμβάπτεται εἰς θερμὸν ὕδωρ, μεμιγμένον μὲ $\frac{1}{4}$ σιδηρότοτος ἐναμμωνίου οὐροῦ, καὶ ἀποπλύνεται ἀκολούθως διὰ ζέοντος ὕδατος. Δύναται δὲ νὰ καθαρισθῇ καὶ διὰ πολλὰ λεπτῆς διαλύσεως τοῦ σάπωνος εἰς ὕδωρ θερμοκρασίας 60° R.

Καὶ τὰ ἐκ βύσσου καὶ λίνου ὑφάσματα ἐμπεριέχουν ἑτερογενεῖς οὐσίας δυγαμένας νὰ ἀποχωρισθῶσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διὰ ζέοντος ὕδατος, ἢ διὰ ζυμώσεως τῶν ἐπινοτισμένων καὶ ἐπισωρευμένων ὑφασμάτων, ἢ καὶ διὰ ζέσεως μὲ λεπτὴν διάλυσιν τοῦ καλίου. Διὰ τῆς ζυμώσεως μέγα μέρος τῆς κόλλας τῶν ὑφασμάτων διαλύεται ὑπὸ τοῦ διὰ τῆς ζυμώσεως σχηματιζομένου ὀξικοῦ ὀξέος, καὶ οὕτως εὐκολύνεται ἡ ἐπιόρη τοῦ καλίου εἰς τὰς ἵνας τῶν ὑφασμάτων. Εἰς τινὰς περιστάσεις πρέπει νὰ λευκαίνωνται τὰ ὑφάσματα, ἀποτελεῖται δὲ τοῦτο διὰ κεκραμένου θεϊκοῦ ὀξέος, ἢ διὰ χλωρίου κτλ.

Περὶ τῶν προστυμμάτων. Mordants.

ὑπὸ τὸ ὄνομα προστύμματα (Mordants) ἐννοοῦμεν ἐν γένει τὰς οὐσίας, αἵτινες ἔχουν τὸ χαρακτηριστικόν, ἐνούμεναι μὲ τὰς χρωματισθησομένας ὕλας, νὰ αὐξάνωσι τὴν πρὸς τὰ ὑφάσματα συγγένειαν τῶν βαφικῶν ὑλῶν. Ἄνευ προστυμμάτων βάφεται εὐκολώτερα. Ἡ μετάξι καὶ τὸ ἔριον παρὰ ἢ βύσσος καὶ τὸ λινάριον τὰ ἀξιολογώτερα προστύμματα, εἶναι ἡ στυπτηρία, ἡ ὀξικὴ ἀργίλλος, ὁ ἀλικὸς ὑποξειδωμένος κασσίτερος, τὸ ἄλλας τοῦ κασσιτέρου, αἱ κηκίδες, ἡ τρυξ, ἄλλατά τινα τοῦ χαλκοῦ, ἀλλοιοειδεῖς τινες βάσεις κτλ.

Ἡ μετάξι προστύφεται διὰ ψυχρᾶς διαλύσεως τῆς στυπτηρίας, τὸ δὲ ἔριον πρέπει νὰ ζέεται μὲ αὐτήν. Εἰς τὰς βαθυχρόους βαφὰς δύναται νὰ μεταχειρισθῇ καὶ ἡ ἐνσίδηρος στυπτηρία, εἰς δὲ τὰς πλέον ἀνοικτὰς ἢ ῥωμαϊκὴ στυπτηρία, ἥτις ἐμπεριέχει μόνις $\frac{1}{500}$ θεϊκοῦ σιδήρου· ἐπεὶ δὲ στυπτηρία ἐμπεριέχουσα περισσότερον σίδηρον ἀποκαθιστᾷ τὰς βαφὰς βαθυχρόους.

Αἱ βαφαί, ὅσαι ἔχουν τὴν μεγάλην συγγένειαν πρὸς τὰ ὑφάσματα,

ὥστε νὰ ἐνοῦνται μὲ αὐτὰ χωρὶς προστυμμάτων, καθὼς τὸ ἰνδικόν, λέγονται κύριαι βαφαὶ Couleurs substantives· ὅσαι δὲ δὲν δύνανται νὰ ἐνωθῶσιν, εἰμὴ διὰ τῆς βοηθείας αὐτῶν λέγονται νόθαι βαφαὶ Couleurs adjectives

Διάφοροι ἐργασίαι τῆς βαφικῆς.

Αἱ βαφαί, τὰς ὁποίας θέλει τις νὰ ἐνώσῃ μὲ τὰ ὑφάσματα, εἶναι ἢ διαλύσιμοι, ἢ ἀδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ. Αἱ διαλύσιμοι διαλύονται εἰς ζέον ὕδωρ, εἰς τὸ ὁποῖον ἔπειτα ἐμβάπτονται διὰ τινα χρόνον αἱ προπαρασκευασμένοι ὕλοι. Ἐὰν δὲ ἡ βαφή εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, πρέπει νὰ γένῃ διαλυτὴ διὰ βοηθητικοῦ τινος μέσου· ἔπειτα ἐμβάπτονται τὰ ὑφάσματα εἰς τὴν διάλυσιν καὶ ἐπομένως κατακρημνίζεται ἡ βαφικὴ ὕλη διὰ τρίτου σώματος, καὶ οὕτως ἐνοῦται μὲ τὰ ὑφάσματα.

Ὅλα τὰ ἐξ ἐρίου ὑφάσματα ἐμβάπτονται εἰς τὸ ὑγρὸν, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἔχῃ θερμοκρασίαν τοῦ ζέοντος ὕδατος· μετὰ δὲ τὴν βάψιν ἀποπλύνονται διὰ πολλοῦ ζέοντος ὕδατος πρὸς ἀποχώρησιν τῆς ἐπὶ τῶν ὑφασμάτων προσκεκολλημένης βαφικῆς ὕλης, μεχριστοῦ τὸ ὕδωρ δὲν βάφεται πλέον ὑπὸ τοῦ ὑφάσματος. Ἀκολούθως ξηραίνονται τὰ βαφέντα ὑφάσματα ἐντὸς θερμῶν οἰκημάτων ἢ διὰ τοῦ ἀτμοῦ.

Περὶ τοῦ ἐρυθροῦ χρωματισμοῦ.

Πρὸς ἐρυθρὸν χρωματισμὸν μεταχειρίζονται κατ' ἐξοχὴν τὸ ἐρυθρόδανον, τὸν ἀνθηρόκοκκον, τὸ τῆς Βρασιλείας ξύλον *Lignum Fernambuc*, καὶ τὰ ἄνθη τοῦ κνήκου (*Safflor*).

Ἐκ τοῦ ἐρυθροδάνου ἀπολαμβάνεται κατ' ἐξοχὴν τὸ ἐρυθροερυθρόδανον, καὶ τὸ τῆς Ἀδριανουπόλεως ἢ ἰνδικὸν ἐρυθροῦν, τὸ μὲν πρὸς χρωματισμὸν τοῦ ἐρίου, τὸ δὲ δεύτερον πρὸς βάψιν τῆς βύσσου. Διὰ νὰ βαφῶσιν τὰ ἐξ ἐρίου ὑφάσματα διὰ τοῦ ἐρυθροδάνου, ζέεται ὥρας τινὰς εἰς πρόστυμμα συγκείμενον ἐξ ὑδατώδους διαλύματος 10 λοθίων στυπτηρίας, καὶ 2 τρυγὸς δι' ἐκάστην λίτραν ὑφάσματος. Ἀκολούθως ἐτοιμάζεται δεύτερον ἀφέψημα, εἰς τὸ ὁποῖον ἀφοῦ θερμανθῇ μέχρι τῆς 50° R προστίθενται δι' ἐκάστην λίτραν ὑφασμάτων $\frac{1}{2}$ λίτρα ἐρυθροδάνου καὶ $\frac{1}{24}$

άλικοῦ κασσιτέρου κεκραμένου μεῖ ἰσοβαρὲς ὕδωρ. Τὸ ἐξυμμένον καὶ ἀσθενῶς ἀπεξηραμμένον ἔριον ἐμβάπτεται μίαν ὥραν εἰς τοῦτο τὸ καλῶς ἀνακινούμενον ἀφέψημα, τοῦ ὁποίου αὐξάνομεν τὴν θερμοκρασίαν μέχρι τῆς 75° μοίρας, καὶ τέλος μέχρι ζέσεως 3—4 λεπτά.

Ἡ βύσσος διὰ νὰ βαφῇ μεῖ ἐρυθροερυθρόδανον πρέπει νὰ στυφθῇ πρότερον διὰ κηκκίδων μετὰ τὴν βάψιν ἀποπλύνεται μεῖ λεπτὴν καὶ ζέουσιν διὰ λυσιν τοῦ σάπωνος. Ἡ βάψις τοῦ ἐρυθροῦ τῆς Ἀδριανουπόλεως ἐγίνε γνωστὴ περὶ τὰ τέλη τῆς παρελθούσης ἑκατονταετηρίδος εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ ἔπειτα εἰς τὴν Γερμανίαν, ὅπου ἤδη μεταχειρίζεται εἰς διαφόρους πόλεις μεῖ μεγάλην ἐπιτυχίαν· αἱ δὲ πρὸς αὐτὴν ἀναγκαῖαι πράξεις εἶναι τόσον σύνθετοι, ὥστε δὲν δύνανται ἐδῶ νὰ περιγραφῶσιν ἐντελῶς.

Ὅλαι αἱ διὰ τοῦ ἐρυθροδάνου ἀποτελούμεναι βαφαὶ εἶναι ἀνεξίτηλοι.

Χρωματισμὸς διὰ τοῦ ξύλου τῆς Βρασιλείας.

Διὰ τοῦ τῆς Βρασιλείας ξύλου προάγονται διάφοροι ἐρυθραὶ βαφαί, ὡς τὸ καλούμενον βρασίλειον ἐρυθροῦν, τὸ ροδόχρουν, τὸ πορφυρίζον, τὸ ἀμάραντον μετὰ τῶν ἀλλοιωσέων του.

Διὰ νὰ βαφῇ τὸ ἔριον, ζέεται 1 μέρος ξυμμένου βρασιλείου ξύλου μεῖ 20 μέρη ὕδατος $\frac{3}{4}$ τῆς ὥρας, ἔπειτα ἐμβάπτονται εἰς τὸ ἀφέψημα τοῦτο 6 μέρη ἐρίου καὶ ζέονται ὀλίγον καιρὸν. Πρὸς πορφυρίζοντα χρωματισμὸν τοῦ ἐρίου πρέπει νὰ προστεθῇ εἰς τὸ ἀφέψημα τοῦ τῆς Βρασιλείας ξύλου ὀλίγη στυπτηρία. Προστιθεμένου καλίου ἢ νάτρου γίνεται τὸ ἐρυθρὸν μᾶλλον ἰσῶδες. Ὅλαι αἱ διὰ τοῦ βρασιλείου ξύλου βαφαὶ εἶναι μὲν πολλὰ ὠραῖαι, ὅχι δὲ ἀνεξίτηλοι, διότι ἀλλοιοῦνται διὰ τοῦ ἀέρος καὶ διὰ τοῦ σάπωνος.

Χρωματισμὸς διὰ τοῦ ἀνθηροκόκκου.

Διὰ τοῦ ἀνθηροκόκκου **Kermes** προάγονται τὰ ἐξῆς χρώματα. Τὸ ὕγιον, πορφυροῦν, ἐρυθρὸν καθ' ὅλας τὰς ἀλλοιώσεις των, βυσινόχρουν καὶ ροδόχρουν κτλ.

Διὰ νὰ λάβουν τὰ ὑφάσματα τὸ ὕγιον χρῶμα, υποβάλλονται εἰς τὰς ἐξῆς πράξεις. Εἰς κασσιτερωμένον λέβητα βάλλονται 6 λίτραι κεκαθαυμένης τρυγὸς καὶ 1600—1800 λίτραι ὕδατος. Ἀφοῦ θερμανθῇ τὸ διά-

λυμα μέχρι τῆς 50°, προστίθεται $\frac{1}{2}$ λειοτριβηθέντων ἀνθηροκόκων καὶ ἀκολούθως 5 λίτραι διαλύματος ἀλικοῦ κασσιτέρου. Εἰς τὸ ἀφέψημα τοῦτο ἐμβάπτονται διὰ τινὰς ὥρας 100 λίτραι ὑφάσματος, μετὰ ταῦτα ἀποπλύνεται διὰ ποταμίου ὕδατος, τέλος ἐρυθροχρωματίζεται· ὁ ἐρυθροῦς χρωματισμὸς ἀποτελεῖται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Εἰς λέβητά τινα βράζεται σχεδὸν ἡ ἰδία μὲ τὴν ἀνωτέρω ποσότης ὕδατος μὲ 5 λίτρας ἀνθηροκόκων· μετὰ ζέσειν ἡμισείας ὥρας προστίθενται 6 λίτραι ἀλικοῦ κασσιτέρου διαλελυμένου. Εἰς τὴν διάλυσιν ταύτην ἐμβάπτεται $\frac{1}{2}$ ὥρας τὸ οὕτω κατασκευασθὲν ὕφασμα καὶ ἐκβαλλόμενον ἐκ νέου ἀερίζεται.

Διὰ νὰ λάβῃ τὸ ὕσγινον χρῶμα περισσοτέρην ζωηρότητα προστίθεται ὀλίγον ποσὸν κιτρίνου ξύλου ἢ κροκοῤῥίζης.

Ἐπειδὴ τὸ ἀφέψημα δὲν χάνει ὀλοτελῶς τὴν βαφικὴν ὕλην δύναται ἔτι νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς παραγωγὴν ἄλλων ἐρυθρῶν χρωμάτων, ὡς τοῦ βυσινόχρου, κρεατόχρου κτλ. Αἱ διὰ ἀνθηροκόκκου βαφαὶ εἶναι ἀνεξίτηλοι.

Χρωματισμὸς διὰ κνήκου.

Τὸ ροδόχρουν προάγεται διὰ τοῦ κνήκου. Τὰ διὰ συνεχοῦς ἀποπλύσεως ἀπὸ τὴν ὥχραν βαφικὴν ὕλην ἐλευθερωθέντα ἄνθη διαβρέχονται μὲ ἀνθρακικὸν νάτρον διαλελυμένον εἰς 8—10· μέρη ὕδατος. Μετὰ μίαν ὥραν τὸ ὑγρὸν διῦλίζεται διὰ πυκνοῦ ὑφάσματος, καὶ προστίθεται εἰς αὐτὸ τόσον μηδικὸν, ὀξικὸν ἢ τρυγικὸν ὀξύ, ὥστε νὰ ὑπερτερῇ ὀλίγον τὸ ὀξύ· ἀκολούθως ἐμβάπτονται τὰ ὑφάσματα εἰς τὸ ψυχρὸν ὑγρὸν, ἐξ οὗ μετ' ὀλίγον δέχονται τὸ διὰ τῶν ὀξέων κατακρημνιζόμενον ροδόχρουν.

Διὰ τοῦ κνήκου παράγονται διάφορα ἐρυθρὰ χρώματα τὸ Poncéau, Nacarat κτλ. ἔχοντα ἅπαντα ζωηρότατον χρῶμα καὶ τιμώμενα πάρα πολὺ· δὲν εἶναι ὅμως ἀνεξίτηλα καὶ χάνουν τὴν ὠραιότητά των μετ' ὀλίγον καιρὸν.

Ὠχρὸς χρωματισμὸς.

Αἱ πρὸς ὥχρον χρωματισμὸν συνηθέσταται οὐσίαι εἶναι τὸ ὥχρον ξύλον καὶ ὁ φλοιὸς τῆς ὥχρας δρυός. Πρὸς βάψιν τῆς μετὰξης διὰ τῆς *Reseda* ζέονται δύο μέρη αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ μὲ 30—40 μέρη ὕδατος

ὀλίγον καιρόν· εἰς τὸ ἀφέψημα διῦλιζόμενον ἐμβάπτεται $\frac{1}{4}$ ὥρας 1 μέρος μετάξης προσετυμμένης, αὐξανομένης τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἀφεψήματος ἀπὸ 30°—75°. ὥσαύτως δύναται νὰ βαφῇ καὶ τὸ προσετυμμένον ἔριον τὸ ὁποῖον ὅμως πρέπει νὰ μείνῃ περισσότερον καιρόν εἰς τὸ ὑγρὸν. Ἐὰν προσθεῶσιν εἰς τὸ ῥηθὲν ἀφέψημα ἀλκάλια, θεϊκὸς σίδηρος, ἀλικὸς κασσίτερος κτλ. ἀποτελοῦνται διάφορα εἶδη ὠχρῶν χρωμάτων. Τὰ διὰ τοῦ Reseda βαφόμενα εἶναι ἐν γένει ἀμετάβλητα.

Χρωματισμὸς διὰ τοῦ ὠχροῦ ξύλου.

Τὸ ὠχρόν ξύλον ἐμπεριέχει περισσότεραν ποσότητα βαφικῆς ὕλης παρὰ τὸ προῤῥηθὲν φυτὸν, ἀλλὰ τὰ δι' αὐτοῦ χρωματιζόμενα δὲν εἶναι τόσον ὠραῖα καὶ ἀνεξίτηλα· διὰ νὰ θάψωμεν δι' αὐτοῦ ζέεται 1 μέρος ξυσμάτων τοῦ ὠχροῦ ξύλου εἰς σάκκον ἐγκεκλεισμένον μὲ 5 μέρη ὕδατος καὶ προστίθενται ἀποκόμματα δερμάτων διὰ νὰ κατακρημνισθῇ ἡ εἰς αὐτὸ ἐμπεριεχομένη φαῖα σκυτοδεψικὴ ὕλη. Τὰ τοῦ δέρματος ἀποκόμματα ἢ 3 λόβια ἀπλῆς κόλλας τῶν ξυλουργῶν διαλελυμένης εἰς ζέον ὕδωρ δύνανται νὰ προσθεῶσιν δι' ἐκάστην λίτραν ὠχροῦ ξύλου.

Χρωματισμὸς διὰ τοῦ φλοιοῦ τῆς δρυός.

Τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἐκχυλίζει εὐκόλως τὴν ὠχρὰν βαφικὴν ὕλην ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς δρυός, τὸ δὲ ζέον ὕδωρ λάμβάνει φαῖον χρῶμα· ἔνεκα τούτου κατεργάζεται ὀλίγα λεπτά 1 μέρος τοῦ φλοιοῦ μὲ 15 μέρη ὕδατος εἰς θερμοκρασίαν 50—60° καὶ ἔπειτα ἐμβάπτονται εἰς τὸ διῦλιζόμενον ὑγρὸν 10 μέρη μαλλίνου ὑφάσματος ἐστυμμένου διὰ στυπτηρίας καὶ ἄλατος τοῦ κασσιτέρου. Τὸ ἀφέψημα τοῦ φλοιοῦ δύναται νὰ χρησιμεύσῃ, ἀφοῦ πρῶτον ἀποχωρισθῇ ἡ βαφικὴ σκυτοδεψικὴ ὕλη διὰ κόλλας ἢ κατὰ τὸν K. Dingler διὰ γάλακτος. Τὸ δρύωχρον εἶναι πολὺ ὠραῖον καὶ ἀμετάβλητον.

Ὄχρον διὰ κροκορρίζης.

Αἱ βαφαὶ τῆς κροκορρίζης, τῆς ὀρελλάνης, καὶ τοῦ κνήκου κτλ. εἶναι ἐν μέρει πολλὰ ζωηραί, ὅχι ὅμως καὶ ἀμετάβλητοι.

Καί τινες ανόργανοι ούσαι εἶναι ἐπιτήδεια πρὸς ὤχρᾰν βαφὴν τῶν ὑφασμάτων. Ὁ Κ. Braconot π. χ. μετεχειρίσθη τὸ διάλυμα τοῦ ὤχρου ἐνθείου ἀρσενικοῦ Auripigmentum εἰς ρευστὴν ἀμμωνίαν πρὸς χρωματισμὸν τοῦ ἐρίου καὶ τῆς μετὰξὺς μετὰ χρυσίζοντος χρώματος.

Τὰ ὑφάσματα ἐμβάπτονται εἰς τοῦτο τὸ ἄχρουν διάλυμα, κεκραμένον πρότερον μὲ πολλὸν ὕδωρ, καὶ διαβραχέντα ὁμοιομερῶς ἐκτίθενται εἰς τὸν ἀέρα. Ἡ ἀμμωνία ἀναθυμιᾶται κατ' ὀλίγον καὶ τὸ ἐπιμένον ὤχρᾰν ἀρσενικὸν ἐνοῦται μὲ τὰ ὑφάσματα. Τὸ ὥραϊον τοῦτο καὶ ἀνεξίτηλον χρῶμα μεταβάλλεται διὰ τοῦ σάπωνος καὶ διὰ τοῦτο δύναται νὰ μεταχειρισθῇ μόνον πρὸς βάψιν τῆς μετὰξὺς.

Πρὸς βάψιν τῶν ὑφασμάτων διὰ τοῦ χρωμικοῦ μολύβδου ἐμβάπτονται τὰ ὑφάσματα $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας εἰς κεκραμένην διάλυσιν τοῦ ὀξεικοῦ μολύβδου μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως ἐχούσης 50—60° θερμοκρασίαν. Ἀφοῦ ἀποπλυθῶσιν διὰ πολλοῦ ὕδατος, ἐμβάπτονται εἰς ζέον καὶ κεκραμένον διάλυμα τοῦ χρωμικοῦ καλίου, εἰς τὸ ὁποῖον λαμβάνουσιν μετὰ διάστημα 10 λεπτῶν ἀξιόλογον ὤχρᾰν χρῶμα.

Τὰ διὰ χρωμικοῦ μολύβδου κεχρωματισμένα ὑφάσματα δὲν μεταβάλλονται μὲν διὰ ψυχροῦ διαλύματος τοῦ σάπωνος, ἀλλὰ τὸ χρῶμά των διαφθείρεται παντελῶς διὰ τῶν ἀλκαλίων καὶ διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος.

Διὰ τινων μὴ ὀργανικῶν οὐσιῶν ἀποτελοῦνται ἐπίσης ὑποκίτρινα χρώματα ὡς τὸ κινικὸν Nankin κτλ. Τὰ ὑφάσματα τοῦ ἐρίου καὶ τοῦ λίνου διὰ νὰ λάβωσι τοῦτο τὸ χρῶμα, ἐμβρέχονται μετὰ ζέοντος ὕδατος καὶ ἐκτίθενται εἰς ἀρτισκεύαστον διάλυμα τοῦ θειικοῦ σιδήρου, ἔχον θερμοκρασίαν 30° R. μετὰ τινα λεπτὰ ἐκβάλλονται, καὶ ἀφοῦ ἐκθλιφθῶσι καλῶς, ἐμβάπτονται εἰς διάλυμα ἀγοραίου ἀνθρακικοῦ καλίου τῆς αὐτῆς θερμοκρασίας διὰ τῆς πράξεως ταύτης λαμβάνει τὸ μᾶλλον ὑφασμα ρυπαρὸν πράσινον χρῶμα, τὸ ὁποῖον μεταβάλλεται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος εἰς ὑποκίτρινον διὰ νὰ μὴν ἀλλοιωθῇ τὸ χρῶμα, ἐμβάπτεται τὸ καλῶς ἀποπλυμένον ἔριον διὰ τινας στιγμὰς εἰς δι' ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τοῦ σάπωνος χωρὶς νὰ ζέται εἰς αὐτό. Ἐκ τῶν ἐκτεθέντων ἐξάγεται, ὅτι τὸ κίτρινον χρῶμα τοῦτο προῆλθεν ἀπὸ τὴν ἑνωσιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου μετὰ τῶν ὑφασμάτων. Δι' ἐπανειλημμένων εἰσβαπτίσεων εἰς ἀμφοτέρω τὰ διαλύματα γίνονται τὰ ὑφάσματα ἀνοικτότερα ἢ βαθύτερα.

Τὸ κοινὸν κίτρινον Nankin δύναται νὰ προαχθῇ, ἐὰν τὰ ὑφάσματα ζέωνται μετὰ τοῦ λειοτριβημένου φλοιοῦ τῆς δρυός. Ἡ οὕτω χρωματισθεῖσα βαθυκίτρινη βύσσος λαμβάνει ἀνοικτὸν κινικὸν κίτρινον χρῶμα, ἐὰν

κατεργασθῇ μετὰ τὴν ἀπόπλυσιν μετὰ λεπτῆς καὶ θερμῆς διαλύσεως τοῦ σάπωνος. Πρὸς ἀπομίμησιν τοῦ χρώματος τοῦ κινικοῦ κιτρίνου τῆς ἀνατολικῆς Ἰνδίας, τὸ ὁποῖον κλίνει εἰς τὸ κοκκινίζον, δύναται νὰ προστεθῇ εἰς τὸ ἀφέψημα τοῦ φλοιοῦ τῆς δρυὸς ὀλίγη ποσότης ἐρυθροδάνου. Τέλος δύναται νὰ λάβῃ τὸ ἔριον ἀμετάβλητον κίτρινον χρῶμα, ἐὰν ζέται εἰς νιτρικὸν ὀξύ, συγκείμενον ἐξ 1 μέρους νιτρικοῦ ὀξέος καὶ 24 μερῶν ὕδατος ἢ εἰς διάλυσιν τῆς ὀξείας φωσφορικῆς τιτάνου.

Χρωματισμὸς κυανοῦς.

Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν μεταχειρίζονται κατ' ἐξοχὴν τὸ ἰνδικόν, τὸ καμπεχιαρόν ξύλον καὶ σπανιότερον τὸ κυανὸν τοῦ Βερολίνου δηλ. τὸν ὑδροκυανικὸν ὀξειδωμένον σίδηρον, ἀλλὰ μόνον τὸ ἰνδικὸν δύναται νὰ προάξῃ ἀνεξίτηλα κυανὰ χρώματα.

Χρωματισμὸς διὰ τοῦ ἰνδικοῦ.

Δύο μέθοδοι ὑπάρχουν, δι' ὧν δύναται νὰ προαχθῶσι διὰ τοῦ ἰνδικοῦ κυανὰ χρώματα. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ διάλυσις αὐτοῦ εἰς θεϊκὸν ὀξύ, διὰ τοῦ ὁποῖου ἀποτελεῖται τὸ λεγόμενον *σαζωνικὸν κυανοῦν* ἢ τὸ σύνθετον *Compositon*, ἡ δὲ δευτέρα συνίσταται εἰς τὴν ἀποξείδωσιν τοῦ ἰνδικοῦ.

Διὰ νὰ κατασκευασθῇ τὸ *σαζωνικὸν κυανοῦν* προσίθεται κατὰ μικρὸν μέρος τοῦ λειοτριβημένου ἰνδικοῦ εἰς 10—12 μέρη ἀκράτου ἀγγλικοῦ ἢ εἰς 5—6 μέρη καπνίζοντος θεϊκοῦ ὀξέος, αὐξανομένης τῆς θερμοκρασίας ἕως τὴν 60°. Τὸ διάλυμα φυλάττεται 24 ὥρας εἰς κεκλεισμένον ἀγγεῖον, καὶ ἀφοῦ ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὴν ὑποσάθμην, συμμιγνύεται μὲ μεγάλην ποσότητα ὕδατος· εἰς τοῦτο τὸ ὑγρὸν θερμαίνομενον, πρύτερον ἕως τὴν 60° ἐμβάπτεται τὸ ἐστυμμένον ἔριον, τὸ ὁποῖον λαμβάνει ἀνοικτο-κυανὸν χρῶμα. Μόνον τὸ ἔριον καὶ ἡ μετὰξιν δύναται νὰ βαφῶσι διὰ τοῦ *σαζωνικοῦ κυανοῦ*.

Κυανοῦν διὰ τοῦ ἀποξειδωμένου ἰνδικοῦ.

Ἐπειδὴ τὸ ἰνδικὸν εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, πρέπει νὰ γένῃ

διαλυτὸν διὰ τῆς ἀποξειδώσεως καὶ ἐνώσεως μὲ ἀλκαλοειδεῖς βάσεις. Τοιοῦτοτρόπως λαμβάνονται 1) τὸ ψυχρὸν βάμμα καὶ 2) τὸ θερμὸν. διάφοροι τρόποι ὑπάρχουν πρὸς παραγωγὴν τοῦ ψυχροῦ βάμματος, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπλούστατος εἶναι ὁ ἑφεξῆς. Εἰς 150 μέρη ὕδατος προστίθενται 1 μέρος λειοτριβηθέντος ἰνδικοῦ, 3 μέρη λείας ἐσθεσμένης τιτάνου καὶ 2 μέρη πρασίνου θειικοῦ σιδήρου ἀρτισκευάστου. Ἀφοῦ ἀνακινηθῇ τὸ μίγμα, κατεργάζεται τινὰς ὥρας εἰς σκεπασμένον ἀγγεῖον, τιθέμενον εἰς τόπον ἔχοντα θερμοκρασίαν 40°. ἀντὶ τῆς τιτάνου δύναται νὰ μεταχειρισθῇ καὶ τὸ ἀγοραῖον ἀνθρακικὸν κάλιον, μεμιγμένον μὲ ὀλίγον ποσὸν πιτύρων καὶ ἐρυθροδάνου, θερμαινομένου τοῦ μίγματος τούτου ἕως τὴν 75° R. Τοῦτο τὸ βάμμα λέγεται Κύρε.

Ἀφοῦ καταβυθισθῶσι τὰ ἀδιάλυτα μέρη ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ ἰνδικοῦ, ἐμβάπτονται τὰ ὑφάσματα εἰς τὸ ὑγρὸν· μετ' ὀλίγον ἐκβάλλονται καὶ ἐκτίθενται εἰς τὸν ἀέρα διὰ νὰ λάβωσι τὸ κυανοῦν χρῶμα· ἔπειτα ἐμβάπτονται καὶ ἐκτίθενται πάλιν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἡ πράξις αὕτη ἐπαναλαμβάνεται, ἕως οὗ τὰ ὑφάσματα φανῶσι βαθυκυανὰ. Τὸ ἄχρουν ἰνδικὸν διαλελυμένον διὰ ἀλκαλοειδῶν βάσεων ἐνοῦται μὲ τὰ ὑφάσματα καὶ λαμβάνει κυανοῦν χρῶμα διὰ τῆς ἀπορρόφησης τοῦ ὀξυγόνου ἐκ τοῦ ἀέρος. Τὸ μετὰ τοῦ ὑφάσματος ἐνούμενον ἰνδικὸν δὲν δύναται πλέον ν' ἀποχωρισθῇ δι' ἐκπλύσεως μὲ ὕδωρ, ἀλλὰ διαφθείρεται μόνον διὰ νιτρικοῦ ὀξέος.

Χρωματισμὸς διὰ διαλύματος τοῦ ἰνδικοῦ διὰ κιτρίνου ἀρσενικοῦ.
(*Auripigmentum.*)

Τὸ διάλυμα τοῦτο κατασκευάζεται, ἐὰν 175 μέρη ὕδατος ζέωνται μὲ 1 μέρος λειοτριβηθέντος ἰνδικοῦ, 1 ἐσθεσμένης τιτάνου καὶ 2 μέρη ἀγοραίου ἀνθρακικοῦ καλίου, προτιθεμένου 1 μέρος λειοτριβημένου κιτρίνου ἀρσενικοῦ. Εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν μεταδίδει τὸ ἰνδικὸν ὀξυγόνον ἐν μέρει εἰς τὸ θεῖον καὶ ἐν μέρει εἰς τὸ ἀρσενικόν, καὶ οὕτως ἀποξειδωθὲν ἐνοῦται μὲ τὰς ἀλκαλοειδεῖς βάσεις. Τοῦτο τὸ βάμμα μεταχειρίζεται κατ' ἐξοχὴν πρὸς τύπωσιν τῶν ἐκ βύσσου ὑφασμάτων.

Χρωματισμὸς διὰ θερμοῦ βάμματος τοῦ ἰνδικοῦ.

Ἡ ἀποξειδωσις τοῦ ἰνδικοῦ καὶ ἡ διάλυσις αὐτοῦ ἐκτελεῖται καὶ

κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. Εἰς σιδηροῦν λέβητα πλήρη ὕδατος καὶ διὰ πυρὸς συνεχῶς θερμαινόμενον προστίθενται 38 μέρη σόδας, 60 μέρη πιτύρων, 4 μέρη θείου, 10 μέρη λειοτετριμμένου ἐρυθροδάνου, 5 τιτάνου καὶ 10 ἰνδικοῦ. Τὸ ποσὸν τοῦ ἰνδικοῦ λειοτρίβεται καὶ ἀναμιγνύεται μὲ 4 μέρη πιτύρων καὶ σόδας, καὶ τὸ μίγμα τοῦτο ζέσται ἀκολουθῶς. Ὁ λέβης ἐπιπωμάτιζεται ὅσον ἔνεσι ἀκριβῶς μετὰ τινων μαλλίνων ὑφασμάτων, καὶ τὸ ἐνυπάρχον μίγμα θερμαίνεται μέχρι τῶν 40° R. Τοιοῦτοτρόπως εἰσάγεται ζύμωσις, δι' ἧς ἀφαιρεῖται ἐκ τοῦ ἰνδικοῦ τὸ θξυγόνον καὶ τὸ λευκὸν ἰνδικόν, ἐνούμενον μετὰ τιτάνου σχηματίζει κιτρινωπὸν βευστάν, τὸ ὁποῖον χρησιμεύει πρὸς θάψιν τῶν ὑφασμάτων. Ἐνίοτε τὸ εἰρημένον τοῦ ἰνδικοῦ διάλυμα ὑπόκειται εἰς ἰδιαιτέραν τινὰ ἀποσύνθεσιν ἀπολαμβάνον φαῖον χρῶμα καὶ ἀηδῆ ὀσμήν. Τοιοῦτοτρόπως διαφθειρόμενον τὸ θάμμα δύναται εἰς πολλὰς περιστάσεις νὰ ἀναδιορθωθῇ, ἐὰν ἡ ἀποσύνθεσις προέρχεται ἀπὸ πλέον ἢ ἥττον τοῦ δέοντος ποσὸν τιτάνου. Εἰς τὴν πρώτην περίστασιν γίνεται διόρθωσις διὰ προσθήκης τρυγὸς καὶ πιτύρων, εἰς τὴν δευτέραν διὰ τιτάνου δι' ὕδατος ἐσβεσμένης.

Περὶ τοῦ κυανοῦ χρωματισμοῦ διὰ Καμπεχιανοῦ ξύλου.

Ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ θάφεται διὰ τοῦ καμπεχιανοῦ ξύλου μόνον τὸ μαλλίον, σπανίως δὲ ἡ βύσσος. Πρὸς προαγωγὴν τούτου τοῦ κυανοῦ χρώματος ζέσται διὰ 6 μέρη μαλλίου, 1 μέρος καμπεχιανοῦ ξύλου μετὰ 15 ἕως 20 μερῶν ὕδατος. Εἰς τοῦτο τὸ ἀφέψημα, ἀφοῦ διῴλισθῇ, προστίθεται $\frac{1}{20}$ ὀξικοῦ χαλκοῦ· τὸ μίαν περίπου ὥραν εἰς τὸ ἀφέψημα ἀφεθὲν μαλλίον ἐκβάλλεται, ἀποπλύνεται καὶ ξηραίνεται. Ἀντὶ τοῦ ὀξικοῦ χαλκοῦ δύναται νὰ μεταχειρισθῇ θεϊκὸς χαλκὸς ἢ ἀνθρακικὴ πότασσα. Ἀλλὰ τὰ κατὰ τὸν ἐκτεθέντα τρόπον βεβαμμένα ὑφάσματα, δὲν εἶναι ἀνεξίτηλα καὶ ἐρυθροῦνται διὰ τῶν ὀξέων.

Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους κυανοχρωματίζονται καὶ τὰ μεταξωτὰ ὑφάσματα διὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἐμβάπτονται τὰ προετοιμασθέντα μεταξωτὰ ὑφάσματα εἰς συνήθη θερμοκρασίαν $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας εἰς διάλυσιν τοῦ θεϊκοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου· μετὰ ταῦτα ἀποπλύνονται ἐκ νέου καὶ ἐμβάπτονται εἰς διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον διάλυμα καὶ δι' ὀλίγου ποσοῦ θεϊκοῦ ἢ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος θξυνίζόμενον διάλυμα τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου. Ἄμα ἐμβαφῇ τὸ μετα-

ζωτὸν εἰς τὸ διάλυμα, κυανίζεται, καὶ ἐκβαλλόμενον, ἀποπλύνεται καὶ ἀποξηραίνεται. Τὰ οὕτω κεχρωματισμένα ὑφάσματα ἔχουσι ζωηρὸν κυανοῦν χρῶμα, ἀποχρωματίζονται δὲ διὰ τῶν ἀλκαλίων.

Περὶ πρασίνου χρωματισμοῦ.

Ἐπειδὴ, ὡς εἶδαμεν, δὲν εὐρίσκεται πρασίνη χρωματιστικὴ ὕλη, πρὸς προαγωγὴν τοιοῦτου χρώματος ἐπὶ τῶν ὑφασμάτων μεταχειρίζονται ἐνώσεις κιτρίνου καὶ κυανοῦ. Ἔνεκα τούτου βάφονται τὰ μάλλινα ὑφάσματα διὰ τοῦ Ἰνδικοῦ κυανῆ, καὶ ἀφοῦ προστυφῶσιν διὰ στυπτηρίας καὶ τρυγὸς ἐμβάπτονται εἰς ἀφεψήματα τῆς κιτρίνης δρυὸς καὶ ἐκ τῆς ἐνώσεως ἀμφοτέρων τῶν χρωμάτων ἀποτελεῖται τὸ πράσινον. Αἱ ἀλλοιώσεις τῶν πρασίνων χρωμάτων ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ ὑπερβάλλον ποσὸν τοῦ κιτρίνου καὶ τοῦ κυανοῦ.

Περὶ προαγωγῆς τῶν μελανῶν καὶ φαιῶν χρωμάτων.

Ἄπαντα τὰ μέλανα χρώματα, ἅτινα δύνανται νὰ ἐνωθῶσι μετὰ τῶν ὑφασμάτων, σύγκεινται ἐξ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου μετὰ τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος ἢ μετὰ τῆς θυρσοδεψικῆς ὕλης. Δύνανται δὲ νὰ ἀποτελεσθῶσιν ἐκ διαλυσίμων ἀλάτων τοῦ σιδήρου μετὰ στυπτικῶν οὐσιῶν, ὡς τῶν κηκίδων, καὶ τοῦ φλοιοῦ τῆς δρυὸς, τῶν λεπύρων τῶν καρύων κτλ.

Ἡ ἐνωσις αὕτη εἰς λεπτὴν καὶ σμικρὰν ποσότητα εἶναι φαιὰ, εἰς πλειοτέραν μελανή. Ἔνεκα τούτου ἐπιτεθεῖσα εἰς ὀλίγον ποσὸν ἐπὶ τῶν ὑφασμάτων βάφει αὐτὰ φαιὰ, εἰς δὲ πολλὴν ποσότητα μελανά. Διὰ νὰ βαφοῦν λ. χ. τὰ μάλλινα ὑφάσματα μελανὰ, ζέονται διὰ τινα καιρὸν μετὰ κηκιδίων καὶ καμπεχικανοῦ ξύλου, καὶ ἀκολούθως ἐμβάπτονται εἰς ζέουσαν διάλυσιν τοῦ ὀξικοῦ σιδήρου, εἰς ἣν ἀφελθέντα προσλαμβάνουσιν ἀξίολογον χρῶμα. Ἐὰν δὲ μεταχειρίζονται εἰς σμικρὰν ποσότητα, λαμβάνουσι τεφρόχρουν ἢ ὅμοιον τοιοῦτον χρῶμα.

Τὰ σύνθετα χρώματα εἶναι πολυειδῆ καὶ προάγονται, ἐὰν τὰ ὑφάσματα ἐνωθῶσιν μετὰ διαφόρων χρωμάτων· οὕτως ἀποτελεῖται τὸ πορφυροῦν, τὸ ὑσγίνον, τὸ ἰσθδες, τὸ ἀμαράνθινον ἐκ τοῦ κυανοῦ καὶ τοῦ ἐρυθροῦ, τὸ χρυσίζον ἐκ τοῦ ἐρυθροῦ καὶ τοῦ κιτρίνου, ἐκ τοῦ μέλανος καὶ ἐρυθροῦ ἀπολαμβάνονται ἀλλοιώσεις τῶν διαφόρων χρωμάτων.

Ζύμωσις ἢ μεταβολὴ τῶν ὀργανικῶν σωμάτων

μετὰ τὴν παῦσιν τῆς ζωϊκῆς δυνάμεως τῶν.

Ἄπασαι σχεδὸν αἱ ὀργανικαὶ οὐσίαι στερηθεῖσαι ἀπὸ τὴν ζωϊκὴν τῶν δυνάμιν, καὶ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ ὕδατος εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν ἐκτεθεῖσαι, ὑπόκεινται εἰς ἀποσύνθεσιν τινα, ἐξ ἧς παράγονται νέα ὄντα διὰ τῆς ἐνώσεως τῶν στοιχείων κατ' ἄλλας ἀναλογίας. Τοιαύτη λοιπὸν αὐτόματος ἀποσύνθεσις γινομένη ὄχι διὰ χημικῶν μέσων, ἀλλὰ διὰ μόνης τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν στοιχείων ἐνεργείας, ἢ τοιαύτη διαφθορὰ τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν ὀνομάζεται ζύμωσις.

Ἐὰν τὰ ἐκ τῆς ζυμώσεως ἀπολαμβάνονμενα σύγκεινται ἐξ οἶνοπνεύματος καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξέος, τότε ἡ ζύμωσις λέγεται οἶνοπνευματώδης ζύμωσις, ἢ οἶνοζύμωσις, ἐὰν δὲ προσλαμβάνουν ὀξεῖαν γεῦσιν ἕνεκα τοῦ σχηματιζομένου ὀξικοῦ ὀξέος, τότε λέγεται ὀξεῖα ζύμωσις, ἢ ὀξύζυμωσις καὶ τέλος ἐὰν αἱ ὀργανικαὶ ὕλαι σήπωνται, τότε λέγεται σαπρὰ ζύμωσις, ἢ σήψις.

Εἰς τοὺς τρεῖς τούτους βαθμοὺς τῆς ζυμώσεως δὲν ὑπόκεινται ἅπασαι αἱ ὀργανικαὶ οὐσίαι· διότι πολλαὶ ἄρχονται τῆς ἀποσυνθέσεώς των εἰς τὴν δευτέραν ἢ εἰς τὴν ὀξύζυμωσιν, αἱ δὲ πλεῖσται ὑπόκεινται μόνον εἰς τὰς μεταβολὰς τῆς τελευταίας ζυμώσεως.

Περὶ τῆς οἶνοπνευματώδους ζυμώσεως.

Ἀπὸ τὰς ὀργανικὰς οὐσίας, ὅσαι ἐμπεριέχουσι ζάχαριν μὲ ζωϊκὴν τινα ὕλην εἶναι ἐπιδεκτικαὶ τῆς πνευματώδους ζυμώσεως, προσέτι καὶ ὅσαι κυρίως μὲν δὲν ἐμπεριέχουν ζάχαριν, εἰς τὰς ὁποίας ὁμως σχηματίζεται ἔπειτα διὰ πράξεων τινῶν, ὡς διὰ τῆς ἐνεργείας τῆς φυτοκόλλας ἐπὶ τοῦ σιταμύλου. Οἱ διὰ τῆς ἐκπίεσεως τῶν γλυκέων καρπῶν ἀπολαμβάνονμενοι ὅποι ἐμπεριέχουν σχεδὸν πάντοτε ἐκτὸς τῆς ζαχαρέως καὶ ζύμην διαλελυμένην, καὶ διὰ τοῦτο ἄρχονται τῆς ζυμώσεως μετ' ὀλίγας ὥρας, καθὼς ὁ ὁπὸς τῶν μήλων, τῶν σταφυλῶν κτλ. Ἡ ζάχαρις ἀνευ ζύμης δὲν ὑπόκειται εἰς πνευματώδη ζύμωσιν, διότι ἡ διάλυσις τῆς καθαρᾶς ζαχαρέως εἰς ὕδωρ δὲν ζυμοῦται, ἀλλ' εὐρωτιᾷ καὶ ἀποσυντίθεται εἰς ἄχρμον θλένναν. Πρὸς πνευματώδη ζύμωσιν ἀναγκαῖα εἶναι.

α.) *βαθμός τις ὑγρότητος ἢ ὠρισμένη ποσότης ὕδατος.*

Διότι ἐὰν εἰς ὕδατῶδες διάλυμα τῆς ζαχάρως, σερapiίου σύστασιν ἔχον, προστεθῇ τὸ ἀνάλογον ποσὸν ζύμης, δὲν θέλει εἰσαχθῇ ἡ πνευματικὴ ζύμωσις, ἢ τοῦλάχιστον θέλει παύσει πάλιν ταχέως· λ. χ. ὁπὸς τῶν σταφυλῶν ἐξατμισθεὶς μέχρι συστάσεως σερapiίου δὲν ὑπόκειται εἰς πνευματικὴν ζύμωσιν. Ἐὰν δὲ οἱ γλυκεῖς ὁποὶ τῶν φυτῶν ἢ τὰ διαλύματα ζαχάρως ἔτι ζύμην περιέχοντα μιχθῶσι μὲ μεγάλην ποσότητα ὕδατος, τότε ὑπόκεινται εἰς ὀξείαν ζύμωσιν, ἀντὶ νὰ ὑπόκλινται εἰς τὴν οἶνοπνευματώδη ζύμωσιν.

β'. *Μετρία τις θερμοκρασία.*

Ἰγρὸν ζάχαριν ἐμπεριέχον, καὶ ἀναμιγνύμενον μὲ ζύμην δὲν ζυμοῦται μῆτε εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ ζέοντος ὕδατος, μῆτε εἰς τὸν τοῦ πεπηγότος, ἐξ ἐναντίας δὲ ἡ ζύμωσις παύει, ὅταν τὸ ὑγρὸν ψυχρανθῇ ἐξαίφνης μέχρι τοῦ 0° ἢ θέρμανθῇ ἕως τὴν 80° R. Ἡ θερμοκρασία τῶν 15° — 30° R. φαίνεται, ὅτι εἶναι ἡ πλέον ἐπιτήδεις διὰ τὴν πνευματώδη ζύμωσιν, ἥτις προχωρεῖ τόσον τακτικώτερα, ὅσον ὀλιγώτερον μεταβάλλεται ἡ θερμοκρασία τοῦ τόπου.

γ'. *Ἰκανὴ ποσότης ὑγροῦ.*

Ὀλίγοι σταλαγμοὶ ὑγροῦ τινος ἐπιδεκτικοῦ ζυμώσεως δὲν ζυμοῦνται, μεγάλαι ποσότητες ζυμοῦνται εὐκόλως καὶ ἐντελῶς, ἴσως ἐπειδὴ μεγαλύτεραι ποσότητες διατηροῦσι περισσότερον καιρὸν τὴν πρὸς τὴν ζύμωσιν ἐκλυομένην θερμότητα, ἥτις ἐξέρχεται ταχύτερα ἐκ μικρῶν ποσοτήτων. Ὡς παράδειγμα ταχείας τεχνητῆς ζυμώσεως φέρομεν τὸ ἐξῆς· 5 μέρη ζαχάρως διαλύονται εἰς 50 μέρη ὕδατος, καὶ μετὰ ταῦτα προσθέτομεν 1 μέρος ζύμης ἢ ἀποπλυμένου ζωμοῦ τοῦ ζύθου· τὸ μίγμα ἐκτίθεται εἰς θερμοκρασίαν 22° R, μετ' ὀλίγον ἄρχεται τὸ ὑγρὸν νὰ ζυμοῦται ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ ἀερίου, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ συναχθῇ εἰς ὑελίνους σίφωνας κυρτοὺς μὲ ὕδωρ πεπληρωμένους. Ὡσαύτως ζυμοῦται ταχέως ὁ εἰς τὸν ἀέρα ἐκπιεσθεὶς ὁπὸς τῶν σταφυλῶν. Ἐὰν ὅμως αἱ ὠριμοὶ σταφυλαὶ τεθῶσιν ἐπὶ ὑδραργύρου εἰς κώδωνα πεπληρωμένον ὑδρογόνου, καὶ

ἔπειτα ἐκπιεσθῶσι, τότε ὁ ὅπως δύναται νὰ φυλαχθῇ 25 ἡμέρας, χωρὶς νὰ δεῖξη σημεῖον ζυμώσεως. Ἐάν δὲ μόνον ὀλίγαι φουσκαλίδες ἀέρος ἢ ὀξυγόνου εἰσέλθωσιν εἰς τὸν κώδωνα, ἀπορρόφωνται αὐτὰ ἐν μέρει, καὶ ἡ ζύμωσις ἄρχεται εὐθύς. Ὁ ὅπως τῶν σταφυλῶν καὶ εἰς τὴν ἀπουσίαν τοῦ ἀέρος ἄρχεται νὰ ζυμοῦται, ἐάν τεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῆς στήλης τοῦ Volta διὰ τοῦ ἐπὶ τοῦ θετικοῦ πόλου ἐκλυομένου ὀξυγόνου. Κατὰ τὰς παρατηρήσεις τοῦ K. Doebereiner, ὁ ὑπὲρ τὸν ὑδράργυρον ὅπως δύναται νὰ γένῃ ἐπιδεκτικὸς ζυμώσεως δι' ὀλίγου ἀνθρακικοῦ αἰρίου. Τὸ ὀξυγόνον λοιπὸν ἢ ὁ ἀήρ μόνον φαίνεται, ὅτι προάγει τὴν ζύμωσιν, καθότι σχηματίζεται δι' αὐτοῦ ὀλίγον ποσὸν ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ μικρὰ μόνον ποσότης τοῦ ἀέρος εἶναι ἱκανὴ πρὸς ζύμωσιν.

Τὰ ἀκόλουθα φαινόμενα παρατηροῦνται κατὰ τὴν πνευματώδη ζύμωσιν. Ἀφοῦ ὁ διϋλισθεὶς ὁπὸς τῶν μῆλων, τῶν σταφυλῶν κτλ. ἐκτεθῇ εἰς θερμοκρασίαν 22°, ἐκλύονται μετ' ὀλίγας ὥρας αἰερίά τινα, καὶ τὰ καθαρὰ ὑγρὰ θολοῦνται κατ' ὀλίγον, καταβυθίζομένης μεγάλης ποσότητος τῆς διαλελυμένης ζύμης εἰς στερεὰν κατάστασιν. Αἱ πομφόλυγες τῶν αἰρίων ἐκλύονται κατ' ἐξοχὴν ἐκ τῆς καταβυθίζομένης ζύμης, αἵτινες ἀναβιβάζουσιν αὐτὴν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, σχηματίζουσαι ἐπ' αὐτῆς λεπίδα τινα, ἥτις διαπερᾶται συχνάκις διὰ τοῦ ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ αἰρίου, καταβυθίζομένης πάλιν εἰς τὸν πυθμένα. Διὰ τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβυθίσεως τῆς ζύμης γίνεται ταραχὴ ὅδης τις κινήσεις εἰς τὴν μάζαν καὶ ἡ θερμοκρασία αὐξάνει βαθμούς τινας· τὰ φαινόμενα ταῦτα διαρκοῦν ἀναλόγως τοῦ ποσοῦ τῆς μάζας ἡμέρας τινάς, καὶ καταπαύουν ἔπειτα κατὰ μικρόν. Ὅταν δὲν ἐκλύωνται πλέον αἰερία καὶ τὸ ὑγρὸν φαίνεται ἡσυχον, ἡ λεπίς συγκειμένη ἐκ ζύμης καὶ βλέννης ῥηγνύεται, κατακρημνίζεται εἰς τὸν πυθμένα, καὶ τὸ ὑγρὸν φαίνεται ἐντελῶς καθαρόν· τότε λοιπὸν χάνει τὴν γλυκεῖαν γεῦσίν του, καὶ λαμβάνει ἀντ' αὐτῆς ἰδιαιτέραν ὀσμὴν καὶ γεῦσιν, ἐπεὶδὴ σχηματίζεται ἐκ τῆς μεταβληθείσης ζαχάρους οἶνόπνευμα. Τὰ ζυμούμενα ὑγρὰ ἔχουν μεθυστικὴν δύναμιν καὶ λαμβάνουν τὸ ὄνομα τῶν ἐκ τῶν εἰς ζύμωσιν ὑποβληθέντων ὀπῶν. Αἱ διὰ τῆς πνευματώδους ζυμώσεως σχηματιζόμεναι ὕλαι εἶναι ἀνθρακικὸν αἰερίον καὶ οἶνόπνευμα, τὰ ὅποια διαλυόμενα εἰς ὕδωρ, ἀποτελοῦσι τὸν οἶνον, τὸν μηλίτην οἶνον, τὸν ζῦθον κτλ.

Οἱ γλυκεῖς καρποὶ ἐκλύουν διὰ τῆς ζυμώσεως ἀνθρακικὸν αἰερίον εἰς καθαρὰν κατάστασιν, τὰ δὲ σιτηρὰ σχηματίζουν καὶ ὀλίγον ὑδρογόνον. Ἡ ζύμη καταβυθίζομένη ἐκ τοῦ καθαροῦ ἐμβρέγματος τῆς βύνης διὰ τῆς

ζυμώσεως σχηματίζεται διὰ μεταβολῆς τινος εἰς φυτοκόλλαν. Ἡ ζύμη ἀφοῦ ἀποπλυθῇ μὲ ψυχρὸν ὕδωρ, συνίσταται κατὰ τὰς μικροσκοπικὰς ἐξετάσεις ἀπὸ πλῆθος σμικροτάτων σφαιριδίων ἀδιαλύτων εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Κατὰ τὸν K. Doehereiner 100 κόκκοι κρυσταλλωμένης ζαχάρως, διαλελυμένης εἰς ὕδωρ, δίδουν 51,4 κόκκους λειψύδρου οἰνοπνεύματος καὶ 48,6 κόκκους, ἢ 96 σχεδὸν κυβικοὺς δακτύλους ἀνθρακικοῦ ἀερίου. Διὰ-φορα εἶναι τὰ μέσα τὰ δυνάμενα νὰ ἀφαιρέσουν ἀπὸ τὴν ζύμην τὴν δύναμιν τοῦ νὰ προάγῃ πνευματώδη ζύμωσιν. Ἀποπλυνομένη μὲ οἰνόπνευμα χάνει τὴν δύναμιν μὴ μεταδιδομένην εἰς τὸ ἀποχυθὲν οἰνόπνευμα, καὶ διὰ τοῦτο παύει ταχέως ἡ ζύμωσις εἰς πολὺ πηκτὸν διάλυμα τῆς ζαχάρως, ἐπειδὴ τὸ σχηματιζόμενον οἰνόπνευμα ἐνεργεῖ εἰς τὴν ζύμην καὶ ἀφαιρεῖ ἀπ' αὐτὴν τὴν ῥηθείσαν δύναμιν. Ὁμοίως ἀφαιρεῖται ἡ ἐνέργεια τῆς ζύμης, ἐὰν θερμανθῇ μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ ζέοντος ὕδατος. Τινὰ ὀξέα, ἀλκάλια, ἄλατα, ὀξειδωμένος ὑδράργυρος κτλ. ἀνθίστανται εἰς τὴν ζύμωσιν. Ἐὰν λοιπὸν θέλωμεν νὰ ἐμποδίσωμεν τὴν ζύμωσιν τοῦ γλεύκου δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν εἰς αὐτὸ θειῶδες ὀξύ, ἢ θειώδη τίτανον. Καὶ ὁ σπόρος τοῦ σινάπεως κατ' ἐξοχὴν δὲ τὸ αἰθέριον ἔλαιον ἐμποδίζουσι τὴν πνευματώδη ζύμωσιν. Τὸ θειῶδες ὀξύ ἐνεργεῖ, ἀπορρόφῳ τὸ ὀξυγόνον τοῦ ἀέρος, τὰ δὲ ἄλλα δυνατὰ ὀξέα καὶ τὰ ἀλκάλια φαίνεται ὅτι διαφθείρουσι τὴν ζύμην.

Θεωρία τῆς πνευματώδους ζυμώσεως.

Ὅχι μόνον ἡ ζύμη, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι οὐσίαι ἐμπεριέχουσιν νιτρογόνον, ὡς τὰ νεαρά κρέατα βοῶν, ἡ ὕλη τοῦ τυροῦ, τὸ λεύκωμα, ἡ πηκτὴ κτλ. ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ σχηματίζωσιν ὀλίγον τι οἰνόπνευμα ἐκ τῆς ζαχάρως, ἀναμιχθέντα καὶ ἐκτεθέντα εἰς θερμότητα 25 — 30°. Ἡ ζύμη ὅμως εἶναι προτιμητέα ὅλων τῶν προειρημένων οὐσιῶν. Αἱ οὐσίαι, αἱ μὴ περιέχουσιν νιτρογόνον δὲν δύνανται νὰ προάξωσιν οἰνοπνευματώδη ζύμωσιν. Κατὰ τὸν K. Thenard ἡ πνευματώδης ζύμωσις προέρχεται, καθότι ἀφαιρεῖ ὁ ἀνθραξ ὑδρογόνον ἐκ τῆς ζαχάρως καὶ οὕτως ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἀναλογίας τῶν στοιχείων σχηματίζει ἀνθρακικὸν ἀέριον καὶ ὕδωρ.

Τὰ στοιχεῖα λοιπὸν τῆς ζαχάρως μεταβάλλονται κατὰ τὴν ἀναλογίαν των· ἐὰν δὲ ἐνεργοῦν πρὸς ἄλληλα καὶ ἐὰν ἀφαιρεθῇ ἡ ἀναμεταξύ των

στοιχείων ισορροπία, σχηματίζεται άνθρακικόν όξυ και οινόπνευμα, ενώ ή ζύμη άποσυντίθεται εις λευκήν τινα ουσίαν και εις εκχυλισματικήν ύλην. Κατά τόν K. Doebereiner και τόν K. Gay-Lussac άποσυντίθεται ή ζάχαρις έντελώς διά τής ζυμώσεως εις 1 άτομον άνθρακικού όξέος συγκειμένου έξ 1 ατόμου άνθρακος και εκ 2 όξυγόνου και εις 1 άτομον οινόπνεύματος (συγκειμένου έξ 1 όξυγόνου, 1 άνθρακικού και 3 ύδρογόνου). ή αναλογία αύτη δέν συμφωνεί άκριβώς με τά στοιχεΐα τής ζαχάρεως. Ο K. Schweiger εΐναι τής γνώμης, ότι ή ζύμωσις εΐναι άποτέλεσμα του έκλυομένου γαλθανικού ήλεκτρισμού, ή ζύμη δηλαδή σχηματίζει μετά τής ζαχάρεως και με τó ύδωρ πολλάς ήλεκτρικάς δυνάδας και διά τής ζυμώσεως προάγεται άρνητικόν άνθρακικόν όξυ και θετικόν οινόπνευμα. Τήν γνώμην ταύτην παρεδέχθησαν και άλλοι χημικοί, μάλιστα ό K. Koelle, όστις τήν μεταξύ τής ζαχάρεως και τής ζύμης έκλυομένην ήλεκτρικήν έσύναξεν δι' ιδιαιτέρας γαλθανικής συσκευής. Τά φαινόμενα όμως τής πνευματικής ζυμώσεως εΐναι άκόμη αίνιγματώδη, ώστε άπαιτούνται πολλai άκόμη δοκιμασίαι διά να άποδειχθοϋν άκριβώς.

Περί τών διά τής ζυμώσεως προαγομένων ποτών.

Μετά τó τέλος τής πνευματικής ζυμώσεως παρατηρείται, ότι ή μὲν ζύμη και ή ζάχαρις, αναγκαΐαι προς σχηματισμόν του οινόπνεύματος αφανίζονται έν μέρει, αι δὲ άλλαι ουσίαι, αι έμπεριεχόμεναι πρότερον εις τó υγρόν, καθώς ή ζάχαρις τής μάννας, τά άλατα, ή εκχυλισματική ύλη κτλ. δέν λαμβάνουσιν οϋδεμίαν μεταβολήν διά τής ζυμώσεως· ως εκ τών οϋσιών τούτων προέρχεται ή διαφορά τών γνωστών ζυμωμένων ποτών.

Τά πλέον γνωστά τών διά τής ζυμώσεως προαγομένων υγρών εΐναι, ό οΐνος, ό μηλίτης οΐνος, τó οινόμελι, ό ζύθος κτλ.

Περί του οΐνου.

Έν γένει οΐνον ονομάζομεν τόν έξ ώρίμων και γλυκέων καρπών έκπιεσθέντα όπόν, όστις διά τής πνευματικής ζυμώσεως μετεβλήθη και έλαβε μεθυστικήν τινα δύναμιν, άλλ' ιδίως έννοοϋμεν τόν ζυμωμένον όπόν τών σταφυλών. Προς κατασκευήν του οΐνου τίθενται αι ώριμοι σταφυλαι εις

τετράγωνον κιβώτιον, πανταχόθεν τετρυπημένον· εἰς τινὰ μέρη χωρίζονται πρότερον οἱ μίσχοι. Ἀφοῦ τὸ κιβώτιον τοῦτο πλήρες σταφυλῶν τεθῇ εἰς τὸ στόμα μεγάλου πίθου, αἱ σταφυλαὶ πατῶνται ἀπὸ ἀνθρώπων ἐνδεδυμένον ξύλινα ὑποδήματα. Ὁ οὕτως ἀποθλιβόμενος ὁπὸς βάλλεται εἰς μεγάλον ξύλινον ἢ λίθινον πίθον, καὶ ἀφίεται εἰς ὑπόγειον θερμοκρασίας 10 — 15° πρὸς πνευματικὴν ζύμωσιν. Ἡ ἐργασία αὕτη εἶναι ἀρκετὰ σπουδαία διὰ τὴν οἰνοκατασκευὴν, διότι ἐξ αὐτῆς καλῶς ἢ κακῶς πρακτομένης ἐξαρτᾶται ἡ ποιότης τοῦ οἴνου. Μετὰ τινὰ καιρὸν ἄρχεται ἡ ζύμωσις, ἡ μάζα θερμαίνεται ὀλίγον, τὸ ἀνθρακικὸν ἀέριον ἐκλύεται μὲ κράτον τόσον συχνά, ὥστε ἡ εἰς τὰ ὑπόγεια εἰσόδος ἀποκαθίσταται ἐπικίνδυνος εἰς αὐτὸν τὸν καιρὸν, καὶ ἅπαντα τὰ στερεὰ μόρια αὐτοῦ ὑψόνονται εἰς σχῆμα ἡμισφαιρικῆς λεπίδος.

Ἐὰν ἡ ζύμωσις παύσῃ, δύναται πάλιν νὰ εἰσχυθῇ ἀνακινουμένης τῆς μάζης διὰ ῥάβδου· μετὰ δὲ τὴν ἐντελῇ παύσειν μεταγγίζεται τὸ ὑγρὸν εἰς ξυλίνους κάδους καὶ τὰ ἐπιμέμοντα στέμφυλα ἐκθλίβονται. Ὁ οἶνος ζυμούμενος ἔτι μικρὸν εἰς τοὺς κάδους καθίζει τὴν τρύγα, συγκειμένην κατ' ἐξοχὴν ἐκ τρυγός, βαφικῆς ὕλης, ζύμης καὶ ὀξειδωμένης ἐκχυλισματικῆς ὕλης. Τέλος ὁ ἀπὸ τὴν ζύμην μετὰ προσοχῆς μεταγγισθεὶς οἶνος καθαρίζεται διὰ διαλύματος ἰχθυοκόλλας δι' οἴνου ἢ διὰ λευκώματος, καὶ οὕτω μεταγγίζεται εἰς κάδους οἵτινες ἐντελῶς ὑπ' αὐτοῦ πληροῦνται. Πρὸς διατήρησιν τῶν οἴνων εἶναι ἀναγκαῖον νὰ καπνίζωνται πρότερον οἱ κάδοι διὰ θείου, διότι τὸ διὰ τῆς καύσεως σχηματιζόμενον θειῶδες ὀξύ ἐμποδίζει τὴν ὀξειάν ζύμωσιν τοῦ οἴνου. Εἰς τινὰ μέρη συνειθίζουν νὰ καπνίζουν τοὺς κενοὺς κάδους διὰ κηροῦ, λιθάνου, ἢ διὰ πίστες, καὶ οἱ εἰς τοιοῦτους κάδους φυλαττόμενοι οἶνοι ὀνομάζονται *Vina piccata* καπνιστοὶ οἶνοι.

Οἱ μέλινες οἶνοι γίνονται ἐκ τῶν μελανῶν, οἱ δὲ ξανθοὶ ὅχι μόνον ἐκ τῶν λευκῶν σταφυλῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν μελανῶν. Ὁ οἶνος λαμβάνει τὸ χρῶμα τῆς ὑπὸ τὴν λεπίδα τῶν σταφυλῶν ἐνυπαρχούσης βαφικῆς ὕλης. Ξανθὸς οἶνος δύναται νὰ κατασκευασθῇ καὶ ἐκ τῶν μελανῶν σταφυλῶν, ἐὰν ὁ ὁπὸς ἐκθλίβεται ἀμέσως ἐκ τῶν καταπατηθεῖσων σταφυλῶν, καὶ ἔπειτα ὑποβληθῇ εἰς ζύμωσιν χωρὶς νὰ προστεθῶσιν τὰ λέπυρα.

Ἐὰν δὲ τὸ γλεύκος ζυμοῦται, προσθεμένων τῶν στεμφύλων τῶν μελανῶν σταφυλῶν, τότε ὁ ὁπὸς δέχεται τὴν βαφικὴν ὕλην πῆς λεπίδος, καὶ μάλιστα ἀφοῦ ἡ ζύμωσις προχωρήσῃ βαθμὸν τινα, ἀφοῦ δηλαδή σχηματισθῇ ἱκανὴ ποσότης οἰνοπνεύματος· ὁ οἶνος γίνεταί τόσον μελανώτερος, ὅσον περισσότερο καιρὸν τὰ στέμφυλα κατεργάζονται ἐν αὐτῷ. Οἱ ξανθοὶ καὶ εἰ

μέλανες οἶνοι εἰς τοὺς κάδους τιθέμενοι ὑπόκεινται ἀκόμη εἰς βραδείαν τινα ζύμωσιν. Ἐπειδὴ δὲ σχηματίζεται δι' αὐτῆς μεγαλητέρα ἔτι ποσότης οἰνοπνεύματος, βελτιώνονται οἱ οἶνοι καὶ καταβυθίζουσιν ἀκόμη εἰς τὰς πλευρὰς τῶν κάδων τρύγα κοκκίνην ἢ λευκὴν. Οἶνοί τινες βάλλονται εἰς λαγήνους πρὶν καταπαύσῃ ἡ ζύμωσις, αἱ λάγνηοι κλείονται ἔπειτα ἀκριβῶς, διὰ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ ἐξόδος τοῦ διὰ τῆς προχωρούσης ζυμώσεως ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς τὸν οἶνον· κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον κατασκευάζονται οἱ βράζοντες οἶνοι π. χ. ὁ οἶνος τῆς Champagne καὶ ἄλλα εἶδη οἶνων· τελεσθείσης τῆς ζυμώσεως τῶν μεταγγιζόντων εἰς λαγήνους, ἐν οἷς βελτιοῦται διὰ τῆς πολυκαιρίας. Αἱ λάγνηοι πρέπει νὰ κηῖνται πλαγίως διὰ νὰ ἐγγίξῃ ὁ οἶνος τὸν φελλὸν, ἄλλως δὲ ξηραίνεται οὗτος καὶ δὲν κλείει πλέον τόσον καλῶς τὴν λάγνηον.

Διὰ τῆς πολυκαιρίας ὁ οἶνος λαμβάνει ἰδιαιτέραν ὁσμὴν, ἄνθος Bouquet λεγομένην· ἡ ποιότης τοῦ οἶνου ἐξαπρᾶται πολλὰκις ἀπ' αὐτὴν καὶ ὅχι τόσον ἀπὸ τὴν ποσότητα τοῦ οἰνοπνεύματος.

Τὸ εἰς τὸν οἶνον ἐμπεριεχόμενον ἄνθος εἶναι ἰδιαιτέρον εἶδος αἰθέρος συνστάμενον ἐκ τοῦ οἰοανθικοῦ ὀξέος Acidum oenanthicum καὶ αἰθέρος. Ἐὰν τὸ μετὰ τὴν ζύμωσιν τοῦ γλεύκους εἰς τὸν πυθμένα ἐπιμένον ὑπόλειμμα ἀποσταχθῇ, ἐξάγεται γαλακτώδες ὕδωρ, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐπιπλέει ἰδιαιτέρον τι ἔλαιον. Ἐὰν τοῦτο τὸ ἐλαιοῦχον ρευστὸν ζεσθῇ χρόνον τινα μετὰ καυστικοῦ καλίου καὶ ὑπερκορεσθῇ ἀκολούθως διὰ ὑδροχλωρικοῦ ἢ θειικοῦ ὀξέος ἀποχωρίζεται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ρευστοῦ, τὸ οἰοανθικὸν ὀξύ εἰς εἶδος ἐλαίου, καὶ διαλυόμενον ὑπὸ τῶν ἀλκαλίων, ἀποτελεῖ τὰ οἰοανθικὰ ἅλατα. Ἄν τοῦτο τὸ ὀξύ εὐρίσκηται εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν εἰς τὰς σταφυλὰς εἶναι ἄγνωστον, μόνον τοῦτο φαίνεται, ὅτι εἶναι προϊόν τῆς ζυμώσεως.

Καὶ ὁ εἰς ξύλινα ἀγγεῖα φυλαττόμενος οἶνος βελτιοῦται κατ' ὀλίγον ἐξερχομένων τῶν ὕδατωδων μερῶν του διὰ τῶν τοῦ ξύλου πόρων. Κατὰ τὰς παρατηρήσεις τοῦ K. Sommering ἐξατμίζεται τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ οἶνου ταχύτερον διὰ βοσίων κύστεων. Παράδειγμα τούτου εἶναι τὸ ἐξῆς, εἰς ὑέλινον κύλινδρον ἀρκετοῦ μήκους καὶ καλῶς ἐπιπωματισθέντα τίθενται οἶνοι καὶ φυλάττονται εἰς θερμὸν τόπον τινὰς μῆνας. Ἡ κύστις δέχεται τοὺς ὑδατώδους ἀτμοὺς ἐκ τοῦ οἴνου, οἱ δὲ τοῦ οἰνοπνεύματος ἀτμοὶ δὲν δύνανται νὰ διαπερῶσιν τὴν κύστιν· ὁ τοιοῦτος λοιπὸν οἶνος δύναται μ' αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς διάστημα ὀλίγων μηνῶν γ' ἀποβάλλῃ τὸ ὕδωρ,

καὶ νὰ βελτιωθῇ περισσότερον παρὰ ὁ εἰς κάδους πεφυλαγμένος μετὰ παρέλευσιν χρόνων.

Εὰν ὁ οἶνος δεχθῇ ἀπλῆ γεῦσιν ἐκ τῶν ξυλίνων ἀγγείων, πρὸς ἀποβολὴν ταύτης πρέπει νὰ ταραχθῇ μ' ὀλίγον ἀμυγδαλίνον ἔλαιον, τὸ ὁποῖον ἀπορροφᾷ τὴν δυσώδη ὕλην.

Κατὰ τὰς ἀναλύσεις τοῦ K. Proust ὁ ὁπὸς τῶν ἀώρων σταφυλῶν ἐμπεριέχει ἐκχυλισματικὴν ὕλην μὲ ὀλίγον μηλικόν ὀξύ, τρύγα, πολὺ μηδικόν ὀξύ, θεικόν κάλιον καὶ θεικὴν τίτανον. Ὁ δὲ ὁπὸς τῶν σταφυλῶν ἢ τὸ γλεῦκος ἐκχυλισματικὴν ὕλην, σταφυλοζάχαριν καὶ ρευστὴν ζάχαριν, κόμμι, τρύγα, κολλώδη οὐσίαν, ἔχνη τρυγικοῦ καὶ μηλικοῦ ὀξέος.

Ὁ ζυμωμένος ὁπὸς ἢ ὁ οἶνος τῶν μελανῶν σταφυλῶν ἐμπεριέχει οἰνόπνευμα, ὁσμῆράν ὕλην, βαφικὴν ὕλην, κυανὴν σκυτοδεψικὴν καὶ ἐκχυλισματικὴν ὕλην, ζάχαριν, κόμμι, μηλικόν, ὀξικόν καὶ τρυγικόν ὀξύ, τρύγα, τρυγικὴν τίτανον μὲ ὑπερτεροῦν ὀξύ, φωσφορικὴν τίτανον, θεικόν κάλιον, ὀλίγον ἀλικόν νάτρον, ἀνθρακικόν ὀξύ καὶ ὕδωρ. Τὰ ἄλλα ταῦτα διαφέρουσι πολλάκις κατὰ τὴν φύσιν τῶν γαιῶν, εἰς ἃς εἶναι φυτευμένη ἡ ἄμπελος.

Ἡ διαφορὰ τῆς ποσότητος τῶν προρρήθέντων συστατικῶν εἶναι αἰτία τῶν διαφορῶν εἰδῶν τοῦ οἴνου. Οἱ οἶνοι λευκοὶ ἐρυθροβάφονται πολλάκις διὰ τῶν λεπίδων τῆς ἀρκεύθου ἢ ἄλλων ἐρυθρῶν καρπῶν, ὁ οὕτω χρωματισμένος οἶνος καθιζάνει βαθυ-κυανοῦν ἰζημα, προστιθεμένου ὀξικοῦ μολύβδου, οἱ δὲ διὰ τῆς βαφικῆς ὕλης τῶν λεπίδων τῶν σταφυλῶν, καθιζάνουν πρασινίζον ἰζημα. Ἀλλ' ἡ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου δοκιμασία δὲν εἶναι ἐντελὴς ἀσφαλὴς, ἐπεὶδὴ τὰ ἰζήματα τῶν παλαιῶν οἴνων διαφέρουσιν πολλάκις κατὰ τὸ χρῶμα.

Ὁ διὰ τεύτλων βαφεὶς οἶνος παρέχει ἐρυθρὰν ὑποστάθμην, προστιθεμένου ὀξικοῦ μολύβδου. Ὁ οἶνος οὗτος λευκαίνεται ὁλοκλήρως διὰ τιτανίου ὕδατος, τὸ δὲ ἐρυθροῦν χρῶμα ἐπανέρχεται διὰ τῶν ὀξέων, καθὼς καὶ διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος.

Ἄπαντες οἱ οἶνοι, ἀκόμη καὶ οἱ πολλὰ γλυκεῖς, καθὼς π. χ. ὁ οἶνος τῆς Θήρας, Malaga, Muscat ἐμπεριέχουν ἐλεύθερον ὀξύ καὶ ἔνεκα τούτου κοκκινίζουν τὸ τοῦ καγκαμίνου βάμμα. Οἱ δὲ οἶνοι τοῦ Ῥήνου καὶ ἐν γένει οἱ γινόμενοι ἐν καιρῷ ψυχροῦ καὶ βροχεροῦ θέρους, ἢ ἀπὸ ἀώρων σταφυλῶν ἐμπεριέχουν πολὺ περισσότερον ὀξύ ἀπὸ τοὺς γλυκεῖς.

Διὰ ν' ἀποχωρισθῇ τὸ ὀξύ ἀπὸ τὸν οἶνον ἢ διὰ νὰ λάβῃ αὐτὸς πάλιν γλυκεῖαν γεῦσιν ἀνακινεῖται ὑποκακοήθων οἰνοπώλων μὲ λιθάργυρον εἰς τὴν

περίστασιν ταύτην συμβαίνει νά ἐνωθῇ τὸ εἰς τὸν οἶνον ἐμπεριεχόμενον ὀξύ μετὰ μολύβδου σχηματίζον ἄλας γλυκὺ, διαλυτὸν ἐν μέρει εἰς τὸν οἶνον· τὴν διάλυσιν ταύτην ἢ μᾶλλον δηλητηρίασιν τοῦ οἴνου σπανίως μεταχειρίζονται τὴν σήμερον, ἐπεὶ δὴ ἕκαστος γνωρίζει τὴν βλαβερὰν δύναμιν τοῦ μολύβδου εἰς τὴν ὑγείαν, καὶ τὸν ἐκ τοιαύτης δηλητηριάσεως προσπίπτοντα κίνδυνον. Εἰς βαθυ-μέλανας οἶνους δὲν εἶναι τόσον ὑποψία, νὰ ἐμπεριέχεται μολύβδος ὅσον εἰς τοὺς ξανθοὺς, ἐπεὶ δὴ ὁ λιθάργυρος καταβυθίζει ἐν μέρει τὴν βαφικὴν ὕλην, ὥστε ὁ οἶνος λαμβάνει πελιδνώτερον χρῶμα καὶ μετὰ καιρὸν μεταβάλλεται εἰς ὠχρὸν ὑγρόν. Οἱ ξανοὶ οἶνοι κατεργασθέντες μὲ λιθάργυρον μεταβάλλονται καὶ ἀποχρωματίζονται ὀλοτελῶς.

Διὰ νὰ γνωρισθῇ ἂν ὁ μολύβδος ὑπάρχῃ εἰς τὸν οἶνον, προστίθεται ὑδροθεικὸν ὀξύ, τὸ ὅποιον ἀποτελεῖ μέλαν ἴζημα, ἐνθὺιον μολύβδον, δηλαδή καὶ ἐπὶ διαπύρου ἀνθρακος σχηματίζει σφαιρίδιον μολύβδου. Καὶ ὁ μεταλλικὸς ψευδάργυρος δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ μολύβδου, ἀνάγκη ὅμως νὰ κρεμασθῇ σφαιρίδιον αὐτοῦ διὰ κλωστῆς εἰς τὸν οἶνον· μετ' ὀλίγον καιρὸν ὁ ψευδάργυρος ἀποβάλλει τὴν μεταλλικὴν στιλπνότητά του, καὶ καλύπτεται μὲ πολλὰς τεφροειδεῖς λεπίδας τοῦ ἀποξειδωμένου μολύβδου.

Οἱ ξανοὶ οἶνοι ἔχουν κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ὠχρὸν χρῶμα, τὸ ὅποιον δέχονται ἐν μέρει ἀπὸ τὰ ξύλινα ἀγγεῖα. Διὰ νὰ δώσουν δὲ τὸ χρῶμα τοῦτο οἱ οἰνοπῶλοι, τοὺς θάφουν συχνάκις διὰ κεκαυμένης ζαχάρεως, τῆς ὁποίας μικρὰ ποσότης ἐξαρκεῖ διὰ νὰ δώσῃ εἰς μεγάλην ποσότητα οἴνου ὠχρὸν χρῶμα.

Ἡ ποσότης τοῦ εἰς τὸν οἶνον ὑπάρχοντος οἰνοπνεύματος εἶναι πολὺ διάφορος. Πρὸς καταμέτρησιν λοιπὸν τούτου ἐμεταχειρίσθησαν ἑκπαλαι τὴν ἀπόσταξιν. Ὁ δὲ K. Tabarié ἐσυμβούλευε νὰ βρασθῇ μετρημένη ποσότης οἴνου εἰς ἀνοικτὸν ἀγγεῖον, διὰ νὰ ἐξατμισθῇ τὸ οἰνόπνευμα. Ἡ ποσότης αὐτοῦ μετράται ἐκ τῆς διαφορᾶς τῆς πυκνότητος μεταξύ ἀβράστου καὶ τοῦ ἐπιμένοντος βρασμένου οἴνου, ἀφοῦ προστεθῇ εἰς αὐτὸν ὕδωρ, καὶ ἀναλάβῃ πάλιν τὸν αὐτὸν ὄγκον, τὸν ὅποιον εἶχε πρὸ τῆς βράσεως. Εἰς αὐτὴν τὴν εὐστοχὸν ιδέαν θεμελιούται τὸ οἰνόμετρον τοῦ K. Taberie, δι' οὗ τὸ εἰς τὸν οἶνον ἐμπεριεχόμενον οἰνόπνευμα δύναται νὰ μετρηθῇ ταχύτερον καὶ ἀκριβεστέρον παρὰ διὰ τῆς ἀποστάξεως. Τὸ οἰνόμετρον τοῦτο χρήσιμον μάλιστα εἰς τὴν Γαλλίαν παρέχει μεγάλας ὠφελείας· ὁ K. Fabroni συνέλαβεν τὴν ιδέαν ὅτι τὸ οἰνόπνευμα δὲν ὑπάρχει εἰς

τοὺς οἶνους, ἀλλὰ σχηματίζεται διὰ τῆς θερμότητος εἰς τὴν ἀπόσταξιν.

Διάφοροι οἶνοι ἐξετάσθησαν ὡς πρὸς τὴν εἰς αὐτοὺς ἐμπεριεχομένην ποσότητα οἰνοπνεύματος. Κατὰ τὸν K. Brande ἑκατὸν ὄγκοι οἶνου 0,825 εἰδικῆς βαρύτητος ἐμπεριέχουν οἰνόπνευμα ὡς ἀκολούθως.

Lyssa	25,41
Madera	22,27
Teneriffa	19,79
Teres	19,18
Malaga	18,94
Muscat	18,25
Bordeaux	15,10
Κέας	14,15
Θήρας, Τήνου	14,00
Ρήνου	9,13
Champagne	11,84
Οἱ συνήθεις Οἶνοι τῆς Ἑλλάδος	10,46
Μηλίτης	9,00
Ὑδρομέλι	7,00.

Περὶ τοῦ Μηλίτου. (Cider).

Καθὼς ὁ οἶνος κατασκευάζεται ἐκ τοῦ ὅπου τῶν σταφυλῶν, οὕτω καὶ ὁ μηλίτης ἐκ τοῦ ὅπου τῶν μῆλων καὶ τῶν ἀπιδίων· ἐπεὶ δὲ ὅμως οὗτος ἐμπεριέχει ζάχαριν πολλὰ ὀλιγοτέραν τοῦ ὅπου τῶν σταφυλῶν, οἱ ἐξ αὐτοῦ κατασκευαζόμενοι οἶνοι δὲν παρέχουν τόσον οἰνόπνευμα, καθὼς οἱ ἐκ τῶν σταφυλῶν.

Ὁ ἐκ τῶν μῆλων ἐκπαισθεὶς ὁπὸς ἐμπεριέχει ὀλίγην σταφυλοζάχαριν, ρευστὴν ζάχαριν, πολλὰ ὀλίγον ζωμὸν ἢ ὕλην τινὰ μεταβαλλομένην διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ αἵρος εἰς ζύμην, πολλὴν βλένναν, μηλικὸν καὶ ὀξικὸν ὄξύ, δὲν ἐμπεριέχει δὲ τρύγα.

Διὰ νὰ κατασκευασθῇ ὁ μηλίτης, φυλάττονται τὰ μῆλα σεσωρευμένα καιρόν τινα διὰ νὰ ὠριμάσῃσι καὶ νὰ σχηματισθῇ περισσότερα ζάχαρις. Ὁ ἐκθλιφθεὶς ὁπὸς βάλλεται εἰς πίθους, εἰς τοὺς ὁποίους ζυμοῦται πολὺ βραδέως. Ὁ μηλίτης καθαρίζεται ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκην νὰ κα-

θαρισθῇ δι' ἰχθυοκόλλας ἢ λευκώματος. Δὲν δύναται δὲ νὰ διατηρηθῇ πολὺν καιρὸν, καθότι μεταβάλλεται μετὰ καιρὸν τινα εἰς ὄξος. Ἐὰν ὁ μηλίτης μεταγίγζεται εἰς λαγήνους πρὶν παύσῃ ἡ ζύμωσις, ζυμοῦται ἐκ νέου μετ' ὀλίγον καιρὸν.

Καὶ ἐκ τοῦ ὁποῦ διαφόρων ἄλλων γλυκέων καρπῶν δύναται νὰ κατασκευασθῶσι διὰ τῆς ζυμώσεως οἰνώδη ποτὰ, καθὼς π. χ. ἐκ τοῦ τῶν σικαμῆνων, ἐκ τῶν καρπῶν τῆς ἀκτῆς κτλ. Ὡσαύτως κατασκευάζεται πνευματῶδες ποτὸν ἐκ τοῦ ὁποῦ τῶν σημύδων, τῶν σφενδάμων καὶ τῶν φοινίκων, προστιθεμένης ζαχάρως.

Οἱ διάφοροι οἶνοι τῶν μῆλων, τῶν ἀπιδίων κτλ. γίνονται πλέον ἄκρατοι, προστιθεμένης ζαχάρως καὶ ζύμης πρὸ τῆς ζυμώσεως των.

Περὶ τοῦ οἰνομέλιτος.

Πρὸς κατασκευὴν τούτου διαλύεται τὸ μέλι εἰς ζέον ὕδωρ, καὶ ἀφοῦ προστεθῶσιν ἀρωματικαὶ τινες οὐσίαι καὶ βύνη, προάγεται ἡ ζύμωσις διὰ τεμαχίου ἄρτου πεφρυγμένου καὶ μὲ ζύμην περιβεβλημένου· κατωτέρα ποιότης οἰνομέλιτος γίνεται διὰ τῆς ζυμώσεως τοῦ ὑδατώδους ὑγροῦ, τὸ ὁποῖον ἐπιμένει μετὰ τὴν τελευταίαν βράσιν τῶν μελικηρίων, ἀποχωρίζομένου τοῦ κηροῦ.

Περὶ τοῦ ζύθου. Cerevisia.

Ὁ ζύθος κατασκευάζεται συχνότατα ἐκ τῆς βύνης, ἀντ' αὐτῆς δὲ πολ- λάκις μεταχειρίζονται τὸν σίτον καὶ τὴν ζέαν καὶ ἄλλας σιτηρὰς ὕλας. Ἡ κατασκευὴ τοῦ ζύθου δὲν εἶναι τόσον ἀπλῆ, ὅσον ἡ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ διαφόρους ἐργασίας.

Διὰ νὰ μεταβληθῇ ἡ κριθὴ εἰς βύνην, πρέπει νὰ ἐμβραχῇ 24—48 ὥρας εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ὅπου γίνεται ἐπιτηδεῖα πρὸς βλάστησιν. Ἡ θεβρεγμένη κριθὴ ἐξαπλοῦται εἰς στιβάδας 15—16 δακτύλων πάχος ἐχούσας, αἵτινες θερμανθεῖσαι συνάγονται εἰς λεπτοὺς σωροὺς ἀνακινουμένους δις τῆς ἡμέρας. Ἡ κριθὴ ἄρχεται νὰ βλαστάνῃ, ἀπορρόφῶσα ὀξυγόνον καὶ ἐκλύουσα ἀντ' αὐτοῦ ἀνθρακικὸν ὀξύ· ἡ βλάστησις ὅμως δὲν πρέπει νὰ διαρκέσῃ πολὺν καιρὸν, ἐπειδὴ ἄλλως ἢ δι' αὐτῆς σχηματιζομένη ζάχαρις διαφθεί-

ρεται πάλιν· οί βλαστοί πρέπει νά ἔχωσι μῆκος μόνον $\frac{2}{3} - \frac{3}{4}$ τοῦ σπέρματος· διὰ νά ἐμποδισθῇ λοιπὸν εὐθὺς ἡ βλάστησις, ἡ κριθὴ ἐξαπλωθεῖσα εἰς λεπτάς στιβίδας ξηραίνεται διὰ τοῦ ἀέρος, ἢ διὰ τοῦ ἡλίου, ἢ εἰς τόπον 60° R. θερμοκρασίας. Ἡ διὰ τοῦ ἀέρος ἀπεξηραμμένη βύνη εἶναι χρήσιμος κατ' ἐξοχὴν πρὸς κατασκευὴν τοῦ λευκοῦ ζύθου, ἡ δὲ διὰ τοῦ πυρὸς πρὸς τὴν τοῦ φαιοῦ· οἱ βλαστοὶ ἀκολουθῶς ἀποχωρίζονται. Ἡ βύνη τριφθεῖσα ἀδρομερῶς εἰς μύλους, ἐμβρέχεται ἐντὸς πίθου διὰ θερμοῦ, ἀκολουθῶς δὲ διὰ ζέοντος ὕδατος σχεδὸν 60° R ἔχοντος, οὕτω δὲ ἐκχυλίζονται ἅπαντα τὰ διαλυτὰ συστατικὰ τῆς βύνης δι' ἔτι θερμότερου ὕδατος. Εἰς ἅπαντα τὰ ὑγρά, ἀφοῦ ἐν μέρει ἐξατμισθῶσι, προστίθενται στρόβυλοι τοῦ λυκίσκου *Humulus Lupulus*, καὶ πολλάκις κάσιον ξύλον *Lignum Quassia* καὶ ἄλλαι πικραὶ οὐσίαι, διὰ τῶν ὁποίων τὸ ἐμβρεγμα λαμβάνει ὄχι μόνον ἀρωματικὴν καὶ πικράν γεῦσιν, ἀλλὰ ἐμποδίζεται καὶ ἀπὸ τὴν ξύνισιν. Διὰ νά ἐμποδισθῇ δὲ ἡ μεταξὺ τῆς θραδείας ψύξεως προκχομένη ὀξεῖα ζύμωσις τοῦ ὑγροῦ, πρέπει νά ψυχρανθῇ αὐτὸ ὅσον ἐνεσσι τάχιστα, καὶ αὕτη ἡ ἀπόψυξις γίνεται διὰ μετρίας κινήσεως εἰς πλατέα ἀγγεῖα.

Τὸ ψυχρανθὲν ἐμβρεγμα βάλλεται εἰς ἄλλους πίθους, εἰς τοὺς ὁποίους ζυμόνεται, προστιθεμένης ζύμης· ἐνῶ γεννᾶται ἡ ζύμωσις, καλύπτεται ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὑγροῦ μὲ ἀφρόν, ὅστις κατακρημνίζεται εἰς τὸν πυθμένα μετὰ τὴν παῦσιν τῆς ζυμώσεως.

Εἰς τὴν βλάστησιν τῆς κριθῆς τὸ εἰς αὐτὴν ἐμπεριεχόμενον ἄμυλον μεταβάλλεται διὰ τῆς φυτοκόλλας πρῶτον εἰς ἄμυλοκόμμι καὶ ἔπειτα εἰς ζάχαριν. Ὁ ζύθος βάλλεται ἔπειτα εἰς κάδους εἰς τοὺς ὁποίους ὑπόκειται ἀκόμῃ εἰς ἀσθενῇ ζύμωσιν· ὁ ἐκ τῆς ἀποχωρισθείσης ζύμης μεταγερθεὶς ζύθος ἐρλεῖσται εἰς κάδους ἢ εἰς λαγήνους.

Οἱ κεκραμένοι ζύθοι κατ' ἐξοχὴν οἱ λευκοὶ δύνανται νά φυλαχθῶσιν, ὀλίγον μόνον καιρὸν, ἐπεὶδὴ μεταβάλλονται ταχέως διὰ τῆς ὀξεῖας ζυμώσεως· οἱ δὲ φαιροὶ καὶ κατασκευασμένοι ἀπὸ καλῶς ἀπεξηραμμένη βύνης διατηροῦνται περισσότερον καιρὸν· τὰ καλῆτερα ὅμως εἶδη τοῦ ζύθου ἐμπεριέχουν ἐκτὸς τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ ὀλίγον ὀξικὸν ὀξύ. Ὁ ἐκ πολλοῦ ἀκράτου ἐμβρέγματος κατασκευασμένος ζύθος, ὡς ὁ τοῦ Μονάρχου, ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ ὕδατος καὶ οἶνοπνεύματος, μεγάλην ποσότητα σφεαῶν οὐσιῶν διαλελυμένων, οἷον πικράν ὕλην τοῦ λυκίσκου *Lupuline*, ζάχαριν, φυτοκόλλαν, κόμμι, ἐκχυλισματικὴν ὕλην φαιάν, φωσφορικὴν τίτανον, καὶ φωσφορικὴν μαγνησίαν διαλελυμένην εἰς ὀξικὸν ὀξύ, ὅχι δὲ καὶ ἄμυλον.

Προσπιθεμένης άμμωνίας κατακρημνίζονται τὰ γαιώδη μέρη. Μετά τὴν ἐξάτμισιν τριῶν λιτρῶν τοιούτου ζυθου ἐπιλείπονται τρεῖς οὔγγια καὶ δύο δραχμαὶ πυκνοῦ καὶ βαθυφαίου ἐκχυλίσματος, καὶ ἕνεκα τῆς μεγάλης ταύτης ποσότητος στερεῶν οὐσιῶν εἶναι ὁ ζύθος πολὺ θρεπτικός.

Οἱ εἰς τοὺς Παρισίους κατασκευαζόμενοι ζύθοι εἶναι πολὺ κεκραμένοι καὶ μόλις δύνανται νὰ φυλαχθῶσιν ὀλίγους μῆνας. Οἱ ζύθοι τοῦ Λονδίνου διαφέρουσι κατὰ τὴν ποιότητα· ὁ ἄκρατος φαιὸς ζύθος π. χ. ἐμπεριέχει $6\frac{3}{4}$ τοῖς ἑκατὸν οἶνοπνεύματος· ὁ δὲ μᾶλλον κεκραμένος $3\frac{1}{4}$ τοῖς ἑκατὸν 0,825 εἰδικῆς βαρύτητος.

Ὁ ζύθος ἦτον γνωστὸς καὶ εἰς τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους. Λέγεται ὅτι εἰσῆχθη ἀπὸ τὸν Ὀσῆριδα εἰς τὴν Αἴγυπτον ἀντὶ τοῦ οἴνου· καὶ οἱ Ἕλληνες ἐγνώρισαν τὸ ποτὸν τοῦτο, διότι ὁ οἶνος τῆς κριθῆς, περὶ τοῦ ὁποίου ἀναφέρει ὁ Αἰσχύλος καὶ ὁ Σοφοκλῆς, φάνεται ὅτι ἦτον ζύθος· οἱ παλαιοὶ Γερμανοὶ καὶ Γαλάται ἐπινον ζύθον.

Περὶ τοῦ οἶνοπνεύματος. Alcohol.

Ὅλα τὰ διὰ τῆς οἰνώδους ζυμώσεως παραγόμενα μεθυστικὰ ποτὰ ἐμπεριέχουν οἰνόπνευμα, τὸ ὁποῖον ὡς πτητικώτερον τοῦ ὕδατος δύναται νὰ ἐξαχθῇ εὐκόλως διὰ τῆς θερμότητος. Εἰς τὴν μεσημβρινὴν Γαλλίαν καὶ ἐν γένει εἰς τοὺς οἶνοφόρους τόπους ἐξάγεται διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν οἶνων· τὸ τοιοῦτον οἰνόπνευμα γνωρίζεται ὑπὸ τὸ ὄνομα *Spiritus vini gallicus*· τὸ δὲ εἰς διαφόρους χώρας τοῦ Languedoc ἐκ τῶν οἶνων ἀποσταλαζόμενον λέγεται *Cognac*· εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ εἰς τοὺς ἀρκτικούς τόπους ἐξάγεται τὸ οἰνόπνευμα μόνον ἐκ τῶν σιτηρῶν ἢ ἐκ τῶν γαιωμύλων.

Πρὸς κατασκευὴν τούτου, κεκομμένη κριθή, ἢ σῖτος ἢ βρώμιον συμμιγνύονται μὲ θύνην τῆς κριθῆς, γλισχροῦνται δι' ὕδατος θερμοκρασίας 38°R καὶ ἐνωθέντα ἔπειτα μετὰ ζέοντος ὕδατος κατεργάζονται χρόνον τινὰ εἰς θερμοκρασίαν 60°R , δι' ἧς τὸ ἄμυλον μεταβάλλεται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς φυτοκόλλας εἰς ζάχαριν· ἀφοῦ τὸ μίγμα ψυχρανθῇ ἕως τὴν 22°R διὰ τῆς προσθέσεως ψυχροῦ ὕδατος καὶ συμμιχθῇ μὲ ζύμην, κλείεται ὁ πίθος διὰ καλύμματος, διὰ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ ἐπιρροή τοῦ ἀέρος καὶ ἐντὸς αὐτοῦ ζυμοῦνται διὰ τινὰς ἡμέρας· μετὰ τὴν ζύμωσιν ἀρχεται ἡ ἀπόσταξις.

Διὰ νὰ ἐξαχθῇ οἰνόπνευμα ἐκ τῶν γαιομύλων, ζέονται αὐτὰ πρότερον

εἰς ὕδωρ, ἢ καλῆτερον εἰς ἀτμούς τοῦ ὕδατος, καὶ ἔπειτα συντρίβονται εἰς πόλτον· ἐπεὶ δὲ τὰ γαιόμηλα δὲν ἐμπεριέχουν φυτοκόλλαν δυναμένην νὰ μεταβάλλῃ τὸ ἄμυλον εἰς ζάχαριν, πρέπει νὰ προστεθῇ βύνη ἢ ἔρειγμα καὶ ζύμη· κατὰ τὰς παρατηρήσεις, τινῶν χημικῶν σχηματίζεται μεγαλύτερα ποσότης οἰνοπνεύματος, ἐὰν πρὸς ἐμβρεξίν τοῦ ἐρείγματος μεταχειρισθῇ ὕδωρ ἐμπεριέχον πολλήν ἀνθρακικὴν τίτανον, ἐπεὶ δὲ αὕτη κορενύσει τὸ σχηματιζόμενον ὀξικὸν ὀξύ, τὸ ὅποιον καθὼς ἕκαστον ἐλεύθερον ὀξύ βλάπτει τὴν οἰνώδη ζύμωσιν.

Ἡ ἀπόσταξις τοῦ ζυμωθέντος μίγματος εἴτε ἐκ σιτηρῶν εἴτε ἐκ γαιόμηλων ἀποτελεῖται εἰς τὰς συνήθεις ἀποστακτικὰς φύσας.

Διὰ νὰ ἐμποδισθῇ τὸ ἐμπύρευμα τῶν στερεῶν οὐσιῶν, ἀνακινεῖται τὸ μίγμα διὰ βάρδου, ἥτις διερχομένη διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἀμβικὸς φθάνει μέχρι τοῦ πυθμένος τῆς ἀποσταλακτικῆς φύσης· ἐμποδίζεται προσέτι, ἐὰν ὁ τῆς ἀποστακτικῆς φύσης πυθμὴν σκεπασθῇ δακτύλους τινὰς μὲ ἀρκετὰ διάπυρον τέφραν, ἢ ἐὰν τὸ μίγμα εἰς συρματόπλεκτον κόφινον τεθὲν κρεμασθῇ εἰς τὸν ἀμβικόν· πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν καταλληλότερον εἶναι νὰ διαχετεύωνται οἱ ἀτμοὶ τοῦ ὕδατος διὰ τοῦ μίγματος τὰ ὅποιον ἐντὸς ξυλίων ἀποσταλακτικῶν ἀγγείων ἀποστάζεται.

Ἐὰν ἡ ἀπόσταξις γίνεται εἰς κοινὸν ἀποστακτικὸν σκεῦος, ἐξάγεται οἰνόπνευμα ἐμπεριέχον ἔλαιον βαρύσμον, ὀξυνὸν κτλ. 0,991—0,997 βαρύ· τὸ ἐπιμένον εἰς τὴν φύσαν ἐμπεριέχει ἀμετάβλητον ἄμυλον, φυτοκόλλαν, λεύκωμα, λεπίσματα, πολὺ ὀξικὸν ὀξύ κτλ. καὶ δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς τροφὴν τῶν ζώων. Τὸ πρῶτον ἀποστάλαγμα καθαρίζεται διὰ δευτέρας ἀποστάξεως. Τὸ κατ' ἀρχὰς ἀποσταλαζόμενον οἰνόπνευμα εἶναι πολὺ ἀκρατον, ἔπειτα σταλάζει μᾶλλον κεκραμένον, καὶ τέλος ἐξάγεται γαλακτώδες ὑγρὸν, συγκείμενον ἐκ τοῦ ἰδιαιτέρου ἐλαίου καὶ ὕδατος, καὶ εἰς τὴν φύσαν ἐπιμένει ὑδατώδες ὑγρὸν τὸ ὅποιον ἐμπεριέχει ὀξικὸν ὀξύ καὶ τὸ ἄνω εἰρημένον ἔλαιον.

Τὸ διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν ζυμουμένων γαιόμηλων ἢ τῶν σιτηρῶν σχηματιζόμενον ἰδιαιτέρον ἔλαιον δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ μετὰ τὴν ἀποστάξιν τοῦ οἰνοπνεύματος. Τὸ ὕδωρ καὶ τὸ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἐμπεριεχόμενον ἔλαιον δύνανται νὰ ἀποχωρισθῶσι διὰ ἀνακινήσεως μὲ ἀλικὴν τίτανον καὶ διὰ δευτέρας ἀποστάξεως. Τὸ ἔλαιον τοῦτο εἶναι διαφανές, ἔχει ἰδιαιτέραν ὀσμὴν, πικράν γεῦσιν καὶ εἰδικὴν βαρύτητα 0,821, εἰς θερμοκρασίαν 125° R ἀναΐζει. εἰς ἁλωτέρον ὅμως μεμιγμένον μὲ οἰνόπνευμα καὶ ὕδωρ.

εἶναι σχεδὸν ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, εὐδιάλυτον δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, εἰς τὸ ὀξικὸν ὀξύ καὶ εἰς ἄκρατον τοῦ καλίου διάλυμα.

Διὰ τοῦ χλωρίου λαμβάνει πράσινον χρῶμα. Ἡ ἰδιαιτέρα ὁσμὴ καὶ γεῦσις τοῦ ἐκ τῶν γαιομηλῶν ἢ τῶν σιτηρῶν κατασκευαζομένου οἰνοπνεύματος ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ τοιούτου ἐλαίου.

Τὸ διὰ τῆς ἀποσταξέως ἐκ διαφόρων ζυμουμένων ὑγρῶν ἐξαγόμενον οἰνόπνευμα καὶ ἔπειτα καθαριζόμενον ἔχει τὰς αὐτὰς ιδιότητας, ἀλλὰ διαφέρει κατὰ τὴν γεῦσιν καὶ ὁσμὴν, τὴν ὁποίαν λαμβάνει ἐκ τῶν εἰς αὐτὸ διαλελυμένων ἑτερογενῶν οὐσιῶν· τὸ ἐκ τῶν γαιομηλῶν καὶ τῶν σιτηρῶν ἀποσταχθὲν οἰνόπνευμα π. χ. ἐμπεριέχει πάντοτε πολλὴν ἢ ὀλίγην ποσότητα τοῦ ἰδιαιτέρου τούτου ἐλαίου, καὶ διὰ τὰ ἀποχωρισθῇ ἐξ αὐτοῦ μετεχειρίσθησαν διάφορα μέσα· τὰ κυριώτερα τῶν ὁποίων εἶναι τὰ ἀκόλουθα· κοινῶς ἀνγκινεῖται πολλάκις τὸ οἰνόπνευμα μὲ πεπυρωμένον ἄνθρακα ἢ καλῆτερον μὲ ζωάνθρακα καὶ ἀκολούθως ἀποσταῖζεται. Ἀντὶ τοῦ ἄνθρακος μεταχειρίζονται καὶ τὴν ἐγγλῶριον τίτανον, δι' ἧς τὸ ἔλαιον μεταβάλλεται ἕνεκα τοῦ ἐκλυομένου χλωρίου εἰς ῥητίνην· καὶ ἡ ἀπόσταξις ἐπὶ ἀλικυῷ νάτρου, τιτάνου, τέφρας, ἀνθρακικοῦ καλίου κτλ. εὐδοκίμησεν. Τὸ ἐκ τῶν γαιομηλῶν καὶ τῶν σιτηρῶν οἰνόπνευμα ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ ἐλαίου σχεδὸν πάντοτε ἔχνη ὀξικοῦ ὀξέος καὶ πολλάκις χαλκὸν διαλυθέντα ἐκ τῶν ἀγγείων.

Συχνάκις ἀποσταλάζεται τὸ οἰνόπνευμα ἐπίτηδες ἐπὶ οὐσιῶν τινῶν δριμέων καὶ ναρκωτικῶν διὰ τὰ αὐξηθῇ ἡ μεθυστικὴ δύναμις τοῦ π. χ. ἐπὶ νικοτιανῆς φύλλων, ἐπὶ πεπερίδων κτλ.

Τὸ τοῦ οἴνου οἰνόπνευμα, τὸ γαλλικὸν π. χ. λαμβάνει κοινῶς ὥχρον χρῶμα ἐκ τῶν κάδων, πολλάκις δὲ χρωματίζεται διὰ πεφρυγμένης ζαχάρους. Πρὸς τούτοις ἐμπεριέχει καὶ ἔχνη αἰθέρος δι' ὅσους σχηματιζομένου διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ οἰνοπνεύματος.

Ἐκ πολλῶν ἄλλων ζυμουμένων ὑγρῶν δύνανται νὰ ἀποσπαραχθῶσιν οἰνοπνεύματα διαφέροντα μεταξὺ των κατὰ τὰς εἰς αὐτὰ διαλελυμένας ἑτερογενεῖς οὐσίας. Ἐκ τῶν ζυμουμένων ἀρκευθίδων ἀποσταλάζεται οἰνόπνευμα ἐμπεριέχον ὀλίγον ἔλαιον τῶν ἀρκευθίδων Genievre, ἐκ τοῦ ζυμουμένου μέλανος σερapiίου melasse ἀποτελεῖται ἡ Taffia ἢ Rataffia, ἐκ τῶν εἰς κάθαρσιν τῆς ζαχάρους ληφθέντων σερapiίων κατασκευάζεται τὸ Rhum, ἐκ τῆς ὀρύζης καὶ τῶν σπερμάτων τῆς ἀρεκαφοίνικος (Areca Catechu τὸ Arak, ἐκ τῶν βυσσίνων πιεσθέντων καὶ ζυμωθέντων μὲ τοὺς πυρῆνάς των οἰνόπνευμα ἐμπεριέχον ὕδροκυανικὸν ὀξύ καὶ καλούμενον Eau de Cerise.

Περὶ τοῦ οἴνοπνεύματος. *Alcohol.*

Ἐάν τὸ ἀσθενὲς οἴνόπνευμα ἀποσταλαχθῇ ἐκ νέου, ὥστε νὰ ἐξαχθῇ μόνον $\frac{1}{3}$ αὐτοῦ, τότε ἀφαιρεῖται ἐν μέρει τὸ ὕδωρ καὶ ἐξάγεται οἴνόπνευμα 0,39 εἰδικῆς βαρύτητος καὶ γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα Spiritus vini rectificatus· ἀποσταλαζομένου δὲ πάλιν $\frac{1}{3}$ αὐτοῦ, εἰσέρχεται εἰς τὸ δοχεῖον οἴνόπνευμα 0,833 εἰδικῆς βαρύτητος, Spiritus vini rectificatissimus. Τέλος διὰ νὰ ἀφαιρεθῇ ἐκ τοῦ οἴνοπνεύματος ὅλον τὸ ὕδωρ, καὶ νὰ ἀποτελεσθῇ τὸ *Λεῖψυδρον οἴνόπνευμα* Alcohol absolutum πρέπει νὰ ἀποσταλαχθῇ πάλιν ἐπὶ ἀλικῆς τιτάνου ἀρτιχύτου καὶ τεθλασμένης. Ἀντὶ τῆς ἀλικῆς τιτάνου δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ἡ τίτanos, τὸ δὲ οὕτω σχηματιζόμενον οἴνόπνευμα ἐμπεριέχει ἔχνη τιτάνου, καὶ ἕνεκα τούτου δύναται νὰ χρησιμεύσῃ μόνον πρὸς τὴν τῶν γανωμάτων κατασκευήν. Τὸ οἴνόπνευμα ἔνν ἐμπεριέχει ὀλίγον ἐκ τοῦ ἰδιαίτερου ἐλαίου, λαμβάνει ὑπέρυθρον χροῶμα εἰς τὸν ἥλιον, προστιθεμένου νιτρικοῦ ἀργύρου. Τοιοῦτον οἴνόπνευμα θολοῦται καὶ διὰ προσθήκης ὕδατος.

Τὸ λεῖψυδρον οἴνόπνευμα εἶναι διαφανές, πολὺ λεπτόρρευστον, διαθλαζόμενον τὸ φῶς, ἔχει ἰδίαν ὀσμὴν καὶ καυστικὴν γεῦσιν, ἐνούμενον δὲ μετ' ὕδωρ εἶναι δυναμωτικὸν εἰς μικρὰς δόσεις, πολὺ μεθυστικὸν δὲ εἰς μεγάλας. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης του εἰς τὴν 150° R· εἶναι 0,792, καὶ εἰς τὸ μέγιστον ψῦχος δὲν πηγνύται, εἰς τὴν 62° R· ἀναξέει. Εἰς ὄγκος ἀναξέοντος οἴνοπνεύματος δίδει 488,3 ὄγκους οἴνοπνευματωδῶν ἀτμῶν. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης τοῦ ἀτμοῦ εἶναι 1,613.

Τὸ οἴνόπνευμα δύναται νὰ ἀναφθῇ διὰ τοῦ ἡλεκτρικοῦ σπινθῆρος, ἢ διὰ ἀναμμένου κηροῦ, καίει μὲ ἀμυδρὰν φλόγα ὀλίγον μόνον λάμπουσαν, χωρὶς νὰ γεννᾷ αἰθάλην καὶ νὰ ἐπιλείπῃ τέφραν. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς καύσεως εἶναι μόνον ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ ὕδωρ.

Οἱ ἀτμοὶ κατακαίονται βραδέως καὶ χωρὶς φλόγα, συναπτόμενοι μὲ ἐκ λευκοχρύσου ἐλικοειδὲς σύρμα, διατηροῦν αὐτὸ εἰς διάπυρον κατάσχεσιν. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην σχηματίζονται ἐκτὸς τοῦ ὕδατος ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, αἰθὴρ δι' ἐμπυρευματικοῦ ὀξους καὶ ὀξικὸν ὀξύ, ἢ τὸ λυχνικὸν ὀξύ τοῦ K. Daniell. Ἐπ' αὐτοῦ στηρίζεται ἡ ἐφεύρεσις τοῦ διαπύρου λύχνου τοῦ K. Davy.

Ἐάν οἱ ἀτμοὶ τοῦ οἴνοπνεύματος διοχετευθοῦν διὰ πορφυροῦ διαπύρου σίφωνος, κατακρημνίζεται ὁ ἀνθράξ εἰς τὸν σίφωνα, εἰς δὲ τὸ προσήρμοσμένον δοχεῖον σταλάζει φαιὸν ἔλαιον, πτητικόν, μεμιγμένον μετ' ὕδωρ.

πτους λεπιδωτους κρυστάλλους· πρὸς τούτοις σχηματίζονται ἀνθρακικὸν ὀξύ, ὀξειδιδιον τοῦ ἀνθρακος καὶ διττο-ὕδρογονο-ἀνθρακοῦχον ἀέριον.

Τὸ οἰνόπνευμα ἀναθυμιᾶται εἰς τὸν ἀέρα κατὰ μικρὸν, ἀπορρόφῳν ἐξ αὐτοῦ τὴν ὑγρότητα. Ὡσαύτως ἀπορρόφᾷ καὶ μεγάλην ποσότητα ἀέρος ἐμπεριέχοντος 0,33 ὀξυγόνου, ὁ δὲ ἀήρ οὗτος δύναται ἐν μέρει νὰ ἐξαχθῇ πάλιν, ζεομένου τοῦ οἰνοπνεύματος ἢ ἐνούμενου αὐτοῦ με ὕδωρ.

Τὸ οἰνόπνευμα δύναται νὰ συμμιχθῇ με τὸ ὕδωρ κατὰ πάσας τὰς ἀναλογίας ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν τῆς θερμότητος· ἐὰν ὀλίγον οἰνόπνευμα συμμιχθῇ με χιόνα, γεννᾶται πολὺ ψῦχος.

Τὸ οἰνόπνευμα διαλύει καύσιμά τινα σώματα· ὁ φώσφορος ἀπαιτεῖ 320 μέρη ψυχροῦ καὶ 240 μέρη ζέοντος οἰνοπνεύματος 0,799 εἰδικῆς βαρύτητος, $\frac{1}{3}$ —ὅμως τοῦ φωσφόρου χωρίζεται πάλιν ἐκ τοῦ ἀποψυχραίνομένου διαλύματος· προστιθεμένου ὕδατος γίνεται γαλακτόχρουν τὸ διάλυμα καὶ φωτοβολεῖ εἰς σκοτεινὸν μέρος. Τὸ λεῖψυδρον οἰνόπνευμα διαλύει ὀλίγον μόνον τὸ θεῖον, ψυχραίνομένου δὲ τοῦ διαλύματος, καταβυθίζονται ἄχρως τινὲς χόνδροι· ἐὰν ὅμως οἱ ἀτμοὶ τοῦ θείου συναφθῶσι μετὰ τοῦ οἰνοπνεύματος, διαλύεται ὀλίγον περισσότερον θείου. Τὸ διάλυμα ἔχει ἀηδὴ ὀσμὴν, καὶ φαίνεται ὅτι ἐσχηματίσθη ὀλίγον ἀέριον τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ οἰνοπνεύματος.

Ἐὰν προστεθῇ ὕδωρ, καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύματος ὀλίγον θεῖον ὡς λευκὴ κόνις, ἐὰν δὲ διαλελυμένον μέταλλον, κατακρημνίζεται μέλαν ἱζημα. Κατὰ τὸν K. Saussure ἀπορρόφᾷ τὸ οἰνόπνευμα 116 ὄγκους τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος.

Τὸ ἰῶδες εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ οἰνόπνευμα σχηματίζον ἐρυθρόφαιον ὑγρὸν, προστιθεμένου δὲ ὕδατος, τὸ ἰῶδες κατακρημνίζεται πάλιν εἰς μικροὺς κρυστάλλους. Εἰς τὸ διάλυμα σχηματίζονται μετὰ τινα καιρὸν ὑδριωδικὸν ὀξύ καὶ αἰθὴρ δι' ὑδριωδικοῦ ὀξέος· προστιθεμένων ἀλκαλίων εἰς τὸ διάλυμα, λευκαίνεται ἐξαίφνης καὶ σχηματίζεται ὑδριωδικὸν ὀξύ.

Μεγάλῃ ποσότης χλωρίου ἀπορρόφᾶται ἀπὸ τὸ οἰνόπνευμα, τοῦτο δὲ ἀποσυντίθεται σχηματίζον ἰδιαιτέρας ἐνώσεις, τὰς ὁποίας θέλομεν περιγράψει εἰς τὸν αἰθέρα δι' ἀλικοῦ ὀξέος.

Τὰ καυστικὰ ἀλκάλια, τὸ κάλιον, τὸ νάτρον καὶ ἡ ἀμμωνία, εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ οἰνόπνευμα· διὰ τοῦ καλίου καὶ τοῦ νάτρου μεταβάλλεται μέρος τοῦ οἰνοπνεύματος, μάλιστα διὰ τῆς θερμότητος, εἰς ῥητίνην, δι' ἧς τὰ διαλύματα λαμβάνουν φαιδὸν χρῶμα· φαίνεται δὲ ὅτι σχηματίζεται καὶ μικρὰ ποσότης ὀξικοῦ ὀξέος.

Ἡ βαρεῖα, ἡ στροντιάνη καὶ ἡ τίτανος εἶναι δυσδιάλυτα εἰς τὸ οἶνό-
πνευμα. Τὸ τιτάνιον ὕδωρ θολοῦται εὐθὺς διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος, μετὰ δὲ
 $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας καθιζάνουν κρύσταλλοι. Ἡ ἀρτικεκαυμένη βαρεῖα τεθεῖσα
εἰς λείψυδρον οἶνόπνευμα διαχέεται ὡς λεπτή κόνις.

Τὸ οἶνόπνευμα διαλύει ὅλα τὰ εἰς τὸν ἀέρα διυγραινόμενα ἄλατα, ἐξαι-
ρουμένου τοῦ ὑπανθρακικοῦ καλίου, πρὸς δὲ καὶ πολλὰς ἄλλας μὴ διυγραι-
νομένας ἐνώσεις τῶν ἀλκαλίων καὶ ἀλκαλοειδῶν γαιῶν μετὰ τοῦ θείου.

Ὁ Κ. Graham νομίζει ὅτι δύνανται νὰ κατασκευασθῶσι χημικαὶ ἐνώ-
σεις μὲ ὀρισμένας ἀναλογίας συνιστάμεναι ἐκ λειψύδρων ἀλάτων καὶ οἶ-
νοπνεύματος. Ἐπὶ τοῦτο ἐξήτμησεν λείψυδρά τινα ἄλατα π. χ. τὴν ἀλι-
κὴν τίτανον, τὴν νιτρικὴν μαγνησίαν, τὸν ἀλικὸν ψευδάργυρον κτλ. διαλε-
λυμένα εἰς οἶνόπνευμα 0,796 εἰδικῆς βαρύτητος· τὰς ἐνώσεις ταύτας, τῶν
ὁποίων τινὲς κρυσταλλοῦνται εἰς κανονικὰ σχήματα, πέταλα, ἢ εἰς λεπί-
δας μαργαριτοειδεῖς τὴν στιλπνότητα, ὀνομάζει Alcohولات. Τὸ οἶνόπνευ-
μα διαλύει καὶ φυτικὰς καὶ ὀργανικὰς οὐσίας, οἷον λιπαρά τινα ἔλαια, τὰ
αιθέρια ἔλαια, τὴν καφουράν, τὰς ῥητίνας, πολλὰς φυτικὰς ἀλκχλοειδεῖς
βάσεις καὶ φυτικὰ ὀξέα κτλ.

Τὸ λείψυδρον οἶνόπνευμα σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	2 ατ.	12 — 52,18
Ὑδρογόνου	3 ατ.	3 — 13,04
Ὄξυγόνου	1 ατ.	8 — 34,78
		23 — 100,

Ἡ χρῆσις τοῦ οἶνοπνεύματος κατ' ἐξοχὴν τοῦ κεκραμένου μὲ ὕδωρ
εἶναι πολυειδεστάτη· ὡς ποτὸν, πρὸς κατασκευὴν τῶν διαφόρων οἶνοπνευ-
ματωδῶν ποτῶν Liqueures, πρὸς τὴν τῶν διαφόρων εἰς τὴν ἱατρικὴν εὐ-
χρήστων θαμμάτων Tincturae, Essentiae, πρὸς καῦσιν, πρὸς κατασκευὴν
τῶν γανωμάτων, καὶ τῶν διαφόρων εἰδῶν τῶν αἰθέρων, πρὸς φύλαξιν
φυτικῶν καὶ ζωικῶν ὑλῶν ὑποκειμένων εἰς σῆψιν κτλ.

*Περὶ μεταβολῆς τοῦ οἶνοπνεύματος ὑπὸ τῆς ἐπιρροῆς σωμάτων
μεταδιδόντων πρὸς αὐτὸ τὸ ὀξυγόνον των.*

Ἐὰν τὸ οἶνόπνευμα θερμυνθῇ μὲ σώματα μεταδίδοντα εὐκόλως τὸ ὀξυ-

γόνον των λ. χ. με χλωρικά αλατα, με το υπεροξειδίου του μαγγανησίου, με μίγματα εκ χρωμικού καλίου και θειικού οξέος, με χρωμικών νιτροδαλικόν οξύ κτλ, υπόκειται εις οξειδωσιν. Το οξυγόνον ενεργεί επί του οινόπνεύματος ούτως, ώστε αφαιρεί απ' αυτό 4 άτομα υδρογόνου και σχηματίζει υδωρ· επιμένει λοιπόν εκ του αφυδρογονωμένου οινόπνεύματος σώμα ιδιαίτερον, καλούμενον Aldehyd, λέξις παραχθείσα εκ των αρχαίων στοιχείων του Alkohol και dehydrogenatus. Αφού προχωρήσῃ ἡ οξειδωσις, είνονται 2 άτομα οξυγόνου μετὰ τοῦ νέου σώματος τοῦ Aldehyd, καὶ οὕτω προάγεται τὸ ὑδατομιγρὸς οξικόν οξύ.

Τὸ Aldehyd γεννᾶται καὶ διὰ πολλῶν ἄλλων μέσων, λ. χ. ἐὰν οἱ τοῦ αἰθέρος ἄτμοι διοχετευθῶσι διὰ πεπυρωμένου σωλῆνος· ὁ καλῆτερος ὁμῶς τρόπος τῆς κατασκευῆς ταύτης τῆς ὕλης εἶναι ὁ ἐξῆς. Τέσσερα μέρη λειψύδρου οινόπνεύματος, 6 θειικοῦ οξέος κακαραμένου με 4 ὕδατος καὶ 6 μέρη οξειδίου τοῦ μαγγανησίου διὰ πρῶτον πυρὸς ἀναμιγνύμενα υποβάλλονται εἰς ἀπόσταξιν ἐντὸς καταλλήλου ἀποστακτικοῦ σκεύους, τοῦ ὁποῖου οἱ ἄρμοι ὁμοῦ με τὸ προσκολληθὲν δοχεῖον καλῶς κλείονται. Αφού ἀποσταχθῶσιν 6 μέρη τοῦ μίγματος, πρέπει νὰ διακοπῇ ἡ ἐργασία τὸ δὲ ἀποτελούμενον στάλαγμα ἀναμιγνύεται με ἴσην ποσότητα ἐγγλωρίου τιτάνου καὶ υποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν, μεχρισοῦ ἀποσταχθῶσι 3 μέρη, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποσταλάζονται, προστεθείσης νέας ποσότητος ἐγγλωρίου τιτάνου, $1 \frac{1}{2}$ μέρος· τοῦτο τὸ στάλαγμα θεωρεῖται ὡς καθαρὸν Aldehyd.

Εἶναι δὲ ρευστὸν διαυγές, ἄχρουν, ιδιαίτερας ὀσμῆς καὶ γεύσεως· εἰσπνεύμενος ὁ ἀτμός του διεγείρει σπασμὸν τῶν τοῦ στήθους μυῶν. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης του εἶναι 0,790, διαλύεται ἀπὸ τὸ οινόπνευμα καὶ ἀπὸ τὸν αἰθέρα, δύναται νὰ ἀναφλεχθῇ καὶ καίει μετ' ἀσθενοῦς φλογός· ἐκτεθὲν δὲ εἰς τὸν ἀέρα ἀπορρόφᾷ οξυγόνον καὶ μεταβάλλεται εἰς οξικόν οξύ ἄκρατον, καὶ τοῦτο μάλιστα γίνεται, ἐὰν συναφθῇ με σπόγγον εκ λευκοχρόσου· μελανίζεται ἀπὸ τὸ θειικόν οξύ καὶ οξειδοῦται ἀπὸ τὸ νιτρικόν, ἐκλύον νιτροῶδες οξύ καὶ σχηματίζον οξικόν οξύ. Διὰ τοῦ ὑδρομιγρῶς καλίου ἀποσυντίθεται τὸ ρευστὸν, θολοῦται καὶ θερμικινόμενον ἀποβάλλει ῥητινώδη ὕλην, ῥητίνην τοῦ Aldehyd καλουμένην. Ἐνίοτε υπόκειται εἰς αὐτόματον ἀλλοίωσιν. καὶ ἐγκλειόμενον εἰς φιάλας πῆγνυται πρὸς κρυσταλλώδη μάζαν, ἥτις δύναται νὰ ἐξαχνισθῇ εἰς εἶδος ἀγκιδίων.

Τὸ Aldehyd συνίσταται ἐξ:

Άνθρακος	54,711
Υδρογόνου	7,991
Οξυγόνου	36,198

Εάν εκ τῶν στοιχείων τοῦ Aldehyd ἀποχωρισθῇ ἐν ἄτομον ὕδατος, ἐπιμένουσι 4 ἄτομα ἄνθρακος, 6 ὑδρογόνου καὶ 2 ὀξυγόνου, δηλαδὴ ἰδιαι-
τερον σῶμα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ βάση τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, λεγόμενον Acetyl
ἢ ὑποξικὸν ὀξύ. Ἡ βάση αὕτη ἐνοῦται μετὰ διχοφόρων στοιχείων, ὡς μετὰ
τοῦ ἰωδίου, βρωμίου, χλωρίου, ὀξυγόνου· ἐνουμένη μετὰ τοῦ ὀξυγόνου
σχηματίζει τρία ὀξέα τὸ ὑποξικόν, τὸ ὑποξικὸν καὶ τὸ ὀξικὸν ὀξύ.
Συνίσταται ἐξ

Άνθρακος	89,90
Υδρογόνου	10,90

Περὶ τοῦ λυχνικοῦ ὀξέος.

Εάν ἡ θρυαλλὶς λύχνου τινὸς, αἰθέρα ἢ οἰνόπνευμα ἐμπεριέχοντος, περι-
βληθῇ μὲ ἐλικοειδὲς σύρμα ἐκ λευκοχρύσου, καὶ ἐάν τὸ σύρμα τοῦτο πυ-
ρωθῇ, χωρὶς ὅμως νὰ ἀναφλεθῇ, τὸ οἰνόπνευμα ἢ ὁ αἰθὴρ ἐξακολουθεῖ ἐπὶ
τῆς ἐπιφανείας του νὰ καίῃ. Ὁ λύχνος οὗτος καλεῖται ἐκ τοῦ ἐφευρετοῦ
διάλυρος λύχνος τοῦ Davy.

Εάν τὰ διὰ τῆς καύσεως προαγόμενα διὰ τινος συσκευῆς ἐπιπυκνωθῶσι
καὶ συναχθῶσιν, ἀπολαμβάνεται ὀξινὸν ῥευστὸν ἐμπεριέχον ἐκτὸς τοῦ λυ-
χνικοῦ ὀξέος ὀξικὸν καὶ μυρμηκικὸν ὀξύ, ὀξικὸν αἰθυλοξειδίου, οὐδέτερον
καὶ βασικὸν Aldehyd, οἰνόπνευμα καὶ αἰθέρα. Εάν τοῦτο τὸ ῥευστὸν ἐξα-
τμισθῇ διὰ πρῶτάτου πυρὸς πρὸς ἔκλυσιν τοῦ αἰθέρος καὶ οἰνοπνεύματος,
ὑπολείπεται τὸ λυχνικὸν ὀξύ, τοῦ ὁποίου τὸ κυριώτερον χαρακτηριστικὸν
εἶναι, ὅτι ἀποκατασταίνει τὰ διάφορα ὀξειδία τῶν μετάλλων μετὰ μεγί-
στης ταχύτητος. Τὸ διάλυμα τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου λευκοχρύσου
ἀποσυντίθεται μὲ τόσῃν δυνάμειν ἔκλυσιν τῶν ἀερίων, ὥστε τὸ ῥευστὸν
ἐξογκοῦται πολὺ· ὡσαύτως ἀποκαθίστανται τὰ τοῦ ἀργύρου, τοῦ χρυσοῦ
καὶ τοῦ ὑδραργύρου ἅλατα, καὶ συναπτόμενόν μετὰ τοῦ ὀξειδωμένου μαγ-
γανησίου ἐκλύεται ἀνθρακικὸν ὀξύ. Διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ λυχνικοῦ ὀξέος
τούτου μετὰ τῶν βάσεων προάγονται τὰ λυχνικὰ ἅλατα.

Περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς τοῦ

οἰνοπνεύματος ἀποσυνθέσεως

Τὸ οἰνόπνευμα ὑπόκειται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τινῶν σωμάτων εἰς μεταβολὰς ὡς πρὸς τὴν σύνθεσίν του, καὶ οὕτω ἀποτελοῦνται νέαι ἐνώσεις, αἵτινες ἔχουσιν ὅχι μόνον μεγάλην ἐπιστημονικὴν ἀξίαν, ἀλλὰ καὶ ἐκτεταμένην χρῆσιν. Διὰ τῶν ὀξέων μεταβάλλεται εἰς αἰθέρα· τὸ ποτάσιον ἢ σόδιον προάγουσιν ἐκ τοῦ οἰνοπνεύματος πτητικὰ, ὅχι δὲ αἰθέρια βευστά· διὰ τῆς τῶν ἀλκαλίων καὶ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς μεταβάλλεται εἰς ὀξικόν, μυρμηκικόν ὀξύ καὶ εἰς ῥητινώδη τινὰ ὕλην· διὰ τῆς ὀξειδώσεως μεταβάλλεται κατὰ τὰς διαφόρους περιστάσεις εἰς ὀξικόν ἢ μυρμηκικόν ὀξύ, ἢ καὶ εἰς ἰδιαίτερον πτητικὸν σῶμα, τὸ Aldehyd. Διὰ τῆς τῶν ἀλατογόνων θάσεων ἐπιρροῆς γεννῶνται ἐκτὸς τῶν προρρήθεις καὶ ἄλλα, ἐνώσεις, καὶ τέλος δύναται ν' ἀναπληρωθῇ τὸ ἐν τῷ οἰνοπνεύματι ὀξυγόνον διὰ θείου, δι' οὗ ἀποτελεῖται τὸ λεγόμενον Mercaptan. Περὶ τούτων πραγματευόμεθα ἐνταῦθα.

Αἰθήρ διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος. Ather Sulphuricus.

Τὸ οἰνόπνευμα δύναται νὰ μεταβληθῇ εἰς αἰθέρα εὐκόλως διὰ τοῦ θειικοῦ, δυσκολώτερα δὲ διὰ φωσφορικοῦ, ἀρσενικοῦ, φθορικοῦ καὶ βορικοῦ ὀξέος. Τὰ διὰ τῶν ὀξέων τούτων σχηματιζόμενα εἶδη αἰθέρος ὁμοιάζουσιν ὡς πρὸς τὰ χαρακτηριστικὰ των μετὰ τοῦ θειικοῦ αἰθέρος καὶ ὅτι ἀναφέρομεν περὶ ἐκείνου, δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ ἐπὶ τοῦ φωσφορικοῦ καὶ ἀρσενικοῦ αἰθέρος.

Ὁ θειικὸς αἰθὴρ ἐκατασκευάσθη πρῶτον πρὸς τοῦ Valerius Cordus κατὰ τὸ 1540, ἔτος καὶ πρὸς κατασκευὴν του πράττομεν ὡς ἐφεξῆς.

1.) Οἰνοπνεύματος μέρη 6 ἀναμιγνύονται κατ' ὀλίγον μὲ ἴσην ποσότητα θειικοῦ ὀξέος ἀγοραίου. Ἀφοῦ ψυχρυνθῇ παντάπασιν τὸ μίγμα χύνεται εἰς κερατινὴν ἀμμοχωμένην, εἰς ἣν προσηρμόσθη ἀκριβῶς δοχεῖον εὐρύ, ζεομένου δὲ ἡσύχως τοῦ ὑγροῦ καὶ ψυχραινόμενου πάντοτε τοῦ τὸ ποσοῦ δοχείου διὰ χιόνος ἢ διὰ σταζομένου ὕδατος, ἀποστάζονται τὰ $\frac{3}{4}$. Ἐπὶ τοῦ ὑπολείμματος ψυχρυνθέντος ἐπιχύνονται οἰνοπνεύματος μέρη τρία συγκρασθέντα μὲ $\frac{3}{4}$ θειικοῦ ὀξέος ἀγοραίου· ἀκολούθως ἀποσάζεται ἐκ νέου, ἑωσὺ ληφθῇ ἴσον ποσὸν τοῦ δαπανηθέντος οἰνοπνεύματος, καὶ ἡ πράξις αὕτη δύνα-

ται νά ἐπαναληφθῇ δις καὶ τρίς, προσθετομένης πάντοτε τῆς αὐτῆς ποσότητος οἰνοπνεύματος καὶ θειικοῦ ὀξέος.

2) Εἰς εἴκοσι μέρη τοῦ ληφθέντος ἀποστάγματος προστίθεται ἐν μέρος τιτανίου ὕδατος καὶ τὸ μίγμα ἀφίεται δύο ἡμέρας εἰς ἀγγεῖον κλεισμένον ἀνακινούμενον συνεχῶς· ἀποχωρίζεται ἔπειτα ὁ ἐπιπλέων αἰθήρ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ ὑγρὸν, καὶ ἀποστάζεται εἰς υελίνην κερατίνην, ἐνὸς ὧ ἐξέρχεται καθαρὸς καὶ ἔχων 0,750 — 0,760 εἰδικὴν βαρύτητα. Ὁ οὕτω ληφθεὶς αἰθήρ εἶναι υελοειδής, ἐξατμίζεται ἐξ ὀλοκλήρου, διαλύεται εἰς 10 μέρη ἀπεσταλαγμένου ὕδατος καὶ ἔχει ὁσμὴν πολὺ διαπεραστικὴν καὶ ὄχι θειώδη. Οἱ ἀτμοὶ τοῦ αἰθέρος ἀναμιγνύμενοι μετὰ τοῦ ὀξυγόνου ἀναφλέγονται διὰ τοῦ ἡλεκτρικοῦ σπινθήρος διερχόμενοι δὲ διὰ πεφυρωμένων πηλίνων σιφώνων ἀποσυντίθενται εἰς ὀξειδίου τοῦ ἀνθρακὸς καὶ ὕδρογονοανθρακοῦχον ἀέριον. Μετὰ τοῦ οἰνοπνεύματος ἀναμιγνύεται ὁ αἰθήρ εἰς πάσας τὰς ἀνλογίας καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ μίγματος δύναται νά ἀποχωρισθῇ ἐν μέρει προστεθεμένου ὕδατος ὁ αἰθήρ· ἐκ τῆς συμμιξεως ἐνὸς μέρους αἰθέρος μετὰ δύο ἢ τριῶν μερῶν οἰνοπνεύματος ἀποτελεῖται ῥευστὸν καλούμενον ἀνώδυνον ῥευστὸν τοῦ Ὀφμάνου ἢ κάλλιον αἰθήρ διὰ θειικοῦ ὀξέος καὶ οἰνοπνεύματος *Liquor anodynus mineralis Hoffmami*.

Ἐνωσις ἐξ ἴσης ποσότητος αἰθέρος καὶ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου μελανίζεται, καὶ θερμανθεῖσα, σχηματίζεται ὀξικὸν ὀξύ, οἰνέλαιον, ἀνθρακικὸν ὀξύ ὕδρογονοανθρακοῦχον ἀέριον καὶ ὕδωρ, ἡ δὲ ῥητινώδης ἀνθρακοῦχος ὕλη ἐπιμένει.

Ὁ αἰθήρ εἶναι ἀξιώλογον διαλυτικὸν μέσον διὰ πολλὰς ὕλας· $\frac{1}{30}$ π. χ. φωσφόρου διαλύεται παρ' αὐτοῦ καὶ τὸ διάλυμα τοῦτο φέγγει εἰς τὸ σκότος καὶ ἐκτεθὲν εἰς τὸν ἀέρα ὀξινίζει, τὸ διάλυμα τοῦτο θολοῦται διὰ τοῦ ὕδατος καὶ ἰδίως διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος. Ἐὰν δὲ σταχθῇ ἐπὶ ζέοντος ὕδατος, ἀναφλέγεται τὸ διάλυμα. Ὀλίγη ποσότης θείου διαλύεται ἐπίσης εἰς τὸν αἰθέρα πρὸς ἄχρουν ῥευστὸν, τὸ ὅποιον ἐκπέμπει ὁσμὴν ὁμίαν τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου· τὸ διάλυμα τοῦτο δὲν θολοῦται διὰ τοῦ ὕδατος καὶ μελανίζει τὰ διαλύματα μολυβδούχων ἀλάτων.

Τὸ ἰώδες διαλύεται διὰ τοῦ αἰθέρος πρὸς φαῖόν τι ῥευστὸν καθὼς καὶ τὸ θρώμιον· τὸ δὲ διάλυμα μετὰ τινὰς ἡμέρας ἀποβάλλει τὸ χρομὰ του, σχηματιζομένου ὑδροθρωμικοῦ ὀξέος καὶ ἐμβρωμίου αἰθέρος.

Ἐὰν ἀναμμένος αἰθήρ τεθῇ ὑπὸ δαχτυλίου πληρὸς χλωρίου, ἐξακλουθεῖ μὲν νά καίη, ἀλλ' ἀποθέτει ἀρκετὸν ποτὸν ἀνθρακός. Ἐπὶ τῶν ἀλκαλικῶν γαιῶν δὲν δεικνύει οὐδεμίαν ἐνέργειαν, διαλύει δὲ μόνον ὀλίγην ποσότητα καυστικῆς ποτάσης, τὴν δὲ ἀμμωνίαν ἀπορρόφᾷ εἰς ἀρκετὴν ποσότητα.

Ὁ αἰθήρ διαλύει διάφορα ἅλατα, ὡς τὰ ἐγγλῶρια ἅλατα τοῦ σιδήρου, τοῦ χρυσοῦ, τοῦ οὐρανίου, καὶ τὰ διαλύματά των ἀποκαθίστανται ἢ ἐν μέρει, ἢ ἐξ ὁλοκλήρου διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἡλίου· τὸ διάλυμα τοῦ οὐρανίου εἰς τὸν ἡλίον ἐκτιθέμενον πρασινίζει. Τὸ διάλυμα τοῦ ἀλικοῦ σιδήρου εἰς τὸν αἰθέρα ἀναμιγνύμενον με οἰνόπνευμα καὶ γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Tinctura nervino tonica Bestuschefij*, εἶναι χρυσίζον, γίνεται δὲ ἄχρουν διὰ τοῦ ἡλίου. Ὁ ἀλικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος διαλύεται εἰς μεγάλην ποσότητα εἰς τὸν αἰθέρα, καὶ ἐὰν τὸ διάλυμα ἐντὸς κλεισμένων ἀγγείων ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ἀποσυντίθεται μέρος τοῦ ἀλικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου καὶ σχηματίζεται ἀλικὸς ὑποὀξειδωμένος ὑδράργυρος.

Ὁ αἰθήρ διαλύει λιπαρὰ καὶ πτητικὰ ἔλαια καθὼς καὶ τινὰς ῥητίνας, τὴν καφουράν, καὶ τινὰ κόμμεα κτλ.

Ὁ αἰθήρ σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακος	4 ατ. — 65,31
Ἵδρογόνου	10 ατ. — 13,33
Ὄξυγόνου	1 ατ. — 21,36

100

Ὁ σχηματισμὸς τοῦ αἰθέρος ἐξηγείται ὡς ἑφεξῆς. Ἐὰν θεϊκὸν ὀξύ ἄκρατον ἀναμιχθῇ με οἰνόπνευμα, σχηματίζεται ἀφ' ἑνὸς μέρους ὑδρομιγρὲς θεϊκὸν ὀξύ, ἀφ' ἑτέρου οἰνοθεϊκὸν ὀξύ. Ἐὰν τὸ μίγμα θερμανθῇ μέχρι ζέσεως, προάγεται διὰ τῆς τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ οἰνοπνεύματος καταλυτικῆς ἐνεργείας ὁ αἰθήρ. Ἀφοῦ ἀποσταχθῇ ὁ αἰθήρ οὗτος, αὐξάνει ἡ θερμοκρασία τοῦ μίγματος καὶ τὸ ἐξ αἰθέρος καὶ θεϊκοῦ ὀξέος συγκεείμενον οἰνοθεϊκὸν ὀξύ ἀρχεται νὰ ἀποβάλλῃ τὸν αἰθέρα, ὅστις ἐκτεθεὶς εἰς τὴν συνεχῇ ἐπιρροὴν τῆς καταλυτικῆς δυνάμεως τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀποσυντίθεται εἰς ἰδιαιτέρον τι ἔλαιον καλούμενον οἰνέλαιον καὶ ὕδωρ. Ἐκτὸς τῶν ἐκτεθεισῶν γίνονται καὶ ἄλλαι ἀποσυνθέσεις· μέρος τοῦ σχηματισθέντος οἰνελαιίου χάνει μέρος τοῦ ὑδρογόνου του, τὸ ὁποῖον ὀξειδοῦται διὰ τοῦ ὀξυγόνου τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος. Πρὸς τούτοις σχηματίζεται εἰς τὸ μίγμα μέλαν καὶ ἔμμονόν τι σῶμα διαλυόμενον ὑπὸ τοῦ ὀξέος καὶ καταβυθίζομενον ἐξ αὐτοῦ δι' ὕδατος. Τοῦτο τὸ μέλαν σῶμα ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος καὶ ἕτερον νεωστὶ ἀνακαλυφθὲν ὀξύ, τὸ ὁποῖον ἐκαλέσθη θειομελανικὸν ὀξύ *Acidum Thiomelanicum*. Κατὰ τὰς τερεὶ τοῦ αἰθέρος ἀνα-

ριθμήτους δοκιμάς και πολυχρονίους εργασίας τῶν περιφημοτέρων χημικῶν ἐπαρθέχθησαν εἰς τὸν αἰθέρα και βάσιν δυναμένην νὰ ἐνωθῇ μετὰ τῶν διαφόρων ὀξέων πρὸς ἀλατosiδεῖς ἐνώσεις. Τὴν βάσιν ταύτην συνιστάμενην ἐξ ἀνθρακος και ὑδρογόνου καλοῦσιν *Aethyl* ἐκ τοῦ *αἰθῆρ* και *ὑλῆ* και ἐκ τῆς ἐνώσεως ταύτης μετὰ τοῦ ὀξυγόνου προάγεται τὸ *Aethyl oxyd αἰθυλοξειδιον*.

Τὸ *αἰθυλοξειδιον* ἐνοῦται μετὰ τῶν διαφόρων ὀξέων πρὸς παραγωγὴν οὐδετέρων και ὀξινῶν ἐνώσεων· οὕτω π. χ. τὸ τρυγικὸν αἰθυλοξειδιον σύγκειται ἐξ ἐνὸς ἀτόμου τρυγικοῦ αἰθυλοξειδίου και ὕδατος. Ἀντὶ τοῦ ὕδατος δύναται νὰ ἐνωθῇ ἴση ποσότης βάσεώς τινος και οὕτως ἀποτελοῦνται διπλᾶ ἄλατα.

Αἱ οὐδέτεραι ἐνώσεις τοῦ αἰθυλοξειδίου μετὰ τῶν ὀξέων εἶναι εἰς συνήθη θερμοκρασίαν ῥευσταί, ἔχουσιν ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ αἰθέρος και ὑπόγλυκον γεῦσιν· τινὲς ἐξ αὐτῶν εἶναι κρυσταλλώσιμοι. Διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως π. χ. θεϊκοῦ αἰθυλοξειδίου διὰ διαλύματος ἁλτός τινος τῆς ὕδροχλωρικῆς βαρείας ἀποτελεῖται ἐνώσις τοῦ θεϊκοῦ αἰθυλοξειδίου μετὰ τῆς βαρείας κτλ. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ οἰνοθεϊκοῦ ὀξέος προάγεται τὸ οἰνέλαιον, τὸ ὁποῖον συνίσταται ἐκ δύο ὑλῶν· ἓάν τὸ ληφθῇ ἐλακίον τεθῇ εἰς κατὰλληλὸν φιάλην διὰ τινὰς ἡμέρας και ἐκτεθῇ εἰς ψῦχος, σχηματίζονται κρύσταλλοι διαφανεῖς, λαμπρίζοντες, ἄχυμοι, οἵτινες θερμαινόμενοι ἐκλύουσιν ἀρωματικὴν ὁσμὴν· οἱ κρύσταλλοι ἀνήκουσιν εἰς ὕλην ἰδιαιτέραν καλουμένην *Aetherol*, τὸ δὲ εἰς ῥευστὴν κατάστασιν ἐπιμένον μέρος λέγεται *Aetherin*.

Ἔτερον ὀξύ προαγόμενον διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ οἰνοπνεύματος εἶναι τὸ *αἰθιονικόν* ὀξύ, τὸ ὁποῖον γεννᾶται, ἓάν τὸ ἄκρατον θεϊκόν ὀξύ συναρθῇ μετὰ οἰνοπνεύματος λειψύδρου. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν διοχετεύονται δι' οἰνοπνεύματος, ὅσον ἐνεστὶ διὰ πάγους και ἁλτός ἀποψυχρανθέντος, ἄτμοι ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος, μεχριστοῦ τὸ οἰνόπνευμα μεταβληθῇ εἰς κιτρινωπὸν ἐλαϊώδες ῥευστόν.

Οἱ εἰς τὸ ῥευστόν τοῦτο σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι εἶναι τὸ *αἰθιονικόν* ὀξύ και θεωροῦνται ὡς χημικὴ ἐνώσις τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ ὑδρογονανθρακούχου ἀερίου. Μετὰ τῶν διαφόρων βάσεων προάγονται τὰ *αἰθιονικά* ἄλατα.

Ἐκ τῆς ἐνώσεως τοῦ αἰθυλοξειδίου μετὰ τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος ἀπολαμβάνεται ὁ φωσφορικὸς αἰθῆρ, ἢ τὸ φωσφορικόν *αἰθυλοξειδιον*.

Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἀναμιγνύεται φωσφορικόν ὀξύ σύστασιν στρα-

πίου ἔχον μὲ ἴσην ποσότητα οἰνοπνεύματος λειψύδρου. Τὸ μίγμα θερμαίνεται ἀφ' αὐτοῦ μέχρις 70—80°R. Μετὰ τὴν ἀπόψυξιν συγκερνᾶται τὸ μίγμα μὲ 7 πλάσιον ὕδωρ καὶ κορέννεται δι' ὑπανθρακικῆς βαρείας, καὶ τὸ διάλυμα ζέεται πρὸς ἔκλυτιν τοῦ ἐλευθέρου οἰνοπνεύματος. Μετὰ τὴν ἐντελῇ ἀποψύχρανσιν κρυσταλλοῦται ἡ αἰθεροφωσφορικὴ βαρεία, ἐξ ἧς τὸ αἰθεροφωσφορικὸν ὀξὺ δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ διὰ θειικοῦ ὀξέος. Κατὰ τὸν ἐκτεθέντα τρόπον προάγεται καὶ ὁ ἀρσενικὸς αἰθήρ.

Ἐάν καθαρὸν καὶ πάντῃ λειψύδρον κάλιον διαλυθῇ εἰς λειψύδρον οἰνόπνευμα καὶ δι' αὐτοῦ εἰς πολλὰ ψυχρὰν κατάστασιν ὄντος διοχετευθῇ ἀνθρακικὸν ἀέριον, ἀποτίθεται μετὰ τινα καιρὸν εἰς τὸν πυθμένα λευκὴ κόνις, συνισταμένη ἐξ ἀνθρακικοῦ καὶ αἰθρ-ανθρακικοῦ καλίου. Τὸ δι' αἰθέρος ἀποπλυνθὲν καταβύθισμα κατεργάζεται δι' οἰνοπνεύματος λειψύδρου, δι' οὗ διαλύεται τὸ αἰθρ-ανθρακικὸν κάλιον καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλύματος ἀποχωρίζεται εἰς εἶδος μαργαριτοειδῶς λαμπριζόντων κρυστάλλων διὰ τοῦ αἰθέρος.

Τὸ ῥηθὲν ἄλλας εἶναι λευκὸν, καίει μετὰ φλογός, ἐὰν ῥιφθῇ ἐπὶ ἐλάσμα-τος λευκοχρύσου, ἐπιμένοντος ἀνθρακώδους ὑπολείμματος. Διὰ τῆς συνάψεως τοῦ ἄλλαντος τούτου μεθ' ὕδατος καὶ οἰνοπνεύματος ἀποσυντίθεται εἰς οἰνόπνευμα καὶ εἰς ἀνθρακικὸν κάλιον.

Νιτρικὸν αἰθυλοξειδίον.

Τὸ ὑπονιτρῶδες αἰθυλοξειδίον λέγεται συνήθως νιτρικὸς αἰθήρ Aether nitricus. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ οἰνοπνεύματος γίνεται ἐντελής ἀποσύνθεσις, δι' ἧς προάγεται ἀνθρακικὸν ὀξὺ καὶ ὕδωρ, καὶ τὸ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος προαγόμενον νιτρῶδες ὀξὺ ἐνοῦται μετὰ τοῦ αἰθυλοξειδίου. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ αἰθέρος τούτου ἀποστάζεται μίγμα ἐξ ἴσης ποσότητος νιτρικοῦ ὀξέος καὶ οἰνοπνεύματος εἰς κερατίνην δίστομον ἀμμοχωμένην, εἰς ἣν προσαρμόζεται εὐρὺ δοχεῖον. Τὸ ληφθὲν νάρθη ἀποσταλάζεται ἐκ δευτέρου, ἀφοῦ πρότερον ἀνακινήθῃ μὲ ἴσην ποσότητα ὕδατος, εἰς τὸ ὅποιον ἐδιαλύθη ποσότης μηχανητικῆς πρὸς ἐξουδετέρωσιν τοῦ ἐλευθέρως μετὰ τοῦ νάρθη ἀναμιγνυμένου ὀξέος, ἀκολούθως ἀναποσταλάζεται ἐπὶ ὑδροχλωρικῆς τιτάνου.

Ἐάν μίγμα ἐξ ἑνὸς νιτρικοῦ ὀξέος καὶ 6 οἰνοπνεύματος ἀποσταχθῇ, λαμβάνεται ῥευστὸν καλούμενον Spiritus Nitri dulcis καὶ χρήσιμον εἰς τὴν ἱατρικάν.

Χαρακτηριστικά. Είναι ρευστόν ὑπόχρουν, ἔχει ἰδιαιτέραν διαπεραστικὴν ὁσμὴν καὶ ὑπόγλυκον γεῦσιν, εἶναι 0,836 εἰδικῆς βαρύτητος, ζεεὶ εἰς τὴν 21° R τεθὲν εἰς ἀγγεῖα πλήρη ἀέρος, ἢ ἀνατραχθὲν μετὰ πολλοῦ ὕδατος, ξινίζει τάχιστα, εἶναι εὐανάφλεκτον καὶ καίει μετὰ λευκῆς φλογός, ἐνῶ ἐλευθεριῦται τὸ νιτρικὸν ὀξύ.

Ἐν οἱ ἀτμοὶ τοῦ διέλθωσι διὰ πυρωμένου πορφυροῦ σίφωνος, ἀποτίθεται ἀνθραξ, εἰς δὲ τὸν σωλῆνα σχηματίζεται ἔλαιον φαιὸν καὶ ρευστὸν ἐμπεριέχον ὑδροκυανικὸν ὀξύ, ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν καὶ ὀλίγον ποσὸν ἔλαιου φαιοῦ· τὰ σχηματιζόμενα ἀέρια εἶναι ἀνθρακικὸν ἀέριον, νιτρογό-
νον, νιτρογονοξειδίου, ὀξειδίου τοῦ ἀνθρακίου καὶ ὑδρογονοανθρακοῦχον ἀέριον. Ἐν τὸ διὰ νιτρικοῦ ὀξέος νάσθῃ ἀνακινήθῃ μετὰ διαλύματος ποτάσσης, σχηματίζεται ὑπονιτρώδης πότασσα καὶ ὀξικὴ πότασσα, πρὸς τούτοις δὲ ἐκλύεται νιτρογονοξειδίου.

Εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ νιτρικοῦ αἰθυλοξειδίου μεταβάλλεται μέρος οἰνοπνεύματος διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς νιτρώδες ὀξύ, δι' οὗ γεννᾶται ἀνθρακικὸν ὀξύ· τὸ τοιουτοτρόπως γεννώμενον διττοῦδρογονοανθρακοῦχον ἀέριον ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὑπονιτρώδους ὀξέος πρὸς νιτρικὸν αἰθέρα. Διὰ συνεχούς θερμάνσεως τοῦ εἰς τὴν κερατίνην ἐπιμένοντος ρευστοῦ ἀποσυντίθεται ἀκόμη περισσότερον τὸ ὑπονιτρώδες ὀξύ, καὶ τοιουτοτρόπως σχηματίζονται μηλικὸν καὶ ὀξικὸν ὀξύ καὶ ὀλίγον ποσὸν ὀξαλικοῦ ὀξέος.

Χλωραιθύλιον ἢ Αἰθήρ διὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Aether muriaticus.

Ὁ ὑδροχλωρικὸς αἰθήρ κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, καθὼς καὶ ὁ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος· ἔχουν διὰ τῆς ἀποστάξεως μίγματος συνισταμένου ἐξ ἴσης ποσότητος ἀλικοῦ ὀξέος ἀκράτου καὶ οἰνοπνεύματος. Τὸ ἀποστάλαγμα ἀποστάζεται ἐκ δευτέρου, ἀφοῦ ἀναταραχθῇ μετὰ μαγνησίας κεκαυμένης πρὸς ἀπορρόφησιν τοῦ ἐλευθεροῦ ὀξέος.

Εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ αἰθέρος ἐνεργεῖ τὸ ἀλικὸν ὀξύ ἐπὶ τῶν στοιχείων τοῦ οἰνοπνεύματος καὶ μεταβάλλει αὐτὸ εἰς αἰθύλιον, τὸ ὁποῖον ἐνούμενον μὲ μέρος ἀλικοῦ τινος ὀξέος σχηματίζει τὸ *χλωραιθύλιον*, *Chloroethyl*.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι ἄχρουν ρευστὸν, διαπεραστικῆς ὁσμῆς καὶ γλυκείας ἀρωματικῆς γεύσεως, 0,874 εἰδικῆς βαρύτητος, ζεεὶ εἰς θερμοκρασίαν 12° R, δὲν ἐρυθροῖ τὸν κυανοῦν χάρτην τοῦ καγκαμίνου, ἀναμιγνυσου-

μένου δὲ μετὰ τοῦ βάμματος τοῦ καγκαμίνου καὶ ἀναφλεγομένου ἐλευθεροῦται μέρος ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καὶ τὸ βάμμα λαμβάνει ἐρυθρὸν χροῖμα· ὁ ἀτμός τοῦ αἰθέρος καίει μετὰ πρασίνης φλογός καὶ διερχόμενος διὰ διαπύρου πορφυροῦ σωλῆνος ἀποσυντίθεται εἰς ἴσα μέρη ἀλικοῦ ὀξέος καὶ διττοῦδρογονανθρακούχου αέριου.

Ὁ διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος αἰθὴρ διαλύεται εἰς τὸ 50πλάσιον ὕδωρ, ὁ δὲ ἀτμός τοῦ ἀλικοῦ αἰθέρος διαλύεται εἰς ἴσην ποσότητα ὕδατος, καὶ τὸ ὕδωρ λαμβάνει ὁμοίαν τοῦ ἡδύσμου ὁσμὴν. Ὁ νιτρικὸς ἀργυρος καὶ τὸ διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ ὑδραργύρου, ἀναμιγνύμενα μὲ τοῦτον τὸν αἰθέρα, θολοῦνται μετὰ τινὰς ὥρας· ἐὰν δὲ τὸ διάλυμα ἀναφλεχθῇ, σχηματίζοντα, πάραυτα λευκὰ καταβυθίσματα. Ὁ διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος αἰθὴρ διαλύεται εἰς πάσας τὰς ἀναλογίας παρὰ τὸ οἶνοπνεύματος καὶ τὸ διάλυμα τοῦτο μεταχειρίζεται συχνάκις εἰς τὴν ἱατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Spiritus salis dulcis*.

Ὁ διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος αἰθὴρ σύγκειται ἐξ ἴσης ποσότητος ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καὶ αἰθυλοξειδίου.

Ἐρχλώριον αἰθύλιον.

Σχηματίζεται διὰ τῆς ἐπιφόρης τοῦ χλωρίου ἐπὶ τοῦ οἶνοπνεύματος ἢ ἐπὶ τοῦ θεϊκοῦ αἰθέρος, ἢ διὰ τῆς ἀποσάξεως μίγματος ἐκ θεϊκοῦ ὀξέος, οἶνοπνεύματος, ἀλικοῦ νάτρου καὶ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου. Εἰς καθαρὰν κατάστασιν δύναται νὰ κατασκευασθῇ, ἐὰν διοχετευθῇ διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος ἀρκετὸν ποσὸν χλωρίου, καὶ ἐπομένως ἐξουδετερωθὲν διὰ ἀνθρακικῆς τιτάνου ἀποσταχθῇ· ἐκ τοῦ ληφθέντος ἀποστάγματος δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ὁ αἰθὴρ, ἐὰν ἀναταραχθῇ μετὰ τοῦ διπλασίου ἢ τριπλασίου ὕδατος. Δύναται προσέτι νὰ κατασκευασθῇ διὰ τῆς συνάψεως τοῦ χλωρίου μετὰ τοῦ ὑδρογονανθρακούχου αέριου καὶ ἔχει τὰ αὐτὰ μὲ τὸν προῤῥηθέντα αἰθέρα χαρακτηριστικά. Ὁ αἰθὴρ οὗτος εἶναι γνωστὸς ὑπὸ τὸ ὄνομα *ἔλαιον τῶν χημικῶν τῆς Όλάνδας*· τὸ βρευστὸν τοῦτο διαφέρει ἀπὸ τὸν ἀλικὸν αἰθέρα, καθότι εἶναι πτητικώτερον καὶ εὐαναφλεκτότερον, ἀποσυντίθεται δὲ ταχέως διὰ τῶν ἀλκαλίων, καθὼς καὶ διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος.

Καθὼς τὸ χλώριον οὕτως καὶ τὸ βρώμιον, τὸ ἰώδες καὶ τὸ κυάνιον ἐνοῦνται μετὰ τοῦ αἰθυλίου πρὸς προαγωγὴν ἰδιαιτέρων αἰθέρων. Τὸ βρωμαθύλιον π. χ. ἀπολαμβάνεται, ἐὰν φωσφόρου 4 μέρη καὶ οἶνοπνεύματος 40 ἀναμιχθῶσι μὲ 7—8 μέρη βρωμίου. Οὕτω γεννᾶται φωσφοῦδες ὀξύ,

υδροβρωμικὸν ὀξύ καὶ τὸ βρωμαϊθύλιον. Διὰ τῆς προσεκτικῆς ἀποστάξεως ἐξάγεται τὸ βρωμαϊθύλιον. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κατασκευάζεται καὶ τὸ ἰωδαϊθύλιον, Iodaethyl.

Αἰθήρ διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος. Ὁξικὸν αἰθυλοξειδιον.

Aether aceticus.

Ὁ αἰθήρ οὗτος ἀνεκαλύφθη τὸ 1757 ἔτος· ὀλίγη ποσότης αὐτοῦ ἀπαν-
τᾶται εἰς τοὺς οἶνους, καθὼς καὶ εἰς τὸ ὄξος.

Ὁ διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος αἰθήρ δύναται νὰ κατασκευασθῇ διὰ ἐπανηλειμ-
μένης ἀποστάξεως μίγματος συνισταμένου ἐξ ἴσης ποσότητος οἰνοπνεύ-
ματος καὶ ὀξικοῦ ὀξέος ἀκράτου· τὸ λαμβανόμενον ποσὸν εἶναι πολλὰ
ὀλίγον καὶ αὐξάνει, ἐὰν προστεθῇ θεικὸν ὀξύ εἰς τὸ εἰρημένον μίγμα πρὸ
τοῦ νὰ ἀποσταχθῇ. Τὸ θεικὸν ὀξύ χρησιμεύει μόνον διὰ νὰ ἀποκατασταθῇ
ἀκρατώτερον τὸ ὀξικὸν ὀξύ καὶ τὸ οἰνόπνευμα· εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν
τὸ μεταχειριζόμενον θεικὸν ὀξύ δὲν λαμβάνει μέρος εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ
ὀξικοῦ αἰθέρος, μήτε σχηματίζεται παρ' αὐτοῦ θεικὸς αἰθήρ.

Κατασκευάζεται προσέτι ὀξικὸς αἰθήρ, ἐὰν ὀξικοῦ καλλίου μέρη τρία
ἀποσταχθῶσι μετὰ μίγματος συγκειμένου ἐξ ἴσων μερῶν οἰνοπνεύματος
καὶ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου, ὡσαύτως διὰ τῆς ἀποστάξεως μίγματος συν-
ισταμένου ἐκ δέκα μερῶν οἰνοπνεύματος, 11 $\frac{1}{2}$ θειικοῦ ὀξέος καὶ 20
λειοτριβημένου ὀξικοῦ μολύβδου. Τὸ ἀποτελούμενον ἀποστάλαγμα ἀπα-
στάζεται πάλιν ἐπὶ τιτάνου.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι ῥευστὸν διαφανές, 0,850 εἰδικῆς βαρύτητος,
διαπεραστικὸν καὶ οἰωδὲς τὴν ὀσμὴν, καὶ εἰς ἑπτὰ περίπου μέρη ὕδατος
διαλυόμενον, καίει μετὰ ὀχρολεύκου φλογός, ἐλευθερουμένου ὀξικοῦ ὀξέος.
Εἰς τὸ οἰνόπνευμα εἶναι διαλύσιμον εἰς πάσας τὰς ἀναλογίας, καὶ ἐκ τῆς
ἐνώσεως ταύτης σχηματίζεται ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον γνωρίζεται εἰς τὴν ἱατρι-
κὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Liquor anodynus vegetabilis, araroduror* ῥευστὸν
φυτικόν. Ἀναμιγνύμενον μετὰ θειικοῦ ὀξέος καὶ θερμαινόμενον ἀποσυν-
τίθεται εἰς θεικὸν αἶθερα καὶ ὀξικὸν ὀξύ, παρομοίως μεταβάλλεται διὰ
τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς νιτρικὸν αἶθερα καὶ ὀξικὸν ὀξύ.

Ὁ διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος αἰθήρ σύγκειται ἐξ ὀξικοῦ ὀξέος 57,87 καὶ
42,13 αἰθυλοξειδίου, ἢ ἐξ:

Άνθρακος	55,024
Ύδρογόνου	8,983
Οξυγόνου	35,993

100.

Ὁ αἰθήρ οὗτος μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἱατρικὴν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς ὡς πολλὰ ἐνεργητικὸν μέσον.

Μετὰ τοῦ ὀξικοῦ αἰθέρος ἔχει μεγάλην ὁμοιότητα ὁ διὰ τοῦ μυρμηκικοῦ ὀξέος αἰθήρ, *μυρμηκικὸν αἰθύλιον* καλούμενος ὅστις ἀνεκαλύφθη εἰς τὸ 1777 ἔτος παρὰ τοῦ Κ. Afzelius.

Ὁ αἰθήρ οὗτος κατασκευάζεται, ἐὰν μίγμα συνιστάμενον ἐξ ἴσης ποσότητος οἰνοπνεύματος λειψύδρου καὶ μυρμηκικοῦ ὀξέος ἀποσταχθῇ μέχρι ξηροῦ, καὶ ἐὰν τὸ ληφθὲν ἀποστάλαγμα ἐκ δευτέρου ἀποσταχθῇ. Ἐκ τοῦ ληφθέντος ῥευστοῦ ἀποχωρίζεται ὁ αἰθήρ διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ καυσικοῦ καλίου καὶ ὁ οὕτω προκείμενος αἰθήρ ἀποχωρίζεται καὶ ἀπὸ τὸ ἐνυπάρχον ὕδωρ διὰ ἀποστάξεως ἐπὶ ἀλικῆς τιτάνου. Ὡσαύτως προάγεται διὰ τῆς ἀποστάξεως τοῦ μυρμηκικοῦ ὀξέος μετὰ οἰνοπνεύματος καὶ ὀλίγου ποσοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, καὶ κατὰ νεωτέραν τινὰ μέθοδον ἐὰν μίγμα συνιστάμενον ἐξ ἀμύλου 10 μερῶν, ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου 37, θεϊκοῦ ὀξέος 30, ὕδατος 50 καὶ οἰνοπνεύματος 15 ἀποσταχθῇ καὶ τὸ πρῶτον ἀποστάλαγμα ἀναποσταχθῇ τρίς διὰ πρῶτάτου πυρός.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι ῥευστὸν διαφανές, ἔχει ἀηδῆ γεῦσιν, ὡς τὴν τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων, ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ μυρμηκικοῦ ὀξέος καὶ εἰδικὴν βαρύτητα 0,915· καίει μετὰ κυανῆς φλογός, εἰς τὰ ἄκρα ἀνοικτοχρόου, εἶναι διαλύσιμος εἰς 2 μέρη ψυχροῦ ὕδατος καὶ τὸ ὑδατώδες διάλυμα μεταβάλλεται μετὰ τινά καιρὸν εἰς μυρμηκικὸν ὀξὺ κεκραμένον καὶ εἰς οἰνόπνευμα. Εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλύεται ὁ αἰθήρ οὗτος κατὰ πάσας τὰς ἀναλογίας καὶ δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἐξ αὐτοῦ δι' ὕδατος· κατὰ τὸν *Doebereimer* ἐμπεριέχει 0,44 μυρμηκικοῦ ὀξέος.

Καὶ διὰ τῆς ἐπιρροῆς διαφόρων διὰ τοῦ ὑδρογόνου ὀξέων ἀποσυντίθεται τὸ οἰνόπνευμα εἰς τρόπον ὥστε τὸ σχηματιζόμενον *αἰθύλιον*, ἐνούμενον μετὰ τῶν ὀξέων, προάγει διαφόρους αἰθέρας. Τὸ ὑδροκυανικὸν αἰθύλιον, ὑδροκυανικὸς αἰθήρ, ἀποτελεῖται διὰ τῆς ἀποστάξεως μίγματος ἐκ κυανούχου ποτασίου καὶ αἰθεροθεϊκοῦ καλίου. Τὸ ἀποστάλαγμα εἶναι ἄχρουν, ἔχει δυνατὴν ὁσμὴν ὁμοίαν τοῦ φωσφόρου, συναπτόμενον μετὰ

τοῦ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου ἀποσυντίθεται καὶ ἐξ αὐτοῦ σχηματίζονται κυανούχος ὑδραργυρος, ὑδροκυανικὸν ὀξύ καὶ οἰνόπνευμα.

Διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ ὑδροθειϊκοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ οἰνοπνεύματος, προάγεται τὸ ὑδροθειϊκὸν αἰθύλιον, ὑπὸ τινων χημικῶν Mercaptan καλούμενον. Ἐὰν τὸ διὰ ὑδροθειωμένου αερίου ὅσον ἔνεστι ἀκριβῶς κεκορεσμένον κάλιον ἀναμιχθῇ μετὰ διαλύματος αἰθεροθειϊκοῦ καλίου καὶ τὸ μίγμα ἀποσταχθῇ, ἐξάγεται τὸ ὑδροθειϊκὸν αἰθυλοξειδίου, ἔχον ἀπὸ τῆς διαπεραστικῆς ὁσμῆς καὶ ὑπόγλυκον γεῦσιν, ἀναφλέγεται μετὰ κυανῆς φλογὸς καὶ διαδίδει δυνατὴν ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ θειώδους ὀξέος.

Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν διαφόρων φυτικῶν ὀξέων ἐπὶ τοῦ οἰνοπνεύματος σχηματίζονται ἐνώσεις αἰθέρος ἐιδικῶς βαρύτεραι καὶ ὀλιγώτερον πτητικαὶ ἀπὸ τὸ ὕδωρ, αἵτινες προάγονται μὲ περισσotέραν εὐκολίαν διὰ τῆς βοήθειας τοῦ θειϊκοῦ καὶ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Αἰθὴρ διὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος. Ὅξαλικὸν αἰθυλοξειδίου.

Aether oxalicus.

Πρὸς κατασκευὴν τούτου ἀποστάζεται κατὰ τὸν Thenard σύμμιξις ἐξ ὀξαλικοῦ ὀξέος μερῶν 15, οἰνοπνεύματος 18, θειϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου 3, ἐωσοῦ ἀποσταχθῇ θειϊκὸς αἰθὴρ. Ἐκ τοῦ εἰς τὸ ἀποστατικὸν σκεῦος ἐπιμένοντος ρευστοῦ ἀποχωρίζεται ὁ αἰθὴρ δι' ὀλίγου ὕδατος, καὶ ἀκολουθῶς ἀποπλύνεται μὲ ἀσθενὲς διάλυμα καλίου καὶ ὕδατος.

Ὁ ὀξαλικὸς αἰθὴρ εἶναι ρευστὸν ἄχρουν, ἐλαιῶδες τὴν σύστασιν, ἔχει ἀρωματικὴν ὁσμὴν, καὶ στυπτικὴν γεῦσιν, 1,092 εἰδικὴν βαρύτητα, ζεεὶ εἰς θερμοκρασίαν 163°. Εἰς τὸ ὕδωρ μόνον ὀλίγον διαλύεται, εἰς δὲ τὸ οἰνόπνευμα περισσότερον, καὶ ἀναμιγνύμενον μεθ' ὕδατος ἀποχωρίζεται ἐξ αὐτοῦ. Ζεόμενος μεθ' ὕδατος ἀποσυντίθεται, ἀποχωριζομένου ὀξαλικοῦ ὀξέος· ἐπίσης ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ καλίου καὶ τῆς τιτάνου τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ.

Τὸ ὀξαλικὸν αἰθυλοξειδίου διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἀμμωνίας ἀποσυντίθεται καὶ ἡ ἐνωσις αὐτῶν καλεῖται *Oxamid, Oxamethan, Aetheroxamid*.

Αἰθήρ διὰ τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος. Τρυγικὸν αἰθυλοξειδίον.

Aether tartaricus.

Ἐάν φύραμα ἐξ 7 μερῶν οἶνοπνεύματος, 6 τρυγικοῦ ὀξέος καὶ 2 θεϊκοῦ ὀξέος καθυποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν, ἕωσοῦ ἀποσταχθῶσι μέρη 2 θεϊκοῦ αἰθέρος, ἐπιμένει ὁ τρυγικὸς αἰθήρ εἰς τὴν κερατίνην, διαλελυμένος εἰς τὸ ὀξινὸν ρευστόν.

Ἀφοῦ τὸ ρευστόν τοῦτο ἐξουδετερωθῇ ἀκριβῶς διὰ καλίου, ἐξατμίζεται διὰ πρᾶου πυρὸς καὶ ἀναμιγνύεται μετὰ πολλοῦ οἶνοπνεύματος, δι' οὗ διαλύεται ὁ τρυγικὸς αἰθήρ καὶ ἐπιμένουν τὰ τοῦ καλίου ἅλατα.

Μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ οἶνοπνεύματος ἐπιμένει ὁ τρυγικὸς αἰθήρ, ὅστις ἐμπεριέχει μόνον ἓν μέρος οἶνοθειϊκοῦ καλίου. Ὁ τρυγικὸς αἰθήρ εἶναι ρευστός, ὡς τὸ σεράπιον, φαῖς, ἄσμος, πικρὸς καὶ ἀειδὴς τὴν γεῦσιν, ἐπὶ διαπύρον ἀνθράκων ἐκπέμπει ὀσμὴν σκορώδη. Εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι εὐδιάλυτος, καὶ τὸ διάλυμά του δὲν θολοῦται διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς τιτάνου. Ἐάν ἀποσταχθῇ μετὰ τοῦ καλίου, ἐξάγεται οἶνόπνευμα, ἐπιμενούσης τῆς τρυγικῆς ποτάσης.

Αἰθήρ διὰ βενζοϊκοῦ ὀξέος. Βενζοϊκὸν αἰθυλοξειδίον.

Aether benzoicus.

Ἀνεκλύφθη παρὰ τοῦ Scheele καὶ δύναται νὰ κατασκευασθῇ κατὰ τὸν Thenard, ἐάν φύραμα ἐξ οἶνοπνεύματος μερῶν 4, βενζοϊκοῦ ὀξέος 2, ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἀκράτου $1\frac{1}{2}$, ἀποσταχθῇ, μεχρισοῦ ἐπιμείνῃ τὸ $\frac{1}{2}$ εἰς τὴν κερατίνην καὶ μεταβληθῇ τὸ βενζοϊκὸν ὀξύ εἰς αἰθέρα, ὅστις κατακρημνιζόμενος εἰς τὸν πυθμένα τῆς κερατίνης ἀποπλύνεται δι' ἀρκούντος ὕδατος, ἀφοῦ πρῶτον μεταγγισθῇ τὸ ἐπιπολῶζον ὀξινωπὸν ρευστόν.

Ὁ βενζοϊκὸς αἰθήρ εἶναι ρευστόν ἄχρουν, ελαϊώδες τὴν σύστασιν, ἀσθενὲς τὴν ὀσμὴν καὶ κεντητικὸν τὴν γεῦσιν, 1,053 εἰδικῆς βαρύτητος, ζεεὶ εἰς θερμοκρασίαν 209°R· καὶ καίει μετὰ λαμπρᾶς ἀσβολώδους φλογός. Εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ εἶναι ἀδιάλυτος, διαλύσιμος εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου δι' ὕδατος· διὰ τοῦ ρευστοῦ καλίου ἀποσυντίθεται, καὶ ἐνθ' σχηματίζεται βενζοϊκὸν κάλιον, ἀποχωρίζεται τὸ οἶνόπνευμα.

Κατὰ τὸν ἐκτεθέντα τρόπον δύνανται νὰ προαχθῶσι καὶ ἅπασαι αἱ ἄλλαι ἐνώσεις τοῦ αἰθυλοξειδίου μετὰ τῶν διαφορῶν ὀξέων. Οὕτω διὰ τῆς ἀποσάξεως 10 μερῶν ἠλεκτρικοῦ ὀξέος, 20 οἰνόπνεύματος καὶ 5 ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἀποτελεῖται τὸ ἠλεκτρικὸν αἰθυλοξείδιον· διὰ τῆς ἀποστάξεως 1 μέρους στεατικοῦ, 4 μερῶν θειικοῦ ὀξέος καὶ 4 οἰνόπνευματος τὸ στεατικὸν αἰθυλοξείδιον.

Ἐὰν ἐν μέρος ἰξώδους, 4 θειικοῦ ὀξέος καὶ 4 οἰνόπνευματος ἀποσταχθῶσιν, ἐξάγεται τὸ ἰξῶδες αἰθυλοξείδιον καὶ διὰ τῶν διαφορῶν τούτων πράξεων ἐπίσης μεταβάλλεται τὸ οἰνόπνευμα εἰς αἰθέρα.

Περὶ τῆς ὀξείας ζύμωσης.

Ἐὰν οἰνόπνευματῶδες ρευστὸν, ὡς οἶνος, ζῦθος, κτλ., ἐκτεθῇ εἰς θερμοκρασίαν 20 — 35° ἢ εἰς τὴν ἐλευθέραν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπιρροήν, θολοῦται τὸ ρευστὸν μετ' ὀλίγον. Ἡ θερμότης αὐξάνει τινὰς βαθμοὺς, ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας ἀπορρόφᾶται ὀξυγόνον, καὶ ἀντ' αὐτοῦ ἐκλύετα^ι ἀνθρακικὸν ὀξύ· τὸ ρευστὸν λαμβάνει ὀξείαν γεῦσιν ἕνεκα τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος ἐκ τοῦ οἰνόπνευματος· καὶ ὅταν ἡ ζύμωσις φθάσῃ εἰς τὸν ἐντελῆ βαθμὸν, διαφθείρεται τὸ οἰνόπνευμα. Τὸ σύνολον τῶν φαινομένων τούτων καλεῖται ὀξεῖα ζύμωσις.

Τὰ πρὸς ὀξείαν ζύμωσιν κυρίως ἀπαιτούμενα εἶναι, οἰνόπνευμα, παρουσία ἀέρος, ἱκανὴ ποσότης ὕδατος καὶ κατάλληλος θερμοκρασία· ἐκτὸς δὲ τούτων ὡς ἀναγκαῖα πρὸς ζύμωσιν εἶναι καὶ ἡ ζύμη, μολονότι ἀπεδείχθη, ὅτι τὸ οἰνόπνευμα δύναται νὰ μεταβληθῇ εἰς ὀξικὸν ὀξύ ἄνευ ζύμης.

Ἡ παρουσία τῆς ζύμης, ὡς καὶ ἡ προσθήκη ὄξους, τότε μόνον ἐπιταχύνει τὴν ὀξείαν ζύμωσιν, ὅταν θέλωμεν οἰνόπνευματῶδες ρευστὸν νὰ μεταβάλλωμεν εἰς ὄξος.

Διὰ νὰ ἀποτελεσθῇ ὀξεῖα ζύμωσις πρέπει τὸ ρευστὸν εἰς τὸ ὅποιον ὑπάρχει οἰνόπνευμα νὰ ἀπορρόφήσῃ ὀξυγόνον ἐκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, διότι τοῦτο ἐνούμενον μετὰ τοῦ ὑδρογόνου σχηματίζει ὕδωρ καὶ ὀξικὸν ὀξύ. Ἐκ δὴ ὧν δηλαδὴ μερῶν οἰνόπνευματος ἐνουμένων μετὰ τεσσάρων ὀξυγόνου σχηματίζονται ἐν μέρος ὀξικοῦ ὀξέος καὶ δύο μέρη ὕδατος· ὥστε ἡ ὀξεῖα ζύμωσις πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ὀξειδώσεως. Πρὸς ὀξείαν

τοῦ ζύθου καὶ ἐτέρων πνευματωδῶν ρευστῶν ζύμωσιν δύναται εἰς αὐτὰ νὰ προστεθῶσι ζύμη, σέμυλα, ὀξίνος ἄρτος, πήκτωμα, φύλλα τῆς ἀμπέλου κτλ., ἢ καὶ μόνον ὄξος. Εἰς τοὺς νεαροὺς οἶνους, καθὼς καὶ εἰς τὸν ζύθον, ὑπάρχει ἡ ζύμη ἤδη διαλελυμένη· παλαιὸς δὲ οἶνος, τοῦ ὁποίου τὸ ἐνυπάρχον ζύμωμα ἀπεσυντέθη διὰ τῆς προόδου τῆς ζυμώσεως, δύναται νὰ ὑποβληθῇ εἰς ὀξεῖαν ζύμωσιν διὰ τῆς προσθήκης νέας ζύμης. Τὸ καθαρόν οἰνόπνευμα, ὡς καὶ τὸ τοῦ δι' ὕδατος κεκραμένον, δὲν ὀξινίζουσι, καὶ εἰς τὰς καταλληλοτέρας πρὸς ζύμωσιν περιστάσεις εὐρισκόμενα, ἀλλ' ἀπαιτοῦσι πρὸς τοῦτο τὴν προσθήκην ζύμης. Κατὰ τινὰς δοκιμὰς τοῦ John ἀποτελεῖται ἡ ζύμωσις ταχύτατα, ἐὰν τὸ διὰ τὴν ὀξεῖαν ζύμωσιν προσδιωρισμένον ρευστὸν, θερμαινόμενον 30—38 R, διέρχεται κατὰ σταλαγμοὺς εἰς κάδους πεπληρωμένους ἐξ ἀκανθῶν ἢ φρυγάνων. Εἰς τινὰ μέρη τῆς Γερμανίας μεταχειρίζονται καὶ μυστικόν τινα τρόπον, δι' οὗ κατασκευάζουσιν εἰς ὀλίγων ἡμερῶν διάστημα πολλὰ δριμύ ὄξος. Τοῦτον ἐγνωστοποίησεν ὁ K. Dingler κατὰ τὴν ἐφεξῆς μέθοδον:

Ρίνισματα τῆς φηγοῦ, ἢ ἄλλων σκληρῶν ξύλων, ἐλαφρῶς εἰς κατάλληλον κάδον τεθέντα καὶ δι' ὕδατος ἐκχυλισθέντα, καταβρέχονται διὰ κεκραμένου ὄξους. Ἀφοῦ τὸ ὄξος ἀφεθῇ μετ' αὐτῶν 12 ὥρας εἰς θερμοκρασίαν 34 R, καὶ συναχθῇ κατὰ μέγα μέρος εἰς τὸν πυθμένα τῶν κάδων, ἐπιχύνεται ἐκ νέου τὸ ἐκ τῶν κάτω ὀπῶν τῶν κάδων ἐκρέον ὄξος ἐπὶ τῶν φρυγάνων· ἡ ἐργασία αὕτη εἰς 48 ὥρας ἐπαναλαμβάνεται τετράκις. Ἀφοῦ ταῦτα καταβραχθοῦν ἀρκούντως διὰ τοῦ ὄξους, ἐπιχύνεται ἐπ' αὐτῶν σύμμιξις ἐκ 18 μερῶν ὕδατος θερμοκρασίας 20°, 1 $\frac{1}{2}$ οἰνόπνεύματος 0,940 εἰδικῆς βαρύτητος καὶ 1 $\frac{1}{2}$ ρευστοῦ κατασκευασμένου ἐκ τριῶν μερῶν ἐκλεπισμένου σίτου, 1 βύνης τῆς κριθῆς καὶ 32 μερῶν ὕδατος. Οἱ κάδοι, ἀφοῦ ἐπιτωματισθῶσι, τίθενται εἰς δωμάτιον ἔχον 32° R, τὸ διερχόμενον ρευστὸν ἐπιχύνεται ἐπὶ τῶν ρίνισμάτων, ἕως οὗ λάβῃ ὀξεῖαν γεῦσιν. Αἱ ἐργασίαι αὗται ἀδιακόπως ἐπαναλαμβάνονται καὶ τὰ ἀπαξ ὀξυνισμένα ρίνισματα δύναται νὰ μεταχειρισθῶσι πολλὰ ἔτη πρὸς μεταβολὴν τοιούτων ρευστῶν εἰς ὄξος.

Μέχρι τοῦδε μία μόνον ἀνόργανος ὕλη μᾶς εἶναι γνωστὴ, δι' ἧς δύναται νὰ μεταβληθῇ τὸ οἰνόπνευμα εἰς ὄξος, καὶ ἡ ὕλη αὕτη εἶναι ὁ ὑποξειδωμένος λευκόχρυσος, ἢ κατ' ἄλλους λεπτομεμερισμένος λευκόχρυσος ὅστις ἐὰν βραχῇ μὲ οἰνόπνευμα, γεννᾷ ὑπὸ ἀνάφλεξιν καὶ κρότον, ὕδωρ καὶ ὀξικὸν ὀξύ, χωρὶς ποσῶς νὰ σχηματισθῇ ἀνθρακικὸν ὀξύ· εἰς

τὴν περίστασιν ταύτην 46 μέρη οἶνοπνεύματος ἀπορρόφῳσιν 32 ὀξύγονου, καὶ ἐξ αὐτῶν σχηματίζονται 27 μέρη ὕδατος καὶ 51 ὀξικοῦ ὀξέος.

Ὁ λευκόχρυσος δὲν ὑπόκειται εἰς οὐδεμίαν μεταβολὴν, καὶ δύναται νὰ μεταβάλλῃ ἀπροσδιόριστον ποσὸν οἶνοπνεύματος εἰς ὀξικὸν ὀξύ· τὸ περιέργον τοῦτο φαινόμενον ἐπαρτηρήθη κατὰ πρῶτον παρὰ τοῦ K. Doebereiner. Ἐὰν ὁ λευκόχρυσος καταβραχῇ μὲ μεγάλητερον ποσὸν οἶνοπνεύματος οὕτως, ὥστε νὰ συναφθῇ τὸ οἶνόπνευμα καὶ ὁ λευκόχρυσος μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, σχηματίζεται τὸ ὀξικὸν ὀξύ ἄνευ ὁμως ἀναφλέξεως· ἐπὶ τούτου στηρίζεται ἡ κατασκευὴ τοῦ ἐπονομαζομένου *λύχρου* τοῦ Doebereiner πρὸς παραγωγὴν ὀξους.

Τὸ ὀξικὸν ὀξύ δύναται νὰ κατασκευασθῇ καὶ διὰ διαφορῶν ἄλλων μέσων, ὡς διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τῶν πλειοτέρων πτητικῶν ὑλῶν, διὰ τῆς ἐπ' αὐτῶν ἐπιρροῆς τοῦ θεϊκοῦ, καὶ νιτρικοῦ ὀξέος καὶ τῶν ἀλκαλίων.

Διάφοροι ὕλαι μὴ ἐμπεριέχουσαι οἶνόπνευμα σχηματίζουν εἰς ἀν διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ ὀλίγον κατ' ὀλίγον ὀξικὸν ὀξύ, καθὼς ἡ πολλὰ λεπτυνομένη διάλυσις τοῦ ἀραβικοῦ κόμμεως. Ὡσαύτως διὰ τῆς βλαστήσεως γεννᾶται ὀξικὸν ὀξύ, ἀπαντῶμενον εἰς πολλὰ φυτὰ εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν ἢ ἡνωμένον μετὰ διαφορῶν βάσεων.

Ἀντὶ τοῦ οἴνου ἢ καὶ ἄλλων οἶνοπνευματωδῶν ρευστῶν ἐπιχύνονται μόνον τὰ στέμφυλα εἰς μεγάλους κάδους μὲ δι' ὕδατος κεκραμμένον οἶνόπνευμα.

Ἐπειδὴ ὑπάρχουν διάφορα ρευστὰ, ἅτινα καθυποβάλλονται εἰς τὴν ὀξεῖαν ζύμωσιν, διὰ τοῦτο καὶ τὰ εἶδη τῶν ὀξέων εἶναι διάφορα, τὸ καλῆτερον ὁμως εἶναι τὸ ἐκ τοῦ οἴνου κατασκευαζόμενον, καλούμενον ὄξος τοῦ οἴνου, ἔχει λευκὸν, ἢ ἐρυθρὸν χρῶμα, ἐξαρτῶμενον ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ οἴνου.

Ἐὰν τὸ ὄξος, καὶ ἐξόχως τὸ δι' ὕδατος κεκραμμένον ἐκτεθῇ καιρὸν τινα εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, θολοῦται καὶ διὰ τῆς ἀρχομένης σήψεως σχηματίζεται γλισχρώδης ὕλη, καλουμένη *γεννήτρια* τοῦ ὄξους, ἥτις ξηρανθεῖσα μᾶς δίδει κίτρινον διαφανῆ μάζαν, ἐξ ἧς ἐκλύεται ἀμμωνία, ἐὰν ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν. Τὸ θολούμενον ὄξος δύναται νὰ καθαρισθῇ κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον: Περίπου 30 ὀκάδες ὄξους ἀναμιγνύμεναι μὲ $\frac{1}{4}$ ὀκάδος ζέοντος γάλακτος, ταράσσονται καὶ μεταγγιζόμενον ἀπὸ τὸ διὰ τῆς τοιαύτης πράξεως ταχέως σχηματίζόμενον καταβύθισμα καθαρίζεται. Τὸ ὄξος ἀποβάλλει τὸ χρῶμά του μεταβαλλόμενον

εἰς ὠχρόν. Τὸ ποσὸν τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος διαφέρει εἰς τὰ διάφορα ἤδη τοῦ ὀξους. Ἐὰν θέλωμεν νὰ προσδιορίσωμεν αὐτὸ, πρέπει νὰ τὸ καθυποβάλλωμεν εἰς τὴν ἐξῆς ἐξέτασιν. Ἀφοῦ πρῶτον διὰ τῶν ἀπαιτούμενων δοκιμαστηρίων πληροφορηθῶμεν περὶ τῆς ἀπουσίας τῶν ἐκ τῶν ὀρυκτῶν ὀξέων ὡς τοῦ θειικοῦ καὶ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, πρέπει νὰ κορεσθῇ μετὰ καθαρᾶς ἀνθρακικῆς ποτάσεως κατασκευασμένης ἐκ τῆς τρυγός. Ἐὰν πρὸς κόρον ἑνὸς μέρους ἀνθρακικῆς ποτάσεως ἀπαιτοῦνται 18 μέρη ὀξους, πρέπει νὰ θεωρηθῇ μετρίαις ποιότητος καὶ κατὰλληλος διὰ διαφόρους χρήσεις, ὅσον δὲ ὀλιγώτερον ποσὸν ὀξους ἀπαιτεῖται πρὸς κόρον τῆς ποτάσεως, τόσον δυνατότερον εἶναι τὸ ὄξος. Ἀλλὰ διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν ἀκριβῶς τὸν βαθμὸν τοῦ κόρου, ἀναμιγνύεται ἡ ἀνθρακικὴ πότᾶσσα μετὰ τοῦ βάμματος τοῦ καγκαμίνου, προστίθεται ἔπειτα ὄξος προηγουμένως σταθμισθὲν τόσον, ὅσον ἀπαιτεῖται διὰ νὰ μεταβληθῇ τὸ κυανοῦν ρευστὸν εἰς ἐρυθροῦν ἀμετάβλητον εἰς τὴν θερμότητά.

Τὸ ἐκ τοῦ λευκοῦ οἴνου κατασκευαζόμενον ὄξος δύναται νὰ διακριθῇ ἀπὸ τὸ ἐκ τοῦ ζυμωμένου σίτου διὰ τοῦ φαικοῦ χρώματος, τὸ ὁποῖον λαμβάνει, ἀφοῦ κορεσθῇ μετὰ ἀνθρακικῆς σόδας ἢ ἀμμωνιάς.

Ἐκαστὸν ὄξος κατασκευαζόμενον ἐξ οἴνου, ἢ ἄλλως πως, ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ δι' ὕδατος λεπτυνομένου ὀξικοῦ ὀξέος ἑτερογενεῖς τινὰς ὕλας. Διὰ νὰ καθαρισθῇ δὲ ἐκ τούτων πρὸς χρῆσιν εἰς τὰς τέχνας καὶ εἰς τὴν ἱατρικὴν, καθυποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν ἐντὸς χαλκίνων ἢ υελίνων ἀποστακτικῶν σκευῶν. Ἐπειδὴ τὸ ὕδωρ εἶναι πτητικώτερον ἀπὸ τὸ ὄξος, ἀποστάζεται κατ' ἀρχὰς μόνον ὕδωρ τὸ ὁποῖον δύναται νὰ θεωρηθῇ ἄχρηστον, ἀκολούθως ἀποστάζεται τὸ ὄξος. Ἡ ἀπόσταξις πρέπει νὰ ἐξακολουθήσῃ, ἕως οὗ νὰ λάβῃ τὸ ἀποστάζον ρευστὸν ἐμπυρευματικὴν γεῦσιν· εἰς δὲ τὸ ἀποστακτικὸν σκεῦος ἐπιμένει ἐκχυλισματικὴ ὕλη φακὰ κατὰ τὸ χρῶμα, Sapa aceti καλουμένη καὶ συνισταμένη ἐκ τρυγός, ἐκχυλισματικῆς ὕλης, χυλοῦ καὶ δυνατοῦ ὀξους. Πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ τελευταίου ἀναμιγνύεται τὸ ἐπιμένον μέρος μεθ' ὕδατος καὶ καθυποβάλλεται εἰς δευτέραν ἀπόσταξιν. Τὸ ἀπεσταγμένον ὄξος εἶναι ρευστὸν, ἔχον ὅχι τόσον εὐάρεστον ὁσμὴν καθὼς τὸ ὄξος. Ἡ διαφορὰ αὕτη φαίνεται ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλλειψιν τοῦ εἰς ἕκαστον ὄξος ἐμπεριεχομένου αἰθέρος.

Τὸ ἀπεσταγμένον ὄξος δύναται καὶ διὰ τῆς ψύξεως ν' ἀποβάλλῃ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπομένως νὰ λάβῃ πλέον ἄκρατον κατάστασιν. Διὰ νὰ κατα-

σκευασθῇ ὅμως εἰς τὴν καθαρωτέραν καὶ ἀκρατωτέραν τοῦ κατὰστασιν πρέπει νὰ ληφθῶσιν καὶ ἕτερα μέσα.

Εἰς τὰ ἐργαστάσια εἰς τὰ ὁποῖα κατασκευάζεται τὸ ὄξος συνάζεται, ἰδιαίτερον εἶδος μυτῶν, *Musca cellaris*, καὶ εἰς τὸ ὄξος ἕτερον ἐγχυματικὸν ἔντομον *Vibrio. Aceti*, δυνάμενον νὰ διακριθῇ διὰ τοῦ ἀόπλου ὀφθαλμοῦ. Τὰ ἔντομα ταῦτα πρέπει νὰ ἐξολοθρεύωνται διὰ τῆς διοχετεύσεως τοῦ ὄξους διὰ κασσιτερίνων σωλήνων περιβεβλημένων μεθ' ὕδατος ζέοντος.

Περὶ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος.

Τὸ ὀξικὸν ὀξύ εἰς τὴν ἀκρατωτέραν κατὰστασιν κατεσκευάσθη πρῶτον παρὰ τοῦ K. Westendorf ὑπὸ τὸ ὄνομα *Acetum glaciale* ὄξος διὰ τῆς παρῶσεως. Τὸ ὀξικὸν ὀξύ δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἐκ τῶν ξηρῶν ὀξικῶν ἀλάτων διὰ τοῦθεικοῦ ὀξέος. Εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος ἠνωμένον με ἀποψυχρινόμενον δοχεῖον ἐπιχύνονται 10 μέρη λειοτετριμμένου καὶ διὰ πρᾶου πυρὸς ξηρανθέντος ὀξικοῦ μολύβδου μετὰ τριῶν μερῶνθειικοῦ ὀξέος ἀκράτου, καὶ ἡ σύμμιξις καθυποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν. Τὸθειικὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου πρὸςθειικὸν μολύβδον, τὸ δὲ ὀξικὸν ὀξύ ἀναμιγνύμενον μετὰ τοῦ ὕδατος τοῦθειικοῦ ὀξέος ἀποστάζεται. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἀποσταχθὲν ὀξικὸν ὀξύ πάντοτε ἐμπεριέχει καὶθειῶδες ὀξύ, πρέπει νὰ ἀναμιχθῇ μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου· δι' αὐτοῦ τὸθειῶδες μεταβάλλεται εἰςθειικὸν ὀξύ, καὶ διὰ δευτέρας ἀποστάξεως δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ τὸ ὀξικὸν ὀξύ παρὰ τοῦθειικοῦ ὀξέος.

Εἰς τὴν Γαλλίαν ἀποστάζουσιν εἰς ἐξ ἀργίλλου ἀποστακτικὰ σκεύη τὸν κρυσταλλωμένον ὀξικὸν χαλκόν. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην σχηματίζεται ὕδωρ καὶ ἐμπυρευματικὸν ὄξος, ἀποτελέσματα τῆς ἀποσυνθέσεως μέρους τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος. Ἐπειδὴ καὶ διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τοῦξύλου σχηματίζεται ὀξικὸν ὀξύ, ἐμπεριέχον ὅμως ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον καὶ ἄλλα τινὰ μόρια, δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἐξ αὐτοῦ τοῦ φαιού ρευστοῦ τὸ ὀξικὸν ὀξύ εἰς καθαρὰν κατὰστασιν, ἐὰν δηλαδή κορέσωμεν τὸ ἐμπυρευματικὸν ὄξος με ὑδρομιγῇ τίτανον· τὸ ἀποτελούμενον διάλυμα δηλ. ἡ ὀξικὴ τίτανος ἀποσυντίθεται διὰ διαλύσεωςθειικῆς σόδας, δι' ἧς σχηματίζεται καὶ καταβυθίζεταιθειικὴ τίτανος ἠνωμένη μετὰ τοῦ ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου· εἰς δὲ τὸ ἐπιπολάζον ρευστὸν ἐμπεριέχεται ἡ ὀξικὴ

σόδα. Τὸ διῦλισθὲν ὑγρὸν ἐξατμίζεται ἕως τοῦ συμπηχθῶσιν κρύσταλλοι, οἵτινες τήκονται καὶ θερμαίνονται ἀκολούθως μέχρι ἀνθρακώσεως, δι' ἧς τὸ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον φθείρεται. Ἀφοῦ τὸ μετ' ἀνθρακος ἀναμειγμένον ὑπόλειμμα διαλυθῇ δι' ὕδατος καὶ ἐξατμισθῇ, ἀπολαμβάνεται ἡ καθαρὰ ὀξική σόδα, ἥτις ἐπιχυθεῖσα μετὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος καθυποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν, δι' ἧς ἐκλύεται τὸ ὀξικὸν ὀξύ καὶ συνάζεται εἰς τὸ δοχεῖον. Ἐὰν τὸ ὀξύ ἔχῃ ἀκόμῃ ἐμπυρευματικὴν ὁσμὴν δύναται νὰ τὴν ἀποβάλῃ διὰ τοῦ ζωάνθρακος.

Κατὰ τὸν Berzelius τὸ ἀγοραῖον πυροξυλικὸν ὀξύ εἶναι ὕδατῶδες διάλυμα τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, πυρελαιίου πυρορρήτινης καὶ πυρεχυλίσματος. Διὰ τῆς ζέσεως τοῦ πυροξυλικοῦ ὀξέος μεθ' ὑπερτερούσης τιτάνου ὕδρομιγοῦς ἀποχωρίζεται μέγα μέρος πυρελαιίου καὶ πυρορρήτινης, τὸ πυρεχυλισμα ὅμως ἐπιμένει εἰς τὸ ρευστὸν καὶ μὲ μεγάλην δυσκολίαν δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι διαφανὲς ρευστὸν, ἔχει ὁσμὴν μὲν τοῦ ὀξους, γεῦσιν δὲ δριμεῖαν καὶ καυσικὴν, ἡ εἰδικὴ βαρύτης του εἶναι 1,050 — 1,060, ἐκτεθὲν εἰς ψῦχος κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος ὑελοειδῶν πλατέων φυλλιδίων διῦγραινομένων εἰς μεγαλητέραν θερμότητα καὶ μάλιστα ἐὰν τὸ ἀγγεῖον συνεχῶς ἀποπωματίζεται καὶ ἀνακινεῖται. Ἐὰν θερμανθῇ εἰς ἀνοικτὰ ἀγγεῖα, ἀναφλέγεται μετὰ κυανῆς φλογὸς σχηματίζον ὕδωρ καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ· εἰς τὸν ἀέρα ἀπορροφᾷ ὑγρασίαν καὶ οὕτω λεπτύνεται, ἀναμιγνυόμενον μεθ' ὕδατος ἐπιπυκνῶνται ἀνευ σημαντικῆς ἐκλύσεως θερμότητος. Τὸ ἄκρατον ὀξικὸν ὀξύ ἔχει 1,063 εἰδικὴν βαρύτητα καὶ εἰς 100 μέρη ἐμπεριέχει 15 ὕδατος, εἰς θερμότητα 100°R, ζέει καὶ ἐξατμίζεται χωρὶς νὰ ὑπόκειται εἰς τινὰ μεταβολήν. Ἐὰν τὸ κρυσταλλωμένον ὀξικὸν ὀξύ τεθῇ εἰς λάγνηνον ἐμπεριέχουσαν ξηρὸν χλώριον ἀέριον, καὶ ἀκριβῶς ἐπιπωματισθεῖσα ἡ λάγνηνς ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἄμεσον ἐπιρροὴν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων, συμβαίνει ἐνίοτε ἐκλύσις θερμότητος καὶ πυρσοκροτήσεως. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην σχηματίζεται λευκὸς ἀτμός, καὶ εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς λαγῆνου ἀποτίθενται σταλαγμοί, εἰς δὲ τὰς πλευράς στερεόν τι σῶμα, κρυσταλλούμενον εἰς εἶδος ὀκταέδρων· οἱ κρύσταλλοι οὗτοι εἶναι ἰδιαιτέρον ὀξύ καλούμενον *χλωροξικὸν ὀξύ* *acide chloracetique*. Ἐὰν τὸ ῥηθὲν ὀξύ ζεσθῇ μὲ ὑπερτεροῦσαν ποσότητα ἀμμωνίας, ἀποτελεῖται ἀνθρακικὴ ἀμμωνία καὶ χλωρο-φορμύλιον (*chlorformyl*). ἐὰν δὲ κορεσθῇ ἀκριβῶς μετὰ τῆς ἀμμωνίας καὶ τὸ διάλυμα ἐκτεθῇ εἰς ἀερόκενον τόπον, σχηματίζεται ἄπειροι κρύσταλλοι, οἵτινες εἶναι *χλωρικὴ ἀμμωνία*.

Τὸ ὀξικὸν ὀξύ σύγκειται ἐξ:

Ἀνθρακὺς	4	ἀτ.	24,,	46,83
Υδρογόνου	3	ἀτ.	3,,	6,35
Ὄξυγόνου	3	ἀτ.	24,,	46,82

51. 100.

Τὸ ἄκρατον ὀξικὸν ὀξύ μεταχειρίζεται ὡς ὁσφραντικὸν μέσον εἰς λειποθυμίας καὶ ἐπιδημικὰς νόσους. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἐγκλείονται εἰς μικρὰς φιάλας μόνον κρύσταλλοι θεικῆς ποτάσεως καταβρεχόμενοι μετὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος ἀκράτου.

Ὁξικὰ ἄλατα.

Ἄπαντα τὰ οὐδέτερα ὀξικὰ ἄλατα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, ἀποσυνθέτονται ἄνευ ἀναξέσεως διὰ τοῦ θειικοῦ, νιτρικοῦ καὶ φωσφορικοῦ ὀξέος, ἐκπέμποντα ἀτμούς τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, δι' ὧν διακρίνονται. Μόνον αἱ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ ἀργύρου καὶ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ ὑδραργύρου ἐνώσεις εἶναι δυσδιάλυτοι. Τινὰ ὀξικὰ ἄλατα ἐκλύουσιν, ἐὰν ἐκτεθῶσιν εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, τὸ ὀξικὸν ὀξύ, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἀποσυντεθῇ· τοιαῦτα εἶναι αἱ ἐνώσεις τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος μετὰ τῆς ἀργίλλου, τῆς μαγνησίας, τοῦ χαλκοῦ, ἀργύρου κ.τ.λ.

Ἕτερα ἄλατα ἐκλύουσιν ὀλίγον μόνον ποσὸν ὀξικοῦ ὀξέος καὶ θερμαίνόμενα ἀποσυνθέτονται κατὰ μέγα μέρος εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ, εἰς ὑδρογονανθρακοῦχον ἀέριον, ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον καὶ ἐμπυρευματικὸν ὀξικὸν ὀξύ, καθὼς θέλομεν ἰδεῖ εἰς τὸ περὶ ὀξικοῦ μολύβδου. Μετὰ τὴν ἀπόσταξιν ἐπιμένει εἰς τὸ ἀποστατικὸν σκεῦος ἀνθραξ μετὰ ἀνθρακικῆς βάσεως, ἢ τὸ μέταλλον κατὰ μέγα μέρος ἀποκατασταθέν. Εἰς δὲ τὰ ὑδατώδη διαλύματα τῶν ὀξικῶν ἀλάτων ἀποσυντίθεται μετὰ τινος καιρὸν τὸ ὀξικὸν ὀξύ, ἕνεκα δὲ τῆς ἀποσυνθέσεως εὐρωτιῶσι καὶ οὕτω μεταβάλλονται εἰς ἀνθρακικὰ ἄλατα.

Περὶ τῶν ὀξικῶν ἀλαλίων.

Ὁξικὴ ποτάσσα. Τὸ ἕλκας τοῦτο ἀπαντᾷται αὐτόπυστατον εἰς τοὺς ὀπούς μερικῶν δένδρων, κατασκευάζεται ὁμως σχεδὸν πάντοτε διὰ τοῦ

κόρου τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος μετὰ ὑπανθρακικῆς ποτάσεως καὶ διὰ τῆς ἀμέσου συνθέσεως καὶ ἐξατμίσσεως τοῦ ρευστοῦ. Ἐκ τοῦ δι' αὐτῆς ἐξατμισθέντος μέχρι συστάσεως σερραπίου κρυσταλλοῦται κατ' ὀλίγον δι' ἀποψύξεως τὸ εἰρημένον ἄλας εἰς σχῆμα λευκῶν φυλλιδίων, καὶ ἕνεκα τούτου ἐκαλέσθη *Terra foliata tartari*, *Arcanum Tartari*. Ἐάν τὸ διάλυμα δὲν ᾔνοι κατὰ λευκον, δύναται νὰ καθαρισθῇ ζέονμενον με ζωάνθρακα. Τὸ ξηρὸν ὀξικὸν κάλιον τίκεται πρὸ τοῦ νὰ πυρωθῇ, εἰς ἐλαιῶδες ρευστὸν καὶ μετὰ τὴν ἀποψύξιν πηγνύται πρὸς λευκὴν μάζαν. Διὰ συνεχοῦς πυρώσεως ἀποσυντίθεται ὅλον τὸ ποσὸν τοῦ ἐμπεριεχομένου ὀξικοῦ ὀξέος καὶ τὸ ἐπιμένον μέρος ἐμπεριέχει ἄνθρακα καὶ ἀνθρακικὴν πότασσαν, καὶ εἶναι πυροφόρον. Τὸ ἄλας δι' ὀξυγίνεται εἰς τὸν ἀέρα καὶ ρευστοῦται· τὸ δὲ ρευστούμενον ἄλας γνωρίζεται ὑπὸ τὸ ὄνομα *Liquor terrae foliatae tartari*. Ἐάν τὸ ξηρὸν ἄλας ἀναμιχθὲν με ἴσων ποσότητων ἀρσενώδους ὀξέος ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν, ἐξέρχεται ρευστὸν τι γλίσχρον, καπνίζον, δυσῶδες, ἀναφλεγόμενον εἰς τὸ χλωρίον καὶ καίον μετὰ ἐρυθρώδους φλογός. Τοῦτο τὸ ρευστὸν καλεῖται *Alkargen*.

Ἡ ὀξικὴ πότασσα εἶναι διαλυσιμωτάτη εἰς τὸ ὕδωρ, ἀπαιτεῖ μόνον τὸ ἥμισυ τοῦ βάρους τῆς πρὸς ἐντελῇ διάλυσιν, εἶναι εὐδιάλυτος προσέτι καὶ εἰς τὸ οἶνόπνευμα· σύγκειται δὲ ἐκ

Καλίου	1 ατ. 47,2 — 48,07
--------	--------------------

Ὄξικοῦ ὀξέος	1 ατ. 51, — 51,93
--------------	-------------------

98,2 — 100,

Τὸ ὀξικὸν κάλιον μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἰατρικὴν ἐσωτερικῶς ὡς διουρητικὸν καὶ διαφωρητικόν.

Ὄξικη σόδα. Κατασκευάζεται διὰ τῆς ἀμέσου ἐνώσεως τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος μετὰ τῆς ἀνθρακικῆς σόδα·, καὶ τὸ ἀποτελούμενον ἄλας γνωρίζεται ὑπὸ τὸ ὄνομα *Terra foliata tartari crystallisabilis*.

Τὸ ἄλας τοῦτο κρυσταλλοῦται διὰ τῆς ἐξατμίσσεως τοῦ ρευστοῦ εἰς ἐπιμήκη καὶ διαφανῆ πρίσματα, τὰ ὅποια διαπυροῦνται ἀθροῶς εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, θερμαινόμενα τίκονται, καὶ διὰ πλειοτέρου πυρὸς ἀποσυνθέτονται· διαλύονται σχεδὸν εἰς 2 μέρη ὕδατος, εἶναι δὲ ἀδιάλυτα εἰς τὸ ἰονόπνευμα.

Ἡ ὀξική σόδα σύγκειται ἐκ.

Σόδας 1 ατ. 31,3 — 38,03

Ὄξιکوῦ ὀξέος 1 ατ. 51,0 — 61,97

82,3 — 100

Ὄξική Ἀμμωνία. Ἡ ὀξική ἀμμωνία εὑρίσκεται εἰς τὸ σερπητὸς οὖρος καὶ εἰς διάφορα ζωτικὰ ρευστὰ ἐκτιθέμενα εἰς σῆψιν. Διὰ τῆς τέχνης κατασκευάζεται διὰ τοῦ κόρου τῆς ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας μετὰ ὀξικοῦ ὀξέος. Εἰς ρευστὴν κατάστασιν εἶναι χρήσιμος ἐσωτερικῶς ὡς ἱαματικὸν μέσον γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα *πνεῦμα τοῦ Μίνδερερ Spiritus Mindereri*· δὲν δύναται γὰρ ἐξατμισθῆ μέχρι ξηροῦ ἕνεκα τῆς πτητικότητος καὶ τῆς εὐκόλου ἀποσυνθέσεως τοῦ ἁλτος· ὑπὸ τὸ δοχεῖον τῆς πνευματικῆς ἀντλίας ἐντὸς τῆς ὁποίας εὑρίσκεται θεϊκὸν ὀξύ ἄκρατον, ἐξατμισθὲν, κρυσταλλοῦται εἰς σχῆμα λεπτῶν ἀγκίδων. Τὸ εἰρημένον ἅλας δύναται γὰρ ληρῆθαι καὶ διὰ τῆς ἐξαχνίσεως ἢ καὶ θερμάνσεως μίγματος ἐξ ἴσης ποσότητος ὀξικῆς τιτάνου καὶ ὑδροχλωρικῆς ἀμμωνίας, ἐνῶ δὲ ἡ ὀξική ἀμμωνία ἐξαχνίζεται, ἐπιμένει εἰς τὸ ἀποστακτικὸν σκεῦος ἡ ὑδροχλωρικὴ τίτanos. Ἡ ὀξική ἀμμωνία ἀπορροφᾷ ὑγρασίαν ἐκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος καὶ ρευστοῦται. Ρευστοῦται ὡσαύτως ἡ ὀξική ἀμμωνία μετὰ ὑπερτεροῦντος ὀξέος.

Ὄξικον λίθιον. Τὸ διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος διαλελυμένον λίθιον ἀφίνει μετὰ τὴν ἐξάτμισιν κομμώδη καὶ εὐθραυστον μάζαν διὑγραinoμένην εἰς τὸν ἀέρα.

Ὄξικαὶ γαῖαι.

Ὄξική ἄργιλλος. Ἡ ὑδρομυγῆς ἄργιλλος διαλύεται, εἰς τὸ ὀξικὸν ὀξύ, συνήλως δὲ κατασκευάζεται ἐν τῷ διήλυμα τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου ἀποσυντεθῆ διὰ ὑδατῶδους διαλύσεως τῆς σιπητρίας. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τὸ θεϊκὸν ὀξύ ἐνυῖται μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου πρὸς ἀδιάλυτον ἅλας, ἡ δὲ ὀξική ἄργιλλος ἐπιμένει διαλελυμένη· ἐὰν δὲ ἐξατμιθῇ, μεταβάλλεται εἰς διὑγραinoμένον καὶ εἰς τὸ ὕδωρ εὐδιαλυτώτατον ἅλας, τὸ ὁποῖον θερμανθὲν ἐκλύει τὸ ὀξικὸν ὀξύ. Ἡ ὀξική ἄργιλλος εἶναι ἐν χρήσει εἰς τὰ φάρμακα ὡς πρόστυμμα, καθὼς καὶ πρὸς τυχίχουσιν ἀνθρωπίνων πτωμάτων.

Ἡ ὀξική μαγνησία κατασκευάζεται διὰ τῆς διαλύσεως τῆς μαγνησίας ὑπὸ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, καὶ διὰ τῆς ἐξατμίσεως παράγει κομμώδη καὶ

διυγραινομένην μάζαν, ἔχουσιν πικράν γεῦσιν· εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ θερμαινομένη ἰσχυρῶς ἐλύει τὸ ὀξικὸν ὀξύ.

Ἡ ὀξική τίτanos ἀποτελεῖται διὰ τῆς διαλύσεως τῆς ἀνθρακικῆς τιτάνου, εἰς τὸ ὀξικὸν ὀξύ παρέχει διὰ τῆς ἐξατμίσεως κρυστάλλους λαμπροὺς καὶ ἀθροῦς διαλελυμένους εἰς τὸν ἀέρα. τὸ εἰρημένον ἄλλας διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ ἐκλύωτερα πικρὰ εἰς τὸ οἶνόπνευμα.

Ἡ ὀξική τίτanos σύγκεται ἐκ

Τίτanos	1 ατ. 28,5 — 35,85
Ὄξικοῦ ὀξέος	1 ατ. 51,0 — 64,15
	79,5 — 100,

Ὄξική βαρεῖα. Κατασκευάζεται διὰ τῆς ἀποτυνθέσεως τῆς ὑδροθεικῆς βαρεῖας διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος. Εἰν τὸ δυνισθὲν ρευστὸν ἐξατμισθῇ, κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος λαμπριζόντων ἐξαγώνων πρισμαμάτων. Εἶναι διαλύσιμον εἰς $1 \frac{3}{4}$ ψυχροῦ καὶ εἰς ἴσην ποσότητα ζέοντος ὕδατος, 100 μέρη οἶνοπνεύματος διαλύουσιν μόνον 1 μέρος ὀξικῆς βαρεῖας, θερμὸ δὲ οἶνοπνεύματος ἀπαιτοῦνται 67 πρὸς τελείαν διαλυσιν. Μεταχειρίζεται εἰς τινὰς περιστάσεις ὡς δοκιμαστήριον.

Ἡ ὀξική στρουτιανή κατσκευάζεται ὡς καὶ ἡ ὀξική βαρεῖα, κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος διαγώνων πρισμαμάτων δριμεῖν γεῦσιν ἐχόντων, διαπυρουμένων εἰς τὸν ἀέρα καὶ διαλυσίμων εἰς $2 \frac{1}{2}$ μέρη ζέοντος ὕδατος.

Περὶ τῶν μεταλλικῶν ὀξικῶν ἀλάτων.

Τὸ ὀξικὸν οὐρανοξείδιον κρυσταλλοῦται εἰς κίτρινα, διαφανῆ καὶ τετραγωνικὰ πρίσματα, ἀμετάβλητα εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ· θερμαινόμενα ἐκλύουσι τὸ ὀξικὸν ὀξύ καὶ ἀποθέτουσι τὸ ὀξείδιον τοῦ οὐρανίου.

Ὄξικὸν κοβαλτοξείδιον. Τὸ ὀξείδιον τοῦ κοβαλτίου διαλύεται ὑπὸ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος πρὸς ἐρυθρὸν ρευστὸν, τὸ ὁποῖον ἐξατμισθὲν παράγει ἰώδη μάζαν εἰς τὸν ἀέρα διυγραινομένην.

Ὄξικὸν βισμούθοξείδιον. Τὸ ὀξείδιον τοῦ βισμούθιου δυσκόλως διαλύεται εἰς τὸ ὀξικὸν ὀξύ· δύναται δὲ νὰ κατασκευασθῇ, ἐὰν ζέον διάλυμα ὀξικῆς ποτάσης ἀνμειχθῇ μετὰ ἀλυσιν νιτρικοῦ βισμούθιου. Μετὰ τὴν ἀπόψυξιν καταβυθίζεται τὸ ὀξικὸν βισμούθιον εἰς εἶδος λεπιδίων ἢ φυλλιδίων ὁμοίων τῶν τοῦ θωρικοῦ ὀξέος.

Ὁξικὸν νικέλιον. Κρυσταλλοῦται εἰς τετραγωνικά πρίσματα ἔχοντα χρῶμα πράσινον καὶ γλυκεῖαν γεῦσιν, διαπυρούμενα εἰς τὸν ἀέρα, διαλύσιμα εἰς 6 μέρη ψυχροῦ ὕδατος, ἀδιάλυτα εἰς τὸ οἶνόπνευμα· θερμαινόμενα ἐκλύουσι τὸ ὀξικὸν ὀξύ.

Ὁξικός χαλκός. Τὸ ὀξικὸν ὀξύ ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ μεταλλικοῦ χαλκοῦ ὑπὸ τὴν παρουσίαν μόνον τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος· καθότι τότε ὀξειδούται ὁ χαλκός, καὶ τὸ ὀξειδίον του ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος. Τὸ ὀξικὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ εἰς διαφόρους ἀναλογίας καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀποτελοῦνται ἄλλα μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως καὶ ὑπερτεροῦντος ὀξέος.

Ὁξικός χαλκός εἰς οὐδετέραν κατάστασιν. Κατασκευάζεται ἐάν ὁ ἐκ τῆς Γαλλίης φερόμενος ὀξικός χαλκός διαλυθῇ εἰς ζέον ὀξικὸν ὀξύ, ἢ καὶ διὰ τῆς ἀμοιβαίας ἀποσυνθέσεως τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου μετὰ διαλύματος τοῦ θειικοῦ χαλκοῦ. Ἀφοῦ τὸ διάλυμα ἐκτιμισθῇ μέχρι κρυσταλλώσεως τίθενται εἰς τὴν ῥηθεῖσιν διάλυσιν μικρὰ τμήματα ξύλων ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀποτίθενται κρύσταλλοι ῥομβοειδεῖς, πράσινοι, ἀσθενῶς διαπυρούμενοι εἰς τὸν ἀέρα. Τὸ ἄλλας τοῦτο ἔχει γεῦσιν γλυκεῖαν, καὶ στυπτικὴν, διχλύεται εἰς 13 $\frac{1}{2}$ ψυχροῦ καὶ εἰς 5 μέρη ζέοντος ὕδατος, καὶ εἰς τὸ οἶνόπνευμα· θερμαινόμενον εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα ἀναφλέγεται καὶ καίει μετὰ πρασίνης φλογός.

Ἐάν καθυποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, κροτεῖ διὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ κρυσταλλωμένου ὕδατος καὶ λαμβάνει φαιὸν χρῶμα χωρὶς νὰ τήκεται, ἀκολούθως ὅμως ἐξελχνίζεται ἐξ αὐτοῦ τὸ ὀξικὸν ὑποξείδιον τοῦ χαλκοῦ καὶ τέλος ἀποστάζεται ἐκ τοῦ εὐκαίτου ὀξικοῦ ὕδωρ ἠνωμένον μετὰ τὸ ὀξειδίον τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ ἀθρακὸς ὀξύ.

Τὸ εἰς τὸ δοχεῖον τοῦ χαλκοῦ ἐνεστὶν ἔχει πράσινον χρῶμα, δι' τὸν ἐμπεριέχοντα χαλκόν, ἀπὸ τὸν ὅποιος δύναιται νὰ ἐλευθερωθῇ δι' ἀποστάξεως. Τὸ μετὰ τὴν πρώτην ἀπόσταξιν ἐπιμέμον εἶναι σύνθετον ἐκ μεταλλικοῦ χαλκοῦ, ὑποξειδίου τοῦ χαλκοῦ καὶ ἀθρακός. Ἐν τῷ διαλύματι τοῦ ὀξικοῦ χαλκοῦ ζεῖται μετὰ ζεχάρεως, ἐξάγεται ὀξικὸν ὀξύ, καταβυθίζομένης τινὸς κίσεως ρηϊζῆς, συνισταμένης ἐξ υποξειδίου τοῦ χαλκοῦ. Τὸ ἀπὸ τὴν εἰρημένην κίνιν μεταγριζόμενον σεράπιον εἶναι ρευστὸν φαιόν, ἐμπεριέχον ἐκτὸς τῆς κρυσταλλωσίου ζεχάρεως μικρὸν ποσὸν ὀξικοῦ υποξειδίου χαλκοῦ διχλευμένον.

Ὁ ὀξικός χαλκός οὗτος γνωστὸς ὑπὸ τὸ ἀκατάλληλον ὄνομα ἰδὸς ἀπεσταγμένου σύγκειται ἐξ

Οξειδίου του χαλκού	40
Οξικού οξέος	51
Ύδατος	9

Οξικός χαλκός μεθ' υπερτερούσης βάσεως: ιός χαλκού ξυστός.

Aes viride seu Aerugo.

Είναι φάρμακον συνιστάμενον ἐξ οξικού χαλκού οὐδατέρου καὶ οξικού χαλκού μεθ' υπερτερούσης βάσεως. Ὁ πρῶτος ὢν διαλύσιμος εἰς τὸ ὕδωρ, δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὸν τελευταῖον δι' ὕδατος. Ὁ ιός τοῦ χαλκοῦ κατασκευάζεται εἰς τὰ μεσημβρινὰ μέρη τῆς Γαλλίας ἀπὸ τοὺς χωρικοὺς ὡς ἐφεξῆς· κατὰ αὐτοῦσιν τὰ ἀθηνῶς ἐκλιβόμενα στέμφυλα εἰς κήδους, οἵτινες διὰ νὰ ἐμποδιθῇ ἡ ζύμωσις φυλάττονται καλῶς κλεισμένοι· ἀκολουθῶς πληροῦνται ἑτέρα ἀγγεῖα ὑπὸ αὐτῶν τῶν στεμφύλων καὶ οὕτω δεγείρεται ταχέως ζύμωσις καὶ ἐκπέμπονται ἀτμοὶ ὡς οἱ τοῦ ὄξους. Εἰς ταῦτα τὰ κιβώτια ἐστιβατμένα μετὰ στεμφύλων καὶ ἐγκρύπτωνται ἐλάσματα χαλκοῦ τρισεύς γραμμῆς παχους, καὶ ἀφίονται 12 — 20 ἡμέρας. Μετὰ ταῦτα ἐκβάλλονται τὰ χάλκινα ἐλάσματα καὶ ἀποξύνονται ἀπὸ τὸν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν σχηματιζόμενον ὑποκυανοῦν ἰὸν τοῦ χαλκοῦ διὰ τινος μαχαιρίου· τὸ ἀποξυόμενον μίγμα ἐγκλείεται εἰς δερματίνους σάκκους, καὶ ἀποξηραίνεται εἰς τὸν ἥλιον. Τὰ ἀποξυόμενα χάλκινα ἐλάσματα ἐντίθενται ἐκ νέου εἰς τὰ στέμφυλα, καὶ ἡ ἐργασία αὕτη ἐπαναλαμβάνεται μεχρὶς καταβρωθῇ ὅλος ὁ χαλκός καὶ παύσῃ ἀπὸ τοῦ νὰ μεταβάλλεται εἰς ἰόν.

Εἰς τινὰ μέρη τῆς Γαλλίας κατασκευάζεται διὰ τῆς ἐκθέσεως τῶν χαλκίνων ἐλασμάτων εἰς ἀτμοὺς ὄξους, ὁ οὕτω δὲ ἀπολαμβανόμενος ιός τοῦ χαλκοῦ ἔχει χροῖμα πλέον πράσινον τοῦ πρώτου.

Ὁ ὑποκυανοῦς ιός τοῦ χαλκοῦ ἐκ τοῦ Montpellier μεταφερόμενος ἐμπεριέχει πολλάκις λεῖψανά στεμφύλων ἢ σπόρους συμμεμιγμένους.

Ὁ οξικός χαλκός μεθ' υπερτερούσης βάσεως δύναται νὰ κατασκευασθῇ, ἂν τὸ δι' ὕδατος διάλυμα τοῦ οξικού χαλκοῦ ἀναμιχθῇ μὲ ὀλίγον ποτὸν ἀμμωνίας.

Ὁ ιός τοῦ χαλκοῦ δὲν πρέπει νὰ συγχέται μὲ τὸ πρασινωπὸν κάλυμμα τοῦ εἰς τὴν ὑγρὰν ἀτμοσφαῖραν ἐκτεθέντος χαλκοῦ, ὅστις εἶναι ἀνθρακικὸν οξειδίου τοῦ χαλκοῦ ὑδρομιγές.

Ὁ ἰὸς τοῦ χαλκοῦ διαλύεται εἰς τὴν ζάχαριν καὶ εἰς τὸ ἀποτελούμενον ῥευστὸν ἢ πάροισια τοῦ χαλκοῦ δὲν ἐξιχνιάζεται μήτε διὰ τῆς ἀμμωνίας μήτε διὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ἐντιδέρου καλίου.

Ὁ ἰὸς τοῦ χαλκοῦ χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν διαφόρων χρωμάτων, πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὀξικοῦ χαλκοῦ, τοῦ οὐδετέρου καὶ τοῦ ἀρσενώδους χαλκοῦ, περὶ τοῦ ὁποίου ὠμιλήσαμεν εἰς τὸ περὶ χαλκοῦ.

Ὁξικός μόλυθος.

Τὸ ὀξικὸν ὀξύ ἐν ὕται μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου εἰς διαφόρους ἀναλογίας καὶ οὕτω παράγονται διάφορα ἄλατα.

Ὁ ὀξικός μόλυθος εἰς οὐδετέραν κατάστασιν γνωστὸς ὑπὸ τὸ ὄνομα ὀξικὸν μόλυθος, ἢ ζάχαρις τοῦ μολύβδου, *Sacharum Saturni* κατασκευάζεται εἰς τὰ γημεῖα, ὡς ἐξῆς: ἐλάσματα μολύβδου διαλύονται εἰς ἀπεσταγμένον ὄξος ἢ εἰς καθαρὸν πυρεξυλικὸν ἐξύ· μετὰ τὴν διάλυσιν ἑωσὺ τὸ ῥευστὸν ἐρυθροῖ τὸν καγκκαμίνον δογματικὸν χάρτην, ἐξατμίζεται τὸ διάλυμα μέχρι κρυσταλλώσεως. Μετ' ὀλίγον κρυσταλλοῦται τὸ ἄλας εἰς εἶδος λαμπρίζουσων ἀγκίδων ἢ διὰ τῆς θραδεῖας ἐξατμίσσεως εἰς πλατέα τετραγωνικὰ πρίσματα. Τὸ ἄλας τοῦτο ἔχει ὑπόγλυκον γεῦσιν κατ' ἀρχάς, ἔπειτα δὲ στίφουσαν μεταλλώδη διαπυροῦται εἰς τὸν ξηρὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, καὶ διαλύεται εἰς τὸ κρυσταλλώδες τοῦ ὕδατος· τὸ τοῦ καγκκαμίνου θάμμα δὲν ἐρυθροῦται παρ' αὐτοῦ, τὸ τῶν ἰῶν σεράπιον μεταβιβάζεται εἰς πράτινον, καὶ τὸ θάμμα τῆς κροκοφρίξης εἰς φαῖν, φαινόμενον προερχόμενον ἀπὸ τὴν ὑπαρξίν ἁλατὸς τινος μεθ' ὑπερτεροῦτης θάσεως. Ἐὰν τὸ εἰρημένον ἄλας μεταβληθῇ διὰ τῆς διόδου ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς τέλειον οὐδέτερον ἄλας, δὲν ἐνεργεῖ πλέον ἐπὶ τῶν φυτικῶν θάσεων.

Τὸ εἰς τὴν ζάχαριν τοῦ μολύβδου ἐμπεριεχόμενον ἄλας μεθ' ὑπερτεροῦσης θάσεως εἶναι τὸ αἷτιον, ὥστε τὸ διάλυμά του νὰ ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος τῆς ἀτμοσφαίρας. Ἐὰν θερμανθῇ διὰ δυνατοῦ πυρὸς ἀποσυντίθεται τὸ ὀξικὸν ὀξύ εἰς ἀνθρακικὸν ἐξύ, ὑδρογον-ανθρακοῦχον αἲριον καὶ εἰς ἐμπυρευματικὸν ὀξικὸν ὀξύ. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἐμπυρευματικοῦ ὀξικοῦ ὀξέος τοῦ σχηματιζομένου διὰ τῆς ξηραῖς ἀποστάξεως διαφόρων ὀξικῶν ἁλάτων, ἀποστάζεται ὁ ὀξικός μόλυθος διὰ πρᾶου πυρὸς εἰς πῆλιν ἀποστακτικὸν σκεῦος, μεθ' οὗ προσαρμόζεται καλῶς ἀποψυχαμμένον δοχεῖον.

Τὸ ἀποσάλαγμα ἐξυδρατεοῦται ἀκολούθως μετὰ ποτάσεως καὶ καθυποβάλλεται εἰς ἄλλην ἀποσχὺν ἐν ᾗ δὲ πικρὰ καὶ νὰ ἀποκατασταθῇ λεῖψυδρον, ἀναποιδάσκειται ἐν ζέσει θερμολογικῆς τι ἀνθου. Τὸ ἐμπυρευματικὸν ὀξικὸν ὅξυ εἶναι ῥευτὸν ἄχρον διὰ νῆς χειρὸς κατέστη ὅτι ἡν ὁμοίαν τῆς τοῦ δι' ὀξυς αἰθέρος καὶ κίφου οὐδ' ἔστιν εἰδικὴν βαρύτητα 0,822, ζέει εἰς θερμοκρασίαν 56°R, ἐν αἰετῇ λατῶν καὶ καίει μετὰ αἰθαλώδους φλογός, χωρὶς ποτὸς νὰ υπολείπῃ ἀνθρακῶδες ὑπόλειμμα.

Ὁ ὀξικός μολύβδος εἶναι διαλύσιμος εἰς ἴσον κατὰ τὸ βάρος ποσὸν ψυχροῦ καὶ εἰς ὀλιγώτερον τοῦ ἡμίσεος ζέοντος ὕδατος. Εἶναι χρήσιμον εἰς τὰ βαφεῖα διὰ τὴν τύπωσιν τῶν ὑφασμάτων, πρὸς κατασκευὴν τῆς ὀξικῆς ἀργύλλου, τοῦ χρωμικοῦ μολύβδου, καὶ ὡς ἱματικὸν μέσον πρὸς ἐξωτερικὴν χρῆσιν, καὶ πρὸς ἄλλας πολλὰς ἐργασίας. Σύγκειται ἐξ

Ὁξειδίου μολύβδου	1 ατ.	112	—	68,95
Ὁξικοῦ ὀξέος	1 ατ.	51	—	26,84
	3 ατ.	27	—	14,21
		190	100	

Ἵγποξικός μολύβδος ὑγρός. Κατασκευάζεται, ἐὰν φύραμα ἐξ ἐνὸς μέρους ὀξικοῦ μολύβδου κεκαθαρμένου καὶ ἐνὸς λιθαργύρου λεῖου ζέωνται ὀλίγον καιρὸν εἰς χάλκινον ἀγγεῖον μετ' 20 μέρη ὕδατος, καὶ ἀνακινουῦνται συνεχῶς, ἕως οὗ διαλυθῇ ὁ λιθάργυρος· μετὰ τὴν διάλυσιν διυλίζεται καὶ ἐξατμίζεται μέχρι κρυσταλλώσεως. Κρυσταλλοῦται δὲ εἰς εἶδος λευκῶν καὶ ἀδιαφανῶν φυλλιδίων, ἀμεταβλήτων εἰς τὸν αἴρα, καὶ διαλυσίμων εἰς τὸ ὕδωρ, ὀλιγώτερον τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου. Τὸ διάλυμα πρασινίζει ἰσχυρῶς τὸ δι' ἴων σερᾶπιον καὶ μεταβάλλει εἰς φαιὸν τὸν τῆς κροκοφρίξης δοκιμαστικὸν χάρτην. Διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καταβυθίζεται ἐξ αὐτοῦ μεγάλη ποσότης ἀνθρακικοῦ μολύβδου, καὶ εἰς τοῦτο στηρίζεται ἡ κατασκευὴ τοῦ ψευδαῖου, εἴτε τοῦ ἀνθρακικοῦ μολύβδου. Τὰ διαλύματα τῶν οὐδετέρων ἀλάτων ὡς καὶ τὸ τῆς νιτρικῆς ποτάσεως καὶ σόδας ἀποχωρίζουσιν ἐξ αὐτοῦ ἀδιάλυτον ἄλας μετ' ὑπερτερούσης θάλασσης. Ὡσαύτως ἀποσυντίθεται διὰ διαλυμάτων κόμμεως, βυρσοδεφικῆς ὕλης καὶ πολλῶν ἄλλων ὀργανικῶν ὕλων. Σύγκειται ἐξ.

Ὁξε δίου τοῦ μολύβδου	3 ατ.	336	—	86,82
Ὁξικοῦ ὀξέος	1 ατ.	51	—	13,18
		387	—	100

Ὁ κρυσταλλωμένος ἐμπεριέχει 5 τὸν $\frac{1}{10}$ ὕδατος.

Ὁ ὑγρὸς ὑποξικὸς μόλυβδος ὁ κα-ατκευζόμενος διὰ τῆς ζέσεως τοῦ ἀγοραίου ὄξους μετὰ λιθαργύρου καὶ διὰ τῆς ἐξκτρίσεως τοῦ διϋλισθέντος ῥευστοῦ εἶναι ἐν χρήσει εἰς τὴν ἱατρικὴν καὶ καλεῖται ἐκχύλισμα τοῦ μόλυβδου, *Extractum Saturni*· ὁ δὲ εἰς κεκραμένην κατάστασιν καλεῖται *Acetum Saturni* Ὅξος τοῦ μόλυβδου, ἢ ἐκχύλισμα τοῦ μόλυβδου, τὸ ὁποῖον θλοῦται διὰ τοῦ πηγαίου ὕδατος, ὡς καὶ διὰ παντὸς ἄλλου ἐμπεριέχοντος ἔχνη ἀνθρακικοῦ ὄξεος

Κεκραμένον διὰ πολλοῦ ὕδατος καὶ προστεθέντος ὀλίγου οἶνοπνεύματος γεννᾶται γαλακτόχρουν ῥευστὸν χρήσιμον εἰς τὴν ἱατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα *Μολυβδοῦχον ὕδωρ τοῦ Goulard*, ἐπειδὴ κατὰ πρῶτον ἐμεταχειρίσθη παρὰ τινος χειρουργοῦ Goulard καλουμένου ὡς ἐξωτερικὸν ἱαματικὸν μέσον.

Περὶ τοῦ ψιμυθίου.

Ὁ εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους συνήθης τρόπος πρὸς κατασκευὴν τοῦ ψιμυθίου, εἴτε τοῦ ἀνθρακικοῦ μόλυβδου, συνίσταται εἰς τὸ νὰ μεταβληθῇ ὁ ὀξικός μόλυβδος ζεόμενος μετὰ τοῦ λιθαργύρου εἰς ὑποξικὸν μόλυβδον καὶ νὰ ἀποσυντεθῇ τὸ διϋλισθὲν διάλυμα τοῦτο διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὄξεος τοῦ ἐκλυομένου ἐκ τῆς τιτάνου, ἢ ἐξ ἀνθράκων καιομένων εἰς σιδηροῦν κύλινδρον, μεχριστοῦ δὲν ἀποτελεῖται καταβύθισμα. Τὸ ἐπιπολάζον ῥευστὸν μεταγγιζόμενον ἀπὸ τὸ σχηματιζόμενον ψιμυθίον μεταβάλλεται πάλιν διὰ τῆς ζέσεως μετὰ λιθαργύρου εἰς ὑποξικὸν μόλυβδον, καὶ ἀποσυνθετόμενον δι' ἀνθρακικοῦ ὄξος παρέχει ἐκ νέου ψιμυθίον. Ἡ ἐργασία αὕτη δύναται νὰ ἐπαναληθῇ πολλάκις, καθότι ὁ ὀξικός μόλυβδος διατηρεῖ τὴν ιδιότητά τοῦ διαλύειν τὸν λιθάργυρον. Τὸ ἀποτελούμενον κατακρήνισμα ἀποπλυθὲν ἀρκούντως ξηραίνεται διὰ πρᾶου πυρὸς εἰς τύπους, καὶ οὕτω με-αφέρεται εἰς τὸ ἐμπόριον.

Εἰς τὴν Ὁλλάνδαν καὶ τινὰ μέρη τῆς Γερμανίας πρὸς κατασκευὴν τοῦ ψιμυθίου πληροῦνται ἀγγεῖα μὲ ὄξος καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ῥευστοῦ τίθενται καθέτως λεπτὰ ἐλάσματα ἐλικοειδῶς τυλιγμένα, ἔπειτα ἐγκρύπτονται τὰ ἀγγεῖα πρὸς ἀσθενὴ θέρμανσιν εἰς κόπρον ἢ εἰς βυρσοδεψικὸν λέπος. Διὰ τῆς ἐξκτρίσεως τοῦ ὄξους καὶ τοῦ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως αὐτοῦ ἀποτελουμένου ἀνθρακικοῦ ὄξεος σχηματίζεται τὸ ψιμυθίον· μετὰ παρέλευσιν τινῶν ἐβδομάδων καλύπτεται ἡ ἐπιφάνεια τοῦ

μολύβδου με λευκὴν στιβάδα ψιμυθίου, τὸ ὁποῖον ἀποξύνεται, τὰ δὲ μὴ διαφθαρέντα ἐλάσματα τοῦ μολύβδου τίθενται εἰς τὴν πρώτην τῶν θέσιν. Τὸ οὕτως ὅμως κατασκευαζόμενον ψιμύθιον ἔχει πάντοτε τεφροειδὲς χρῶμα, ἀναμφιβόλως ἕνεκα τοῦ ἐκ τῆς κόπρου καὶ τοῦ θυρσοδυσφικοῦ λέπους ἐκλυομένου ὑδροθειωμένου αἰρίου. Ἀποτελεῖται δὲ λευκότητι, ἐὰν τὰ τοῦ μολύβδου ἐλάσματα ἐκτεθῶσιν εἰς τοὺς ἀτμούς τινας ῥευστοῦ εἰς οἰνώδη ἢ ὀξικὴν ζύμωσιν εὐρισκομένου εἰς θερμὰ δωμάτια οὕτως, ὥστε τὰ ἐλικοειδῶς τυλιγμένα ἐλάσματα νὰ τεθῶσιν ὀρίζοντίως ἐπὶ τοῦ ἀγγείου ἐν ᾧ κείνται αἱ πρὸς ζύμωσιν ὑλαι.

Ἐπειδὴ δὲ ἐκ τοῦ ζυμωμένου φυράματος ἐκλύεται ἀνθρακικὴν ὀξύ μετὰ ἀτμῶν ὄξους καὶ ὕδατος, καταβιβράσκειται ὁ μολύβδος διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ ὄξους, ὑπὸ τὴν συνδρομὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος, καὶ μεταβάλλεται οὕτως κατὰ μέγα μέρος εἰς ἀνθρακικὴν, καὶ ἐν μέρει εἰς ὀξικὴν μολύβδον. Πιθανόν, ὅτι τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ γεννᾶται διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ ὄξους. Ἐπομένως τὸ ψιμύθιον ἀποπλύνεται καὶ μεταγγίζεται συνεχῶς πρὸς διάλυσιν τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον κατασκευάζεται πλησίον τῆς Βιέννης καθαρῶτατον ψιμύθιον ἐμπορευόμενον ὑπὸ τῷ ὀνομα *Cerussa veneta*.

Πρὸς τὸν συνήθη μετ' ἐλαίου ζωγραφισμὸν ἀναμιγνύεται μετὰ κρητιδος καὶ θεϊκῆς βαρείας· πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς νοθεύσεως ταύτης ζέεται τὸ ψιμύθιον ἐπανειλημμένως μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος καὶ οὕτω διαλύεται τὸ ψιμύθιον καὶ ἡ ἀνθρακικὴ τίτανος, ἡ δὲ θεϊκὴ βαρεῖα μένει ἀδιάλυτος. Τὸ διάλυμα, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει νιτρικὸν μολύβδον καὶ νιτρικὴν τίτανον, ἀφοῦ ἐξατμισθῇ μέχρι ξηροῦ, διαλύεται εἰς οἰνόπνευμα, τὸ ὁποῖον διαλύον τὴν νιτρικὴν τίτανον ἀφίνει ἀδιάλυτον τὸν νιτρικὸν μολύβδον.

Εἰς καθαρὰν κατάστασιν σύγγειται ἐξ:

Ὄξειδιόν τοῦ μολύβδου 83. 5.

Ἀνθρακικοῦ ὀξέος 16. 5.

Τὸ ψιμύθιον μεταχειρίζεται ἐξῆχος εἰς τὴν ζωγραφικὴν πρὸς λέπτυνσιν τῶν ἄλλων χρωμάτων, καὶ ἐπίσης ἐπιταχύνεται δι' αὐτοῦ ἡ ξήρανσις τῶν ἐλαίων. Ὅχι ὀλιγώτερον μεταχειρίζεται καὶ πρὸς ἐξωτερικὴν χρῆσιν εἰς τὴν ἱατρικὴν.

Ὁξικὸν ὑποξείδιον τοῦ μαγγανησίου. Κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος διαφανῶν ρουβοειδῶν πλακῶν στυπτικῆς καὶ μεταλλικῆς γεύσεως, διαλυσίμων εἰς $3 \frac{1}{2}$ ψυχροῦ ὕδατος καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Ὁξικός ψευδάργυρος. Ὁ μεταλλικὸς ψευδάργυρος διαλύεται εἰς τὸ

ὄξικόν ὄξύ, ἐκλυομένου ὑδρογόνου, ἐκ δὲ τοῦ ἀποτελουμένου διαλύματος κρυσταλλοῦνται εὐκαμπτα φυλλίδια ἀμετάβλητα εἰς τὸν ἀέρα. Τὸ ἄλλας τοῦτο εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, καίει ἐπὶ διαπύρων ἀνθρώπων μετὰ φλογὸς χαρακτηρίζουσης τὸν ψευδάργυρον.

Ὁξικόν Κάδμιον. Συνίσταται ἀπὸ μικρὰς καὶ ἀστεροειδῶς τεταγμένας ἀγγίδας, αἵτινες εἶναι ἀμετάβλητοι εἰς τὸν ἀέρα καὶ εὐδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ.

Ὁξικὸς ὑποξειδωμένος κασσίτερος. Ὁ μεταλλικὸς κασσίτερος δὲν διαλύεται εὐκόλως ὑπὸ τοῦ ζέοντος ὄξικου ὀξέος, τὸ δὲ ὑδρομιγρὸς ὑποξειδίου τοῦ κασσίτερου διαλύεται εὐκόλως ὑπ' αὐτοῦ· τὸ ἄλλας τοῦτο δύναται νὰ κατασκευασθῇ καὶ δι' ἀμοιβαίης ἀποσυνθέσεως πεπυκνωμένης δικλύσεως ὑδροχλωρικοῦ ὑποξειδωμένου κασσίτερου δι' ὄξικου μολύβδου. Τὸ ἀπὸ τὸν σχηματισθέντα ὑδροχλωρικὸν μολύβδον μεταγγιζόμενον ῥευστὸν δίδει διὰ τῆς ἐξατμίσεως μικροὺς κρυστάλλους ὄξικου ὑποξειδωμένου κασσίτερου ἀποβόρωντας μὲ ταχύτητα τὸ ὀξυγόνον ἐκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

Ὁ ὄξικὸς ὀξειδωμένος κασσίτερος εἶναι ὑποχρον κομμῶδες φύραμα.

Ὁξικὸς ὑποξειδωμένος σίδηρος. Τὰ ῥινίσματα τοῦ σιδήρου διαλύονται θραδῶς εἰς τὸ ὄξικόν ὄξύ, ἐκλυομένου ὑδρογόνου. Ταχύτερα ἀποτελεῖται τὸ εἰρημένον ἄλλας διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως διαλύματος θειικοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου διὰ διαλύσεως ὄξικου μολύβδου, καὶ ἐκ τοῦ ἀπὸ τὸν θειικὸν μολύβδον μεταγγιζόμενου καὶ διυλισθέντος ῥευστοῦ κρυσταλλοῦνται διὰ τῆς ἐξατμίσεως ἀνοικτοπράσινα πρίσματα, ἔχοντα στυπτικὴν καὶ γλυκεῖαν γεῦσιν, καὶ διαπυρούμενα εἰς τὸν ἀέρα. Διὰ τῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς μεταβάλλεται τὸ διάλυμα εἰς ὄξικόν ὀξειδωμένον σίδηρον. Τὸ διάλυμα τοῦ ὄξικου ὀξειδωμένου σιδήρου εἶναι ἐρυθρόφαιον δὲν παρέχει διὰ τῆς ἐξατμίσεως κρυστάλλους, ἀλλὰ μόνον φαῖν καὶ πηκτώδη μάζαν διῶγραιομένην εἰς τὸν ἀέρα. Τὸ διάλυμα τοῦτο χρησιμεύει εἰς τὰ βαφεῖα ὑπὸ τὸ ὄνομα, *διάλυμα τοῦ σιδήρου, βάμμα τοῦ σιδήρου*. Πρὸς κατασκευὴν μεγάλης ποσότητος αὐτοῦ ἐκτίθεται ἄχρηστος καὶ δι' ὄξους καταβραχείς σίδηρος εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἑωσοῦ μεταβληθῇ εἰς ὀξείδιον, μετὰ ταῦτα βάλλεται διαδοχικῶς εἰς κᾶδον πλήρη ὄξους καὶ πάλιν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἡ ἐργασία αὕτη ἐπαναλαμβάνεται μεχρὶς τοῦ διαλυθῇ ἐντελῶς ὁ σίδηρος. Ὁ διὰ τοῦ ὄξους διαλελυμένος ὑποξειδωμένος σίδηρος μεταβάλλεται εἰς ὀξείδιον διὰ τῆς ἐκθέσεώς του εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, καὶ ἕνεκα τούτου σχηματίζεται καταβύθισμα ἐρυθρόφαιον συνιστάμενον ἐξ ὄξικου ὀξειδωμένου σιδήρου μεθ' ὑπερτερούσης

βάσεως· τὸ διάλυμα τοῦτο ἀποβάλλει εὐκόλως τὸ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι χρήσιμον εἰς τὰ βαφεῖα πρὸς τύπωσιν τῶν ὑφασμάτων.

Πρὸς διάλυσιν τοῦ σιδήρου μεταχειρίζονται ἀντὶ τοῦ συνήθους ὄξους τὸ ἐμπυρευματικὸν ὀξικὸν ὀξύ. Ὁ ὀξικὸς σιδηρὸς διαλύεται καὶ εἰς τὸν δι' ὄξους αἰθέρα καὶ τὸ διάλυμα ἀναμιγνύμενον μὲ οἶνοπνευμα εἶναι ἐν χρήτει εἰς τὴν ἱατρικὴν ὑπὸ τὸ ὄνομα αἰθέρ ἐνσίδηρος δι' ὄξους καὶ οἶνοπνεύματος, *Tinctura ferri acetici aetherea Klaprothi*.

Ὁξικὸς ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος. Τὸ προσφάτως καταθυθίζμενον ὑποξείδιον τοῦ ὑδραργύρου διαλύεται μὲν εἰς τὸ ζέον ὀξικὸν ὀξύ, τὸ ἄλλας ὁμως τοῦτο κατασκευάζεται ἐκολώτερον, ἐὰν θερμὸν καὶ πετυκνωμένον διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου ἀναμιχθῇ μετὰ τοῦ θερμοῦ διαλύματος ὀξικῆς ποτάσης. Τὸ οὕτως ἀποτελούμενον καταθύθισμα συνιστάμενον ἐξ ὀξικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου διαλύεται, ἀφοῦ προηγουμένως ἀποπλυθῇ διὰ ψυχροῦ ὕδατος εἰς ὅσον τὸ δυνατὸν ὀλίγον ζέον ὕδωρ· διὰ τῆς ἀποψύξεως τοῦ διαλύματος καθίζει τὸ ἄλλας τοῦτο εἰς εἶδος ἀχρόων καὶ λεπτῶν λεπιδίων ἄτινα, ἔχουν τὴν λαμπρότητα τοῦ ἀργύρου, εἶναι διαλύσιμα εἰς 139 ψυχροῦ ὕδατος, ὠχροῦνται εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα καὶ μελανίζονται διὰ τῆς ἐπιβροῆς τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. Διὰ τῆς θερμάνσεως ἐξαχνίζεται ἐξ αὐτοῦ ἄλλας εἰς λευκὰς ἀγγίδας, μέρος ὀξικοῦ ὀξέος ἀπὸ τῆς ὁσμῆς ἔχοντος ἀποστάζεται, ἕτερον δὲ μέρος ἀποσυντίθεται.

Ὁξικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος. Ἐὰν τὸ ἐρυθρὸν ὀξειδον τοῦ ὑδραργύρου διαλυθῇ εἰς θερμὸν ὀξικὸν ὀξύ καὶ τὸ ἀποτελούμενον ρευστὸν ἐκτριμισθῇ, κρυσταλλοῦται ἐξ αὐτοῦ ἄλλας εἰς ἄχρῳα διαφανῆ πρίσματα, εὐθρυπτα καὶ στίλβοντα εἰς τὸν ἀέρα· δι' ὕγκνινόμενον δὲ ἀποβάλλει μέρος τοῦ ὀξέος, ὠχροῦται καὶ ἀποσυντίθεται εἰς ἄλλας μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως, διαλύεται εἰς 4 μέρη ψυχροῦ ὕδατος καὶ εἰς 17 μέρη οἶνοπνεύματος. Διὰ ζέσεως μετὰ ζαχάρως μεταβάλλεται εἰς ἄλλας ἔχον βάσιν τὸ ὑποξείδιον τοῦ ὑδραργύρου.

Ὁξικὸς ἄργυρος. Δύναται νὰ κατασκευασθῇ διὰ τῆς διαλύσεως προσφάτως κατακρημνιζομένου ὀξειδίου τοῦ ἀργύρου εἰς θερμὸν ὀξικὸν ὀξύ, ἢ διὰ τῆς ἀναμιξεως διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου μετὰ θερμοῦ διαλύματος ὀξικῆς ποτάσης. Μετὰ τὴν ἀπόψυξιν κρυσταλλοῦται τὸ ἄλλας εἰς μαργαριτοροειδεῖς λεπτὰς ἀγγίδας. Οἱ κρυσταλλοὶ δὲν ἐμπεριέχουσιν

ὑδωρ, θερμαινόμενοι δὲ ἐκλύουσιν καθχρόν ὀξικόν ὀξύ, καὶ καθχρὸς ἀργυρος ἐπιμέλει δ ατηρῶν τὸ σχῆμα τῶν κρυτάλλων· εἶναι διαλύσιμος εἰς 100 μέρη ψυχροῦ ὕδατος καὶ σύγκειται ἐξ

Ὀξικοῦ ὀξέος 30,54

Ὀξειδίου ἀργύρου 79,46

Ὀξικὸς χρυσός. Τὸ ὀξικόν ὀξύ ἀκρατον διαλύει μέρος τοῦ προσφάτως καταβυθιζομένου ὀξειδίου τοῦ χρυσοῦ, ὅστις κατ' ὀλίγον ἀποχωρίζεται εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν.

Ὀξικὸς λευκὸς χρυσός. Τὸ ὑδρομιγὲς ὑποξ. ἴδιον τοῦ λευκοχρύτου διαλύεται ὑπὸ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, καὶ τὸ ρευστὸν ἔχει ὑποπράσινον χρῶμα, ξηραίνεται πρὸς πράσινον μάζαν, καὶ διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ, ἐπιμένοντος ὀλίγου ὑποξειδίου τοῦ λευκοχρύσου.

Σῆψις. Εὐρωτιῶσα ζύμωσις.

Ἄπαντα τὰ τῆς ζωῆς στερηθέντα φυτικὰ ἢ ζωϊκὰ σώματα κατ' ὀλίγον μεταβάλλονται, χάνουσι τὸ σχῆμά των, ἐκπέμπουσι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀηδῆ ὀσμὴν, καὶ μάλιστα ἐὰν ἐμπεριέχωσι νιτρογόνον, καὶ τέλος διαλύονται ὀλοτελῶς· τοῦτο δὲ προέρχεται καθότι ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἀπορροφῶσιν ὀξυγόνον, καὶ οὕτω σχηματίζεται ἀνθρακικόν ὀξύ καὶ ὕδωρ. Ἐὰν δὲ ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ δὲν ἔχη ἐλευθέραν εἴσοδον, ἐνοῦται τὸ ὑδρογόνον μετὰ τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν, μετὰ τοῦ θείου, νιτρογόνου κ.τ.λ., καὶ ἐξ αὐτῶν γεννῶνται δυσώδη μιάσματα. Τὸ σύνολον τῶν εἰρημένων φαινομένων καλεῖται σῆψις.

Αἱ μαλακαὶ φυτικαὶ οὐσίαι ὑπόκεινται εἰς ταχυτέραν σῆψιν παρὰ τὰς σκληρὰς καὶ ξυλώδους φύσεως, εἰς τὰς ὁποίας σῆψις τότε μόνον προάγεται, ὅταν ἐπαυξηθῇ ὁ βαθμὸς τῆς θερμότητος καὶ συναφθῶσι μεθ' ὕδατος· ἐνεκα τούτου σώματα καλῶς ξηρανθέντα καὶ φυλαττόμενα εἰς ξηρὰν κατάστασιν δὲν ὑπόκεινται εἰς σῆψιν. Μερικαὶ φυτικαὶ οὐσίαι καθὼς τὰ λιπώδη καὶ πτητικὰ ἔλαια, αἱ ῥητῖναι κτλ. δὲν ὑπόκεινται εἰς σῆψιν, χρησιμεύουσι δὲ μᾶλλον πρὸς διατήρησιν τῶν λοιπῶν οὐσιῶν ἀπὸ αὐτῆν.

Ἄνευ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος τὰ σώματα δυσκόλως

σῆπονται, ἂν καὶ ὑπὸ τὴν ἐνέργειαν τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ὕδατος, καὶ εἰς τοῦτο ἐπιστηρίζεται ἡ μέθοδος, δι' ἧς διατηροῦμεν τὰ ξηρανθέντα φυτικά σώματα πολὺν καιρὸν εἰς τὴν νεαράν των κατάστασιν· ἔαν π. χ. ὑέλιναι φιάλαι πληρωθεῖσαι μὲ πρασίνοους κυάμους ἢ ἄλλους καρποὺς καὶ καλῶς ἐπιπωματισθεῖσαι τεθῶσιν εἰς λέβητα πλήρη ψυχροῦ ὕδατος, καὶ κατ' ὀλίγον τὸ ὕδωρ θερμαίνεται μέχρι ζέσεως, καὶ ἔαν αἱ φιάλαι, ἀφοῦ ὀλίγον χρόνον ἀφεθῶσιν εἰς τὸ ζέον ὕδωρ, βραδέως ἀποψυχρανθῶσι, τότε αἱ εἰς αὐτάς τεθεῖσαι φυτικαὶ οὐσίαι δύνανται νὰ διατηρήσωσι πολὺν χρόνον τὴν νεαράν των κατάστασιν. Εἰς τὴν περίεασιν ταύτην ἀπορροφᾶται παρὰ τῶν εἰς τὰς φιάλας ἐγκεκλεισμένων καρπῶν τὸ ὀξύγονον καὶ ἀντ' αὐτοῦ σχηματίζεται ἀνθρακικὸν ὀξύ, ὥστε οἱ καρποὶ εὐρίσκονται εἰς ἀτμοσφαῖραν συγκεκριμένην ἀπὸ νιτρογόνου καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξυ, καὶ ἐπειδὴ ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ δὲν δύναται νὰ εἰσέλθῃ, προφυλάττονται ἀπὸ τὴν σῆψιν.

Εἰς τὴν σῆψιν τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν σχηματίζονται διάφοροι οὐσίαι, ἐξαερώμεναι ὅμως ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀέρος, τοῦ ὕδατος καὶ τῆς μεγάλης ἢ μικρᾶς θλίψεως τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, καθὼς ὅταν εὐρίσκωνται εἰς ἀρκετὸν βάθος ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς.

Πρὸ πάντων γεννᾶται διὰ τῆς αὐτομάτου ἀποσυνθέσεως τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν εἰς τὴν ὑγρὰν ἀτμοσφαῖραν ὁ Εὐρώς γνωστός καὶ ὑπὸ τὸ ὄνομα *Ulmin*, *Acidum Ulmicum*, *εὐρωϊκὸν ὀξύ*, *βορβορῶδες ὀξύ*. Ὁ εὐρώς σχηματίζεται καὶ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τῶν μαραμμένων φυτῶν, ἀναμιγνύεται μετὰ τοῦ κηπαίου χρώματος, καὶ οὕτω σχηματίζεται ἡ μέλαινα ἀρόσιμος γῆ, ἡ ὁποία ἐνουμένη μετὰ τῶν ἄλλων συστατικῶν συντείνει πρὸς κήπρισμα τῶν ἀγρῶν, καὶ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον ποσὸν τοῦ εὐρώτος κρέμαται κατὰ μέγα μέρος ἡ εὐκαρπία τοῦ ἀγροῦ. Ὁ εὐρώς εἶναι συστατικὸν μέρος τῆς τούρφας καὶ τοῦ ἀσφαλτώδους ξύλου, εὐρίσκεται διακλυμένος καὶ εἰς τινὰ πηγαία ὕδατα, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν δι' αὐτοῦ κίτρινον χρῶμα. Τοῦτο τὸ βορβορῶδες ὀξύ εὐρίσκεται εἰς τὴν μέταξιν ὡς συστατικὸν τοῦ χρώματός της, καθὼς καὶ εἰς τὴν αἰθάλην· σχηματίζεται δὲ τεχνητῶς διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου ἐπὶ πολλῶν ὀργανικῶν ὑλῶν.

Ἡ ἀποχώρησις τοῦ εὐρώτος εἰς καθαρὰν κατάστασιν εἶναι πολλὰ δύσκολος, ἐπειδὴ εὐρίσκεται ἡνωμένος μετὰ τινων βάσεων, καὶ ἔαν αὗται ἀποχωρισθῶσιν, ἐνοῦται κατὰ μέγα μέρος μετὰ τοῦ πρὸς ἀποχώρησιν μεταχειριζομένου ὀξέος. Συνήθως ἐκχυλίζεται ἐκ σερπηπότος ξύλου καὶ ἐκ

τῆς ἀροσίμου γῆς διὰ καυστικοῦ καλίου, καὶ ἀκολούθως ἀποχωρίζεται ἐκ τῆς διαλύσεως ταύτης διὰ προσθήκης τινὸς ὀξέος.

Ὁ Sprengel μεταχειρίζεται πρὸς κατασκευὴν τοῦ εὐρώτος τὴν λειοτετριμμένην τούρβαν, ἐκ τῆς ὁποίας ἐκχυλίζονται πρότερον διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος τὰ ἐνυπάρχοντα ἀλκάλια· μετὰ τὴν ἐκχύλισιν διὰ τῶν ἀλκαλίων κατεργάζεται καιρόν τινα μὲ καυστικὴν ἀμμωνίαν, δι' ἧς διαλύεται ὁ εὐρώς, καὶ, προστεθέντος ἀλικοῦ ὀξέος, ἀποχωρίζεται· διὰ πλύσεως δὲ μετὰ ταῦτα καθαρίζεται.

Ὁ νεαρὸς κατακρημνιζόμενος εὐρώς σχηματίζει κιτρίνας κροκίδας ξηρανομένας πρὸς μέλαιναν καὶ εὐθρυπτον μάζαν, καὶ τὸ τοῦ καγκαμίνου βάμμα ἐρυθροῦται παρ' αὐτοῦ. Διὰ τῆς μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ζέσεως μεταβάλλεται εἰς βυρσοδεψικὴν ὕλην, ἐκτεθεὶς δὲ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἀπορροφᾷ ὀξυγόνον, καὶ οὕτω σχηματίζεται ἀνθρακικὸν ὀξύ.

Ὁ εὐρώς διαλύεται παρὰ τῶν ἀλκαλίων, ὡς ὑπὸ τῆς ποτάσσης, τῆς σόδας, κτλ., καὶ ἐνούμενος μετ' αὐτῶν ἀφαιρεῖ τὰ ἀλκαλικά των χαρακτηριστικά· τὰ διαλύματά του ἀφίνουσιν, ἐξατμιζόμενα, μελανὴν, εὐθρυπτον καὶ εἰς τὸν ἀέρα ἀμετάβλητον μάζαν, τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν ἔχει καὶ ἡ ἀμμωνία σχηματίζουσα μετ' αὐτοῦ εὐδιάλυτον ἢ φαϊὰν ἔνωσιν.

Μετὰ τῆς βαρείας καὶ τιτάνου σχηματίζει δυσδιάλυτους ἐνώσεις, μετὰ δὲ τῆς μαγνησίης πλέον εὐδιάλυτον, ἥτις ὅμως ξηρανθεῖσα ἀποκαθίσταται σχεδὸν ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ· αἱ πλείουςτεροι ἐνώσεις τοῦ εὐρώτος μετὰ τῶν ὀξειδίων τῶν μετάλλων, εἶναι ὀλίγον ἀδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ, δύνανται δὲ νὰ ληφθῶσι διὰ τῆς ἀναμίξεως διαλύματος τοῦ εὐρώτος εἰς τὴν ἀμμωνίαν μετὰ τῶν διαλυμάτων τῶν μετάλλων, τοιουτοτρόπως γεννῶνται αἱ ἀδιάλυτοι ἐνώσεις τοῦ εὐρώτος μετὰ τῶν ὀξειδίων τοῦ μολύβδου, σιδήρου, χαλκοῦ, ὑδραργύρου, καὶ ἀργύρου. Ἡ ἔνωσις τοῦ εὐρώτος μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀπαντᾷται αὐτοσυστάτως, καὶ μάλιστα εἰς τὰ τῶν βορβορωδῶν τόπων χρώματα. Ὁ Sprengel, ὅστις θεωρεῖ τὸν εὐρώτα ὡς ἰδιαιτέρον ὀξύ, καλεῖ τὰς εἰρημένους ἐνώσεις μετὰ τῶν βάσεων ἄλατα. Ὁ εἰς τὴν μελανὴν ἀροσίμον γῆν ἐνυπάρχων εὐρώς ἀπορροφᾷται ὑπὸ τῶν βλαστάνοντων φυτῶν καὶ οὕτως ἡ γῆ αὕτη ἀποκαθίσταται τέλος ἄκαρπος, καὶ μόνον διὰ ζωτικῶν οὐσιῶν διὰ τῶν ὁποίων ἀναγεννᾶται ὁ εὐρώς δύναται νὰ δοθῇ εἰς τὸν ἀγρὸν ἢ πρῶτη του γονιμότης.

Εἰς βαλτωδεῖς τόπους ἀπαντᾷται ἐνίοτε ἄκαρπος καὶ ὀξέα χαρακτη-

ριστικά ἔχουσα γῆ, εἰς τὴν ὁποίαν μόνον διάφορα εἶδη ἀλγῶν, μνίων κτλ. φύονται, τοῦτο προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπαρξίν ἐλευθέρων ὀξέων ὡς τοῦ ὀξικοῦ, μηλικοῦ καὶ φωσφορικοῦ ὀξέος κτλ, καὶ τὰ τοιαῦτα ὀξέα πολλάκις εὐρίσκονται ἐνωμένα μετὰ τῆς τιτάνου· ἐάν δὲ κατῇ, εὐρίσκονται φωσφορικὸν ὀξύ εἰς τὴν τέφραν· τοιαύτης φύσεως ἄκκοπος γῆ δύναται νὰ μεταβληθῇ εἰς γόνιμον, ἐάν ἀναμιχθῇ μετὰ τιτάνου ἢ τέφρας. Μετὰ τὸ προεκτεθεὶν εὐρωτικὸν ὀξύ ὁμοιάζει τὸ κρηνικόν, καὶ τὸ ἀποκρηνικόν ὀξύ, *Acidum crenicum*, *apocrenicum*.

Ἀμφότερα τὰ ὀξέα ταῦτα εὐρίσκονται εἰς τὴν ἑκτινων σιδηρούχων ἱαματικῶν ὑδάτων ἀποτιθεμένην ἰλὸν, εἰς τὸ σεσηπὸς ξύλον, τὴν ὥχραν, καὶ ἄλλα τινὰ σιδηροῦχα ὀρυκτά· ἠνωμένα μετὰ τοῦ χαλκοῦ ἀπαντῶνται εἰς τὰ μετὰ τὴν σῆψιν ἐπιμένοντα ὑστρακα τῶν ἐγχυματικῶν ζώων· τεχνητῶς σχηματίζεται τὸ βορβορώδες ὀξύ ἐπίσης διὰ τῆς ἐπιρρόης τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ ἀνθρακος καὶ ἐπὶ τοῦ χυτοῦ σιδήρου.

Πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ ὀξέος τούτου ἐκτίεται ἡ λειοτριβημένη ὥχρα μετὰ καυστικοῦ καλίου καὶ ἀφοῦ τὸ διάλυμα κορεσθῇ δι' ὀξικοῦ ὀξέος, ἀποχωρίζεται τὸ διαλυθὲν ὀξύ δι' ὀξικοῦ χαλκοῦ, καὶ ἐκ τοῦ ἀποτελουμένου ἰζήματος διὰ ὑδροθειωμένου ἀερίου. Τὸ καθαρὸν ὀξύ ἔχει κατ' ἀρχὰς ὀξινήν, ἀκολουθῶς στυπτικὴν γεῦσιν, διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Ἐάν τὸ διάλυμά του ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρρόην τοῦ ἀέρος, μεταβάλλεται δι' ἀπορρόφησης ὀξυγόνου εἰς τὸ ἀποκρηνικόν ὀξύ.

Ἔλαι διὰ τῆς σήψεως τῶν ὀργανικῶν σωμάτων ὑπὸ τὸ ὕδωρ.

ὑπὸ τὸ ὕδωρ ὑπόκεινται τὰ φυτικά σώματα εἰς σῆψιν μὲ ἀρκετὴν ὅμως βραδύτητα, καὶ ἐκ τοῦ ξύλου καὶ ἄλλων τινῶν φυτῶν σχηματίζεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἶδος τι ἰλύος γλισχρώδους τὴν ἀφήν καὶ χρησίμου διὰ λασπώδη λουτρά.

Νεαραὶ φυτικαὶ ροσάι βυθισθεῖσαι εἰς ὕδωρ ἀνθίστανται πολὺν καιρὸν εἰς τὴν σῆψιν· εἰς τὸ ὕδωρ βυθισθέντα ξύλα, ἢ καταποντισθέντα πλοιάρια ἐδιατηρήθησαν διὰ πολλοὺς αἰῶνας· Εἰς τοῦτο ἐπιστηρίζεται ἡ ἀσφάλεια τῶν ἐν τῷ ὕδατι ξυλίνων θεμελίων τῶν οἰκῶν.

Εἰς τὴν τάξιν ταύτην ἀνήκει ἡ *Tourbe Turba, Tourbe*.

Σχηματίζεται διὰ τῆς σήψεως τῶν φυτῶν εἰς τὰ ἔλη ὑπὸ τὴν ἐπιφά-

νειαν τοῦ ὕδατος· ξηρανθεῖσα δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ὡς καύσιμος ὕλη, ἐμπεριέχει δὲ ἰδιαιτέραν ὕλην καλουμένην *ύλη τῆς τούρρας*. Εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος δὲ εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον, καὶ τὸ διάλυμα τοῦτο, ἐὰν ἐξατμισθῇ, σχηματίζει πηκτώδη ὕλην. Ἀναφλεγόμενη καίει ὡς ἡ ἴσκα καὶ ἐκπέμπει ἀηδῆ ὀσμήν.

Τὰ διὰ τῆς σήψεως ὀργανικῶν οὐσιῶν ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς ἀποτελούμενα εἶναι διάφορα ὡς πρὸς τὰ χαρακτηριστικά. Εἰς τὴν τάξιν ταύτην ἀνήκουσιν οἱ λιθάνθρακες, γαιάνθρακες, ἄσφαλτος, τὸ ἤλεκτρον καὶ τὸ νάφθα. Τὰ εἰρημένα σώματα καλοῦνται καὶ *Bitumina* καὶ διαίρουνται εἰς σκληρὰ καὶ ῥευστά.

Λιθάνθρακες.

Οἱ λιθάνθρακες εὐρίσκονται εἰς τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς γῆς, ἐνίοτε ἐπὶ τῆς ἀργίλλου ἢ ἐπὶ τοῦ ἀμμιτου, καὶ ἄλλοτε ὑπὸ τὸν ἀμμιτήν καὶ ἄργιλλον. Οἱ λιθάνθρακες φαίνονται προηγμένοι ἐξ ἀνεστραμμένων δασῶν. Οἱ τῶν δένδρων κορμοὶ εὐρίσκονται συχνάκις κατὰ μίαν μόνον διεύθυνσιν, καὶ πολλάκις χωρὶς τάξιν τινά. Ἐκ τῶν ἐνίοτε εὐρεθέντων καρπῶν ἐθεωρήθησαν τὰ δένδρα ἀνήκοντα εἰς τινὰ τάξιν φοινίκων *Areca* μὴ ὑπαρχόντων τὴν σήμερον. Οἱ γαιάνθρακες διαφέρουσιν ὡς πρὸς τὸ σχῆμα, ἐνίοτε εὐρίσκονται ἡλκωμένοι εἰς φαιὰν γαιώδη ὕλην, ἣτις χρησιμεύει ὡς χρῶμα καὶ λέγεται *Terre de Cologne*, *Umbra*. Εὐρίσκονται λιθάνθρακες καὶ ὑελωειδοῦς θραύσεως, οἵτινες καλοῦνται *Iajet*, *Gagas*.

Γαιάνθρακες.

Οἱ καλῆς ποιότητος, καθὼς οἱ τῆς Ἀγγλίας *Canal kool* καλούμενοι, καίουσι μετὰ ζωηρᾶς φλογός, ἐπεὶδὴ ἐμπεριέχουν πισσώδη τινὰ ὕλην, διαλύσιμον εἰς τὸ Νάφθα· ἐὰν ἀποσταχθῶσιν, ἐκλύουσιν ἐλαιώδες τι ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον καλεῖται πίσσα τῶν γαιανθράκων· ἐκτὸς δὲ τούτου ἐξάγεται ἀνθρακικὴ καὶ θειώδης ἀμμωνία.

Ἄσφαλτος.

Ἡ ἄσφαλτος ἐκρίπτεται καὶ ἐπιπλέει εἰς τὰ τῆς νεκρᾶς θαλάσσης ὕδατα, εὐρίσκεται ὅμως καὶ εἰς ἄλλους διαφόρους τόπους, εἶναι σῶμα

λείον και εὐθραυστον, μέλαν τὸ χρώμα, λαμπρὸν τὴν θραῦσιν, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, καθὼς και εἰς τὸ οἰνόπνευμα· διὰ τῆς ἀποστάξεως ἐξάγεται τεχνητὸν ἔλαιον και ὀξύ τι βευστόν, εἰς δὲ τὸ κέρας μένει ἀνθραξ με πολλὰ γαιώδη μόρια· ἡ ἀσφαλτος διαλύεται παρὰ τοῦ ἐλαίου τοῦ λίνου και τῆς τερεβινθίνης.

Ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους ἐμεταχειρίζετο πρὸς ταρίχευσιν τῶν ἀνθρωπίνων πτωμάτων· διαλελυμένη μετὰ τοῦ λινελαίου χρησιμεύει πρὸς ἀλειμμα τῶν σιδηρῶν σκευῶν· εἶναι χρήσιμος προσέτι πρὸς σύνθεσιν τῆς υδραυλικῆς κόνεως, και πρὸς στρώσιν τῶν δρόμων. Ἡ στρώσις αὕτη γίνεται διὰ τῆς ἐπιχύσεως ἐπὶ τινος καταλλήλως προετοιμασμένου θεμελίου μίγματος ἐξ ἀσφάλτου, μελαινης ῥητίνης και ἄμμου, και μετὰ ταῦτα ἐπιπεδοῦται διὰ σιδηρῶν κυλίνδρων. Νομίζουν τινὲς ὅτι τὰ τεῖχη τῆς Βαβυλῶνος ἦσαν οἰκοδομημένα διὰ τινος κονίας ἐμπεριεχοῦσης ἀσφαλτον.

Ἡλεκτρον. *Succinum, Succin.*

Τὸ ἥλεκτρον εἶναι ἀσφαλτώδης οὐσία εἰς τοὺς αἰγιαλοὺς τῆς Βαλτικῆς θαλάσσης, και κατ' ἐξοχὴν εἰς τὰ παράλια τῆς Πρωσίας εὐρισκομένη· ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ ἡλέκτρου ἐκτυπωμάτων διαφόρων φύλλων, και ἐκ τῶν ἐν αὐτῷ εὐρισκομένων ἐντόμων, συμπεραίνεται ἡ ποτὲ βευστότης αὐτῆς. Συνίσταται ἀπὸ κομμάτια διαυγῆ και σπανίως σκιαρά, κατὰ τὸ μᾶλλον και ἥττον κίτρινα, εὐθραυστα, κογχοειδῆ τὴν θραῦσιν, και υελώδη ἢ λιπαρὰ τὴν στιλπνότητα· καίόμενον εὐωδιάζει, καθυποβληθὲν εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν ἐξάγει ὕδωρ, ὀξικὸν ὀξύ, πτητικὸν τι ἔλαιον και ἡλεκτρικὸν ὀξύ, ἐκτὸς δὲ τούτων ἐκλύονται ἀνθρακικὸν ὀξύ και διττοῦδρογονανθρακοῦχον ἀέριον, εἰς δὲ τὸ κέρας ἐπιμένει φαῖα τις ὕλη, γνωστὴ ὑπὸ τὸ ὄνομα ῥητίνη τοῦ ἡλέκτρου, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξαχρίζεται, ἐὰν ἀνθρακωθῇ, ἰδιαίτερα ὕλη, ἥτις καθαρισθεῖσα διὰ τοῦ ἐλαίου καλεῖται πτητικὴ τοῦ ἡλέκτρου ῥητίνη, ἢ πορφυρὰ τοῦ ἡλέκτρου ῥητίνη.

Ἡ ὕλη αὕτη σχηματίζει κίτρινα φυλλίδια, ἀπαλὰ τὴν ἀφήν, ἄσμα και ἄχυμα, ἐξατμιζόμενα και καίόμενα μετὰ φλογός, διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς τὸ οἰνόπνευμα και τὸ νάφθα. Εἰς τὴν ξηρὰν ἀπόσταξιν τοῦ ἡλέκτρου ἐξάγεται ἔλαιον κατ' ἀρχὰς κίτρινον και ἀκολούθως φαῖον· τὸ κίτρινον δύναται νὰ γενῇ ἄχρουν διὰ ἐπανειλημμένων ἀποστάξεων, μεθ'

ὕδατος ἐπὶ ὑέλου λειοτριβημένης ἢ ἐγγλωρίου τιτάνου καὶ καλεῖται ἔλαιον τοῦ ἡλέκτρον ἀπεσταλαγμένον *Oleum Succini rectificatum*.

Ἐὰν διαλυθῇ εἰς 24 μέρη δυνατοῦ οἶνοπνεύματος καὶ ἐνωθῇ μετὰ καυστικῆς ἀμμωνίας, ἀποτελεῖται φάρμακόν τι καλούμενον *Eau de Luce*, τὸ ὁποῖον μεταχειρίζεται πρὸς ὄσφρησιν εἰς περιπτώσεις ἀσφιδίας.

Τὸ ἀπεσταλαγμένον ἔλαιον τοῦ ἡλέκτρον μεταβάλλεται διὰ τῆς κατ' ὀλίγον προσθήκης τριῶν μερῶν νιτρικοῦ ὀξέος ἀκράτου εἰς ὀξείαν ῥητίνην, ἥτις δύναται νὰ καθαρισθῇ δι' ἀποπλύσεως διὰ πολλοῦ ὕδατος· εἶναι δὲ φαῖά τὸ χρῶμα, γλίσχρα καὶ διαλύσιμος εἰς τὸ οἶνόπνευμα, καὶ ἐπειδὴ ἔχει ὁσμὴν ὁμοίαν τοῦ μύσχου ἐκχλέσθη καὶ μύσχος τεχνητός. *Moschus artificialis*.

Τὸ ἡλεκτρον χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ὀξέος, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἐν τῇ ῥητίνῃ μετὰ τῶν ῥητινωδῶν καὶ ἐλαιωδῶν μορίων, ἐκτὸς τούτου χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν γανώματος ἀποτελουμένου διὰ διαλύσεως τοῦ φαιοῦ τηκομένου ἡλέκτρον εἰς τὸ λινέλαιον· τὰ διαφανῆ κομμάτια τοῦ ἡλέκτρον τορνευόμενα χρησιμεύουσιν ὡς κοσμήματα· τὰ ἀποξύσματα τοῦ ἡλέκτρον ἢ τὸ ῥινημένον ἡλεκτρον χρησιμεύει διὰ κάπνισμα.

Ῥητινίτης ἢ *ῥητινώδης ἄσφαλτος* λέγεται ὀρυκτώδης τις ῥητίνη, ἥτις εὐρίσκεται σπανίως εἰς τοὺς γαιάνθρακας, σχηματίζει κυλινδρικοῦς κομμάτια σκεπασμένα μὲ τεφρόχρουν χιτῶνα, ῥητινώδη μὲν τὴν θραύσιν, ὅχι δὲ τόσον λαμπρὰ ὡς ἡ κοινὴ ῥητίνη, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀδιαφανῇ, τεφρόχροα, ὠχρὰ, φαῖά, ἢ ἐρυθρὰ τὸ χρῶμα. Ἡ εἰδικὴ βαρύτης εἶναι 1,070 ἕως 1,350.

Ὁ ῥητινίτης τήκεται εὐκόλως, ὅχι δὲ τόσον ὡς ἡ κοινὴ ῥητίνη, ἀναφλέγεται ταχέως καὶ καίει μὲ λαμπράν αἰθαλίζουσαν φλόγα, καπνίζει καὶ ἐκπέμπει ὁσμὴν ὁμοιάζουσαν τὴν τοῦ ἡλέκτρον. Μετὰ τὴν καυσίν του ἐπιμένει ὀλίγη τέφρα.

Ὁ *στεατίτης* *Hatchetine*, *Sehererit* εὐρίσκεται πολλὰ σπανίως· εὐρέθη εἰς τινὰ μέρη τῆς Ἀγγλίας, Σκωτίας καὶ Ἑλβετίας, μέρος μὲν εἰς βορβόρους ἐπιπολάζων ἐπὶ τοῦ ὕδατος, μέρος δὲ εἰς τοὺς γαιάνθρακας.

Ὁ *στεατίτης* εἶναι μάζα ὠχρὰ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον λευκὴ, φυλλώδης ἢ χονδροειδής, διαφανὴς ἢ ἀδιαφανὴς καὶ μαργαριτώδης τὴν στιλπνότητα, εἶναι ἄσμος, ἄχυμος καὶ εὐτηκτος, δύναται ν' ἀποσταλαχθῇ χωρὶς ν' ἀποσυντεθῇ, εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος δὲ εἰς τὸ οἶνόπνευ-

μα, τὸν αἰθέρα, τὰ πτητικὰ καὶ λιπαρὰ ἔλαια, ἀλλὰ εἰς τὰ ἀλκάλια μῆτε διαλύεται, μῆτε μεταβάλλεται εἰς σάπωνα.

Ἐπειδὴ ἡ οὐσία αὕτη ἀπαντᾷται μὲ διάφορα χαρακτηριστικὰ, ἔλαβε καὶ διάφορα ὀνόματα ὡς Hatchetin, Schererit, Naphteine, Idrialin. Ὁ Glokner περιγράφει εἶδος τι στεατίτου εὐρισκομένου εἰς τὴν Μολδαυίαν, τὸ ὁποῖον μεταχειρίζονται οἱ κάτοικοι πρὸς κατασκευὴν λαμπάδων, αἵτινες καίουσιν ἀξιόλογα καὶ εὐωδιάζουσιν ἀφοῦ ἀποσβεσθῶσι. Διὰ τοῦτο ὠνόμασεν αὐτὸ ὡζοκηρότην *Ozokerit*. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν σύγκριται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	85,80 — 86,20
Ἵδρoγόνου	13,95 — 14,16

Μελίλιθος. Ἡ ὕλη αὕτη δὲν εὑρέθη μέχρι τοῦδε ἄλλου, εἰμὴ εἰς τοὺς γαιάνθρακας τοῦ Thüringen. Εἶναι ἄλας συγκείμενον ἐξ ἰδιαίτερου ὀξέος καὶ ἀργίλλου, καὶ κρυσταλλοῦται ἐν μορφῇ ὀκταέδρων. Οἱ κρύσταλλοι ὁμοιάζουσι κατὰ τὸ χρῶμα μὲ τὸ ἥλεκτρον, ἐκλύουσι διὰ τῆς θλίψεως ἀρνητικὸν ἡλεκτρικόν, ἔχουσιν 1,580—1,660 εἰδικὴν βαρύτητα καὶ ἀποβάλλουσι τὸ χρῶμά των διὰ τῆς καύσεως. Ἐκ τοῦ λειοτετριμμένου μελιλίθου διαλύει τὸ ζέον ὕδωρ ὀξινὸν ἄλας, καὶ τὰ ὀξέα διαλύοντα αὐτόν, τὸν μεταβάλλουσιν εἰς ὀξινὸν ἄλας. Τὰ καυστικὰ ἀλκάλια τὸν διαλύουσι, τὰ δὲ ἀνθρακικὰ τὸν ἀποσυνθέτουσιν ἐνούμενα μετὰ τοῦ ἐν αὐτῷ ὀξέος. Ὁ μελιλίθος σύγκριται ἐξ

Ἀργίλλου	14,5
Μελιλιθικοῦ ὀξέος	41,4
Ἵδατος	44,1

100.

Πρὸς τοῦτοις ἐμπεριέχει ἔχνη ρήτινης, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξαρτᾶται τὸ χρῶμά του, ἴσως καὶ ἡ ἀρωματικὴ ὁσμὴ, τὴν ὁποίαν ἐκλύει διὰ τῆς πυρώσεως.

Μελιλιθικὸν ὀξύ. Τοῦτο τὸ ὀξύ ἀνεκαλύφθη ὑπὸ τοῦ Klaproth, ἀποχωρίζεται δὲ ἐκ τοῦ μελιλίθου καλῆτερα κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Woehler. Τὸ λειοτετριμμένον ὄρυκτὸν ζέεται μὲ ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν. Διὰ τῆς ζέσεως ἐκλύεται ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἀποχωριζομένης τῆς ἀργίλλου· ἀλλ' ἐπειδὴ ἡ διαλυομένη μελιλιθικὴ ἀμμωνία ἐμπεριέχει πάντοτε ὀλίγην ἀργίλλον, πρέπει γὰρ υποβληθῇ εἰς κρυστάλλωσιν. Οἱ καθαροὶ κρύ-

σταλλοὶ διαλύονται εἰς ὕδωρ, ἡ δὲ διάλυσις καταβυθίζεται δι' ὀξικοῦ μολύβδου διαλελυμένου· τὸ ἀποβληθὲν ἵζημα μεμιγμένον μὲ ὕδωρ ἀποσυντίθεται δι' ὑδροθειωμένου ἀερίου, τὸ δὲ ἀπὸ τὸν ἔνθειον μολύβδον ἀποχωρισθὲν ῥευστὴν ἐξατμίζεται μέχρι συστάσεως σερapiίου, καὶ ἐξ αὐτοῦ στερεοῦται πρὸς λευκὴν μάζαν συνισταμένην ἐκ λεπτῶν βελονοειδῶν κρυστάλλων.

Τὸ οὕτω ληφθὲν ὀξύ ἔχει γεῦσιν δριμεῖαν ὀξινὴν, εἶναι ἀμετάβλητον εἰς τὸν αέρα, ὑποβαλλόμενον εἰς μεγάλην θερμοκρασίαν δὲν ἀποσυντίθεται, τέλος δὲ ἀνθρακοῦται ἄνευ τήξεως. Διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως ἀποσυντίθεται, ἐξαχνίζομένης ὀξινῆς κρυσταλλώδους καὶ εὐτήκτου οὐσίας, ἣτις φαίνεται ὅτι εἶναι ἐμπυρευματικὸν ὀξύ· πολλὸς ἀνθραξ ἐπιμένει, ἀλλὰ δὲν σχηματίζεται ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, μήτε ἐκλύεται τὸ ἐλαχιστον ἵχνος ἐμπυρευματικῆς ὁσμῆς. Τὸ μελιλιθικὸν ὀξύ εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ ψυχρὸν οἰνόπνευμα. Τὸ ψυχρὸν ἄκρατον θεϊκὸν ὀξύ δὲν ἐνεργεῖ ἐπ' αὐτοῦ, τὸ δὲ ζέον διαλύει αὐτὸ ἄνευ ἀποσυνθέσεως· μάλιστα τὸ θεϊκὸν ὀξύ δύναται νὰ ἐξαχθῇ πάλιν διὰ τῆς ἐξατμίσεως, ἐπιμένοντος τοῦ μελιλιθικοῦ ὀξέος εἰς ἀμετάβλητον κατάστασιν. Τὸ καπνίζον νιτρικὸν ὀξύ μήτε τὸ ψυχρὸν, μήτε τὸ ζέον δὲν διαλύει τὸ μελιλιθικόν. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Liebig καὶ Woehler σύγκριται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	4	ἀτ.	50,21
Ὄξυγόνου	3	ἀτ.	49,79

100.

Τὸ μελιλιθικὸν ὀξύ σχηματίζει μετὰ τῶν βάσεων ἄλατα, τὰ ὁποῖα πυρούμενα ἀποσυντίθενται μὲν, ἐπιμένοντος πολλοῦ ἀνθρακος, ἀλλὰ δὲν σχηματίζουν ὑδρογονοῦχα προϊόντα.

Ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ μεταβολὴ εἰς τὴν ὁποίαν ὑπόκειται τὸ μελιλιθικὸν ὀξύ διὰ τοῦ ζέοντος οἰνοπνεύματος. Ἐὰν ἡ τοῦ μελιλιθικοῦ ὀξέος διάλυσις εἰς λεῖψυδρον οἰνόπνευμα θερμανθῇ καιρὸν τινα μέχρι ζέσεως καὶ ἐξατμισθῇ, δὲν λαμβάνομεν πλεόν μελιλιθικὸν ὀξύ, ἀλλὰ διαφανῆ ἄμορφον μάζαν, ἥτις ἀποπλυθεῖτα μὲ ὕδωρ ἐπιλείπει λευκὴν κόνιν, ἄχυμον, εὐτήκτον καὶ μετὰ τὴν ψύξιν κρυσταλλώδη. Ἡ οὐσία αὕτη καίει ὡς ῥητίνη, ἀνθρακοῦται διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως, χωρὶς δὲ νὰ ἐξαχνίζεται, εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ οἰνόπνευμα, καταβυθίζεται δὲ πάλιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ ὕδατος.

Πετρέλαιον, Oleum Petrae.

Τὸ καθαρώτατον πετρέλαιον ἀπαντᾷται εἰς τὴν Περσίαν, εἰς τὰς ὄχθας τῆς Κασπίας θαλάσσης ἠνωμένον μετὰ ἀργίλλου. Πρὸς σύναξιν τοῦ ἐλαίου τούτου σκάπτονται εἰς τὴν γῆν λάκκοι, εἰς τοὺς ὁποίους τὸ εἰρημένον ἔλαιον κατ' ὀλίγον συνάγεται. Εἰς δὲ τὴν Εὐρώπην ἐκρέει πολ- λάκις μετὰ τοῦ πηγαίου ὕδατος, καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς μέρη ὅπου ἀπαν- τῶνται στρώματα γαιανθράκων· οὕτω π. χ. ἀπαντᾷται εἰς μεγάλην ποσότητα ἐπιπολάζον ἐπὶ τοῦ ὕδατος τοῦ *Αἱματοῦ*, χωρίου εἰς τὴν ἡγε- μονίαν *Parma*. Ὁμοίως εἰς τινὰ μέρη τῆς *Μοδίνης*, εἰς τὴν *Καλα- βρίαν* καὶ *Σικελίαν*, ὡσαύτως εἰς τὴν *Ζάκυνθον* καὶ εἰς τὸ *Λήτζιον* τῆς *Πελοποννήσου*. Τὸ ἐντελὲς λευκὸν πετρέλαιον δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς καθαρὸν πτητικὸν ἔλαιον, τὸ δὲ ἐρυθρῶπόν καὶ φαιὸν ἐμπεριέχουν ἑτερογενῆ καὶ ἀσφαλιώδη μόρια, ἐπιμένοντα διὰ τῆς ἀποστάξεως μεθ' ὕδατος. Τὸ καθαρὸν πετρέλαιον ἔχει εἰδικὴν βαρύτητα 0,758, ἀσθενῆ ὀσμὴν, εἶναι ἄχρυμον καὶ ζεεὶ εἰς θερμοκρασίαν 85°R. Διὰ τῆς τοῦ ἡλίου, ἢ τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς δὲν μεταβάλλεται, εἶναι εὐανάφλε- κτον καὶ καίει μετὰ ζωηρᾶς φλογὸς ὑπὸ σχηματισμὸν πολλῆς αἰθάλης. Ἐὰν οἱ ἀτμοὶ τοῦ πετρελαίου διέλθωσι διὰ πυρωμένου σίφωνος, ἀποτίθε- ται λαμπρίζων ἄνθραξ, ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον καὶ στερεὰ τις ὕλη ἐξαχνι- ζομένη εἰς εἶδος ῥομβικῶν πλατυσμάτων. Τὸ πετρέλαιον εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον λαμβάνει τὴν ὀσμὴν του, διαλύσιμον κατὰ πάσας τὰς ἀναλογίας εἰς τὸ λειψυδρὸν οἰνόπνευμα, τοῦ δὲ συνήθους οἰνο- πνεύματος δηλ. 0,820 εἰδικῆς βαρύτητος ἀπαιτεῖ 8 μέρη πρὸς τελείαν διάλυσιν· εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ νάφθα καὶ εἰς τὰ πτητικὰ ἔλαια, παρὰ τοῦ θεϊκοῦ καὶ νιτρικοῦ ὀξέος ὀλίγον μεταβάλλεται, καὶ διὰ τοῦ χαρα- κτηριστικοῦ τούτου δύναται νὰ γνωρισθῇ ἡ καθαριότης του· διότι ἐὰν ᾖναι νοθευμένον παρὰ τοῦ τῆς τερεβινθίνης ἐλαίου, χρωματίζεται διὰ τοῦ νι- τρικοῦ ὀξέος μετ' ὀλίγον καιρὸν εἰς φαιόν· τὸ πετρέλαιον διαλύει, καθὼς καὶ τὰ πτητικὰ ἔλαια, τὸ θεῖον, τὸν φώσφορον, τὴν καφουράν καὶ τὴν ῥητίνην.

Σύγκειται δὲ ἐξ

Ἀνθρακος	6 1/2	ἀτ.	36	87, 8
Ἵδρογόνου	5	ἀτ.	5	12, 2

Ἐπειδὴ τὸ πετρέλαιον δὲν ἐμπεριέχει ὀξυγόνον, φυλάττεται εἰς αὐτὸ τὸ ποτάσσιον καὶ σόδιον, χρησιμεύει εἰς τὴν ἰατρικὴν καὶ μάλιστα πρὸς ἐξωτερικὴν χρῆσιν, πρὸς κατασκευὴν γανωμάτων, εἰς δὲ τὴν Πάρμαν πρὸς φωτισμὸν τῶν ὁδῶν.

Εἰς τινὰ ἱαματικὰ ὕδατα τῶν ἡφαιστείων τόπων τῆς Γαλλίας καὶ Ἑλλάδος παρετηρήθη ὅτι ἐμπεριέχεται νιτρογονοῦχος οὐσία ὁμοιάζουσα μὲ τὰ ὀργανικὰ σώματα, ἥτις κατὰ τὰς νεωτέρας ἐξετάσεις φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι ἄλλο, εἰμὴ προϊόν τῶν διαφόρων ἐν αὐταῖς ζώντων ἐντόμων ὡς τῶν Tremellae, Oscillatoriae, καὶ ἐγχυματωδῶν ζῶων. Τὴν ὕλην ταύτην, ἥτις διαφέρει κατὰ τὸ χρῶμα, ἐκάλεσαν Glairine. Εἰς τὴν ἰατρικὴν μεταχειρίζονται αὐτὴν κατὰ διαφόρων ἐξανθημάτων καὶ τῆς ἀρθρίτιδος. Περὶ τῆς χρήσεως ταύτης λέγει ὁ Plinius. » Mucus qui in aquis fuerit, Podagris prodest.»

*Περὶ τῶν τῆς διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς καταλυτικῆς δυνάμεως
προαγομένων.*

Ἐπειδὴ καὶ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν διὰ τῆς θερμότητος προάγονται ἀποτελέσματα, ἐντὸς τῶν ὁποίων εὐρίσκονται μεθυστικὴν δυνάμιν ἔχοντα ρευστὰ, νομίζω κατάλληλον νὰ παρεισάξω ἀμέσως μετὰ τὴν ζύμωσιν τὴν ἐξῆς σύντομον περιγραφὴν τῶν διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ ξύλου προϊόντων.

Ξυλικὸν ὀξύ.

Διὰ τῆς τοῦ ξύλου ἀποσταλάξεως λαμβάνομεν βαθύφαιον καὶ βαρύοσμον ρευστὸν τὸ λεγόμενον ξυλόξος, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει ὕδωρ, ὀξικὸν ὀξύ, πυρέλαιον, πυρορρήτιν, ἰδιαίτερον νιτρογονοῦχον καὶ ἐκχυλισματικὴν ὕλην (τὸ πυρεκχύλισμα) καὶ ἰδιαίτερον πτητικὸν ρευστὸν, τὸ λεγόμενον ξυλόπνευμα. Ἐπειδὴ τὸ ξυλόξος δύνχται νὰ συναχθῇ καὶ ἄνευ ἰδιαίτερας δαπάνης εἰς τὰ πρὸς ἀνθρώκωσιν τοῦ ξύλου καταστήματα, ἐξήτησαν ν' ἀποχωρήσωσιν ἐξ αὐτοῦ τὸ ὀξικὸν ὀξύ εἰς καθαρὰν κατάστασιν, διὰ νὰ χρησιμεύσῃ τόσον πρὸς κατασκευὴν τινῶν ἀλάτων χρησίμων εἰς τὰς τέχνας, ὅσον καὶ πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐκ τοῦ οἴνου ἢ τοῦ ζύθου ὀξους. Πρὸς τὸν πρῶτον σκοπὸν εἶναι εὐκόλον ν'

ἀποχωρισθῇ τὸ ὀξύ, πρὸς δὲ τὸν δεύτερον χρειάζονται πράξεις, αἵτινες αὐξάνουσι τόσον τὴν τιμὴν του, ὥστε δὲν δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς οἰκονομικὴν χρῆσιν.

Διὰ νὰ καθαρισθῇ τὸ ὀξικὸν ὀξύ, πρέπει ν' ἀποσταλαχθῇ κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Stoltze μέχρι ξηροῦ, τὸ δὲ ὠχρὸν ἀποστάλαγμα κατεργάζεται με ὑπεροξειδωμένον μαγγανήσιον καὶ θεικὸν ὀξύ, ἢ με ἀμφοτέρας τὰς οὐσίας καὶ κοινὸν ἄλας. Διὰ τοιούτων προσθηκῶν ὀξειδοῦται τὸ μετ' ὀξύ ἡνωμένον πυρέλαιον, μεταβαλλόμενον εἰς πυρορρήτιν, ἣτις ἐπιμένει μετὰ τὴν ἀποστάλαξιν τοῦ ὀξέος. Κοινῶς κατεργάζεται καὶ τὸ ὀξύ πρὸ τῆς ἀποσταλάξεως με καλῶς πεπυρωμένον ξυλάνθρακα.

Κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Mellerat οὐδετεροῦται τὸ ξυλικὸν ὀξύ με ἔνυδρον τίτανον, ἣτις σχηματίζει μετὰ τὴν πυρορρήτιν φαῖαν καὶ δυσδιάλυτον ἔνωσιν· τὸ δὲ ἀποχυθὲν καθαρὸν ῥευστὸν συμμιγνύεται με διαλυμένον θεικὸν νάτρον, ἐνὸςφ σχηματίζεται θεικὴ τίτανος. Τὸ διῦλισθὲν ῥευστὸν ἐπιπυκνοῦται διὰ τῆς ζέσεως, δι' ἧς ἀποχωρίζεται καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ῥευστοῦ μέγα ποσὸν πυρορρήτινης, καὶ ἀφοῦ τὸ ῥευστὸν ἐξατμισθῇ μέχρι τινὸς βαθμοῦ, ὑποβάλλεται τὸ φαῖον διάλυμα τοῦ ὀξικοῦ νάτρου εἰς κρυστάλλωσιν. Τὸ δι' ἀναδιαλύσεως καὶ κρυσταλλώσεως καθαρισθὲν ἄλας τήκεται καὶ πυροῦται σχεδὸν μέχρις ἀνθρακώσεως, διὰ νὰ ἀποσυντεθῇ τὸ ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχόμενον πυρέλαιον, τὸ δὲ ἀνθρακῶδες υπόλειμμα ἐκχυλίζεται δι' ὕδατος· τὸ διάλυμα ἐξατμίζεται καὶ ἐκ τοῦ ἐπιμένοντος ὀξικοῦ νάτρου πορίζεται τὸ ὀξικὸν ὀξύ διὰ τῆς ἀποσταλάξεως με θεικὸν ὀξύ. Ἐὰν τὸ ληφθὲν ὀξύ ἔχῃ ἀκόμῃ ἐμπυρευματικὴν ὁσμὴν, δύναται νὰ καθαρισθῇ ἀπ' αὐτὴν διὰ ζωάνθρακος.

Τὸ οὕτω καθαρισθὲν ὀξικὸν ὀξύ δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ὡς τὸ ὀξύ· ἐὰν συμμιχθῇ μετὰ τὸ ἀνήκον ποσὸν ὕδατος, εἶναι δὲ ὀλίγον δριμύτερον τὴν γεῦσιν, ἂν καὶ τὰ δύο ταῦτα ἐμπεριέχωσι τὸ αὐτὸ ποσὸν ὀξέος· τὸ αἴτιον τούτου τοῦ φαινομένου εἶναι ὅτι, τὸ διὰ τῆς ζυμώσεως ὀξύς ἐμπεριέχει διαφόρους μετὰ τοῦ ὀξέος ἡνωμένας ὀργανικὰς ὕλας, αἵτινες δὲν φθείρουσι μὲν τὰ χαρακτηριστικά του, ἀλλὰ λαμβάνουν δι' αὐτῶν ἡπιωτέραν γεῦσιν. Εἰς τὸ κεκαυμένον ὀξικὸν ὀξύ προσθέτουσι κοινῶς ὀλίγον αἰθέρα δι' ὀξικοῦ ὀξέος καὶ κεκαυμένην ζάχαριν, ἢ καὶ οἶνον, διὰ νὰ γίνῃ ὅμοιον μετὰ τὸ διὰ τῆς ζυμώσεως ληφθὲν καὶ τφόντι τὸ μετ' ἀρωματικῶν, λ. χ. μετὰ τοῦ χόρτου *Artemisia Dracunculus* (Esdragon) κατεργασθὲν ὀξύς ἐκ τοῦ ξυλικοῦ ὀξέος δὲν δύναται νὰ διακριθῇ ἀπὸ τῶν διὰ τῆς ζυμώσεως ὀξέος καὶ αὐτὸ ἀρωματισμένον.

Τὸ κεκαθαρμένον ξυλόξος ἔχει πολυειδῆ τεχνικὴν χρῆσιν, διὰ τὴν ὁποίαν δὲν πρέπει νὰ ᾔηται καὶ τόσον καθαρὸν, ὥς διὰ τὰ φαγητά. Τὸ μεταχειρίζονται πρὸς κατασκευὴν χημικῶν τινων κατασκευῶν χρησίμων εἰς τὴν βαφικὴν κ.τ.λ. πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου ἢ τῆς διὰ μολύβδου ζαχαρώσεως.

Τὸ ἀκάθαρτον ξυλικὸν ὀξύ ἔχει ἀξιόλογον ἀντιστηπτικὴν δύναμιν, κρέας ἐμβαπτιζόμενον εἰς αὐτὸ τινὰς ὥρας, ξηραίνεται μετὰ ταῦτα εἰς τὸν ἀέρα χωρὶς νὰ σήπηται, γίνεται δὲ σκληρόν, ὥστε δὲν δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς τροφήν. Κατὰ τὸν Πλίνιον φαίνεται ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι μετεχειρίσθησαν τοῦτο τὸ ξυλικὸν ὀξύ πρὸς ταρίχευσιν τῶν νεκρῶν. Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους παρατηρήθη ὅτι τὸ ξυλικὸν ὀξύ ἐμποδίζει τὴν σήψιν εἰς τὰ καρκινώματα, καθὼς καὶ τὴν δι' αὐτῶν ἀηδῆ ὁσμὴν.

Ξυλόπνευμα. Spiritus pyrolignicus.

Ἐὰν τὸ διὰ τῆς ἀποσταλάξεως τοῦ ξύλου ληφθὲν ξινὸν ῥευστὸν ἀναποσταλαχθῇ, ἐξέρχεται κατὰ πρῶτον ὥχρὸν ῥευστὸν, ἐλαφρότερον τοῦ ὕδατος, αἰθερώδες καὶ συγχρόνως ἐμπυρευματικὸν τὴν ὁσμὴν, συγκείμενον δὲ ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔκ τινος αἰθέρος δι' ἰδιαιτέρου πνεύματος, ἐκ πτητικοῦ τινος πυρελαίου, ἐξ ὠχρᾶς βαφικῆς ὕλης καὶ ὀλίγης ὀξικῆς ἀμμωνίας. Τὸ ἰδιαίτερον πνεῦμα ἀνεκαλύφθη τὸ 1812 παρὰ τοῦ Taylor, ὅστις τὸ ἐπώλει πολὺν καιρὸν ὥς καύσιμον ὕλην διὰ τοὺς λύχνους μὲ οἰνόπνευμα· ὁ δὲ αἰθὴρ ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Reichenbach καὶ ὠνομάσθη παρ' αὐτοῦ μεσίτης Mesite.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ξυλοπνεύματος ἐκ τοῦ ξυλικοῦ ὀξέος κατεργάζεται τὸ ἀποσταλαχθὲν ξυλόπνευμα μὲ ἔνυδρον τίτανον, καὶ τὸ ἀποχυθὲν ῥευστὸν ὑποβάλλεται εἰς ἀποστάλαξιν εἰς τρόπον ὥστε οἱ ἀτμοὶ νὰ διέρχωνται δι' ἰδιαίτερων ἀγγείων ἐμπεριεχόντων ἔνυδρον τίτανον, μεμιγμένην μὲ ἤδη ἀνασταλαχθὲν ξυλόπνευμα. Διὰ τῆς ἐνύδρου τιτάνου ἀποσυντίθεται ὁ μεσίτης, καθὼς καὶ τὸ ὀξικὸν αἰθυλοξείδιον σχηματίζονται δηλαδὴ ὀξικὴ τίτανος καὶ ξυλόπνευμα. Τὸ ληφθὲν ὥχρὸν ξυλόπνευμα κατεργάζεται καὶ ἀνασταλάζεται κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον μὲ ἔνυδρον τίτανον, καὶ ἀφοῦ διῴλισθῇ διὰ καλῶς κεκαυμένων καὶ λειωτετριμμένων ἀνθράκων, ἀναταράσσεται μὲ ἔλαιον, διὰ νὰ ἀποβάλῃ τὴν ἐμπυρευματικὴν ὁσμὴν, καὶ ἀναμιγνύεται μὲ διάλυσιν στυπτηρίας, δι' ἧς ἀποχωρίζεται ἡ ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένη ἀμμωνία καὶ ἐξαλείφεται ὅλος

διόλου ἢ ὁσμῇ. Τὸ ὑελοφανές πνεῦμα, ἀφοῦ ἀνασταλαχθῇ εἶναι καθαρόν, ἐμπεριέχει ὅμως ὕδωρ, ἀπὸ τὸ ὁποῖον δύναται ν' ἀποχωρισθῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς τὸ οἰνόπνευμα, δηλαδή διὰ τοῦ ἐγγλωρίου τιτανίου.

Χαρακτηριστικά. Τὸ λεῖψυδρον ξυλόπνευμα εἶναι ἄχρουν, λεπτόρρευσον, αἰθεριῶδες καὶ οἰνοπνευματῶδες τὴν ὁσμὴν, ἔχει μὲν τὴν γεῦσιν τοῦ οἰνοπνεύματος, ἀλλὰ εἶναι δριμύτερον. Ἡ εἰδική του βαρύτης εἶναι 0,798 εἰς τὴν 20° θερμότητος, ἀναζέει δὲ εἰς τὴν 66°. Τὸ ξυλόπνευμα εἶναι σχεδὸν πάντοτε ὅμοιον μὲ τὸ οἰνόπνευμα. Καίει μετὰ κυανῆς φλογός, τὸν ἐκ λευκοχρύσου σπόγγον κάμνει διάπυρον, ἐὰν ὅμως ὁ λευκόχρυσος ἐπινοτίζεται μὲ ξυλόπνευμα, ὀξειδούται αὐτὸ ὡς τὸ οἰνόπνευμα, καὶ οὕτω σχηματίζεται διὰ τῆς ὀξειδώσεως κατὰ μέγα μέρος ὀξικὸν ὀξύ καὶ ἰδιαίτερα ὕλη Acetal λεγομένη, τὸ δὲ οἰνόπνευμα μεταβάλλεται εἰς μυρμηκικὸν ὀξύ καὶ ὕλην τινὰ Formal καλουμένην. Τὸ ξυλόπνευμα ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ ἀνάζη μὲ κοχλίαςμα, ἐὰν ἀποσταλαχθῇ μετὰ τοῦ ὕδατος τοῦ οἰνοπνεύματος, καὶ τοῦ αἱθέρος, δύναται νὰ συρμιχθῇ καθ' ὅλας τὰς ἀναλογίας· διὰ τῶν ἀκράτων ὀξέων μεταβάλλεται εἰς αἰθέρα καὶ διὰ τῶν μεταδιδόντων ὀξυγόνον, καθὼς καὶ διὰ τῶν ἀλατογόνων σωμάτων σχηματίζονται τὰ αὐτὰ προϊόντα, ὡς καὶ ἐκ τοῦ οἰνοπνεύματος ἢ τοῦλάχιστον ἀνάλογα. Τὰ ἔνυδρα ἀλκάλια διαλύονται δι' αὐτοῦ, συνεργοῦντος δὲ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἀποτελεῖται καὶ ὥχρον τι ῥητινωδὲς σῶμα ὡς εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Τὸ ξυλόπνευμα διαλύει σχεδὸν τὰ αὐτὰ ἅλατα, τὰ ὁποῖα διαλύει τὸ οἰνόπνευμα· ἐπίσης διαλύει τὸ θεῖον καὶ τὸν φώσφορον εἰς μικρὰν ποσότητα, πολλὰς φυτικὰς ὕλας. λ. χ. ῥητίνας, πτητικὰ ἔλαια, ζάχαριν κτλ. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Dumas καὶ Peligot σύγκειται τὸ λεῖψυδρον ξυλόπνευμα ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	1 ἀτ.	6 — 37,96
Ἰδρυγόνου	2 »	2 — 12,39
Ὄξυγόνου	1 »	8 — 49,65

16—100.

Τὸ ξυλόπνευμα δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ὡς καύσιμος ὕλη εἰς τοὺς λύχνους, ἐκλύει δὲ ὀλιγωτέραν θερμότητα παρὰ τὸ οἰνόπνευμα καὶ ἐξαιτρίζεται ταχύτερα. Εἶναι προσέτι χρήσιμον διὰ τὰ ῥητινώδη γανώματα, ἀλλ' ὅχι τόσον πρὸς στίλβωσιν τῶν ξύλων, ὡς τὸ οἰνόπνευμα. Εἰς

τὴν Ἀγγλίαν λέγουσι τὸ μεταχειρίσθησαν καὶ ὡς μεθυστικόν, χωρὶς νὰ προξενήσῃ ἐπιβλαβὴ ἐπακόλουθα.

Ἐρέργεια τῶν ὀξέων ἐπὶ τοῦ ξυλοπνεύματος.

Καθὼς τὸ οἰνόπνευμα οὕτω καὶ τὸ ξυλόπνευμα διαλύεται διὰ τῶν ὀξέων εἰς ὕδωρ καὶ αἰθέρα. Ὁ αἰθήρ εἶναι τὸ ὀξειδίον τινὸς βάσεως, ἥτις λέγεται *μεθύλιον* (ἀπὸ μέθη καὶ ὕλη) πρὸς διαφορὰν τοῦ ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ αἰθέρος ἐκ τοῦ οἰνοπνεύματος δηλαδὴ τοῦ αἰθυλίου.

Ὁξείδιον τοῦ μεθυλίου, (αἰθήρ ἐκ τοῦ ξυλοπνεύματος). Ἐάν 1 μέρος λειψύδρου ξυλοπνεύματος συμμιχθῇ μὲ 4 μέρη ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος καὶ τὸ μίγμα θερμανθῇ μέχρι ζέσεως, ἐκλύεται ἰδιαίτερον ἀέριον, τὸ ὁποῖον δὲν ἐπιτυκνύται εἰς τὸ δοχεῖον, ἀλλὰ πρέπει νὰ συναχθῇ ὑπὲρ ὑδράργυρον. Τοῦτο τὸ ἀέριον εἶναι τὸ ὀξειδίον τοῦ μεθυλίου. Ἐάν ἐξακολουθῇ ἡ ἀπόσταξις, βάφεται τὸ ὀξὺ ὠχρὸν, ἔπειτα φαιὸν, καὶ τέλος μέλαν, ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ καὶ θειώδους ὀξέος, ἀπὸ τῶν ὁποίων καθαρίζεται τὸ μεθυλοξειδίον διὰ ξηροῦ ἐνύδρου καλίου.

Χαρακτηριστικά. Τὸ ἀέριον τοῦ μεθυλοξειδίου εἶναι ὄχρουν, ἔχει τὴν ὁσμὴν τοῦ αἰθέρος, δὲν ἐπιτυκνύται μήτε εἰς τὴν 16° R, ἔχει 1,617 εἰδικὴν βαρύτητα, καὶ καίει μὲ κυανὴν φλόγα. Εἰς ὄγκος ὕδατος ἀπορρόφᾳ 37 τοῦτου τοῦ αἰρίου, καὶ λαμβάνει τὴν ὁσμὴν αὐτοῦ καὶ πιπερώδη γεῦσιν. Εὐκολώτερον τὸ διαλύουσι τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὸ ξυλόπνευμα. Ἐπίσης ἀπορρόφᾳται ὑπὸ τοῦ ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος· ἐάν δὲ συμμιχθῇ μὲ ὕδωρ ἀναθυμιάται μὲ ἀναβρασμόν. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Dumas καὶ Peligot σύγκειται ἐξ

Ἀνθρακικῆς ὕλης	2 ἀτ.	12 — 52, 18
Ὑδρογόνου	3 "	3 — 13, 04
Ὄξυγόνου	1 "	8 — 34, 78

23 100.

Ἐξ αὐτῆς τῆς ἀναλύσεως ἐπεται ὅτι τὸ μεθυλοξειδίον ἔχει τὴν αὐτὴν σύνθεσιν ὡς τὸ οἰνόπνευμα. Ἡ βάσις τοῦ μεθυλοξειδίου δηλαδὴ, τὸ μεθύλιον, σύγκειται ἐκ 2 ἀτ. ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ 3 ἀτ. ὑδρογόνου· ἀλλὰ μέχρι τοῦδε δὲν ἐδυνήθη ν' ἀποχωρισθῇ εἰς καθαρὰν κατάστασιν.

Τὸ μεθυλοξειδίον ἐνοῦται μετὰ τῶν ὀξέων σχηματίζον διάφορα εἶδη

αιθέρων. Είναι λοιπὸν ἀνάλογον μὲ τὸ αἰθυλοξειδίου, ἀλλὰ τὸ μεθυλο-
ξειδίου σχηματίζει οὐδετέρας ἐνώσεις μετὰ τινων ὀξέων, αἵτινες δὲν
ἐνοῦνται μετὰ τοῦ αἰθυλοξειδίου, π. χ. μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, δι' οὗ
ἀποτελεῖται τὸ *Νιτρικὸν μεθυλοξειδίου*. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος
μεταβάλλεται τὸ ξυλόπνευμα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς μυρμηκικὸν
ὀξύ, ἐὰν ὅμως 2 μέρη νίτρου ἐπιχυθῶσιν εἰς δίστομον κερατίνην μὲ
ἀρτισκεύαστον μίγμα ἐξ 1 μέρους ξυλοπνεύματος καὶ 2 μερῶν ἀκράτου
θειικοῦ ὀξέος, διὰ μόνης τῆς θερμότητος, ἥτις ἐκλύεται διὰ τῆς συμμι-
ξεως ἀμφοτέρων τῶν ρευστῶν, ἀποστάζεται εἰς τὸ δοχεῖον 1 μέρος περί-
που αἰθέρος, ὅστις μετὰ ταῦτα ἀναταραχθεὶς μὲ ὕδωρ συνάγεται εἰς τὸν
πυθμέναν.

Οὗτος ὁ αἰθὴρ ἀφοῦ ἀνασταλαχθῇ, γίνεται ἄχρους, παντελῶς οὐ-
δέτερος, 1,182 βαρὺς καὶ ἀναζέει εἰς τὴν 66°. ἀναφλεχθεὶς καίει
μὲ ὥχρᾶν φλόγα, ὁ δὲ ἀτμός του καίει μὲ σφοδρὰν πυρσοκρότησιν, ἐὰν
θερμανθῇ μέχρι τῆς 150°, ἢ ἐὰν ἀναφλεχθῇ διὰ καίοντος σώματος.
Εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι δυσδιάλυτος, εὐδιάλυτος δὲ εἰς τὸ ξυλόπνευμα καὶ
οἰνόπνευμα. Σύγκειται ἐξ 29, 99 μεθυλοξειδίου καὶ 70, 01 νιτρικοῦ
ὀξέος.

Τὸ ὀξικὸν μεθυλοξειδίου ἐμπεριέχεται εἰς τὴν διὰ τῆς ἀποσταλά-
ξεως ἐλαφροῦ ξύλου ληφθεῖσαν ρευστὴν πίσσαν· ὁ Reichenbach τὸ
ἀνεκάλυψεν ἐν αὐτῇ καὶ τὸ ὠνόμασε *μεσίτην*. Εἰς μεγαλητέραν ποσό-
τητα ἐμπεριέχεται εἰς τὸ ἀκάθαρτον ξυλόπνευμα, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπο-
χωρίζεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον.

Τὸ ἀκάθαρτον ξυλόπνευμα ὑποβάλλεται εἰς ἀποστάλαξιν, ἕως οὗ νὰ
ἐξέλθῃ τὸ ἥμισυ, τὸ ὅποιον ἔχει ὥχρᾶν χροῶμα, καὶ ἐμπεριέχει ἐκτὸς
τοῦ αἰθέρος δηλαδὴ τοῦ ὀξικοῦ μεθυλοξειδίου, ὀλίγον ξυλόπνευμα, ὥχρᾶν
βαφικὴν ὕλην καὶ ὥχρᾶν ἔλαιον. Τὸ στάλαγμα ἀναταράσσεται μὲ λειο-
τετριμμένην ἔνυδρον τίτανον ἐνόσω λαμβάνει αὐτὴ ὥχρᾶν χροῶμα· ἡ
τίτανος μεταβάλλει μέρος τοῦ ἐλαίου εἰς ῥητίνην καὶ σχηματίζει μετ'
αὐτῆς ἰδιαιτέραν ἔνωσιν, διαλυομένην ἐν μέρει διὰ τοῦ σταλάγματος.
Ἀφοῦ τοῦτο ἀποχυθῇ, συμμιγνύεται καὶ ἀναταράττεται ὀλίγον κατ' ὀλί-
γον μὲ κορεσθὲν διάλυμα στυπτηρίας, δι' ἧς ἀποσυντίθεται ἡ μετὰ
τῆς ῥητίνης ἔνωσις τῆς τιτάνου, ἀποχωριζομένης αὐτῆς καὶ τῆς βαφι-
κῆς ὕλης. Διὰ τῆς μετὰ ταῦτα ἀποσταλάξεως πορίζεται ρευστὸν ἄχρουν,
ἀλλὰ ἐμπυρευματικὸν τὴν ὁσμὴν· διὰ τοῦτο πρέπει ν' ἀναταραχθῇ μὲ
λιπαρὸν τι ἔλαιον καὶ νὰ διύλισθῇ διὰ λειοτετριμμένων ἀνθράκων. Μετὰ

ταῦτα χύνεται τὸ ἀνασταλαχθὲν ρευστὸν ἐπὶ τακείσαν ὑδροχλωρικήν τι-
τανον, δι' ἧς ἀποχωρίζεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον ὕδωρ, ξυλόπνευμα,
καὶ ὀξικὸν μεθυλοξειδίον, τὸ ὁποῖον σχηματίζει τὴν ἄνω στιβάδα· ἀλλ'
ἐπεὶ δὲ ἐμπεριέχει καὶ ὑπερτεροῦν ὀξικὸν ὅξυ πρέπει ν' ἀποσταλαχθῇ
ὑπὲρ λεῖψυδρον τίτανον.

Αὕτη ἡ μέθοδος εἶναι χρήσιμος πρὸς κατασκευὴν τούτου τοῦ αἰθέρος
εἰς μεγάλην ποσότητα· δύναται δὲ νὰ κατασκευασθῇ καὶ διὰ τῆς ἀπο-
σταλάξεως 2 μερῶν ξυλοπνεύματος, 1 μ. ἀκράτου ὀξικοῦ καὶ 1 μ. ἀκρά-
του θειικοῦ ὀξέος.

Χαρακτηριστικά. Τὸ ὀξικὸν μεθυλοξειδίον εἶναι ρευστὸν ἄχρουν,
εὐάρεστον, αἰθερωδὲς τὴν ὁσμὴν, καυστικὸν δὲ τὴν γεῦσιν, 0,919 βαρὺ,
ἀναΐζει περίπου εἰς τὴν 60°, διαλύει διάφορα ἄλατα, φυτικά ὀξέα, λι-
παρὰ, καὶ πτητικὰ ἔλαια, ῥητίνας κ.τ.λ., καὶ σύγκειται ἐξ 1 μεθυ-
λοξειδίου καὶ 68, 9 ὀξικοῦ ὀξέος.

Διὰ τῆς ἀποσταλάξεως ἴσων μερῶν ξυλοπνεύματος, ὑπεροξειδωμένου
μαγγανησίου, θειικοῦ ὀξέος καὶ ὕδατος ἀποτελεῖται εἰδὸς τι αἰθέρος, τὸν
ὁποῖον ὁ Kane ὠνόμασε *φορμάλιον Formale*, λέξις σχηματισθεῖσα ἐκ
τῆς Λατινικῆς *Formica* (μύρμηξ) καὶ ἐκ τῶν πρώτων στοιχείων τῆς
λέξεως *Alcohol*. Τὸ φορμάλιον εἶναι ρευστὸν ἄχρουν, ἀρωματικὸν τὴν
ὁσμὴν καὶ ζεεῖ εἰς τὴν 38°. Καθὼς τὸ *Acetal* σύγκειται ἐκ 3 ἂτ.
αἰθυλοξειδίου καὶ 1 ἂτ. ὀξικοῦ ὀξέος, οὕτω σύγκειται τὸ *φορμάλιον*
ἐκ 3 ἂτ. μεθυλοξειδίου καὶ 1 ἂτ. μυρμηκικοῦ ὀξέος.

*Οὐσία ἐκ τοῦ ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου καὶ τῆς ἐμπυ-
ρευματικῆς ῥητίνης.*

Ἐκ τῶν ἐλαιωδῶν καὶ πισσωδῶν ὑλῶν τῶν λαμβανομένων διὰ ξηρὰς
ἀποστάξεως τοῦ ξύλου, ἀπεχώρησεν ὁ Reichenbach πλῆθος πολλὰ
ἀξιολόγων ὑλῶν, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα βέβαιοι, ἂν ἐμπεριέχωνται ὅλαι
ὡς τοιαῦται εἰς τὰς εἰρημένους ὕλας. Διάφοροι ἐξ αὐτῶν σχηματίζονται
ἴσως διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν πρὸς ἀποχώρησίν των μεταχειριζομένων χη-
μικῶν μέσων, τῶν ὁποίων τόσον ἡ χημικὴ, ὅσον ἡ καταλυτικὴ ἐνέργεια
δὲν δύναται νὰ προσδιορισθῇ ἀκριβῶς. Αἱ ὕλαι αὗται εἶναι αἱ ἐξῆς·

Paraffin. Οὕτω λεγόμενον ἔνεκα τῆς ἀσθενοῦς του συγγενείας
πρὸς τὰ ἄλλα σώματα. Εἶναι κρυσταλλῶδες, ἄχρουν, στίλπνόν,

λιπαρὸν τὴν ἀφὴν, ἄχυμον καὶ ἄσμον, εὐτήκτον, καὶ πτητικόν, διαλύσιμον εἰς τὸν αἰθέρα, καὶ τὸ λείψυδρον οἰνόπνευμα, καθὼς καὶ εἰς τὰ λιπαρά καὶ πτητικὰ ἔλαια, δὲν μεταβάλλεται μῆτε διὰ τῶν ἀκράτων ὀξέων, καὶ τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων, μῆτε διὰ τοῦ χλωρίου, μῆτε διὰ τοῦ ποτασίου.

Πισσόπικρον. Ὑπὸ τοῦ ἐφευρετοῦ ὠνομάσθη Picamar ἀπὸ τὸ Λατινικὸν Pīx καὶ amarus. Εἶναι ὕλη παχύρρευστος, ἐλαιώδης, διαφανής, ἄχρους, καὶ πολλὰ πικρά. Ἡ πικρὰ γεῦσις, τὴν ὁποίαν λαμβάνουσιν αἱ ὀργανικαὶ οὐσίαι διὰ τῆς καύσεως, προέρχεται ἀπὸ τὸ πισσόπικρον. Εἶναι σχεδὸν ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ· ἀπεναντίας δὲ, συνεργούσης τῆς θερμότητος, ἑκατὸν μέρη πισσοπίκρου διχλύνουσι 5 μέρη ὕδατος. Εἶναι ἠλεκτροαρνητικὸν σῶμα καὶ ἐνοῦται μετὰ τῶν ἀλατογόνων βάσεων.

Καπνομόριον. Ἐκ τοῦ καπνὸς καὶ μόριον. Εἶναι ρευστὸν διαφανὲς καὶ ἄχρουν, ἔχει μεγάλην διαθλαστικὴν δύναμιν, ἀσθενῆ μὲν ἀλλ' ἀρωματικὴν ὁσμὴν καὶ ὁμοιάζουσαν τὸ ροῦμι, κατ' ἀρχὰς ἀσθενῆ γεῦσιν, ἔπειτα δὲ πολλὰ δριμύειαν, ἀλλὰ μῆτε ὀξινὴν ἢ πικράν, μῆτε γλυκεῖαν. Ἐπὶ τοῦ χάρτου ἀρτίνει λιπαρὰς κηλίδας ἐξαλειφομένας παντελῶς εἰς τὸν ἀέρα. Εἶναι καύσιμον καὶ καίει μὲ αἰθαλίζουσαν φλόγα. Μὲ θεϊκὸν ὀξύ 1,850 βαρὺ σχηματίζει καθαρὰν πορφυράν διάλυσιν. Τὰ ἀλκάλια, καθὼς καὶ αἱ ἀλκαλικαὶ γαῖαι δὲν ἐνεργοῦσιν ἐπὶ τοῦ καπνομορίου.

Κεδριρέτη. Κρυσταλλοῦται ἐν μορφῇ λεπτῶν ἐρυθρῶν ἀγκίδων, αἵτινες φαίνονται ἐπὶ τοῦ ὑλιστῆρος δικτυοειδεῖς· ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα ἐκ τοῦ εἰς τὴν πισσοπύριαν ληφθέντος ὀξίνου ὕδατος Cedrium, καὶ ἐκ τοῦ Rete (δίκτυον). Εἶναι καύσιμος, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ οἰνόπνευμα, τὸν αἰθέρα, τὸ τερμίνθιον ἔλαιον, τὸ πετρέλαιον, ἀμυγδάλινον ἔλαιον κτλ. Εἰς δὲ τὸ σωσίκρεον διαλύεται μὲ πορφυροῦν χρῶμα, τὸ ὅποιον διὰ τοῦ ἡλίου ἢ διὰ τῆς θερμότητος μεταβάλλεται εἰς ὠχρόν. Τὸ θεϊκὸν ὀξύ διαλύει τὴν κεδριρέτην μὲ χρῶμα τοῦ Ἰνδικοῦ, μεταβαλλόμενον δὲ διὰ τῆς μὲ ὕδωρ συμμίξεως εἰς ὠχρόφαιον.

Ὁ Reichenbach εὗρηκεν εἰς τὴν ἐλαιόπισσαν ὕλην τινὰ λαμβάνουσαν διὰ τῆς ἑαρείας τὸ τοῦ Ἰνδικοῦ χρῶμα καὶ τὴν ὠνόμασε πισσοκαλλόν Pittakall ἀπὸ κάλλος καὶ πίσσα· οὐδεμίᾳ ἄλλῃ θάσις ἐκτὸς τῆς ἑαρείας γεννᾷ αὐτὸ τὸ φαινόμενον.

Ἐὰν κατασκευασθῇ ἐκ τινος διαλύσεως, ἢ ληφθῇ διὰ τῆς ἐξατμίσεως,

σχηματίζει βαθυκυανούν, σκληράν και εὐθραυστον βαφικὴν μάζαν, ἥτις ζυομένη διὰ τοῦ μαχαίριου γίνεται χαλκόχρους, ὡς και ἄλλα βαθυκυανὰ χρώματα.

Εἰς πολλὰ καθαρὰν κατάστασιν λαμβάνει διὰ τοῦ μαχαίριου ὀρειχάλκινον χρῶμα και λεπτὸς χιτῶν αὐτοῦ ἀντανακλᾷ κίτρινον φῶς, ὡς χρυσωμένον σῶμα. Εἶναι ἄσμος και ἄχυμος, ἔμμοнос, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καθὼς και εἰς τὸ οἰνόπνευμα και τὸν αἰθέρα. Τὰ ὀξεᾶ διδουσιν εἰς αὐτὴν ἐρυθροῦν χρῶμα και τὴν διαλύουσι· διὰ τῶν ἀλκαλίων καταβυθίζεται πάλιν με κυανοῦν χρῶμα, κατ' ἐξοχὴν ἐκ τῆς εἰς ὀξικὸν ὀξύ διαλύσεώς της. Πρὸς παύτοις δύναται νὰ καταβυθισθῇ ἡ χρωματιστικὴ ὕλη αὕτη τόσοι δι' ἀργίλλου, καθὼς διὰ ὀξειδίου τοῦ κασσιτέρου· εἰς τὸ θαμβάκιον καθὼς και εἰς τὸν λίνον δίδει χρῶμα κυανοῦν ἀνεξίτηλον, τὸ ὅποιον δὲν φθείρεται μήτε διὰ φωτὸς και ὕδατος, μήτε διὰ σάπωνος δι' ἀμμωνίας, οἴνου, και οὔρου.

Εὐπιον ἀπὸ εὐ και πῖον. Εἶναι ῥευστὸν ἄχρουν, διαφανές, εὐοσμον και ἄχυμον, ἔχει ὀλίγην διαθλαστικὴν δύναμιν, εἶναι δὲ τὸ πλεόν παχύρρευστον σῶμα και διὰ τῆς θερμότητος ἐκτείνεται πλεόν τῶν ἄλλων σωμάτων. Εἶναι καύσιμον και καίει με καθαρὰν λαμπρίζουσαν φλόγα, εἶναι παντελῶς οὐδέτερον και δὲν μεταβάλλεται μήτε διὰ τοῦ φωτὸς μήτε διὰ τοῦ ποτασίου, τὸ ὅποιον δύναται νὰ φυλαχθῇ ἐν αὐτῷ, μήτε διὰ τῶν ἀνοργάνων ἀκράτων ὀξέων, μήτε διὰ τῶν ἀλκαλίων. Τὸ εὐπιον δὲν διαλύει μήτε ἅλατα, μήτε φυτικὰς ἅλαταγόνους εἴσεις, μήτε ρητίνας, ὥστε δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ἐν γένει, ὅτι τὸ εὐπιον εἶναι τὸ πλεόν ἀδιάφορον σῶμα· μὴνύεται δὲ μόνον μετὰ τινων λιπαρῶν οὐσιῶν και τινων εἰδῶν αἰθέρος.

Σωσίκερον Kreosotum. Τοῦτο τὸ σῶμα ἔλαβε τόσοι πολυειδῆ ἐφαρμογὴν, ὥστε κατὰ τὸ παρὸν κατασκευάζουσιν εἰς τὰ χημεία μεγάλας ποσότητος αὐτοῦ. Ἐλαβε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν ιδιότητα τοῦ νὰ διατηρῇ τὸ κρέας και ὅλας τὰς ζωϊκὰς ὕλας ἀπὸ τὴν σήψιν. Εἰς τὸ ἐκ τῆς φηγαῦ κατασκευάζεται ξυλόξος ἐμπεριέχονται περίπου $1 \frac{1}{2}$ τοῖς 0/0 σωσικρέου, εἰς δὲ τὴν ῥευστὴν πίσσαν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ξύλου 20—25 τοῖς 0/0. Πρὸς τούτοις εὐρίσκεται εἰς ἅπαντα τὰ διὰ τῆς ἀποστάξεως προϊόντα, τόσοι τῶν ζωϊκῶν, ὅσον τῶν φυτικῶν ὕλων.

Ἡ ἀποχώρησις τοῦ σωσικρέου ἐκ τοῦ ξυλόξου, ἡ ἐκ τῆς ῥευστῆς πίσης εἶναι πολλὰ σύνθετος και ἐκτεταμένη. Τὸ ξυλόξος θερμανθὲν μέχρι τῆς 70 ἢ 80°, κορέννεται με θεϊκὸν γάτρον διαχεόμενον τὸ δὲ εἰς τὴν

ἐπιφάνειάν του ἀποχωριζόμενον ἔλαιον ἀφαιρεῖται, καὶ μετὰ ταῦτα κατασκευάζεται τὸ σωσίκρεον ἐκ τούτου, ἢ ἐκ τῆς ῥευστῆς πίσσης κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον.

Ἡ ῥευστὴ πίσσα ἀνασταλάζεται, ἕωσθ' ἑξαχθῶσιν περίπου 56 τοῖς 0/0. Τὸ στάλαγμα συνίσταται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκ 2 στρωμάτων ἐλαιώδους ῥευστοῦ, μετὰ τῶν ὁποίων εὐρίσκεται καὶ στρώμα ὀξίνου ὕδατος· τὸ δὲ κάτω στρώμα ἐμπεριέχει τὸ σωσίκρεον. Ἀνίσως δὲ σχηματισθῶσι τὰ εἰρημένα δύο στρώματα, ἀνασταλάζεται τὸ ῥευστὸν, καὶ τὸ ἐξερχόμενον συνάζεται εἰς χωριστὰς μερίδας, αἵτινες πρέπει νὰ ἐξετασθῶσιν, ἂν ἐπιτολάζωσιν ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἢ ἂν κατακρημνίζωνται εἰς αὐτό· εἰς τὴν πρώτην περίστασιν ἐμπεριέχουσι εὖπιον, εἰς δὲ τὴν δευτέραν σωσίκρεον. Ἡ ἀποστάλαξις ἐξακολουθῇ μεχριστοῦ ἀναφαίνεται τεφρόχρους ἀτμός, σημεῖον ὅτι ἐξέρχεται καὶ Paraffin.

Τὸ σωσίκρεον θερμὸν ἔτι ὃν συμμιγνύεται μὲ ἀνθρακικὸν κάλιον, ἐνὸςω παρατηρεῖται ἀναβρασμός, καὶ τὸ μετὰ τὴν φύξιν ἀποχωριζόμενον ἔλαιον ἀνασταλάζεται μετὰ προσοχῆς διὰ νὰ μὴ καῇ. Τὸ κατὰ πρῶτον σταλάζον ἀποβάλλεται, καὶ μόνον τὸ εἰς τὸ ὕδωρ κατακρημνιζόμενον φυλάττεται· ἀλλὰ δὲν πρέπει ν' ἀποσταλαχθῇ μέχρι ξηροῦ. Τὸ στάλαγμα κατεργάζεται μὲ καυστικὸν κάλιον ῥευστὸν 1,12 εἰδικῆς βαρύτητος, δι' οὗ διαλύεται τὸ σωσίκρεον, ἀποχωριζομένων τῶν ἔτι ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένων ἐλαίων. Ἀφαιρεθέντων αὐτῶν θερμαίνεται τὸ ἀλκαλικὸν ῥευστὸν μέχρι ζέσεως· μετὰ ταῦτα δὲ ἐκτίθεται εἰς τὸν αἶρα, ὅπου ἀποψυχραινεται καὶ λαμβάνει φαιὸν χρῶμα· ἀπορρόφᾳ δηλαδὴ ὀξυγόνου, δι' οὗ βάφεται ἰδιαίτερα τις οὐσία ἐμπεριεχομένη ἐν τῷ ῥευστῷ.

Τὸ σωσίκρεον καταβυθίζεται ἐκ τοῦ ἀλκαλικοῦ ῥευστοῦ διὰ θεϊκοῦ ὀξέος, ἀποπλυθὲν δὲ μὲ ὕδωρ ἀναδιαλύεται εἰς καυστικὸν κάλιον καὶ ἀναζέεται, μετὰ ταῦτα πάλιν καταβυθίζεται καὶ ἡ πρᾶξις αὕτη ἐπαναλαμβάνεται, ἐνὸςω λαμβάνῃ διὰ τοῦ καυστικοῦ καλίου φαιὸν χρῶμα. Τέλος ἀποπλύνεται μὲ ὕδωρ καὶ σταλάζεται ἐπ' ὀλίγου ἐνύδρου καλίου πρὸς ἐντελῇ ἀποχώρησιν τοῦ ὀξέος. Ἡ ἀποστάλαξις παύει, ἀφοῦ τὸ ἐν τῇ κερατίνῃ ὑπόλειμμα λάβῃ φαιὸν χρῶμα. Τὸ κατὰ πρῶτον σταλάζον ἐμπεριέχει πολὺ ὕδωρ, τὸ δὲ μετέπειτα εἶναι λεῖψυδρον.

Χαρακτηριστικά. Τὸ καθαρὸν σωσίκρεον εἶναι ῥευστὸν διαφανές, ἄχρουν, ἐλαιώδες τὴν σύστασιν παντελῶς οὐδέτερον, διαπεραστικὸν καὶ ἀηδὲς τὴν ὁσμὴν, ἥτις ὁμοιάζει τὴν τοῦ καπνισμένου κρέατος καὶ καυ-

στικὸν τὴν γεῦσιν. ἔχει σχεδὸν τὴν αὐτὴν διαθλαστικὴν δύναμιν ὡς ὁ ἔνθεις ἄνθραξ, εἰδικὸν βάρος 1,037 καὶ ἀναζέει εἰς τὴν 23°. Δὲν εἶναι ἀγωγὸν τῆς ἡλεκτρικῆς, ἐπὶ τοῦ χάρτου ἐπιλείπει λιπαρὰν κηλίδα μετ' ὀλίγον ἀφανιζομένην, διοχετευθὲν εἰς διάπυρον σωλῆνα ἀποσυντίθεται σχηματίζον ναφθάλιον, ἄνθρακα καὶ ἰδιαιτέραν λιπαρὰν οὐσίαν. Ἄνευ θρυαλίδος καίει δυσκόλως, μετ' αὐτῆς δὲ δίδει καθαρὰν αἰθαλίζουσαν φλόγα. Εἰς τὸν ἀέρα εἶναι ἀμετάβλητον, μεταβάλλεται δὲ εὐκόλως εἰς ῥητίνην δι' ὀξειδωμένων ὑλῶν, διὰ τῶν ἀλατογόνων βάσεων, τῶν τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου ἀλάτων, τοῦ ὀξειδωμένου λευκοχρύσου, τοῦ ἐγγλωρίου χρυσοῦ, τοῦ μγγανησιακοῦ ὀξέος κ.τ.λ. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ὀξειδοῦται σχεδὸν μὲ ἐκπυρσοκρότησιν. Τὸ σωσίκρεον διαλύει τὸ βρώμιον, τὸ σελήνιον, τὸ ἰώδιον, τὸν φώσφορον καὶ τὸ θεῖον. Εἰς θερμοκρασίαν τοῦ ζέοντος ὕδατος 100 μέρη ὕδατος διαλύουσι $4 \frac{1}{2}$ σωσικρέου, μετὰ δὲ τὴν ψύξιν ἀποχωρίζονται πάλιν $3 \frac{1}{2}$ αὐτοῦ. Τὸ οἰνόπνευμα, ὁ αἶθρ καὶ ὁ ἔνθεις ἄνθραξ συμμιγνύονται μετ' αὐτοῦ κατὰ πάσας τὰς ἀναλογίας. Τὸ θεϊκὸν ὀξύ ἀποσυντιθέμενον ἐν μέρει λαμβάνει δι' αὐτοῦ κόκκινον, ἐρυθρόφαιον καὶ εἰς τὴν θερμότητα μέλαν χρώμα. Μεταξὺ πάντων τῶν ὀργανικῶν ὀξέων διαλύεται τὸ σωσίκρεον καλῆτερα εἰς τὸ ὀξικόν· τὸ ψυχρὸν διαλύει 6 τοῖς $\%$, τὸ δὲ θερμὸν 10 τοῖς $\%$ σωσικρέου.

Μὲ τὸ κάλιον ἢ νάτρον σχηματίζει τὸ σωσίκρεον εἰς μετρίαν θερμοκρασίαν δύο ἐνώσεις· τὴν μὲν λειψυδρον καὶ ἐλαϊώδη, τὴν δὲ ἔνυδρον καὶ κρυσταλλουμένην εἰς μαργαριτοεῖδη λεπίδια· καὶ ἡ ἀμμωνία διαλύει τὸ σωσίκρεον. Ἄπαντα τὰ ὀξέα, καὶ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἀποχωρίζουσι τὸ σωσίκρεον ἐκ τῶν ἐνώσεων αὐτοῦ· ἀποσυντιθένται ἐπίσης διὰ τοῦ ὀξυγόνου ἐκ τοῦ ἀέρος καὶ βάφονται ὡχραί, μεταβαλλομένου τοῦ σωσικρέου. Μὲ τὴν ἔνυδρον τίτανον καὶ βαρεῖαν σχηματίζει ὡχρολεύκους διαλυσίμους ἐνώσεις, αἵτινες ἀποξηραίνόμεναι λαμβάνουσι ῥοδόχρουν χρώμα. Τὸ ποτάσιον ὀξειδοῦται δι' αὐτοῦ ὑπὸ ἀνάβρασμόν καὶ τὸ σχηματιζόμενον κάλιον ἐνῶται μὲ τὸ μὴ ἀποσυντιθέμενον μέρος σωσικρέου.

Τὸ σωσίκρεον διαλύει, μάλιστα συνεργούσης τῆς θερμότητος, τὸ βορικὸν ὀξύ, καθὼς καὶ τὰ περισσότερα κρυσταλλούμενα φυτικὰ ὀξέα, τὸν ὀξειδωμένον χαλκόν, δι' οὗ λαμβάνει φαιὸν χρώμα, πολλὰ ἄλατα, κατ' ἐξοχὴν τὰ δι' ὀξικοῦ ὀξέος, τινὰ μεταλλικὰ διὰ νιτρικοῦ ὀξέος, τὰς φυτικὰς ἀλατογόνους βάσεις, λιπαρὰ ἔλαια, καφουράν, τὸ ἐλαστικὸν κόμμι, ῥητίνας, βαφικὰς ὕλας, μάλιστα δὲ τὸ ἰνδικόν, τὸ ὁποῖον καταβυθίζεται ἐξ αὐτοῦ διὰ οἰνόπνεύματος ἐν μορφῇ κροκίδων, διὰ δὲ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος

εἰς εἶδος κρυστάλλων. Τινὲς τῶν οὐσιῶν τούτων κρυσταλλοῦνται ἐκ τῆς εἰς σωσίκρεον διαλύσεως, ὥς ἐκ τοῦ ὕδατος. Ἀπ' ἐναντίας δὲ δὲν διαλύει τὸ νίτρον, τὸ ἀμμωνιακὸν ἄλας, τὸν βόρακα καὶ τὰ πλεῖστα ἀνόργανα ἅλατα, ζάχαριν, τὸ κόμμι.

Πλέον περιέργος εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ σωσίκρεου ἐπὶ τοῦ λευκώματος καὶ τῶν λευκοματούχων συστατικῶν τοῦ αἵματος. Τὸ λεύκωμα καὶ αἱ ἴνες τοῦ αἵματος πηγνύονται διὰ καθαροῦ σωσίκρεου εὐθὺς, διὰ δὲ τῆς εἰς ὕδωρ διαλύσεως αὐτοῦ κατ' ὀλίγον, καὶ μετὰ ταῦτα αἱ οὐσίαι δὲν σήπονται πλέον. Ζωϊκαὶ ἴνες καὶ κρέας ἐκτεθέντα περίπου $\frac{1}{4}$ ὥρας εἰς τὴν ἐπιρροὴν διαλελυμένου σωσίκρεου, δὲν ὑπόκεινται πλέον εἰς σήψιν καὶ ἂν ἐκτίθενται εἰς τὸν ἥλιον. Ἐπὶ τῆς γλώσσης προξενεῖ ἀρκετὸν πόνον καὶ σταλαχθὲν εἰς τὸ δέρμα φθείρει τὴν ἐπίδερμίδα· ἔντομα καὶ ἰχθύες, παρομοίως καὶ τὰ φυτὰ ἀποθνήσκουσιν εὐθὺς εἰς τὸ σωσίκρεον. Ἡ δηλητήριος ἐνέργεια τοῦ σωσίκρεου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πῆξιν τοῦ αἵματος καὶ λευκώματος εἰς ζωϊκὰ ρευστά. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Liebig σύγκειται τὸ σωσίκρεον ἐξ:

Ἄνθρακος	75, 56
Ἰδρογόνου	7, 78
Ὄξυγόνου	16, 66

100.

Τὸ σωσίκρεον εἶναι εἰς ἀρκετὴν χρῆσιν. Ἡ εἰς πολὺ ὕδωρ διάλυσις του εἶναι τὸ καλλίτερον μέσον πρὸς ταχεῖαν ταρίχευσιν τοῦ κρέατος. Ἐσωτερικῶς ἐδειξεν μεγάλην θεραπευτικὴν δύναμιν, λ. χ. εἰς τὴν φθίσιν ὠφελεῖ πολὺ, εἰς τὴν ὀδονταλγίαν καταπραῖνει τοὺς πόνους, βαλλόμενον εἰς τὸ κοῖλον τοῦ ὀδόντος. Εἰς τὴν ἀνατομίαν καὶ εἰς ζωοχημικὰς ἀναλύσεις δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἐμπόδισιν τῆς ἐλευθέρως ἀποσυνθέσεως ζωϊκῶν ὑλῶν. Ἔνεκα τῆς διαθλαστικῆς του δυνάμεως τὸ ἐπρότειναν ὡς χρήσιμον εἰς τὰς κοίλας φακὰς τῶν ἀχρωματίστων τηλεσκοπίων.

Περὶ τῶν διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν λιθανθράκων προαγομέων.

Ἀφοῦ εἰσῆχθη τόσον εἰς τὴν Ἀγγλίαν, καθὼς καὶ εἰς ἄλλα μέρη ὁ ῥεοφωτισμὸς διὰ τῶν διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τῶν λιθανθράκων ἀε-

ρίων, ἐλήφθησαν καὶ πλῆθος ἄλλων σωμάτων περὶ τῶν ὁποίων ὀφείλομεν ν' ἀναφέρωμεν ἐν συντόμῳ.

Ψευστή πίσσα καὶ ἔλαιον ἐκ τῶν γαιανθράκων.

Οἱ γαιάνθρακες δὲν δίδουσι διὰ τῆς ἀποστάξεως τόσα ἔνδρα προϊόντα ὅσα τὸ ξύλον· συνίστανται δὲ ταῦτα ἐκ ρευστῆς ἀνθρακικῆς καὶ θειώδους ἀμμωνίας, τὰς ὁποίας μεταχειρίζονται πρὸς κατασκευὴν καθαρᾶς ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας καὶ ἀμμωνιακοῦ ἁλατος. Τὸ εἰς ρευστὴν κατάστασιν ἐξερχόμενον συνίσταται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ρευστὴν πίσσαν ὁμοιάζουσαν μὲν κατὰ τὰ ἐξωτερικὰ τὴν ἐκ τοῦ ξύλου, διαφέρουσαν δὲ ἀπ' αὐτὴν κατὰ τὴν ὁσμὴν καὶ ἄλλα τινά. Ἡ ἐκ τῶν λιθανθράκων ρευστὴ πίσσα εἶναι, ὡς ἡ ἐκ τοῦ ξύλου διάλυσις τῆς πυρορρήτινης εἰς πυρέλαιον, ἡ δὲ πυρορρήτινη αὕτη δὲν εἶναι ὀξινή, ἀλλὰ ἔνωσις τις μετ' ἀμμωνίας καὶ πυρορρήτινης. Ἐὰν ἡ ρευστὴ πίσσα ἀποσταλαχθῇ μὲ ὕδωρ, συνάγεται εἰς τὸ δοχεῖον βαθύφαιον πυρέλαιον ὁμοιάζον τὸ πετρέλαιον καὶ ἐπιτολάζον ἐπὶ τῆς μετ' αὐτοῦ ἐξερχομένης διαλύσεως τῆς ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας. Ἐὰν ἐκ νέου ἀποσταχθῇ μὲ ποσὸν τι ὕδατος, ἐπιμένει ὀλίγη πυρορρήτινη, τὸ δὲ πυρέλαιον σταλάζει ἔχον ὑποκίτρινον χρῶμα καὶ κεντητικὴν ἰδιαιτέραν ὁσμὴν. ἔχει μεγάλην ὁμοιότητα μὲ τὸ πετρέλαιον, τὸ ὁποῖον, ὡς εἶδαμεν, δύναται νὰ προαχθῇ καὶ ἐκ τῶν λιθανθράκων. Εἶναι 0,770 βαρὺ καὶ τόσον πτητικόν, ὥστε ἀναθυμιάται πολὺ ταχέως, ἂν σταλαχθῇ ἐπὶ τῆς χειρὸς· καίει μὲ καθαρὰν αἰθαλίζουσαν φλόγα, καὶ διαλύει τὸ ἐλαστικὸν κόμμι, τὸ ὁποῖον, ἐξατμιζομένου τοῦ ἐλαίου εἰς τὴν 100°, ἐπιμένει εἰς τὴν ἐλαστικὴν του κατὰστασιν. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν ἀποσταλάζουσι τοῦτο τὸ ἔλαιον εἰς μεγάλην ποσότητα, κατασκευάζοντες μετὰ τοῦ ἐν αὐτῷ διαλελυμένου ἐλαστικοῦ κόμμεως ὑφάσματα.

Ὁ Runge ἐξετάσας τὸ ἐκ τῶν λιθανθράκων πυρέλαιον ἀπεχώρισε τρεῖς βάσεις, τὸ κυανέλαιον (Kyanol), τὸ λευκέλαιον (Leucol) καὶ τὸ πυρέλαιον (Pyrröl), καὶ τρία ὀξέα, τὸ ἐλαιανθρακικόν ὀξύ (Acidum carbohicum), τὸ ροδελικόν (rosolicum) καὶ τὸ φαιελικόν ὀξύ (brunolicum).

Κυανέλαιον. Εἶναι ρευστὸν ἄχρουν, ἐλαιώδες, ὄχι δὲ ἀηδὲς τὴν ὁσμὴν, πτητικόν, διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα, καὶ σχηματίζει μετὰ τῶν ὀξέων οὐδέτερα κρυσταλλώσιμα

άλατα. Διὰ τῆς ἐγγλωρίου τιτάνου μεταβάλλεται εἰς ὀξύ, τὸ ὁποῖον σχηματίζει μετὰ τῶν βάσεων κυανὰς ἐνώσεις. Ἐάν 1 μέρος κυανελαίου συμμιχθῇ μὲ 10 μέρη γαλακτοχρόου διαλύσεως τῆς ἐγγλωρίου τιτάνου, συγκεκριμένης ἐξ 1 μέρους ἐγγλωρίου τιτάνου καὶ 20 μερῶν ὕδατος, σχηματίζεται ὠραιότατον βαθυ-ιώδες, τὸ ὁποῖον μεταβάλλεται διὰ τῶν ὀξέων εἰς ἐρυθρόν, ἀποκαθίσταται δὲ πάλιν διὰ τιτάνου.

Ἄλλο χαρακτηριστικὸν ιδίωμα τοῦ κυανελίου εἶναι τὸ νὰ δίδῃ εἰς τὸ τῶν πευκῶν ξύλον φαιὸν χρῶμα· $\frac{1}{500000}$ τοῦ κόκκου κυανελαίου μὲ ἐνὸς σταγόνης ὕδατος δύναται νὰ κάμνῃ αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν. Αὕτη δὲ ἡ βάψις δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν ἵνα τοῦ ξύλου, ἀλλ' ἀπὸ ἰδιαίτεραν ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένην ὕλην διαλύσιμον εἰς τὸ οἰνόπνευμα· ἡ αὕτη ὕλη εὐρίσκεται καὶ εἰς τὴν ἐντεριώνην τῆς ἀκταίας. Ἡ εἰς αἰθέρα διάλυσις τοῦ κυανελαίου δὲν γεννᾷ ταύτην τὴν βαφὴν, εἰμὴ παρόντος ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Λευκέλαιον. Τοῦτο εἶναι ἐλαιῶδες τὴν σύστασιν, κεντητικὸν τὴν ὁσμὴν, τὴν ὁποίαν ἀποβάλλει ἀφοῦ κορεσθῇ δι' ὀξέων. Κατ' ἐξοχὴν μετὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος, σχηματίζει ὠραῖον κρυσταλλούμενον ἄλας. Ἐπειδὴ δὲν γεννᾷ τοιαύτας μεταβολὰς ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, καθὼς τὸ κυανέλαιον καὶ τὸ ἀκόλουθον πυρέλαιον, ἔλαβε τὸ ὄνομα τοῦτο *Λευκὸν ἔλαιον*.

Πυρέλαιον. Εἶναι σῶμα ἀεροειδές, ὁμοιάζει κατὰ τὴν ὁσμὴν τὰ κοκκινογούλια καὶ γνωρίζεται διὰ τοῦ ἐξῆς ιδιώματος. Τμῆμα ξύλου τῆς πεύκης, ἐπινοτισθὲν μὲ ὕδροχλωρικὸν ὀξύ καὶ κρεμασθὲν εἰς τινα λάγνηνον ἐμπεριέχουσαν πυρέλαιον ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ῥευστοῦ, βάφεται βαθυπορφυρῶν· τὸ χρῶμα τοῦτο δὲν φθείρεται διὰ χλωρίου, χάρτης καὶ λίνον δὲν βάφονται κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον· καθότι τὸ αἷτιον τοῦ χρωματισμοῦ δὲν εἶναι αἱ ἵνες, ἀλλὰ ἡ αὕτη ἐν τῷ ξύλῳ ἐμπεριεχομένη καὶ εἰς τὸ περὶ κυανελαίου εἰρημένη ὕλη. Πρὸς τούτοις βάφεται τὸ πυρέλαιον ὠραῖον κόκκινον διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος.

Ἐλαιανθρακικὸν ὀξύ. Εἶναι σῶμα ἐλαιῶδες, ἄχρουν, ἔχει μεγάλην διαθλαστικὴν δύναμιν καὶ πολλάκις λαμβάνεται κρυσταλλωμένον, οἱ δὲ κρύσταλλοι ῥευσοῦνται πάλιν εἰς κεκλεισμένα ἀγγεῖα. Εἶναι 1,062 εἰδικῆς βαρύτητος, ἀναζέει εἰς τὴν 197, 5°, εἶναι καύσιμον καὶ καίει μετὰ φαιᾶς καὶ πολὺ αἰθαλιζούσης φλογός. Ἡ ὁσμὴ του εἶναι ἰδιαίτερα, ἡ δὲ γεῦσις πολὺ καυστική. Τὸ ἐλαιανθρακικὸν ὀξύ φθείρει τὴν ἐπιδερμίδα καὶ ἐν

γίνει ἔχει τὰ αὐτὰ μὲ τὸ σωσίκερον χαρακτηριστικά· ἀξιοπαρατήρητον δὲ εἶναι ὅτι τὸ τῆς πύκης ξύλον ἐμβαπτισθὲν εἰς διάλυσιν τοῦ ἐλαιανθρακικοῦ ὀξέος ἢ τῶν δι' αὐτοῦ ἀλάτων, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, βάφεται βαθυκυανοῦν, ἀφοῦ ξηρανθῇ, καὶ ὅτι τὸ χρῶμα αὐτὸ δὲν φθείρεται διὰ χλωρίου. Τὰ δι' ἐλαιανθρακικοῦ ὀξέος ἅλατα μὲ ἀλλοκλην βάσιν εἶναι εὐδιάλυτα καὶ κρυσταλλώσιμα.

Ροδελικὸν ὀξύ. Εἶναι στερεὰ υἑλώδης καὶ ἐρυθρὰ μάζα καὶ κυρίως εἶναι βαφικὴ ὕλη· σχηματίζει μετὰ τῶν βάσεων καὶ ἱκανῶν στυπτικῶν μέσων χρώματα καὶ λάκκα ὠραιότερα πολλάκις τῶν δι' ἀνθροκόκκων.

Φαιελικὸν ὀξύ. Εἶναι μάζα υἑλώδης, στιλπνὴ, εὐθρυπτος, ἀσφαλτώδης. Αἱ μετὰ τῶν βάσεων ἐνώσεις του εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον φαιαὶ καὶ ἀδιάλυτοι.

Ναφθάλιον. Ἡ ἐκ τῶν λιθανθράκων ῥευστὴ πίσσα ἐμπεριέχει καὶ ἄλλο σῶμα, τὸ *ναφθάλιον*, παρατηρηθὲν κατὰ πρῶτον παρὰ τοῦ Garten, περιγραφθὲν δὲ διεξοδικώτερον καὶ ὀνομασθὲν παρὰ τοῦ Kidd. Τοῦτο τὸ σῶμα λαμβάνεται, ἐὰν μεγάλα ποσότητες ῥευστῆς πίσσας ἐκ τῶν λιθανθράκων θερμανθῶσιν ἄνευ ὕδατος διὰ πολλὰ μιλιακοῦ καὶ κατ' ὀλίγον αὐξανομένου πυρός. Κατὰ πρῶτον σταλάζει πυρέλαιον, ἔπειτα πυρέλαιον μὲ διαλυμένον ναφθάλιον, καὶ τέλος ἐξαχνίζεται μόνον ναφθάλιον ἐν μορφῇ στιλπνῶν λεπιδίων. Καθαρίζεται διὰ τῆς εἰς ζέον οἶνόπνευμα διαλύσεως ἢ δι' ἐπανειλημμένης ἐξαχνίσεως. Τὸ ναφθάλιον εἶναι ἄχρουν, διαφανές, κρυσταλλῶδες, ἰδιαίτερον τὴν ὁσμὴν, καυστικὸν καὶ ἀρωματικὸν τὴν γεῦσιν, τήκεται εἰς τὴν 79°, καὶ ἐξαχνίζεται εἰς τὴν 210°. ἀναφλέγεται δυσκόλως, καίει δὲ μετὰ λαμπρᾶς πολὺ αἰθαλιζούσης φλογός, δὲν μεταβάλλει μήτε τὸν τοῦ καγκαμίνου, μήτε τὸν τῆς κροκοῤῥίζης χάρτιν, εἶναι ἀδιάλυτον εἰς ψυχρὸν, δυσδιάλυτον εἰς ζέον ὕδωρ, εὐδιάλυτον δὲ εἰς τὸ οἶνόπνευμα, τὸν αἰθέρα, εἰς τὰ πτητικὰ καὶ λιπαρὰ ἔλαια. Κατὰ τὸν Faraday σύγκειται ἐξ:

Ἀνθρακικῆς ὕλης	5 ἀτ.	30 — 93, 75
Ἵδρογόνου	2 ἀτ.	2 — 6, 25

32 100.

Ναφθάλιον καὶ θεικὸν ὀξύ. Τὸ ναφθάλιον διαλύεται διὰ τινων ὀξέων· διὰ δὲ τῆς τοῦ θεικοῦ ὀξέος ἐπιρροῆς ἐπὶ τοῦ ναφθαλίου σχηματίζονται ἰδιαίτερα σώματα: τὸ ὑποθειοναφθαλικόν, τὸ ὑποθειοναφθικόν καὶ

ὑποθειογλοιαδικόν ὄξύ, τὸ θειογραφθάλιον καὶ θειογραφθαλίδιον. Ταῦτα τὰ σώματα σχηματίζονται τόσον διὰ τοῦ ἐνύδρου, ὥς καὶ διὰ τοῦ λειψύδρου θειικοῦ ὀξέος, ἢ δὲ διαφορά των προέρχεται ἀπὸ τὴν διάφορον ἐνέργειαν τοῦ ὀξέος. Κατ' ἐξοχὴν διὰ τοῦ λειψύδρου ὀξέος γεννᾶται πάντοτε καὶ θειῶδες ὄξύ, ὅχι δὲ καὶ διὰ τοῦ ἐνύδρου θειικοῦ ὀξέος. Ἡ τοῦ λειψύδρου ὀξέος ἐπιρροή συνδεύεται ἀπὸ σημαντικὴν ἔκλυσιν τῆς θερμότητος, ἥτις ἀναβαίνει πολλάκις μέχρις ἀναφλέξεως. Ἐὰν προστεθῇ εἰς τὰ ληφθέντα μίγματα ὕδωρ, ἀποχωρίζονται ναφθάλιον, θειοναφθάλιον καὶ θειοναφθαλίδιον· ἢ δὲ ὡχρὰ διάλυσις ἐμπεριέχει ἀμετάβλητον θειικόν ὄξύ, ὑποθειογλοιαδικόν, ὑποθειοναφθικόν καὶ ὑποθειοναφθαλικόν ὄξύ, καθὼς καὶ ἰδιαίτερα ῥητίνη καὶ χρωματιστικὴ ὕλη.

Ὑποθειογραφθαλικόν ὄξύ. Ἀνεκλύφθη παρὰ τοῦ Faraday, ἐξετάσθη δὲ ἀκριβέστερον παρὰ τοῦ Berzelius· ἐκεῖνος νομίσας αὐτὸ σύνθετον ἀπὸ ναφθάλιον καὶ θειικόν ὄξύ τὸ ὠνόμασε θειοναφθαλικόν ὄξύ· οὗτος δὲ εὗρηκεν, ὅτι εἶναι ἔνωσις τοῦ ναφθαλίου μετὰ τοῦ ὑποθειικοῦ, ὅχι δὲ μετὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος.

Τὸ ὑποθειοναφθαλικόν ὄξύ σχηματίζει μάζαν κρυσταλλώδη, σκληράν, εὐθραυστον, ἄοσμον, ὀξινὴν καὶ πικράν, σχεδὸν μεταλλικὴν τὴν γεῦσιν· διῷγραίνεται εὐκόλως, εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ κατὰ πάσας τὰς ἀναλογίας, διαλύεται δὲ καὶ εἰς τὸ οἶνόνπνευμα, τὸ τερμίνθινον καὶ τὸ κοινὸν ἔλαιον. Ἄπαντα τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα εἶναι διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ. τὰ περισσότερο δὲ καὶ εἰς τὸ οἶνόνπνευμα, εἶναι πικρά, σχεδὸν μεταλλικὰ τὴν γεῦσιν, καὶ καίουσι μὲ αἰθαλίζουσαν φλόγα· καὶ δι' ἐρυθρᾶς πυρώσεως δὲν ἀποσυντίθενται ἐντελῶς.

Ὑποθειογραφθικόν ὄξύ. Τοῦτο τὸ ὄξύ σχηματίζεται, ἐὰν τὸ ἐνύδρον ἢ καὶ τὸ λειψύδρον θειικόν ὄξύ ἐνεργῇ ἐπὶ τοῦ ναφθαλίου. Εἶναι ἀπαλὸν τὴν ἀφήν, ὥς λεῖα μαγνησία, μεταβάλλει κατ' ὀλίγον τὸ χρῶμά του, μάλιστα ἐκτεθὲν εἰς τὸν ἀέρα διὰ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων, δὲν διῷγραίνεται, εἶναι πικρὸν καὶ ὀξινόν τὴν γεῦσιν, εὐδιάλυτον εἰς τὸ οἶνόνπνευμα. Τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα δὲν ἀποσυντίθενται, καὶ ἂν ἐκτεθῶσιν εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, εἶναι δὲ πικρά καὶ ὁμοιάζουσι πολὺ τὰ διὰ ὑποθειοναφθαλικοῦ ὀξέος ἄλατα.

Τὸ ὑποθειογλοιαδικόν ὄξύ (Acidum hyposulfoglutinicum) γεννᾶται διὰ τῆς τοῦ λειψύδρου θειικοῦ ὀξέος ἐπιρροῆς ἐπὶ τοῦ ναφθαλίου. Δὲν εἶναι κρυσταλλώσιμον, ἀλλὰ εἰς ξηρὰν κατάστασιν σχηματίζει μάζαν διαφανή· σκληράν, ἄχρουν ἢ ὑπόφαιον· εἶναι ἄοσμον, πικρὸν καὶ δρῶσι τὴν γεῦσιν,

εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸν αἰθέρα, δυσδιάλυτον δὲ εἰς τὸ οἶνόπνευμα. Ἐκ τῆς εἰς ὕδωρ διαλύσεως του καταβυθίζεται δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος κατ' ὀλίγον ἐν μορφῇ διαφανῶν γλοιωδῶν σταγόνων, οἷτινες ἐνοῦνται βραδέως πρὸς συμπαγῇ μάζαν· ἕνεκα τούτου τοῦ χαρακτηριστικοῦ ἔλαβε καὶ τὸ ὄνομα (ἐκ τοῦ γλοιαδίου, *Gluten*). Τὸ ὑποθειογλοιαδικὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τῶν ἀλκαλίων καὶ τῶν γαιῶν καὶ ἀποχωρίζει ἐξ αὐτῶν τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ.

Τὸ παρὰ τοῦ Berzelius ἀνακαλυφθὲν *θειοναφθάλιον* κρυσταλλοῦται ἐν μορφῇ λευκῶν φυλλοειδῶν θρόμβων τηρομένων καὶ ὑπὸ τὴν 100° πρὸς ὥχρον ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον σερεοῦμενον διὰ τῆς ψύξεως σχηματίζει διαφανὲς ὑγρὸν καὶ ῥητινώδη μάζαν. Εἰς αὐτὴν τὴν κατάστασιν εἶναι τόσον ἡλεκτρικόν, ὥστε δὲν δύναται νὰ λειοτριφθῇ, ἀλλὰ προσκολλάται εἰς τὸν ὄλμον καὶ εἰς τὸν τριπτῆρα. Εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμον δὲ εἰς ψυχρὸν οἶνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα.

Τὸ *θειοναφθαλίδιον* ἀνεκάλυψεν ὁ Berzelius ὁμοῦ μετὰ τὸ προηγουμένον, τὸ ἀπεχώρισε δὲ διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος, εἰς τὸ ὁποῖον διαλύεται μὲν τὸ *θειοναφθάλιον*, ὅχι δὲ καὶ τὸ *θειοναφθαλίδιον*. Εἶναι λευκόν, τόσον ἡλεκτρικόν, ὡς καὶ τὸ *θειοναφθάλιον*, δὲν τήκεται εἰμὴ ὑπὲρ τὴν 100°, κατὰ δὲ τὰ λοιπὰ χαρακτηριστικὰ ὁμοιάζει τὸ *θειοναφθάλιον*.

Ἡ ἐν τῷ *ξυλοπνεύματι* ἐμπεριεχομένη ὥχρὰ βαφικὴ ὕλη ἐξετάσθη παρὰ τοῦ Scanlan καὶ τοῦ Gregory· ὁ μὲν πρῶτος τὴν ὠνόμασεν *Eblanine*, ἀπὸ τοῦ λατινικοῦ ὀνόματος τῆς πόλεως *Dublin*, ὅπου κατοικεῖ ὁ χημικὸς οὗτος· ὁ δὲ δεύτερος *πυροξάνθιον*, *Pyroxanthine*. Κρυσταλλοῦται εἰς μακρὰς ὥχρας ἀγκίδας, εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος δὲ εἰς τὸ οἶνόπνευμα, τὸν αἰθέρα καὶ τὸ ὀξικὸν ὀξύ.

Ἀπολιθώσεις.

Τὰ μεταξὺ τῶν διχοφώρων στρωμάτων τῆς γῆνης σφαίρας ἀπαιτούμενα λείψανα φυτῶν καὶ ζώων, τὰ ὁποῖα διατηροῦν τὸ ἐξωτερικόν των σχῆμα καὶ ἐνίοτε τὸ χρῶμά των, καὶ ἀνταλλάσσουν τὰ ὀργανικά των στοιχεῖα μετὰ τὰ ἀνόργανα, λέγονται ἀπολιθώματα· ἀπολιθώσεις εἶναι καὶ τὰ ἀφθαρτα λείψανα τινῶν ὀστράκων περιβεβλημένων μετὰ γαιώδη μόρια, ἀλλὰ δεικνύουσιν τὴν προσλαβοῦσαν ὑπαρξίν ὀργανικῶν σωμάτων διὰ τὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖον ἐνετυπώθη εἰς αὐτὴν τὴν

περιβάλλουσιν γῆν, ἐν ᾗ τὸ ἐγκλειόμενον ἀπεξηράνθη ἢ ὑπέκυψεν εἰς βραδεῖαν σῆψιν, διάφορον ὅμως ἀπὸ ἐκείνης, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπόκεινται τὰ ὀργανικὰ σώματα ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ φωτός, τῆς θερμότητος, τοῦ αἰέρος καὶ τοῦ ὕδατος. Τὸ ὀργανικὸν σῶμα μεταβάλλεται εἰς σκληρὰν, ἀνθρακώδη καὶ μελαινὴν ὕλην διατηροῦσαν τὸ σχῆμά του, ἐνῶ τὰ ἐν τῷ ὕδατι διαλύσιμα μέρη ὑπὸ τῶν γαιῶν ἀπορροφῶνται. Διὰ τῆς τέχνης δυνάμεθα νὰ προάξωμεν ἀπολιθώσεις, μεταβάλλοντες φυτικὰς οὐσίας εἰς ὀξειδίων τινὸς μετάλλου, εἰς μέταλλον, εἰς χάλικα κτλ. Ταῦτα δὲ ἀποτελοῦνται, ἐὰν λ. χ. φυτὸν διαβραχέν μετὰ διαλύματος μετάλλου ἢ ὑδροφθορικοῦ ὀξέος χαλικούχου ξηρανθῇ, καὶ ἐπομένως πρὸς καῦσιν τῶν ἐμπεριεχομένων ὀργανικῶν σωμάτων προσεκτικῶς θερμανθῇ. Τοιουτοτρόπως ἀπὸ φυτὰ καταβραχέντα μετὰ διαλύματος θεϊκοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου καὶ θερμανθέντα ἐπιμένει ὀξειδίων τοῦ σιδήρου, δεικνύον ὅχι μόνον τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα τοῦ φυτοῦ ἀλλὰ καὶ τὸν ἐσωτερικὸν τοῦ φυτοῦ ὀργανισμόν μετὰ ἀξιοθυμίας ἀκριβοείας· ἐὰν δὲ βραχῶσι μὲ ἄλατα τοῦ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, ἐπιμένουσι τὰ ἀποκατασταθέντα μέταλλα δεικνύοντα τὸ σχῆμα τοῦ φυτοῦ ἢ τοῦ ζώου· ἐὰν δὲ διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ χάλικος διαβραχῶσι τὰ φυτὰ, ἐπιμένει χαλικοειδὲς τι σκελετόν.

ΖΩΪΚΗ ΧΗΜΕΙΑ.

Περὶ τῶν ζωϊκῶν ὑλῶν.

Καθὼς τὰ φυτικὰ σώματα, οὕτω καὶ τὰ ζωϊκὰ σύγκεινται ἐκ διαφόρων στοιχείων, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ταῦτα ἐμπεριέχουσιν, ἐκτὸς τοῦ ἀνθρακος, τοῦ ὑδρογόνου καὶ ὀξυγόνου, πάντοτε νιτρογόνον, ἐνίοτε καὶ ἔχνη θείου καὶ φωσφόρου. Αἱ ζωϊκαὶ οὐσὶαι διαιροῦνται εἰς ὀξείας, λιπώδεις καὶ οὐδετέρας. Σπανίως ἀπαντῶνται αἱ πρῶται, αἱ λιπαραὶ οὐσὶαι εὗρίσκονται συχνότερα καὶ ἔχουσι κατὰ μέγα μέρος ὁμοιότητα μὲ τὰ τῶν φυτῶν λιπαρὰ ἔλαια, τὰ ὁποῖα, καθὼς εἶδαμεν, δὲν ἐμπεριέχουν νιτρογόνον καὶ ἐπομένως δὲν ἔχουν τῶν ζωϊκῶν οὐσιῶν τὸ κυριώτερον χαρακτηριστικόν. Συχνότατα ἀπαντῶνται αἱ οὐδέτεραι οὐσὶαι, αἱ πλείονες τῶν ὁποίων ἐμπεριέχουσι μέγα ποσὸν νιτρογόνου. Τὰ νιτρογονοῦχα ζωϊκὰ σώματα

ὑπόκεινται διὰ τῆς ἐπιρροῆς διαφόρων χημικῶν μέσων εἰς ἀλλοιώσεις, αἵτινες διαφέρουσιν ἀπὸ τὰς τῶν φυτικῶν οὐσιῶν.

Περὶ τῶν διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς θερμότητος προαγομένων.

Ἐὰν αἱ ζωϊκαὶ οὐσαὶ ἐκτεθῶσιν εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῆς θερμότητος, ἀποσυντίθενται καὶ ἐκ τῶν στοιχείων των προάγονται διάφορα σώματα, περὶ τῶν ὁποίων θέλομεν διαλάβει. Τὰ διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τῶν ζωϊκῶν ὑλῶν ἀποτελούμενα δὲν εἶναι τόσον σύνθετα, καθὼς τὰ διὰ τῆς ἀποστάξεως τῶν φυτικῶν· κοινῶς ἀποτελοῦνται ὕδωρ κεκορεσμένον μὲ ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν, ἀνθρακικὴ ἀμμωνία ἐξαχνιζομένη εἰς στερεὰν κατὰστασιν, ἐμπυρευματικά ἐλαία διαφέροντα ὡς πρὸς τὴν πτητικότητα, ἐμπυρευματικὴ ρητίνη καὶ ἀερίαι. Ἄλλ' εἰς τὸ ἐμπυρευματικὸν ἐλαίον ἐμπεριέχονται διάφορα σώματα ὁμοιάζοντα μὲν τὰ ἐμπυρευματικά ἐλαία κατὰ τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικά των, κατὰ δὲ τὰ χημικὰ συμφωνοῦντα μὲ τὰς ὀργανικὰς ἀλατογόνους θάσεις. Τὰ κυριώτερα τούτων εἶναι τὰ ἑξῆς.

Ἀλκαλικὸν ῥευστὸν καὶ τὸ ἄλλας. Sal et Spiritus Cornu Cervi. Καὶ τὰ δύο ταῦτα εἶναι μεμιγμένα μὲ ἐμπυρευματικὸν ἐλαίον καὶ ἐπομένως ὠχρὰ ἢ φαῖα. Πρὸς ἰατρικὴν χρῆσιν καθαρίζεται τὸ ἄλλας διὰ δευτέρας ἐξαχνίσεως μὲ ζωάνθρακα. Τὸ ἄλλας συνίσταται ἀπὸ ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν, χημικῶς ἠνωμένην μὲ ἐμπυρευματικὸν ἐλαίον καὶ μάλιστα μὲ ἀνθρακικόν τι ἄλλας μιᾶς τῶν ἀκολούθως περιγραφησομένων θάσεων. Πρέπει νὰ φυλάττηται εἰς πλήρη καὶ καλῶς κεκλεισμένα ἀγγεῖα, καθότι τὸ ἐλαίον τοῦτο κιτρινίζει διὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

Ἐκτὸς τῆς ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας καὶ τοῦ ἐλαίου ἐμπεριέχει τὸ ἀλκαλικὸν ῥευστὸν ὀλίγην ἔνθειον ἀμμωνίαν, μεταβαλλομένην κατ' ὀλίγον διὰ τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιρροῆς εἰς ὑποθειώδη,θειώδη καὶθειϊκὴν ἀμμωνίαν, ἔτι δὲ ποσὸν τι ἐμπυρευματικῆς ρητίνης καὶ ὀξικὴν ἀμμωνίαν. Ἡ ἐμπυρευματικὴ ρητίνη δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διὰ ζωάνθρακος.

Τόσον τὸ ἀλκαλικὸν ῥευστὸν, ὅσον τὸ ἄλλας μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἰατρικὴν ἐσωτερικῶς ὑπὸ τὰ ὀνόματα Sal καὶ Spiritus Cornu Cervi, δηλαδή ἄλλας καὶ πνεῦμα τοῦ ἐλαφείου κέρατος· ἐπειδὴ ἄλλοτε ἐκατασκευάζοντο κατ' ἐξοχὴν ἐκ τοῦ ἐλαφείου κέρατος ὡς μὴ ἐμπεριέχοντος μυελόλιπος. Νῦν δὲ κατασκευάζεται ἐκ τῶν ὀστέων, τὰ ὁποῖα πρὶν τῆς καύσεως καθαρίζονται διὰ τῆς ζέσεως ἀπὸ τοῦ μυελόλιπος.

Ἐμπυρευματικὸν ἐλαίον, Oleum Cornu Cervi, κοινῶς Oleum

animale Dippellii. Τὸ κατὰ πρῶτον σταλάζον ἔλαιον εἶναι ὑποκίτρινον, λαμβάνει δὲ εἰς τὴν ἀπόσταξιν κατ' ὀλίγον βαθύτερον χρῶμα, γίνεται παχύρρευστον, τέλος μέλαν καὶ γλίσχρον καὶ κατακρημνίζεται εἰς τὸ ἀποσταλάζον ρευστόν.

Τὸ διὰ τῆς ἀνσταλάξεως μὲ ὕδωρ καθαρισθὲν ἔλαιον εἶναι ὑελοφανές, λεπτόρρευστον, πολὺ πτητικόν, διαπεραστικόν τὴν ὁσμὴν καὶ κυστικόν τὴν γεῦσιν. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ φωτός μεταβάλλεται εὐκολώτερον τῶν ἄλλων ἐμπυρευματικῶν ἐλαίων, γίνεται δηλαδὴ παχύρρευστον κίτρινον, φαῖον, καὶ τέλος μέλαν. Τὸ καθαρισθὲν ἔλαιον μεταβάλλει τὸν τῆς κροκορρίζης χάρτην ὡς τὰ ἀλκάλια, καὶ μεταδίδει τοῦτο τὸ ἰδίωμα καὶ εἰς τὸ ὕδωρ· εἰς τὸ οἰνόπνευμα εἶναι διαλύσιμον· μεμιγμένον μὲ ἄκρατον νιτρικὸν ὀξύ ἀναφλέγεται, διὰ δὲ κεκραμένου νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς ῥητίνην. Εἰς ὕδροχλωρικὸν ὀξύ διαλύεται μέγα ποσὸν, ἐὰν κατεργασθῇ μὲ αὐτὸ, ἀποχωρίζεται δὲ πάλιν ὡς φαῖα ῥητίνη, προστιθεμένου θεϊκοῦ ἢ νιτρικοῦ ὀξέος.

Εἰς τοῦτο τὸ ἔλαιον ἀνεκάλυψεν ὁ Unverdorben ὄχι ὀλιγωτέρας τῶν 4 ἐλαιωδῶν ἀλταρογόνων βάσεων, αἱτινὲς ὠνομάσθησαν παρ' αὐτοῦ *Ὁδόριον, Ἀνίμιον, Ὀλάριον καὶ Ἀμμώλιον.*

Ὁδόριον. Ἀπὸ τὸ *Odor.* Ἐμπεριέχεται σὺν τῷ ἀνιμίῳ καὶ ὀλανίῳ εἰς τὸ ἀνσταλαχθὲν ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, τὸ ὅποῖον ἐμπεριέχει καὶ ἀμμωνίαν. Ἡ ἀμμωνία πρέπει νὰ κορεσθῇ ἀκριβῶς μὲ νιτρικὸν ὀξύ, τὸ δὲ ἀποχυθὲν ἔλαιον ἀποσταλάζεται εἰς μετρίαν θερμότητα, ἀλλὰ ἄνευ προσθήκης ὕδατος. Τὸ κατὰ πρῶτον σταλάζον εἶναι τὸ ὁδόριον. Ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν δοκιμάζεται τὸ στάλαγμα, ἂν δὲν ἐμπεριέχῃ εἰμὴ ὁδόριον, ἢ ἂν ἤρχιται καὶ τὸ ἀνίμιον νὰ ἐξέρχεται. Τὸ ὁδόριον σταλαχθὲν εἰς ὕδωρ διαλύεται εἰς αὐτὸ, τὸ δὲ ἀνίμιον θολώνει τὸ ὕδωρ. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἀλλάζεται τὸ δοχεῖον διὰ νὰ μὴ νοθευθῇ τὸ ληφθὲν ὁδόριον. Ἡ ἀπόσταξις ἐξακολουθεῖ μεχριτοῦ ἐπιμείνῃ εἰς τὴν κερατίνην τὸ $\frac{1}{20}$ περίπου, καὶ οὕτω λαμβανόμεν μίγμα ἐξ ὁδορίου καὶ ἀνιμίου, τὸ δὲ ἐπιμένον $\frac{1}{20}$ εἶναι μίγμα τοῦ ἀνιμίου καὶ ὀλανίου.

Τὸ ὁδόριον εἶναι ἐλαιῶδες, ἄχρουν, ἔχει μεγάλην διαθλαστικὴν δύναμιν, ἰδιαιτέραν ἀπὸ τῆς ὁσμῆς διαφέρουσαν ἀπὸ τὴν τοῦ ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου, γεῦσιν δὲ καυστικὴν· δὲν στερεοῦται μήτε εἰς τὴν 25°, ἀναζέει εἰς τὴν 100°. εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ οἰνόπνευμα, τὸν αἰθέρα καὶ τὰ πτητικὰ ἔλαια. Τὸν δι' ὀξέων ἐρυθρωθέντα χάρτην τοῦ καγκά-

μίνου μεταβάλλει πάλιν εἰς κυανοῦν, καὶ μετὰ τῶν ὀξέων σχηματίζει ἰδιαίτερα ἄλατα. Τὸ ὁδόριον διαλύει τινὰς ῥητίνας καὶ ἐνοῦται μετὰ διαφορῶν ἐκχυλισματοδῶν ὑλῶν.

Τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα διαφέρουσι τῶν ἄλλων, καθότι ταῦτα παριστά-
νουσιν ἐλαιώδη σώματα· αἱ ἐνώσεις του μὲ τὸ νιτρικόν, ὑδροχλωρικόν
καὶ ὀξικόν ὀξύ, δύνανται μὲν νὰ ἀποσταλαχθῶσι, χωρὶς νὰ ὑπόκηνται
εἰς ἀποσύνθεσιν, ἀλλὰ ἐν γένει μεταβάλλονται εὐκόλως. Ἐκ τῶν οὐδετέ-
ρων ἀλάτων του ἀναθυμιάται κατ' ὀλίγον, ἐπιμένοντος τοῦ ὀξέος ἢ ὀξינוῦ
ἄλατος, καὶ σχεδὸν ἅπασαι αἱ λοιπαὶ βάσεις ἀποχωρίζουσι τὸ ὁδόριον
ἐκ τῶν μετὰ τῶν ὀξέων ἐνώσεων των.

Ανιμίνη, Animin (ἀπὸ τὸ animal). Εἰς τὴν ἤδη εἰρημένην ἀποστά-
λαξιν ἐξέρχεται πρότερον ἢ ὁδορίνη, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ *ανιμίνη*.
Αὗται αἱ μεμιγμέναι βάσεις ἀνακινοῦνται μὲ ὀλίγην ποσότητα ὕδα-
τος, τὸ ὅποιον διαλύει τὴν ὁδορίνην καθὼς καὶ ὀλίγην ἀνιμίνην. Ἡ
πρώτη δύναται ν' ἀποχωριθῇ ἐκ τῆς διαλύσεως, ἐὰν ὑπερκορέννται
μὲ θεικόν ὀξύ, ἐξατμίζεται ὀλίγον, καὶ ὑποβάλλεται μετὰ τινος βάσεως
εἰς ἀπόσταξιν. Ἡ ἀνιμίνη ἐπιμένει ἐν μορφῇ ἐλαίου, ἔχει τὴν ὁσμὴν
τῆς ἐμπυρευματικῆς ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας καὶ χρειάζεται πρὸς διάλυσιν
20 μέρη ψυχροῦ, ἀλλὰ πολὺ περισσότερον ζέοντος ὕδατος. Ἔνεκα τούτου
ἡ διάλυσις ἐὰν θερμανθῇ, θολοῦται διὰ τῆς ἀποχωριζομένης ἀνιμίνης,
γίνεται δὲ πάλιν ὑελοφανὴς διὰ τῆς ἀποψύξεως. Ἡ διάλυσις χρωματίζει
τὸν δι' ὀξέων ἐρυθροβέντα χάρτην τοῦ καγκαμίνου μὲ ἰώδες χρῶμα.
Ἡ ἀνιμίνη δύναται νὰ συμμιχθῇ κατ' ὅλας τὰς ἀναλογίας μὲ τὸ οἶνό-
πνευμα, τὸν αἰθέρα καὶ τὰ ἔλαια, τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα εἶναι ἐλαιώδη ὡς
τὰ δι' ὁδορίνης ὅχι δὲ τόσον διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ.

Ὀλανίνη (λέξις σχηματιζομένην ἀπὸ τὰς πρώτας συλλαβὰς τοῦ *Oleum*
καὶ *animale*). Τὸ εἰς τὴν κερατίνην ἐπιμένον $\frac{1}{10}$ σύγκριται ἐκ ταύτης
τῆς ἀλατογόνου βάσεως. Ἐὰν ἀνακινήθῃ μὲ τὸ 20 πλοῦν ὕδατος, ἡ
καλλήτερα μὲ τὸ 5 πλοῦν, διαλύεται ἡ ὀλανίνη, ἡ δὲ ὀλανίνη μένει
ἀδιάλυτος σχηματίζουσα ὀλίγον λεπτόρρευσον καὶ ἐλαιώδες ῥευστόν, τὸ
ὅποιον διὰ τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιπρόσῃς μεταβάλλεται εἰς νέαν τινὰ ὑλὴν
ὀνομασθεῖσαν *Fuscine*.

Ἡ ὀλανίνη εἶναι ὀλίγον διαλύσιμος εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς δὲ τὸ οἶνόπνευμα
καὶ τὸν αἰθέρα κατ' ὅλας τὰς ἀναλογίας· τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα εἶναι
ἐλαιώδη καὶ ὅμοια μὲ τὰ δι' ὁδορίου.

Άμμωλίη. Λέξις σχηματιζομένη εκ τῶν πρώτων συλλαβῶν τοῦ ammoniacum καὶ Oleum. Δύναται νὰ σχηματισθῇ μόνον εκ τοῦ μὴ ἀνασταλαχθέντος ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου. Ὁ τρόπος τῆς κατασκευῆς εἶναι πολὺ σύνθετος.

Ἡ ἀμμωλία εἶναι σῶμα ἄχρουν, ἐλαϊώδες, κατακρημνιζόμενον εἰς τὸ ὕδωρ, ἐρυθροὶ τὸν πολὺ χάρτην τοῦ καγκαμίνου καὶ τόσον ὀλίγον πτητικόν, ὥστε διὰ τῆς ζέσεως μὲ ὕδωρ ἀναθυμιᾶται διόλου ἢ ὀλίγον μόνον. Εἶναι διαλύσιμον εἰς 40 μέρη ζέοντος καὶ 200 ψυχροῦ ὕδατος, εἰς δὲ τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὸ ὕδωρ καθ' ὅλας τὰς ἀναλογίας. Πρὸς τὰς ἐκχυλισματικὰς ὕλας καὶ τὰς ῥητίνας ἔχει μεγάλην συγγένειαν, καὶ μεταξὺ τῶν εἰρημένων βάσεων εἶναι αὐτὸ τὸ δυνατώτερον. Εἰς βαθμὸν ζέσεως ἐξάγει τὴν ἀμμωνίαν εκ τῶν ἐνώσεών της μετὰ τῶν ὀξέων, καὶ τὰ δι' αὐτοῦ ἄλατα εἶναι ἐλαϊώδη, διαλύσιμα εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸ ὕδωρ, ἀδιάλυτα δὲ εἰς τὸν αἰθέρα.

Κατ' ἄλλον τρόπον ἀπεχώρισεν ὁ Unverdorben εκ τοῦ μὴ ἀνασταλαχθέντος ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου καὶ ἄλλας ὕλας, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι λόγου ἄξιαι μάλιστα τὸ φούσκιον καὶ τὸ ζωϊκὸν πυροξυ.

Πρὸς κατασκευὴν τούτων τῶν ὑλῶν ἀποσταλάζεται 1 μέρος ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου μὲ $\frac{1}{3}$ ἐνύδρου καλίου καὶ 6 ὕδατος. Εἰξαγομένων τῶν πτητικῶν βάσεων καὶ τοῦ ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου ἐπιμένει εἰς τὴν κερατίνην ἀλκαλικὴ διάλυσις, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐπιπολάζει πρισσώδης ὕλη ἢ μὲν ἐμπεριέχει τὸ πυροξυ, ἢ δὲ τὸ φούσκιον.

Φούσκιον. Ἀπὸ τὸ λατινικὸν fuscus φαίος. Εκ τῆς πρισσώδους ὕλης δύναται ν' ἀποχωρισθῇ τὸ φούσκιον κατὰ μέρος δι' ὀξικοῦ ὀξέος. Τὸ διαλελυμένον καταβυθίζεται πάλιν διὰ καλίου, καὶ ἐὰν τὸ φαῖον ἴζημα κατεργάσθῃ μὲ οἰνόπνευμα, ἀποσυντίθεται εἰς 2 διαφόρους ὕλας, τῶν ὁποίων ἢ εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλύσιμος ὠνομάσθη παρὰ τοῦ Unverdorben φούσκιον. Εἰξατμισθεῖσα παρίσταται ὡς φαῖα ῥιγματοῦδης μάζα, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ διαλύσιμος δὲ εἰς τὰ ὀξέα. Τόσον τὸ ξηρὸν καθὼς καὶ τὸ εἰς τὰ ὀξέα διαλελυμένον φούσκιον ὀξειδοῦται κατ' ὀλίγον καὶ λαμβάνει ἐρυθροῦν χρῶμα. Αἱ διαλύσεις ἐμπεριέχουσι τότε τὴν αὐτὴν ὕλην, ἥτις μένει ἀδιάλυτος εἰς τὸ οἰνόπνευμα, κατασκευαζομένου τοῦ φουσκίου κατὰ τὸν προεκτεθέντα τρόπον. Ἡ μεταβολὴ ἐξακολουθεῖ, μεχρισοῦ σχηματισθῇ φαῖα κονιώδης μάζα εἰς ἅπαντα τὰ ρευστὰ ἀδιάλυτος.

Τόσον τὸ φούσκιον ὅσον ἡ ἐρυθρὰ ἀλλοίωσις καὶ ἡ ἀδιάλυτος ὕλη

σχηματίζονται, ἐὰν τὸ ἀνασταλαχθὲν ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον μελανοῦται εἰς τὸν ἀέρα.

Τὸ ζωϊκὸν πυροξὺ λαμβάνεται ἐκ τοῦ ἀλκαλικοῦ ρευστοῦ, τὸ ὁποῖον ἐπιμένει μετὰ τὴν εἰρημένην ἀποστάλαξιν τοῦ ἐμπυρευματικοῦ ελαίου. Ἀφοῦ ἀποχωρισθῇ ἐξ αὐτοῦ τὸ ἐμπεριεχόμενον πυρέλαιον δι' ἐπανειλημμένης ἀποσταλάξεως μὲ ὕδωρ, συμμιγνύεται μὲ κεκραμένον θειϊκὸν ὀξύ, ἐνόσω καταβυθίζεται δι' αὐτοῦ πισσώδης ὕλη· μετὰ δὲ ταῦτα ὑποβάλλεται τὸ μίγμα εἰς ἀποστάλαξιν. Τὸ ἐξερχόμενον πτητικὸν ἔλαιον εἶναι τὸ ζωϊκὸν πυροξὺ τοῦ Unverdorben, ὑποκίτρινον, λεπτόρρευστον, κεντητικὸν καὶ ἐμπυρευματικὸν τὴν ὁσμὴν, καὶ κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐφευρετοῦ τὸ αἷτιον τῆς ἐμπυρευματικῆς ὁσμῆς τῶν πυρελαίων. Εἰς τὸν ἀέρα ἀποσυντίθεται εὐκόλως λαμβάνον φαιὸν, καὶ μετὰ ταῦτα μέλαν χροῶμα· οἱ ἀτμοὶ τοῦ κοκκινίζουσι τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην· εἶναι δὲ ἀδύνατον ὀξύ, τὸ ὁποῖον καὶ εἰς τὴν ζέσιν δὲν δύναται ν' ἀποσυνθέσῃ τὰ ἀνθρακικὰ ἀλκάλια.

Τὸ ἐκ νιτρογονούχων φυτικῶν ὕλῶν ληφθὲν πυρέλαιον εἶναι τὸ αὐτὸ ὡς τὸ ζωϊκόν, ἢ τοῦλάχιστον πολὺ ὅμοιον μὲ αὐτό. Ἐκ δὲ τοῦ ἰνδικοῦ ἐλήφθη χημικῶς πυρέλαιον, ὃχι ἀηδὲς τὴν ὁσμὴν, τὸ ὁποῖον περιέχει ἐλαιώδη τινὰ βάσιν, ἣτις σχηματίζεται διὰ τοῦ ἀέρος. Τὴν βάσιν ταύτην ὠνόμασε *κρυστάλλιον*, διότι ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ σχηματίζῃ μὲ τὰ ὀξέα κρυσταλλώσιμα ἅλατα.

Αἱ αὐταὶ ὕλαι, τὰς ὁποίας ἀνεκάλυψεν ὁ Reichenbach διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποσταλάξεως τῶν φυτικῶν ὕλῶν, ἐμπεριέχονται ἐν μέρει καὶ εἰς τὸ ζωϊκὸν πυρέλαιον· ἐκτὸς τοῦ παραφίου εὗρηκεν ἐν αὐτῷ λιπαρώδη τινὰ ὕλην, ὁμοιάζουσαν τὸ χοληστεάριον, καὶ ὀνομασθεῖσαν παρ' αὐτοῦ *πυροστεάριον*. Εἶναι σῶμα λευκόν, ὀλίγον διαφανές, λιπαρῶδες, εὐθραυστον, μετὰ τὴν τῆξιν κρυσταλλώσιμον, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, διαλυτὸν δὲ εἰς τὸ ζέον οἰνόπνευμα, καὶ μάλιστα εἰς τὸν ἐνθεῖον ἄνθρακα, ἀναφλεχθὲν καίει ὡς ὁ κηρός.

ῥ δ ω ρ.

Ἐὰν ζωϊκαὶ οὐσίαι τεθῶσιν ὑπὸ ὕδωρ ὀλίγον κατ' ὀλίγον σήπονται καὶ ἐκ τῆς σήψεως ἀποτελοῦνται διάφοροι ἄλλαι ὕλαι.

Καυστική πότασσα.

Παρά τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων φθείρονται μὲ περισσοτέραν ταχύτητα αἱ ζωϊκαὶ παρὰ αἱ φυτικαὶ ὕλαι, καὶ μεταβάλλονται εἰς ἀμμωνίαν, ἥτις ἐκλύεται διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τῶν ἐκτὸς τούτων σχηματίζεται ἀνθρακικὸν ὀξύ, ὀξικὸν ὀξύ, καὶ νιτρογονοῦχος ὕλη, ἥτις ἐπιμένει μὲ τὰ ἀλκάλια.

Ἐὰν αἱ ζωϊκαὶ οὐσίαι πυρρῶθωσιν εἰς χύτραν μὲ κάλιον ἢ νάτρον, καὶ τὸ ἐπιμένον φύραμα ἐξαλουσισθῇ δι' ὕδατος, λαμβάνεται ρευστὸν σχηματίζον μετὰ τῶν τοῦ σιδήρου ἀλάτων τὸν ὑδροκυανικὸν σίδηρον. Μὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ τίτανος διαλύει τὰ μαλακὰ μέρη τῶν ζωϊκῶν οὐσιῶν, καὶ τὰ μεταβάλλει εἰς ἀμμωνίαν, σχηματίζει δὲ καὶ νέα σώματα μὴ ἐκπέμποντα ἀηδῇ ὁσμὴν, καὶ ἐὰν σήπωνται διὰ τοῦτο καλύπτουν τὰ πτώματα μετὰ τιτάνου.

Ἄκρατα ὀξέα.

Ἐὰν ἐπὶ τῶν ζωϊκῶν οὐσιῶν ἐπιχυθῶσιν ἄκρατα ὀξέα, τὰ ὀξέα ταῦτα ἐνοῦνται μετ' αὐτῶν καὶ τὰς ἀποσυνθέτουσιν, καὶ τοῦτο ἀκολουθεῖ ἰδίως μετὰ τοῦ θειικοῦ καὶ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος. Τὸ θειικὸν ὀξύ λ. χ. σχηματίζει μετὰ τῶν ἐκπλυνομένων ἰνῶν ἰδιαιτέραν ὕλην λευκίην *Leucin* καλουμένην καὶ μετὰ τοῦ πηκτώματος ἰδιαίτερου εἶδους ζάχαριν. Τὸ νιτρικὸν ὀξύ καὶ αἱ ζωϊκαὶ οὐσίαι ἀποσυντίθενται ἀμοιβαίως μετὰ μεγάλης ζωηρότητος, καὶ ἐξ αὐτῶν σχηματίζονται διάφοροι νέαι ὕλαι. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ζέοντος νιτρικοῦ ὀξέος γεννᾶται ὕδωρ καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ, νιτρογόνον ὀξειδίου, ἀμμωνία, ὀξικὸν, μηλικὸν, ὀξαλικὸν ὀξύ, ἰδιαιτέρα πυρσοκροτοῦσα ὕλη καὶ ἄλλαι τινὲς οὐσίαι, περὶ τῶν ὁποίων θέλομεν ἀναφέρει ἀκολουθῶς.

Περὶ τῶν οὐδετέρων ζωϊκῶν οὐσιῶν.

Πρωτείνη. *Protein.*

Τὴν στοιχειώδη ὕλην, ἥτις εἶναι ἡ κυρία βάσις τοῦ φυτικοῦ λευκώματος, τῶν ἰνῶν, τοῦ κρέατος, τοῦ τυροῦ, ἐκάλεσαν *πρωτεΐνην* ἀποχωρίζεται δὲ ἐξ αὐτῶν κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον.

Τὸ μεταχειριζόμενον σῶμα ἐκχυλίζεται ἐπανειλημμένως δι' ὕδατος, οἰνοπνεύματος καὶ αἰθέρος πρὸς διάλυσιν τῆς ζαχάρως, τῆς ῥητίνης καὶ τοῦ λίπους, ἐπομένως κατεργάζεται διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος πρὸς διάλυσιν τῆς φωσφορικῆς τιτάνου. Τὸ δὲ ἐπιμένον μέρος διαλύεται διὰ τοῦ καυστικοῦ καλίου καὶ ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου ἀποχωρίζεται δι' ὀξικοῦ ὀξέος.

Ἡ δι' ὕδατος ἀρκοῦντως ἀποπλυθεῖσα πρωτεΐνη σχηματίζει διαφανεῖς κροκίδας, φαιάς καὶ διὰ τῆς ἀποξηράνσεως σκληρὰς γενομένας· διὰ συνεχοῦς ζέσεως διαλύεται ἐντελῶς· ἐνοῦται τόσον μετὰ τῶν ὀξέων, ὅσον καὶ μετὰ τῶν ἀλκαλίων πρὸς οὐδετέρας σχεδὸν ἐνώσεις. Ἡ ἐνωσις τῆς πρωτεΐνης μετὰ τοῦθειικοῦ ὀξέος καλεῖται πρωτεΐν-θειϊκὸν ὀξύ. Ἡ πρωτεΐνη παρέχει καὶ μετὰ τοῦ χλωρίου ἰδιαιτέραν τινα ἐνωσιν ἀπολαμβανομένης ἐν τῷ χλώριον διοχτευθῇ διὰ διαλύματος καθαρῷ λευκώματος, καὶ ἡ ἐνωσις καλεῖται χλωρική πρωτεΐνη. Ἐὰν ἡ πρωτεΐνη κατεργασθῇ μετ' ὑπερτεροῦντος ποσοῦ καυστικοῦ καλίου ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν ὀλίγης θερμότητος ἀποσυντίθεται, ἐξ αὐτῆς ἐκλύεται ἀμμωνία, καὶ ἀφοῦ ἡ πρωτεΐνη ἐντελῶς ἀποσυντεθῇ, ἐπιμένει ἀνθρακικὸν καὶ μυρμηκικὸν κάλιον, τὸ δὲ διάλυμα ἐμπεριέχει τρεῖς ὀργανικὰς οὐσίας· τὴν λευκίνην, πρωτίδην (Protid) καὶ τὴν ἐρυθροπρωτίδην.

Ἰνώδης ὕλη. Fibrina.

Ἡ ζωϊκὴ ἰνώδης ὕλη εἶναι ἐκ τῶν κυριωτέρων συστατικῶν τῶν μυῶν, ἐμπεριέχεται δὲ καὶ εἰς τὸ αἷμα, καὶ ἕνεκα τούτου δύναται νὰ συγκαταταχθῇ μετὰ τὰ ἀφθονέστερα συστατικὰ τῶν ζωϊκῶν οὐσιῶν. Δύναται δὲ νὰ κατασκευασθῇ εἰς καθαρὰν κατάστασιν, ἐὰν τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν ἐκρέον ἥδη θερμὸν αἷμα ἀνακινήθῃ διὰ φρυγάνων μέχρις ἀποψύξεως, καὶ ἐὰν τὸ οὕτως ἀποχωριζόμενον ἰνώδες μέρος ἀποπλυθῇ διὰ ψυχροῦ ὕδατος, ἕως οὗ δὲν χρωματίζεται πλέον τὸ ὕδωρ. Παρομοίως ἀποτελεῖται ἡ ἰνώδης ὕλη, ἐὰν τὸ εἰς λεπτὰ τεμάχια κεκομμένον κρέας συνεχῶς τρίβεται εἰς ὄλμον διὰ προσθήκης ψυχροῦ ὕδατος, ἕως οὗ τὸ ἐκθλιβόμενον ὑπόλειμμα κατασταθῇ ἐντελῶς ἄχρουν.

Ἡ τοιουτοτρόπως ληφθεῖσα καὶ καθαρισθεῖσα ἰνώδης ὕλη εἶναι λευκὴ τὸ χρῶμα, ἄσμος καὶ ἄχυμος, ὀλίγον ἐλαστικὴ καὶ βαρυτέρα τοῦ ὕδατος. Διὰ βραδείας ξηράνσεως χάνει σχεδὸν τὰ $\frac{4}{5}$ τοῦ βάρους τῆς καὶ διὰ τῆς ἀποβολῆς τοῦ ὕδατος γίνεται ὠχρὰ, σκληρὰ καὶ εὐθρυπτος, τεθεῖσα

δὲ εἰς τὸ ὕδωρ ἀπολαμβάνει τὸ χρῶμα καὶ τὴν μορφήν της. Ἐὰν καθυποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, σχηματίζει ἀρκετὴν ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν, καὶ ἐν γένει ἐξάγονται τὰ ἴδια ἀποτελέσματα, ἅτινα ἀποτελοῦνται διὰ τῆς ἀποσταξέως τῶν νιτρογονούχων ὑλῶν. Ἀποτεφρωθεῖσα δὲ ὑπολείπεται φωσφορικὴ τίτανος, φωσφορικὴ μαγνησία καὶ ἔχνη χάλικος.

Εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ εἶναι ἀδιάλυτος ἡ ἰνώδης ὕλη, ἐὰν δὲ ζέηται πολλὸν καιρὸν μετ' αὐτοῦ συστέλλεται· τὸ δὲ ὕδωρ ἐμπεριέχει ἰδιαιτέραν ζωϊκὴν ὕλην διαλελυμένην.

Ἐὰν ἡ ἐκ τοῦ αἵματος ἀποχωριθεῖσα ἰνώδης ὕλη τεθῇ εἰς ἀνοικτὸν ἀγγεῖον πλήρες ὕδατος, ἄρχεται νὰ σήπηται, καὶ κατ' ὀλίγον διαλύεται ἐντελῶς. Ἡ ἰνώδης ὕλη τοῦ κρέατος, καθὼς καὶ τοῦ ἥπατος, υποβληθεῖσα εἰς τὰς αὐτὰς πράξεις παραλείπει λίπος· ἐκ τούτου λοιπὸν πληροφορούμεθα ὅτι τὸ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τῶν πτωμάτων ἀποτελούμενον λίπος πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσυνθέσεως τῶν μυῶν.

Ἡ ἰνώδης ὕλη διαλύεται ὑπὸ τοῦ καυστικοῦ καλίου εἰς ἀρκετὴν ποσότητα, καὶ δι' αὐτῆς ἀποβάλλει τὸ κάλιον τὰ ἀλκαλικά του χαρακτηριστικά. Ἐνεκα τοιοῦτου ἐντελοῦς κόρου τοῦ καλίου ἐθεωρήθη τὸ διάλυμα τῆς ἰνώδους ὕλης ὑπὸ τοῦ καλίου ὡς ἀλατώδης τις ἔνωσις καὶ καλεῖται *Ἰνικὸν κάλιον*, *Fibras Kalicus*. Ἐὰν δι' αὐτοῦ ἀποσυντεθῶσι τὰ μεταλλικά ἢ μὴ μεταλλικά ἄλατα, ἀπολαμβάνονται τὰ διάφορα ἰνικά ἄλατα. Ἡ ἰνικὴ τίτανος καὶ βαρεῖα εἶναι ἄλατα διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ. Ὁ ἰνικὸς χαλκός, *Fibras Cupricus*, ἀπολαμβάνόμενος διὰ τῆς τοῦ διχλίου τοῦ ὑδροχλωρικοῦ χαλκοῦ δι' ἰνικῆς ποτάσεως ἀποσυνθέσεως συνίσταται ἐξ 92,791 ἰνώδους ὕλης καὶ 7,209 ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ. Ὁ ἰνικὸς ἄργυρος, *Quadri-fibras argenticus* σύγκειται ἐκ 5,43 ὀξειδίου τοῦ ἀργύρου καὶ 94,57 ἰνώδους ὕλης. Ὁ ἰνικὸς ὑποξειδωμένος καὶ ὀξειδωμένος ὑδράργυρος, *Fibras hydrargyrosus* καὶ *hydrargyricus*, ἀποτελοῦνται διὰ τῆς καταβυθίσεως τοῦ ἰνικοῦ καλίου διὰ ἀλάτων δι' ὀξειδωμένου ἢ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου.

Εἰς πάντα τὰ ἄκρατα ὀξέα, ἐξαιρουμένου μόνον τοῦ νιτρικοῦ, οἰδαίνεται ἡ ὑγρὰ ἰνώδης ὕλη καὶ ἀποκαθίσταται διχφανής. Διὰ δὲ τῶν δι' ὕδατος κεκραμένων ὀξέων πάλιν συστέλλεται.

Ἐὰν λειοσκεομμένον καὶ δι' ὕδατος ἀποπλυθὲν κρέας κατεργασθῇ μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου, ἐξοιδούται καὶ διαλύεται· καὶ ἐὰν τὸ μίγμα ζεσθῇ, προστεθέντος ὕδατος, ἀποσυντίθεται καὶ ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν ἀμμο-

νίας σχηματίζεται ὕλη λευκή καὶ διαλύσιμος εἰς τὸ οἰνόπνευμα, ἥτις δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ διαλύματος, ἐὰν κορεσθῇ, διὰ τινος βάσεως. Ἡ ὕλη αὕτη καλεῖται *λευκίνη*, *Leucin*, καὶ ἐνωθεῖσα μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος σχηματίζει τὸ λευκίνο-νιτρικὸν ὀξύ.

Τὰ αὐτὰ μὲ τὴν ἰνὸδὴ ὕλην χαρακτηριστικὰ ἔχει τὸ *Fibroin* οὕτως ἐκαλέσθη τὸ κύριον συστατικὸν τῆς μετάξης, εὗρισκόμενον δὲ καὶ εἰς τὰς κλωστὰς, αἵτινες ἐπιπλέουσι τὸ ἔαρ εἰς τὸν ἀέρα.

Περὶ τῆς ζωϊκῆς βλέννης. Mucus.

Ἡ ζωϊκὴ βλέννα ἐμπεριέχεται εἰς ἰδιαιτέρον ὄργανον ἢ εἰς ἰδιαίτερα ἄγγεια, ἀλλὰ σχηματίζεται πάντοτε ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ὅλων τῶν βλεννομεμβρανῶν καθὼς εἰς τὴν ρίνα, εἰς τὸ στόμα, τὸν λάρυγγα, εἰς τὸν στομάχον καὶ τὴν χοληδόχον κύστιν. Ἐὰν ἡ βλέννα ξηρανθῇ, σχηματίζει μικρὰ λεπίδια, τὰ ὁποῖα διὰ τῆς τρίψεως ἀποξύνονται. Ὁ οὕτω καλούμενος κάλος, καὶ τὰ σκληρὰ στρώματα ὑπὸ τὴν πτέρναν ἐμπεριέχουσι πολλὴν βλένναν, ἐπίσης ἐμπεριέχεται εἰς τὰς τρίχας, εἰς τὰ πτερὰ, εἰς τὰς λεπίδας τῶν ἰχθύων κτλ.

Ἡ βλέννα, ἥτις ὑπάρχει εἰς τὴν ρίνα, εἶναι διαφανῆς, ἰσώδης καὶ ξηραίνουμένη σχηματίζει εὐθραυστα καὶ διαφανῆ λεπίδια, θερμανθεῖσα ἰσχυρῶς ἐξοιδούται, καὶ ἐξ αὐτῆς ἐξαχνίζεται πολλὴ ἀνθρακικὴ ἀμμωνία. Ἡ δὲ τέσσαρς τῆς βλέννης ἐμπεριέχει φωσφορικὴν καὶ ἀνθρακικὴν τίτανον, ὁμοῦ μὲ ἀνθρακικὴν σόδαν.

Λεύκωμα. Albumen.

Τὸ λεύκωμα εἶναι μία ἐκ τῶν ἀφθόνως ἀπαντωμένων ὑλῶν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ζῶων, καὶ ἔνωσις ἐκ *προτεΐνης*, *Protein*, θείου, φωσφόρου καὶ φωσφορικῆς τιτάνου, ἐξ ὧς ἀπαντᾷται εἰς τὰ ὡὰ τῶν ὀρνέων, τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ἐντόμων. Εὗρίσκεται εἰς τὸ ὀρρεῶδες μέρος τοῦ αἵματος, εἰς τὸν ὀρρόν τοῦ χυλοῦ, εἰς τὸ ὕδωρ τῶν ἀπὸ ὑδροπικίαν πασχόντων, εἰς τὰς φλυκταίνας τὰς σχηματιζομένας διὰ τῶν ἐκδορίων, καθὼς καὶ εἰς τὰς διὰ τῆς καύσεως. Τὸ λεύκωμα γίνεται στερεόν, ἐὰν τὸ νεκρὸν ἐκ τῶν ὡῶν τῶν ὀρνέων λεύκωμα ἀναμιχθῇ μὲ 12 μέρη οἰνοπνεύματος, τὸ ὁποῖον ἐνωθὲν μετὰ τοῦ ὕδατος ἀποχωρίζει τὸ λεύκωμα εἰς εἶδος λευκῶν θρόμβων, οἵτινες ἀκολούθως ἀποπλύνονται διὰ

πολλοῦ ψυχροῦ ὕδατος· τὸ λεύκωμα πήγνυται, ἐν θερμανθῇ μέχρι τῆς 100°, καὶ τὸ πεπηγμένον λεύκωμα ἀποπλύνεται διὰ πολλοῦ ὕδατος.

Τὸ πεπηγμένον λεύκωμα εἶναι, καθὼς ἡ ἰνώδης ὕλη, λευκὴ καὶ στερεὰ μάζα, ἄσμος καὶ ἄχυρος, μετὰ τὴν ζήρανσιν εἶναι εὐθρυπτος, κιτρίνη καὶ διαφανής, εἰς τὸ ὕδωρ μεταβάλλεται, οἰδαίνεται καὶ ἀποκαθίσταται ἀδιαφανὴς καὶ λευκὴ. Διακρίνεται ἀπὸ τὴν ἰνώδη ὕλην, καθότι τὸ μὲν λεύκωμα δὲν δεικνύει οὐδεμίαν ἐνέργειαν ἐπὶ τοῦ ὀξειδωμένου ὕδατος, ἐνῶ ἡ ἰνώδης ὕλη ἐκτυλίσσει ἐξ αὐτοῦ μέγα ποσὸν ὀζυγόνου μὲ σημαντικὴν θερμότητα. Τὸ νεκρὸν λεύκωμα τῶν ὠνν πήγνυται εἰς θερμοκρασίαν 161°, καθὼς καὶ διὰ τῶν πλειοτέρων ὀξέων, διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος, τοῦ αἰθέρος καὶ τοῦ ἐλαίου τῆς τερεβινθίνης. Διὰ τῆς πήξεως φαίνεται ὅτι ὑπόκειται εἰς χημικὴν τινα ἀλλοίωσιν.

Τὸ λεύκωμα τῶν ὠνν εἶναι γλισχροῦδες, διαλύσιμον εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ἀφρίζει διὰ τῆς ἀνακινήσεως, καὶ πρασινίζει τὸ σεράπιον τῶν ἰων, φαινόμενον τὸ ὅποιον πρέπει ν' ἀποδοθῇ εἰς τὴν ὑπαρξιν τῆς ἀνθρακικῆς σόδας, σήπεται ταχέως ἐκλύον ὑδροθειωμένον ἀέριον. Ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῆς γαλβανικῆς στήλης πήγνυται, καὶ τοῦτο προσέρχεται ἀπὸ τὴν ἐκλυσιν τῆς θερμότητος· τὸ διάλυμά του εἰς τὸ ὕδωρ δύναται νὰ ἐξατμισθῇ χωρὶς νὰ πήξῃ, καὶ τὸ τοιοῦτον λεύκωμα διαλύεται ἐντελῶς εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ. Ἐὰν δὲ τὸ λεύκωμα ὑπάρχῃ διαλελυμένον εἰς 10 μέρη ὕδατος, δὲν πήγνυται πλέον διὰ τῆς θερμάνσεως, ἀλλὰ τὸ διάλυμα γίνεται ὑπόλευκον.

Τὸ δι' ὕδατος διάλυμα τοῦ λευκώματος καταβυθίζεται διὰ πολλῶν ὡνν, καθὼς διὰ τοῦ χλωρίου, τοῦ ἰώδους καὶ τῶν ὀξέων, ἐξαίρουμένου τοῦ φωσφορικοῦ καὶ ὀξικοῦ ὀξέος, ἅτινα ἐνοῦνται χημικῶς μετὰ τοῦ λευκώματος.

Τὸ λεύκωμα ἐνοῦται μετὰ τῶν ὀξέων σχηματίζον εὐδιαλύτους καὶ ἀδιαλύτους ἐνώσεις. Τὸ θεϊκὸν λεύκωμα ἀπολαμβάνεται, ἐὰν εἰς τὸ διϋλυθὲν λεύκωμα προστεθῇ θεϊκὸν ὀξύ, μεχριστοῦ τὸ βευστόν προσλάβῃ προφανῶς ὀξείαν γῦσιν. Ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦτο ἐξατμισθῇ εἰς ἀερόκενον τόπον, ὑπολείπεται τὸ θεϊκὸν λεύκωμα εἰς εἶδος διαφανοῦς μάζης. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποτελεῖται τὸ ὑδροχλωρικὸν καὶ νιτρικὸν λεύκωμα. Τὸ δὲ ἀνθρακικὸν ἀπολαμβάνεται, ἐὰν τὸ διὰ τινος ἀλκαλίου ἐκ τοῦ θεϊκοῦ λευκώματος καταβυθισθὲν λεύκωμα ἀναμιχθῇ μὲ ὕδωρ καὶ διοχετευθῇ ἀνθρακικὸν ἀέριον μέχρις ἐντελοῦς διαλύσεως. Τὸ ὑδροκυανικὸν λεύκωμα μὲ ὑδροκυανικὸν σίδηρον ἀπο-

λαμβάνεται, ἂν τὸ ὑδροχλωρικὸν διάλυμα καταβυθισθῇ διὰ διαλύματος τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλίου ἐνσιδήρου.

Διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων ἀποχωρίζεται ὅλον τὸ ποσὸν τοῦ λευκώματος ἐκ τοῦ διαλύματός του, καὶ οὕτω σχηματίζεται κίτρινον, πισσῶδες καὶ ὀλίγον μόνον ἐλαστικὸν καταβύθισμα. Τὰ πλείοτερα μεταλλικὰ ἄλατα θολόουσι τὸ διάλυμα τοῦ λευκώματος, καὶ τὰ ἀποτελούμενα καταβυθίσματα εἶναι ἐνώσεις τοῦ λευκώματος μετὰ τῶν ὀξέων καὶ τῶν μεταλλοξειδίων. Ὁ ὑδροχλωρικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύματός του διὰ τοῦ λευκώματος. Ἔνεκα τούτου τὸ λεύκωμα εἶναι τὸ ἀξιολογώτατον ἀντίδοτον κατὰ τῆς διὰ τῆς ἀχνης τοῦ ὑδραργύρου δηλητηριάσεως. Ὁφείλομεν δὲ νὰ σημειώσωμεν, ὅτι ὑπερτεροῦν ποσὸν λευκώματος δύναται νὰ ἀναδιαλύσῃ τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα.

Τὰ καυστικὰ ἀλκάλια διαλύουσι τὸ λεύκωμα πρὸς πηκτῶδες ρευστὸν, ἂν καὶ διὰ τῶν ὀξέων πεπηγμένον ἀναμιγνύμενον ὅμως μετὰ λείας τιτάνου σκληροῦται ταχέως, καὶ τὸ εἰσέτι μαλακὸν φύραμα μεταχειρίζεται πρὸς συγγόλλησιν τῶν υἑλίνων ἢ πορφυρίνων τεθραμμένων σκευῶν. Τὸ λεύκωμα διαλύμενον ὑπὸ τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων ἐξουδετερόνει αὐτὰ τόσον ἐντελῶς, ὥστε ἀποβάλλουσιν ὅλως διόλου τὰ ἀλκαλικά τῶν χαρακτηριστικά. Ἐὰν τὰ διαλύματα ταῦτα ἐξατμισθῶσι μέχρι σερapiοῦ συστάσεως καὶ ἀναμιχθῶσι μὲ οἰνόπνευμα, καταβυθίζονται αἱ ἐνώσεις τοῦ λευκώματος μετὰ τῶν ἀλκαλίων. Αἱ ἐνώσεις αὗται θεωροῦνται ὡς ἄλατα καὶ καλοῦνται λευκωματικά ἄλατα, Albuminates. Αἱ διαφοροὶ ἐκ λευκώματος καὶ μετάλλου ἐνώσεις ἀπολαμβάνονται, ἂν τὸ διάλυμα τοῦ λευκώματος διὰ τοῦ καλίου καταβυθισθῇ διὰ τῶν διαλυμάτων τῶν ἀλάτων· οὕτως ἀποτελεῖται ὁ λευκωματικὸς μόλυβδος, Albuminas plumbicus, ὁ λευκωματικὸς χαλκός, Albuminas cupricus, ὁ λευκωματικὸς ὑδράργυρος, Albuminas hydrargyricus.

Κατὰ τὸν Couerbe ἐνυπάρχει εἰς τὸ λεύκωμα τῶν ὀρνέων ἰδιαιτέρα ὀργανικὴ ὕλη· ἂν λ. χ. πεπυκνωμένον διάλυμα λευκώματος ἐκτεθῇ εἰς ψύχος 8°, πήγνυνται καὶ ἀποτίθενται λευκοὶ θρόμβοι, ἄοσμοι, ἄχυμοι, καὶ εὐθρυπτοὶ, οἵτινες πυρούμενοι μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ, δὲν ἐκλύουσι νιτρογόνον. Τὸ ψυχρὸν ὕδωρ δὲν διαλύει αὐτοὺς μήτε τὸ ζέον, μετὰ τοῦ ὁποίου παρέχει ἀδιάλυτον γλίσχραμα. Ἡ ὕλη αὕτη καλεῖται *Oenine*, Oenin. Τὸ λεύκωμα σύγκειται ἐξ:

Ἀνθρακός 54, 84

Υδρογόνου	7, 09
Νιτρογόνου	15, 83
Οξυγόνου	21, 23
Φωσφόρου	0, 33
Θείου	0, 68

100.

Χρήσις. Εάν θολόν ρευστόν, εις τὸ ὁποῖον διελύθη λεύκωμα, ζεσθῇ, τὸ λεύκωμα πήγνυται καὶ ἀνυψόνει τὰς εἰς τὸ ρευστόν διεσκορπισμέ-
νας ἑτερογενεῖς ὕλας. Ἐνεκα τούτου χρησιμεύει πρὸς κάθαρσιν τῶν
χυλῶν καὶ θολομένων ρευστῶν, λ. χ. καὶ πρὸς κάθαρσιν τοῦ οἴνου, ὅπου
ἐνοῦται μετὰ τῆς βυρσοδεψικῆς ὕλης πρὸς ἀδιάλυτον καταβύθισμα. Μετὰ
τῆς τιτάνου ἀναμιγνύμενον σχηματίζει φύραμα πρὸς κόλλησιν τῆς πορφύ-
ρας. Τέλος δὲ πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς μία τῶν σημαντικωτέρων ὑλῶν τῶν
συντεινουσῶν πρὸς τροφήν, καθότι τὸ λεύκωμα ἐμπεριέχεται εἰς τὰ ὠά,
εἰς τὸ αἷμα καὶ εἰς τὸ κρέας.

Πήκτωμα. Gelatine, Colleforte.

Τὸ πήκτωμα δὲν ἀπαντᾷται εἰς τὰ ζωτικὰ ρευστὰ σχηματισμένον
ἀλλὰ πολλὰ μαλακὰ καὶ σκληρὰ ζωϊκὰ σώματα ἐμπεριέχουν ὕλην τινὰ,
ἣτις διὰ συνεχοῦς ζέσεως δύναται νὰ μεταβληθῇ εἰς πήκτωμα, τοιαύτης
φύσεως εἶναι τὸ ἰνώδες κρέας, τὸ κυψελῶδες ἱστοῦν, οἱ μύωνες κ.τ.λ.
Τὸ πήκτωμα κατασκευάζεται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς μεγάλας ποσότητας,
ἐὰν αἱ εἰρημέναι ὕλαι ἀποπλύνονται διὰ ψυχροῦ ὕδατος πρὸς διάλυσιν τοῦ
λευκώματος, τῶν διαφόρων ἐνυπαρχόντων ἀλάτων, τοῦ ὁσμοζωμίου κτλ.
Μεταχειρίζονται δὲ συνήθως τὰ ἀποξύσματα τῶν δερμάτων, καθὼς καὶ
τὰ ἀποκόμματα τῶν χειροκτίων, ἰδίως δὲ τὰ ὄτα καὶ τοὺς πόδας τῶν
βοῶν, τῶν ἵππων, τῶν προβάτων καὶ τῶν μοσχारीων ταῦτα ζέονται
ἀκολούθως εἰς χαλκίνοὺς λέβητας μὲ ἀρκετὸν ὕδωρ, ἀφαιρουμένου τοῦ
σχηματιζομένου ἀφροῦ, ὅστις διὰ τῆς προσθήκης τιτάνου ἢ γύψου ἐπι-
ταχύνεται. Ἡ ζέσις ἐξακολουθῇ, ἕως οὗ αἱ ὕλαι νὰ διαλυθῶσιν ἐντελῶς,
διῶλίζεται μετὰ ταῦτα τὸ ἀποτελούμενον ρευστόν, τὸ ὁποῖον μετὰ τὴν
ἀπόψυξιν ἀπὸ τὸ καταβύθισμα μεταγγιζόμενον ἐξατμίζεται, μεχρισοῦ
καλυφθῇ τὸ ρευστόν μὲ χιτῶνα· ἀκολούθως δὲ ψυχραίνόμενον πήγνυται
μετὰ ταῦτα χύνεται ἢ ληφθεῖσα πηκτὴ εἰς κυβικοὺς τύπους καὶ ἀπο-
ψυχρανθεῖσα διακόπτεται εἰς τεμάχια, ἅτινα κρεμασθέντα ἐπὶ πλεγμά-
των στεγνοῦνται διὰ πρᾶου πυρὸς ἢ δι' ἐκθέσεως εἰς τὸν ἥλιον.

Ἐκ τῶν ὀστέων δὲν δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἡ πηκτὴ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον, ἀλλὰ ὡς ἐφεξῆς.

Τὰ λειοτριβηθέντα ὀστᾶ ἐπιχύνονται μετὰ δι' ὕδατος κεκραμμένου ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, τὸ ὁποῖον μεταγγιζόμενον μετὰ τινὰς ἡμέρας ἀναπληροῦται δι' ἄλλου ὀξέος. Διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος διαλύεται ἡ φωσφορικὴ τίτανος ἐκ τῶν ὀστέων, καθὼς καὶ ἄλλα ἀλατώδη μόρια· οὕτω δὲ ἐπιμένει εὐκαμπτος καὶ διαφανὴς μεμβράνη, ἥτις ἀποπλυθεῖσα ζέεται 4 ὥρας μεθ' ὕδατος, δι' οὗ διαλύεται ἐντελῶς, καὶ ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου δύναται νὰ κατασκευασθῇ πήκτωμα πολλὰ καθαρόν. Παρομοίως κατασκευάζεται διὰ τῆς ζέσεως τῶν ξυσμάτων τοῦ ἐλαφίου κέρατος σχεδὸν ἄχρουν πήκτωμα. Εἷς τινὰ μέρη τῆς Γαλλίας μεταχειρίζονται πρὸς κατασκευὴν τοῦ πηκτώματος καὶ τὰ λέπη τινῶν εἰδῶν κυπρίνου. Τὰ λέπη κατεργάζονται πρῶτον διὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος πρὸς διάλυσιν τῶν διαφόρων τιτανούχων ἀλάτων, μετὰ ταῦτα δὲ καλῶς ἀποπλυνόμενα ζέονται, καὶ οὕτω μεταβάλλονται εἰς πήκτωμα.

Ὡσαύτως μεταβάλλονται οἱ καθαροὶ χόνδροι (Cartilagines) διὰ τῆς ζέσεως εἰς πήκτωμα. Τὸ ξηρὸν πήκτωμα εἶναι ὠχρόλευκον, διαφανὲς εἰς καθαρὴν κατάστασιν, διαυγές, ἄχρουν καὶ ἄοσμον, βαρύτερον ἀπὸ τὸ ὕδωρ. Ἀποσταχθὲν ἐκλύει ἀρκετὴν ποσότητα ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας. Ἐὰν καλῇ, δυσκόλως ἀποτεφροῦται καὶ εἰς τὴν τέφραν ἐμπεριέχονται ἔχνη φωσφορικῆς τιτάνου. Εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ μεταβάλλεται τὸ πήκτωμα, ἐξοιδαίνεται καὶ εἶναι ὀλίγον διαλύσιμον. Εἰς τὸ βραστὸν ὕδωρ διαλύεται εὐκολα καὶ τὸ διάλυμα πήγνυται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν. Τρία μέρη πηκτώματος διαλελυμένα εἰς 100 μέρη ὕδατος ἀρκοῦν πρὸς σχηματισμὸν συνεχομένης μάζης, ἥτις ῥευστοῦται καὶ ὀξυνίζει ταχέως, τὸ θέρος σήπεται καὶ ἐκλύει ἀμμωνίαν, διὰ συνεχοῦς ζέσεως ἀποβάλλει τὴν ιδιότητα τοῦ πήγνυσθαι καὶ ἀποκαθίσταται διαλύσιμος εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ἀπορρόφωσα τὴν ὑγρασίαν ἐκ τοῦ ἀέρος.

Τὸ οἰνόπνευμα, ὃ αἰθὴρ καὶ τὰ ἔλαια δὲν ἐνεργοῦσιν ἐπὶ τοῦ πηκτώματος. Τὸ δι' ὕδατος διάλυμα δὲν θολοῦται μήτε διὰ τῶν ὀξέων, μήτε διὰ τῶν ἀλκαλίων. Τὸ οἰνόπνευμα ἐνούμενον μετὰ τοῦ ὕδατος καταβυθίζει μέρος τῆς διαλελυμένης πηκτῆς. Παρομοίως καταβυθίζεται τὸ πήκτωμα ἐκ τῆς διαλύσεώς του διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηλίδων· τὸ καταβύθισμα ἐκ πηκτῆς καὶ βυρσοδεψικῆς ὕλης συνιστάμενον, εἶναι κατ' ἀρχὰς γλισχρῶδες καὶ ἐλαστικόν, ἀποξηραίνόμενον δὲ γίνεται εὐθρυπτον καὶ ἀντέχει εἰς τὴν σῆψιν.

Διὰ τοῦ χλωρίου σχηματίζεται εἰς τὸ διάλυμα τῆς πηκτῆς λευκὸν μαργαριτοειδὲς καὶ ἐλαστικὸν κατακρήμνισμα διαλύσιμον, μὴ σηπόμενον καὶ συνιστάμενον ἐκ μεταβεβλημένης πηκτῆς, χλωρίου καὶ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Τὸ διάλυμα τοῦ πηκτώματος καταβυθίζεται διὰ τοῦ ἀλικοῦ λευκοχρύσου μετ' ὠχροῦ χρώματος, διὰ δὲ τοῦ νιτρικοῦ ὑδραργύρου, καθὼς καὶ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου μετὰ λευκοῦ· διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου κατακρημνίζεται φαιὸν, καὶ διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου ἐρυθροῦν κατακρήμνισμα.

Τὸ δι' ὕδατος κεκραμμένον νιτρικὸν ὀξύ διακλύει τὴν πηκτὴν ἄνευ ἐκλύσεως τινὸς ἀερίου πρὸς ὠχρὸν ρευστὸν, τὸ ὁποῖον ἐξατμίζομενον γίνεται βαθύτερον καὶ ἀνθρακοῦται πρὸ τῆς ξηράνσεως, ἐκλυομένου τοῦ νιτρογονοξειδίου. Διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἀκράτου σχηματίζονται μηλικὸν καὶ ὀξαλικὸν ὀξύ. Τὸ θειικὸν ὀξύ ἐνεργεῖ ἰδιαιτέρως ἐπὶ τῆς πηκτῆς, δηλ. σχηματίζει ἰδιαιτέραν γλυκεῖαν ὕλην, ζάχαριν τῆς πηκτῆς, *Sucre de gelatine*, ἀνακαλυφθεῖσαν παρὰ τοῦ *Braconot*. Πρὸς σχηματισμὸν ταύτης τῆς ζαχάρεως καταβρέχεται πηκτῆς λειοτριβημένης μέρος ἐν μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου μερῶν δύο, μετὰ παρέλευσιν 24 ὥρων προστίθεται ἀπεσταγμένον ὕδωρ καὶ τὸ φύραμα τοῦτο καθυποβάλλεται εἰς ζέσιν, ἀναπληρουμένου τοῦ διὰ τῆς ζέσεως ἐξατμίζομένου ὕδατος. Ἐὰν τὸ ρευστὸν ἐξουδετερωθῇ διὰ κρητίδος καὶ ἐξατμισθῇ μέχρι συστάσεως σαραπίου, σχηματίζονται θρομβώδεις κρύσταλλοι. Οἱ κρύσταλλοι οὗτοι ἀποχωρίζομενοι καὶ δι' οἶνοπνεύματος ἀποπλυνόμενοι καθαρίζονται.

Εἶδος τι χελιδόνος, *Hirundo esculenta* καὶ *fuciphaga*, κατοικοῦ τῆς Σουμάτρας, Ἰαβᾶς καὶ ἄλλων Ἀσιατικῶν νήσων, κατασκευάζει τὴν φωλεάν της ἐκ τινος ζωτικῆς οὐσίας χρησίμου πρὸς τροφήν. Ἐὰν αἱ φωλεαὶ αὗται ζεσθῶσι συνεχῶς δι' ὕδατος καὶ οἶνοπνεύματος, ἐπιμένει πηκτώδης ὕλη, ἣτις καλεῖται *Neossin*, καὶ ἥτις κατεργασθεῖσα διὰ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς ξανθο-προτινικὸν ὀξύ.

Ἰχθυόκολλα. *Ichtyocolla*.

Οὕτω λέγεται καθαρὸν τι πήκτωμα γενόμενον ἀπὸ τὰ ἔντερα καὶ κατ' ἐξοχὴν ἀπὸ τὴν νυκτικὴν φύσαν τοῦ γνησίου ἢ ἀσταρίου ἔλλοπος,

ἡ καὶ τοῦ ἀντακαίου. Ἐάν 1 μέρος διαλυθῇ εἰς 24 μέρη ὕδατος καὶ ἀποψυχρυνθῇ, πυκνοῦται πρὸς παχεῖαν πηκτὴν, λεγομένην *Gelatina Ichtyocolae*, ἣτις διαλύεται κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος εἰς ἀραιωμένον θερμὸν οἰνόπνευμα.

Χρῆσις τοῦ πηκτώματος.

Μεταχειρίζονται πρὸς συγκόλλησιν τῶν τμημάτων ξύλων, τοῦ χάρτου καὶ ἄλλων οὐσιῶν, καὶ πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν προτιμᾶται τὸ ἐκ τῶν ἀποκομμάτων τῶν δερμάτων κατασκευασθέν· μεταχειρίζεται πρὸς χρωματισμὸν ἐνούμενον μετὰ διχθόρων χρωμάτων ἀναμιγνύμενον μετὰ στυπτηρίας, διὰ νὰ ἀποκατασταθῇ ὁ χάρτης πυκνὸς καὶ ἐπιτήδειος πρὸς γραφήν. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἀγγλικοῦ ἐμπλάστρου, ὡς θρεπτικὸν μέσον, ἐπεὶδὴ σχηματίζεται διὰ τῆς ζέσεως μεθ' ὕδατος ἐκ τοῦ κρέατος. Ἐκ τοῦ συνήθους πηκτώματος κατασκευάζεται καὶ καθαρωτέρα τις κόλλα χρήσιμος πρὸς συγκόλλησιν τοῦ χάρτου· τοῦτο ἀποτελεῖται, ἐάν τὸ ὑδατῶδες διάλυμα τοῦ συνήθους πηκτώματος ζεσθῇ μέχρι σεραπίου συστάσεως· εἰς 6 κυβικοὺς δακτύλους τοῦ βευστοῦ τούτου προστίθενται 2 κοιλίαρια ζαχάρεως καὶ ἴσον ποσὸν ἀραβικοῦ κόμμεως. Ἀφοῦ ζεσθῇ ἐκ νέου μέχρι τῆς διαλύσεως τοῦ κόμμεως, ἐγχύνεται εἰς μετ' ἐλαίου ἠλειμμένης χαρτῆνας θήκας καὶ ξηρανθὲν διακόπτεται εἰς κομμάτια.

Ὁσμοζώμιον. *Osmazom*.

Τὸ ὁσμοζώμιον ἢ ἡ ζωτικὴ ἐκχυλισματικὴ ὕλη ὑπάρχει εἰς τὸ κρέας, εἰς τὸν ἐγκέφαλον, καθὼς καὶ εἰς πολλὰς ζωϊκὰς οὐσίας.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὁσμοζωμίου κατεργάζεται τὸ λευκοκομμένον κρέας με 2 μέρη ὕδατος ψυχροῦ, καὶ τὸ ἀποτελούμενον καὶ διϋλίζομενον βευσδόν, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει ἅπαντα τὰ εἰς τὸ ὕδωρ διαλύσιμα μέρη τοῦ κρέατος, ὡς λεύκωμα, ὁσμοζώμιον, αἷμα, γαλακτικὸν ὀξύ καὶ διάφορα ἅλατα, ζέσται διὰ νὰ πηχθῇ τὸ λεύκωμα, τὸ ὁποῖον διὰ διϋλίσεως πρέπει νὰ ἀποχωρισθῇ. Τὸ οὕτω διὰ τῆς ζέσεως καθαρωμένον καὶ ἄχρουν βευσδὸν ἐξατμίζεται διὰ πύρου πυρὸς μέχρι συστάσεως σεραπίου καὶ τὸ ὑπόλειμμα τοῦτο ἀνταρράσσεται εἰς συνήθη θερμότητα μετὰ δυνατοῦ οἰονοπνεύματος, τὸ ὁποῖον διαλύει τὸ ὁσμοζώμιον εἰς κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον καθαρὰν κατὰστασιν. Εἶναι ἐρυθρόφαιος διαφανὴς μάζα,

ἀπορρόφῳσα ὑγρασίαν ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας ἔχουσα γεῦσιν καὶ ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ ζωμοῦ τοῦ κρέατος, εἰς τὸ ὅποιον ἐμπεριέχεται κατὰ μέγα μέρος. Τὸ διάλυμά του εἰς τὸ ὕδωρ καταβυθίζεται διὰ τοῦ ὀξικοῦ μο-
λύβδου, τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου καὶ τοῦ ὑδραργύρου.

Ἐκτὸς τῆς πηκτῆς ὕλης, ἥτις εἶναι τὸ κυριώτερον συστατικὸν τῶν μυῶν, ἐμπεριέχονται τένοντες, κυψελῶδες ὀστοῦν, λίπος, αἵματοφόρα ἀγγεῖα, λυμφατικὰ ἀγγεῖα, νεῦρα, ἀπονευρώσεις, λεύκωμα καὶ γαλακτικὸν ὀξύ.

Διὰ τοῦ ψυχροῦ ὕδατος διαλύονται ἐξ αὐτῶν τὸ ὁμοζώμιον, τὸ γαλακτικὸν ὀξύ καὶ λεύκωμα, τὸ δὲ ζέον ὕδωρ μεταβάλλει τὸ κυψελῶδες ὀστοῦν καὶ τὰς ἀπονευρώσεις εἰς πήκτωμα, τὸ ὅποιον ὁμοῦ διαλυόμενον παριστάνει τὸν τοῦ κρέατος ζωμὸν ἢ τὸ Bouillon. Διὰ τῆς τοῦ ζέοντος ὕδατος ἐπιρροῆς ἐπὶ τοῦ κρέατος τήκεται καὶ τὸ ἐμπεριεχόμενον λίπος, τὸ λεύκωμα πήγνυται, καὶ ἀμφότερα τὰ συστατικὰ ἐπιπολάζοντα ἐπὶ τοῦ ρευστοῦ ἐξαφρίζονται.

Ἐὰν τὸ κρέας ἐκτεθῇ εἰς ζέον ὕδωρ, πήγνυται τὸ εἰς τὸ κρέας ἐμπεριεχόμενον λεύκωμα πρὸς σκληράν τινα οὐσίαν, καὶ οὕτω προάγεται διττὴ βλάβη· δηλαδή τὸ κρέας δὲν μαλαττεται, ἐπειδὴ τὸ ὕδωρ δὲν δύναται νὰ εἰσχωρήσῃ εἰς τὸ ἐξωθεν σκληρυνθὲν κρέας, καὶ πρὸς τούτοις ἐμποδίζεται ὁ σχηματισμὸς τοῦ πηκτώματος, καὶ οὕτως ὁ ζωμὸς τοῦ κρέατος γίνεται πολὺ ἀσθενής. Διὰ νὰ ἀποφύγωμεν τοῦτο, ἐκτίθεται τὸ κρέας εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ὀλίγον κατ' ὀλίγον μέχρι ζέσεως θερμαινόμενον· οὕτω διαλύεται κατ' ὀλίγον τὸ λεύκωμα, πήγνυται ἐπομένως καὶ ἐξαφρίζεται ἐπιπολάζον ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας. Τὸ πήκτωμα σχηματίζεται ἐκ τοῦ κυψελώδους ὀστοῦ; τοιουτοτρόπως ἀποτελεῖται ὅχι μόνον δυνατὸς ζωμὸς, ἀλλὰ καὶ τὸ κρέας γίνεται διὰ τῆς βραδείας καὶ συνεχοῦς ζέσεως μαλακόν· ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἐξακολουθήσῃ ἡ ζέσις παρὰ πολὺν καιρὸν, καθότι ἄλλως ἀποκαθίσταται τὸ κρέας ἄχυμον καὶ ἄπεπτος οὐσία, ἂν καὶ ὁ ζωμὸς τοῦ κρέατος γίνεται δυνατώτερος. Ὁ ζωμὸς τοῦ κρέατος ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ πηκτώματος ὁμοζώμιον, δι' οὗ λαμβάνει τὴν ἰδιαιτέραν ὁσμὴν καὶ τὴν θρεπτικὴν δύναμιν, διάφορα ἄλατα, γαλακτικὸν ὀξύ, δι' οὗ ἡ ἐνυπάρχουσα φωσφορικὴ τίτανος διελύθη, καθὼς καὶ ἰδιαιτέραν ὕλην, Kreatin λεγομένην. Ἡ ὕλη αὕτη ἀπολαμβάνεται εἰς κρυστάλλους, ἐὰν τὸ ἐκχύλισμα τοῦ κρέατος κατεργασθῇ δι' οἰνοπνεύματος καὶ τὸ ἐπιμένον διαλυθῇ εἰς ὕδωρ· ἐκ τοῦ ὕδα-
τώδους διαλύματος κρυσταλλοῦται εἰς κύβους. Ἐὰν ὁ ζωμὸς ἐξατμισθῇ

μέχρι συστάσεως σεράπιου, πήγνυται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν, καὶ οὕτως κατασκευάζεται τὸ καλούμενον ἐκχύλισμα αὐτοῦ τοῦ κρέατος, *Tablettes de bouillon*, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ διατηρηθῇ πολὺν καιρὸν· ἐὰν διαλυθῇ εἰς ζέον ὕδωρ, δίδει ζωμὸν κρέατος.

Τὸ ἐκχύλισμα τοῦτο σύγκειται ἐξ 7 μερῶν πηκτώματος καὶ 1 ὁμοζωμίου. Ἐὰν τὰ νεαρὰ ὅστ᾽ ἑσθῶσι πολὺν καιρὸν εἰς κλεισμένα ἀγγεῖα, διαλύεται ἐξ αὐτῶν ὁμοζώμιον μετὰ πολλοῦ πηκτώματος, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀφεψήματος δύναται νὰ κατασκευασθῇ τὸ ἐκχύλισμα διὰ τῆς ἐξατμίσεως. Τὸ κρέας, ἐνῶ διὰ τῆς μεθ' ὕδατος ζέσεως ἀποβάλλει τὰ διαλύσιμά του· μύρια, διὰ τῆς ψήσεως τὰ διατηρεῖ, καὶ τούτου ἕνεκα εἶναι τὸ ψητὸν κρέας πολὺ θρεπτικώτερον καὶ ὠφελιμώτερον διὰ τὴν υἰεῖαν ἀπὸ τὸ βραστόν.

Τὸ βόειον κρέας ἐξετασθὲν ἔδωκε τὰ ἐφεξῆς συστατικά: ἰνώδη ὕλην, ἀγγεῖα, νεῦρα, 15, 8 κυψελώδους ὁστοῦ, τὸ ὁποῖον διὰ τῆς ζέσεως μεταβάλλεται εἰς πῆκτωμα 1, 9, διαλύσιμον λευκώμα καὶ βαφικὴν ὕλην, 2, 20, ὁμοζώμιον καὶ ἄλατα, 1, 30, εἰς τὸ ὕδωρ διαλυσίμου ἐκχυλισματικὴν ὕλην, 1, 05, φωσφορικῆς τιτάνου μετὰ λευκώματος 0, 08, ὕδατος 77, 17.

Περὶ τῶν λιπαρῶν οὐσιῶν.

Ἄπαντα τὰ θερμὰ ζῶα αἶμα ἔχοντα ἔχουσιν εἰς τὸ δέρμα, ἐπὶ τῆς τῶν μυῶν καὶ τῶν ἐντοσθίων ἐπιφανείας, περίξ τῆς καρδίας κτλ. πολλὴν ἢ ὀλίγην ποσότητα λίπους, διαφόρου κατὰ τὸ χρῶμα, τὴν σύστασιν καὶ τὴν ὁσμὴν του· τὸ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ἀμφιβίων λίπος εἶναι συνήθως ῥευστόν, τὸ τῶν κρεοφάγων μαλακὸν καὶ ἰδιαιτέρας ὁσμῆς, τὰ δὲ τῶν ἀναμικσώντων ζώων εἶναι σκληρόν, λευκὸν καὶ ἄοσμον καὶ καλεῖται στέαρ.

Τόσον τὰ ῥευστὰ, καθὼς καὶ τὰ μαλακὰ ἢ σκληρὰ λίπη σύγκεινται ὡς τὰ ἐκ τῶν φυτῶν ληφθέντα λιπαρὰ ἔλαια ἐκ στεατώδους καὶ ἐλαιώδους ὕλης κατὰ διαφόρους ἀναλογίας, διαφέρουσι δὲ ἐκείνων ὡς πρὸς τὰ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀλκαλίων προαγόμενα.

Τὰ λίπη χρησιμεύουσιν εἰς τὰ ζῶα διὰ προφύλαξιν τῶν ὀργάνων κατὰ τραυματισμῶν, πρὸς διατήρησιν τῆς θερμοκρασίας των καὶ πρὸς ἐλάττωσιν τοῦ τῶν νεύρων ἐρεθισμοῦ.

Adeps Ceti. Huile de poisson. Ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἐκτίξεως ἐκ τοῦ λίπους τῶν φαλινῶν καὶ φωκῶν· τὸ ἐκ τοῦ ἥπατος εἶδους τινὸς ὄνισκου, *Jecor Asellus*, ἐκτηκόμενον καὶ λεγόμενον *Oleum Jecoris Aselli*, μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἰατρικὴν κατὰ τῶν διαφορῶν χοιραδικῶν ἀρρώστων. Τοῦτο τὸ τελευταῖον ἔλαιον ἐμπεριέχει ὑδριωδικὰς καὶ ὑδροβρωμικὰς ἐνώσεις. Τὰ ἔλαια ταῦτα εἶναι φαικὰ τὸ χρῶμα, ἀπὸ τὴν ὁσμὴν καὶ γεῦσιν, παρέχοντα μετὰ τῶν ἀλκαλίων μαλακοὺς σάπωνας.

Μεταχειρίζονται πρὸς κατασκευὴν μαλακῶν ἢ φαιῶν σαπῶνων, πρὸς φωτισμὸν, πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὑδρογον-ανθρακικοῦ ἀερίου, καὶ ὑπὸ τῶν κατοίκων τῶν ἀρκτικῶν μερῶν πρὸς τροφήν.

Ἐλαιον τοῦ δελφίνου. Huile de Dauphin. Εἰσάγεται διὰ τῆς ἐκτίξεως ἐκ τοῦ λίπους τοῦ δελφίνου, *Delphinus Phocaena, globiceps*. Ἐὰν τὸ λίπος τοῦτο ἀποψυχρανθῇ μέχρι 30° R. ἀποτίθεται λαμπρίζουσα κρυσταλλώδης ὕλη, ἣτις εἶναι ἡ στεατώδης ὕλη τοῦ ἐλαίου καὶ καλεῖται *Phocenin*. Ἐὰν τὸ δελφινέλαιον ζεσθῇ με καυστικὸν κάλι καὶ μεταβληθῇ οὕτως εἰς σάπωνα, σχηματίζεται ἰδιαιτερον ὀξύ, τὸ δελφινικόν ὀξύ, δυνάμενον νὰ ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ σάπωνος διὰ τριγυκοῦ ὀξέος. Τοῦτο τὸ ὀξύ εἶναι ἄχρουν, ἐλαιῶδες, ρευστὸν, ἐλαφρώτερον τοῦ ὕδατος καὶ πτητικὸν εἰς τὴν θερμότητα. Ἐὰν δὲ τὰ δελφινικὰ ἄλατα ὑποβληθῶσιν εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, εἰσάγεται ἐλαιῶδες ρευστὸν καλούμενον *Delphinon*, ὁμοιάζον ὡς πρὸς τὴν ὁσμὴν μετὰ τὸ *Butyron*.

Ἐλαιον τῶν ὠῶν. Oleum ovorum. Ἀπολαμβάνεται διὰ τῆς ἐκθλίψεως ἐκ τοῦ πεπηγμένου κρόκου τῶν ὠῶν.

Ἐλαιον τῶν ποδῶν τῶν βοῶν. Κατασκευάζεται, ἐὰν οἱ ἀπὸ τὸ δέρμα καὶ τοὺς ὀνυχας κεκαθαρμένοι καὶ λειοκοκκομένοι πόδες ζεσθῶσι διὰ τινος ὥρας εἰς ὕδωρ. Τὸ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ρευστοῦ συναγόμενον ἔλαιον ἐκβάλλεται καὶ τίθεται εἰς κυλίνδρους· τοῦτο εἰς τὴν Γαλλίαν μεταχειρίζεται πρὸς ἄλειμμα τῶν μηχανῶν, καθὼς καὶ πρὸς τροφήν.

Τὸ ἔλαιον τῶν μυρμηκῶν ἀπολαμβάνεται, ἐὰν τὸ μετὰ τὴν ἀπόσταξιν τοῦ μυρμηκικοῦ ὀξέος ὑπόλειμμα ἐκθλιφθῇ. Τὸ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἐπιπολάζον ἔλαιον εἶναι κροκοκίτρινον καὶ ἔχει κατ' ἀρχὰς ἥπιον, ἀκολούθως δριμύτην γεῦσιν.

Μαλακὰ λίπη.

Ἀνθρώπινον λίπος. Τὸ ἐκ τῶν νεφρῶν καὶ μηρῶν ἐκτεκνόμενον λίπος εἶναι ὑποκίτρινον καὶ ᾄσμον. Ἐκτὸς τῆς στεατώδους καὶ λιπώδους ὕλης ἐμπεριέχει κίτρινον καὶ πικράν οὐσίαν, ὁμοίαν ὡς πρὸς τὴν ὁσμήν καὶ γεῦσιν μὲ τὴν χολήν· διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἀλκαλίων μεταβάλλεται εὐκόλως εἰς σάπωνα· καὶ $\frac{1}{20}$ τοῦ βάρους τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος συνίσταται ἐκ λίπους.

Χοίρινον στέαρ. *Axungia Porci. Adeps suillae.* Ἐξάγεται, ἐὰν τὸ μὲ ὕδωρ ἀποπλυθὲν λίπος ζεσθῇ δι' ὕδατος. Εἶναι λευχόν, ᾄσμον καὶ εὐτηκτον, ἀναμίγνυται διὰ συνεχοῦς ἀνακινήσεως μετὰ τοῦ μεταλλικοῦ ὑδραργύρου καὶ τὸ μίγμα τοῦτο καλεῖται *Unquentum mercuriale*. Ἐὰν ἡ ἀλοιφὴ αὕτη κατεργασθῇ μετὰ ψυχροῦ αἰθέρος, δύναται νὰ διαλυθῇ ἐξ αὐτῆς τὸ λίπος καὶ ὁ ὑδράργυρος ἀποχωρίζεται εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν καὶ μόνον σμικρὸν ποσὸν ὑδραργύρου εὐρίσκεται χημικῶς ἠνωμένον καὶ διαλελυμένον ὑπὸ τῶν διαφόρων ὀξέων. Ἐὰν τὸ λίπος τοῦτο θερμυνθῇ μετὰ $\frac{1}{2}$ νιτρικοῦ ὀξέος 1,22 εἰδικῆς βαρύτητος μεταβάλλεται εἰς κίτρινον καὶ σκληρὰν μάζαν ἐμπεριέχουσαν διάφορα λιπαρὰ ὀξέα· τὸ οὕτως ἀλλοιωμένον ἄλειμα λέγεται, *Axungia oxygenata* ἢ *nitrica*. Ἐπίσης μεταβάλλεται τὸ ταχὺν χοίρινον λίπος διὰ προσθήκης νιτρικοῦ ὑδραργύρου εἰς κιτρίνην καὶ σκληρὰν μάζαν, ἥτις εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν ἰατρικὴν καὶ καλεῖται *Unquentum citrinum*.

Τὸ λίπος τῶν χηνῶν καὶ τῶν νησσοῦν εἶναι ἐπίσης μαλακόν, ὑποκίτρινον, εὐάρεστον τὴν γεῦσιν, καὶ ὅμοιον ὡς πρὸς τὰ χαρακτηριστικὰ του μὲ τὸ χοίρινον.

Σκληρὰ λίπη.

Σκληρὸν λίπος, συνήθως στέαρ καλούμενον, εἶναι τὸ τῶν προβάτων, βοῶν καὶ τῆς ἐλάφου. Τὸ βόειον στέαρ εἶναι κίτρινον καὶ εἰς 39°R. τήκεται, εἶναι διαλύσιμον εἰς 40 μέρη ζέοντος οἶνοπνεύματος καὶ ἐμπεριέχει $\frac{3}{4}$ στεατώδους ὕλης. Ἐκ τοῦ πηγνυομένου στέατος δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἐλαιωδὲς τι μέρος διὰ τῆς ἐντὸς μαλλίνων ὑφασμάτων ἐκθλίψεως· ἡ ἀποχώρησις αὕτη τοῦ στεατώδους ἐκ τοῦ ἐλαιωδους μέρους γίνεται τὴν σήμερον εἰς πολλὰ ἐργοστάσια τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἀποχωρισθεῖσα στεατώδης ὕλη μεταχειρίζεται πρὸς κατασκευὴν λαμπάδων ὑποδιαφανῶν, ὁμοίων τῶν ἐκ κηροῦ· κατασκευάζεται ἐπίσης ἡ στεατώδης αὕτη ὕλη,

ἥτις εἶναι τὸ στεατικὸν ὀξύ διὰ τῆς διὰ τιτάνου μεταβολῆς εἰς σάπωνα καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ διαλύματος τοῦ σάπωνος διὰ θεϊκοῦ ὀξέος. Αἱ κατασκευασθεῖσαι λαμπάδες λευκαίνονται εἰς τὸν ἥλιον.

Διὰ προσθήκης ὀλίγου ποσοῦ θεϊκοῦ ψευδαργύρου καὶ ὀξικοῦ μολύβδου λαμβάνει τὸ στέαρ πλειοτέραν σκληρότητα. Ἐάν τὸ στέαρ τακῇ μετ' ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου, ἀποκαθίσταται λευκότερον καὶ σκληρότερον. Τὸ στέαρ μεταχειρίζεται πρὸς παραγωγὴν σκληρῶν σαπώνων.

Τὸ στέαρ τοῦ τράγου εἶναι ὅμοιον τοῦ προεκτεθέντος, διαφέρει δὲ μόνον διὰ τὴν ἰδιαιτέραν ἀηδῆ του ὁσμῆν, ἥτις προέρχεται ἀπὸ ἰδιαίτερον ἐνυπάρχον λίπος, *Hircen* καλούμενον. Ἐάν τὸ λίπος τοῦτο ζεόμενον μετὰ καυστικοῦ καλίου μεταβληθῇ εἰς σάπωνα, σχηματίζεται ἐξ αὐτοῦ ὀξύ, *Acide hircique*, τραγικὸν ὀξύ καλούμενον, τὸ ὁποῖον εἶναι ῥευστὸν ἐλαιώδες, ὀλίγον μόνον διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ, εὐδιάλυτον ὁμῶς εἰς τὸ οἶνό-πνευμα.

Τὸ τοῦ κήτους σπέρμα. *Sperma Ceti*.

Εἰς τὰ κοῖλα τοῦ κρανίου τοῦ φουσητῆρος τοῦ μακροκεφάλου *Physeter macrocephalus* εὐρίσκεται λίπος εἰς ῥευστὴν κατάστασιν, πηγνύμενον δὲ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ζώου· ἀπὸ τὸ μετ' αὐτοῦ ἀναμεμιγμένον ἐλαιώδες μέρος καθαρίζεται, ἐάν κατεργασθῇ μετ' ἀσθενοῦς διαλύματος τοῦ καλίου καὶ ἔπειτα τακῇ εἰς ζέον ὕδωρ.

Εἶναι ὕλη γεατώδης, τήκεται εἰς τὴν 50° R. καὶ εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ οἶνόπνευμα, εἰς τὸν αἰθέρα, εἰς τὰ λιπαρά καὶ πτητικὰ ἔλαια. Ἐάν τὸ εἰρημένον στέαρ κατεργασθῇ πρῶτον διὰ ψυχροῦ καὶ ἀκολούθως διὰ θερμοῦ οἶνοπνεύματος, ἐπιμένει τὸ καθαρὸν λίπος, *Cetine*, κητίνη καλούμενον. Ἡ ὕλη αὕτη δυσκόλως μεταβάλλεται διὰ τοῦ ὑδρομιγοῦς καλίου εἰς σάπωνα, συνίσταται ἐκ μαργαρώδους, ἐλαιώδους ὀξέος καὶ τινος ἰδιαιτέρου λίπους, *Aethal*. Τὸ τελευταῖον λίπος δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ, ἐάν ὁ διὰ τοῦ σπέρματος τοῦ κήτους προαχθεῖς σάπων ἀποσυντεθῇ διὰ τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος καὶ τὸ ἀποχωριζόμενον μέρος διαλυθῇ εἰς λειψυδρον οἶνόπνευμα. Ἐάν τὸ διάλυμα τοῦτο ἐξατμισθῇ, κρυσταλλοῦται τὸ λίπος εἰς εἶδος λεπτῶν καὶ λαμπριζόντων λεπιδίων.

Τοῦτο τὸ λίπος ἐνοῦται καὶ μετὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, ἐάν συντακῇ διὰ πρᾶγου πυρὸς, καὶ τὸ προαγόμενον καλεῖται κητοθεϊκὸν ὀξύ. Μετὰ τοῦ χλωρίου πορίζεται ἡ ἐγχλωρίος κητίνη, *Chlorcetyl*.

Ἐάν τὸ Aethal ἀναμιχθὲν μετὰ φωσφορικοῦ ὀξέος ἀποσταχθῇ, ἐξάγεται ἐλαιώδες ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον καλεῖται Aethalol ἢ Cetene. Μετὰ τοῦ χλωρίου προήχθη ἔνωσις ἐπονημασθεῖσα Aethalylechlorür.

Χρήσις. Τὸ τοῦ κήτους σπέρμα χρησιμεύει εἰς τὰ φαρμακεία δι' ἔμπλαστρα καὶ αἰλοιφάς, ὡσαύτως πρὸς κατασκευὴν λαμπάδων, αἵτινες ὁμῶς ἕνεκα τῆς κρυσταλλώσεως τῆς κητίνης ἀποκαθίστανται εὐθραυστοι. Ἡ εὐθρυψία αὕτη βελτιοῦται διὰ τῆς μετὰ κηροῦ συντήξεως.

Χοληστεάρι. Cholesterine.

Εἶναι ἐν τῶν κυριωτέρων συστατικῶν τῶν τῆς ἀνθρωπίνου χοληδόχου κύστεως συγκριμάτων. Ἐάν οἱ λειωτετριμμένοι λίθοι ζεσθῶσι μεθ' οἶνο-πνεύματος καὶ τὸ διάλυμα τοῦτο ἀποψυχρανθῇ, ἀποτίθεται ἐκ τοῦ διαλύματος τὸ στέαρ εἰς εἶδος λευκῶν μαργαριτοειδῶν λαμπρίζουσων ἀγκίδων, διαλυσίμων εἰς τὸν αἰθέρα καὶ ἐπιπολαζουσῶν εἰς τὸ ὕδωρ. Ἐάν τὸ λίπος τοῦτο ζεσθῇ μὲ 3 μέρη νιτρικοῦ ὀξέος, προάγεται τὸ χοληστεατικὸν ὀξύ, τὸ ὁποῖον ἐκ τοῦ δι' οἶνοπνεύματος διαλύματος κρυσταλλοῦται εἰς λευκὰς ἀγκίδας· τὰ διὰ τοῦ ῥηθέντος ὀξέος σχηματιζόμενα ἄλατα ἔχουσι κίτρινον ἢ ἐρυθρὸν χρῶμα.

Κυψέλη. Cerumen.

Ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀκουστικοῦ πόρου ἀποκρίνεται ὑπὸ πολλῶν μικρῶν ἀδένων ἡ κυψέλη, ἥτις εἶναι ὑποκίτρινον ἢ γαλακτωδές ῥευστὸν, κατ' ὀλίγον πρὸς φαιάν καὶ ἰξώδη μάζαν πηγνυόμενον. Κατὰ τὰς ἀναλύσεις τινῶν χημικῶν πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς γαλάκτωμα ἐκ λευκοῦ λίπους, ζωϊκοῦ λευκώματος καὶ ἰδιαιτέρας πικρᾶς ὕλης, ἀναμειγμένης μὲ τινα γαλακτικά ἄλατα. Ἐάν ἡ κυψέλη συναχθῇ εἰς μέγα ποσὴν, σκληροῦται, φράττει τὸν ἀκουστικὸν πόρον καὶ προξενεῖ βαρυκοΐαν καὶ κουφότητα.

Περὶ τῶν ζωϊκῶν ὀξέων.

Τὰ εἰς τὰς ζωϊκὰς οὐσίας ἐνυπάρχοντα ὀξέα σύγκεινται ἐκ τριῶν ἢ τεσσάρων στοιχείων· τινὰ μὲν ἐμπεριέχουσι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ὀξυγόνον, ἄλλα δὲν ἐμπεριέχουσι διόλου ὀξυγόνον, καὶ πρέπει νὰ θεωρῶνται ὡς δι' ὑδρογόνου σχηματιζόμενα ὀξέα.

Εἰς τὴν τάξιν τῶν διὰ τοῦ ὀξυγόνου ὀξέων ἀνήκουσιν τὸ οὐρικὸν ὀξύ, τὸ ῥόδιον, τὸ ἐρυθρὸν ὀξύ περὶ τῶν ὁποίων θέλομεν ὁμιλήσει εἰς τὸ περὶ οὐρους κεφάλαιον. Περὶ τοῦ βουτυρικοῦ καὶ γαλακτικοῦ ὀξέος θέλομεν ἀναφέρει τὰ δέοντα εἰς τὸ περὶ γάλακτος καὶ βουτύρου.

Ὅξυ τῶν μυρμηκῶν.

Acidum formicum.

Οἱ μύρμηκες ἐκρίπτουσιν ὀξινόν τι ῥευστὸν, εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάρχει ἰδιαίτερον ὀξύ, καλούμενον *μυρμηκικὸν ὀξύ*. Τοῦτο τὸ ὀξύ εὐρίσκεται καὶ εἰς τινὰ ἔντομα, ὡς καὶ εἰς τὰς συνήθεις μυίας, *Musca domestica* καὶ *Oniscus Asellus*, καὶ δύναται νὰ ἐκχυλισθῇ, ἐὰν τὰ ῥηθέντα ἔντομα ἐκπιεσθῶσι καὶ ὁ χυλὸς ἀναμιχθεὶς μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος κεκραμμένου ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν. Κατὰ τὰς δοκιμὰς τοῦ Doebereiner σχηματίζεται, ἐὰν σύμμιξις συνισαμένη ἐκ 10 μερῶν τρυγικοῦ ὀξέος καὶ 18 ὑποξειδίου τοῦ μαγγανησίου ἐπιχυθῶσιν εἰς 15 μέρη θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου, πρῶτον συγκερασθέντος μὲ 30 μέρη ὕδατος, καὶ ἐὰν ἀποσυχθῇ ἐξ ὑελίνου ἀποστακτικοῦ σκεύους. Τὸ ἐπιμένον μυρμηκικὸν μαγγανήσιον ἀποσυντίθεται ἀκολούθως διὰ τῆς θερμότητος μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος. Τὸ ὀξύ τοῦτο σχηματίζεται συχνάκις διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, ἐπὶ τινων ὀργανικῶν σωμάτων συμμιγνυομένων μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου, καθὼς μετὰ ζαχάρους, τοῦ γάλακτος, τῶν ξύλων. κ. τ. λ. Διὰ νὰ ἀποχωρισθῇ τὸ ὀξύ τοῦτο ἐκ τῶν μυρμηκῶν, ἀποσπάζονται συντεθλασμένοι μύρμηκες μετὰ διπλῆς ποσότητος ὕδατος, ἕωσού νὰ ἐκπέμπωσιν ἐμπυρευματικὴν ὀσμὴν. Τὸ οὕτω ληρθὲν ῥευστὸν, ἀφοῦ πρῶτον ἐξουδετερωθῇ διὰ ποτάσεως καὶ ἐξατμισθῇ μέχρι ξηροῦ, υποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν μετὰ $\frac{2}{3}$ θεϊκοῦ ὀξέος κεκραμμένου δι' ὀλίγου ὕδατος.

Χαρακτηριστικά. Τὸ ὀξύ τῶν μυρμηκῶν εἶναι ῥευστὸν ἄχρουν, κεντητικὸν τὴν ὀσμὴν καὶ ὀξύ τὴν γεῦσιν, ἔχει εἰδικὴν βαρύτητα 1,116, θερμαινόμενον μετὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀποσυντίθεται εἰς ὀξειδίου τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ ὕδωρ. Ἐὰν τὸ ὀξύ τοῦτο ἢ καὶ τὰ δι' αὐτοῦ προαγόμενα ἅλατα συνάπτονται μετὰ ὀξειδίων, ἅτινα μεταξιδίδουσιν εὐκόλως τὸ ὀξυγόνον των, ἀποκαθίστανται αὐτὰ, καὶ τὸ τῶν μυρμηκῶν ὀξύ μεταβάλλεται εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ. Τούτου τοῦ χαρακτηριστικοῦ ἕνεκα μεταχειρίζονται τὰ ῥηθέντα ἅλατα εἰς τὴν ἀναλυτικὴν χημεῖαν πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν ὀξειδίων τοῦ χρυσοῦ, λευκοχρύσου κτλ.

Μετὰ τῶν βάσεων ἐνοῦται καὶ ἀποτελεῖ ἄλλατα, τῶν ὁποίων τὰ πλειότερα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ. Ἐὰν ξηρὰ μυρμηκικὴ τίτanos ἀναμιχθῇ με ἴσην ποσότητα ὑδρομιγοῦς τιτάνου καὶ τὸ μίγμα ὑποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, ἀπολαμβάνεται ἐκτὸς τῶν διαφόρων ἀερίων καὶ φαίνεται ῥευστόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐπιπολάζει ἔλαιον, τὸ ὁποῖον ἀναποσταζόμενον γίνεται ἄχρουν καὶ καλεῖται Formicon. Τὸ διάλυμα τοῦ μυρμηκικοῦ ὀξέος εἰς οἰνόπνευμα χρήσιμον εἰς τὴν ἱατρικὴν καλεῖται Spiritus Formicarum.

Υδροκυανικὸν ὀξύ.

Acide prussique.

Ἐὰν τὰ φύλλα τῆς πικροδάφνης, *Prunus Laurocerasi*, οἱ πυρῆνες τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων καὶ ἄλλων ὁμοίων καρπῶν ἐνούμενα με ὕδωρ ἀποσταχθῶσι, προσλαμβάνει τὸ ἀποστάλαγμα ὀσμὴν καὶ γεῦσιν τῶν ῥηθέντων σωμάτων, καὶ ἐὰν ἀναμιχθῇ με διάλυμα τοῦ σιδήρου, ἀποτελεῖται μετὰ τινα καιρὸν κυανοῦν καταθύσιμα, κυανοῦν τοῦ *Berolincou* ὀνομαζόμενον· ἐπεὶ δὲ ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ καταβυθίζῃ τὸν σίδηρον μετὰ κυανοῦ χρώματος ἐπωνομάσθη καὶ κυανοῦν ὀξύ.

Τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ σχηματίζεται συχνάκις καὶ ἐκ τῆς ἀποσυνθέσεως ὀργανικῶν οὐσιῶν, εἰς τὴν ξηρὰν ἀπόσταξιν πολλῶν ζωτικῶν ὑλῶν, εἰς τὴν πύρωσιν τοῦ ζωάνθρακος μετὰ ποτάσεως καὶ σόδας, καθὼς καὶ διὰ τῆς ἐπιφύσεως τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ ὀργανικῶν σωμάτων.

Τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Scheele καὶ κατεσκευάσθη πρῶτον παρ' αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Λειοτριβημένου ὑδροκυανικοῦ σιδήρου μέρη 2 ζέονται με 1 ὀξειδωμένου ὑδραργύρου καὶ 6 ὕδατος, ἕωστού ἐξαλειφθῇ τὸ κυανοῦν χρώμα του ἐντελῶς. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐνοῦται ὁ ὑδράργυρος μετὰ τοῦ κυανίου πρὸς εἰς τὸ ὕδωρ εὐδιάλυτον ἔνωσιν, ἐπιμένοντος τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.

Τὸ ἀποτελούμενον ῥευστόν, ἀφοῦ ἐνωθῇ με ὀλίγην ποσότητα ψηγμάτων σιδήρου καὶ θειικοῦ ὀξέος, ἀποστάζεται περίπου τὸ $\frac{1}{4}$ διὰ πρωτάτου πυρός. Ὁ σίδηρος ἀποσυνθέτει τὸ ὕδωρ καὶ ἐκλύει ὑδρογόνον, ἐνῶ αὐτὸς ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὀξυγόνου καὶ μετὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος· τὸ ἐκλυόμενον ὑδρογόνον ἐνούμενον μετὰ τοῦ κυανίου ἀποτελεῖ ὑδροκυανικὸν ὀξύ· τοῦτο με ὕδωρ μινυόμενον ἐξατμίζεται, εἰς δὲ τὸ ἀποστακτικὸν σκεῦος ἐπιμένει ἐκτὸς τοῦ θειικοῦ σιδήρου καὶ μεταλλικὸς ὑδράργυρος.

Κατὰ τὸν Gay-Lussac κατασκευάζεται τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ εἰς καθάραν κατάστασιν κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Ὁ λειοτετριμένος ὑδροκυανικὸς ὑδράργυρος ἐπιχύνεται μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος, τοῦ ὁποίου ὁ ῥύγχος εἰσέρχεται εἰς τινα ὑέλινον σωλῆνα, πλήρη μέχρι τῶν $\frac{2}{3}$ ὑπὸ μικρῶν τμημάτων μαρμάρου καὶ ὑδροχλωρικῆς τιτάνου λειψύδρου. Ὁ σωλὴν οὗτος ἐφαρμόζεται εἰς μικρὸν καὶ διὰ πάγους ἀποψυχραίνόμενον δοχεῖον. Τὸ εἰς τὸν σωλῆνα τεθὲν μάρμαρον χρησιμεύει πρὸς ἀπορρόφησιν τοῦ ἐξατμιζομένου ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος· ἡ δὲ ὑδροχλωρικὴ λειψύδρος τίτανος πρὸς ἀπρρόφησιν τοῦ συγχρόνως ἀποστάζοντος ὕδατος.

Χαρακτηριστικά. Εἶναι ῥευστὸν διαφανές, ἐκπέμπει δυνατὴν ὀσμὴν, ὁμοίαν τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων, προξενεῖ βῆχα, ἔχει γεῦσιν πικράν, εἶναι εἰδικῆς βαρύτητος 0,705, ζεεὶ διὰ θερμοκρασίας 26° 5, ἐρυθροῖ ἀσθενῶς τὰς κυανὰς φυτικὰς βαφὰς, αἵτινες ἐπανέρχονται διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ ὀξέος. Τὸ ἄκρατον ὑδροκυανικὸν ὀξύ ἐξατμίζεται εἰς θερμότητα 20° R. με τοσαύτην ταχύτητα, ὥστε τὸ ἐπιμέμον μέρος μεταβάλλεται εἰς πάγον· τοῦτο μάλιστα συμβαίνει, ἐὰν σταγὼν τοῦ εἰρημένου ὀξέος ἐξατμισθῇ ἐπὶ ὑελίνου ἐλάσματος. Τὸ ἄκρατον ὑδροκυανικὸν ὀξύ προφυλαττόμενον ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴν ἀτμοσφαιρικοῦ αέρος καὶ τοῦ φωτὸς ἀποσυντίθεται, καὶ μετ' ὀλίγον καιρὸν μεταβάλλεται εἰς φαιὴν καὶ ἰδιαιτέραν νιτρογονο-ανθρακοῦχον ὕλην, ἥτις κατακρημνίζεται. Εἰς δὲ τὸ ῥευστὸν ὑπάρχει ἀμμωνία, ἥτις ἐν μέρει ἐνοῦται μετὰ τοῦ κυανίου. Ἐπειδὴ τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἰατρικὴν, καὶ ἐπειδὴ δὲν δύναται νὰ διατηρηθῇ εἰς ἄκρατον κατάστασιν, διὰ τοῦτο ἐφευρέθησαν μέθοδοι, δι' ὧν ἀποτελεῖται τὸ ὀξύ εἰς κεκραμένην κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ὑπόκειται εἰς τόσῃν ταχεῖαν μεταβολήν.

Κατὰ τὸν Vauquelin κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. Διὰ διχλύσεως συνισταμένης ἐξ 1 μέρους κυανούχου ὑδραργύρου καὶ 8 ὕδατος διοχετεύεται ὑδροθειωμένον αέριον, ἕως οὗ ἀποχωρισθῇ ὅλος ὁ ὑδράργυρος· ἐπειδὴ ὅμως ὑπάρχει ἤδη ὑδροθειωμένον αέριον διαλελυμένον εἰς τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ, προστίθεται ψυμίθιον, τὸ ὁποῖον δι' ἀνακινήσεως ἀφαιρεῖ τὸ ὑδροθειώμενον αέριον.

Ἄλλος τρόπος κατὰ τὸν ὁποῖον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατασκευάζεται τὸ εἰς χρῆσιν τῆς ἰατρικῆς ὑδροκυανικὸν ὀξύ εἶναι ὁ ἐξῆς·

Ὑδροκυανικοῦ καλλίου σιδηρίζοντος λείου 4 μέρη διαλύονται εἰς ἀπο-

σταγμένου ὕδατος 16. Τὸ διάλυμα τοῦτο ἐνοῦται μετὰ συμμιζέως συγκεκριμένης ἐκ 12 μερῶν οἶνοπνεύματος καὶ 3 θειικοῦ ὀξέος. Τὸ ῥευστὸν τοῦτο ἀνακινεῖται συνεχῶς εἰς κεκλεισμένον ἀγγεῖον καὶ μετὰ παρέλευσιν 24 ὥρων μεταγγίζεται τὸ ῥευστὸν ἀπὸ τὴν σχηματιζομένην κρυσταλλώσιμον καταβύθισιν συνισταμένην ἀπὸ θειικὴν πότασσαν. Τὸ ῥευστὸν τίθεται εἰς ὑελίνην σικύαν μακρόλαιμον καὶ ἀφοῦ τὸ στόμιον αὐτῆς καλυφθῇ μὲ βύσσινον ὕφασμα, προσαρμόζεται ἀμβυξ μὲ δοχεῖον ἀφοῦ δὲ κλεισθῶσιν οἱ ἄρμοι καλῶς καὶ τεθῇ τὸ δοχεῖον εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ἀποστάζονται τὰ $\frac{20}{100}$ αὐτοῦ διὰ μαλακοῦ πυρὸς καὶ δι' ἀμμοχωσιάσεως.

Τὸ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον κατασκευαζόμενον ὑδροκυανικὸν ὀξὺ δύναται νὰ φυλαχθῇ πολλοὺς χρόνους, καὶ μάλιστα ἐὰν τεθῇ εἰς μικρὰ ἀγγεῖα μελκνοβαφῇ καὶ εἰς σκοτεινὸν μέρος.

Τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξὺ σύγκειται ἐκ κυανίου 96, 35 ὑδρογόνου 3, 65,	
ἢ ἐκ Νιτρογόνου	52, 08
Ἀνθρακικῆς ὕλης	44, 27
Ἰδρογόνου	2, 65
	100.

Τὸ κυάνιον ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὑδροθειωμένου αἰρίου εἰς ἀναλογίαν 1 πρὸς 1, 5 καὶ ἡ ἔνσωσις αὕτη σχηματίζει λεπτὰς καὶ ὠχρὰς ἀγκίδας διαλυσίμους εἰς τὸ ὕδωρ. Κατὰ τὴν ἰδίαν ἀναλογίαν ἐνοῦται καὶ μετὰ τῆς ἀμμωνίης σχηματίζον φαιὸν ῥευστὸν, ἐμπεριέχον ὑδροκυανικὴν καὶ ὀξάλικὴν ἀμμωνίαν.

Δηλητηριάσεις διὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος.

Τὸ ἄκρατον ὑδροκυανικὸν ὀξὺ εἶναι ἐν τῶν δραστικωτέρων καὶ τῶν πλέον θανατηφόρων δηλητηρίων, καθότι πτηνὰ, μυῖες, σφῆκες κ.τ.λ. εἰσβαπτισθέντα εἰς αὐτὸν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἀποπνίγονται συνήθως μετ' ὀλίγων στιγμῶν παρέλευσιν. Ἐὰν σταγὼν ἀκράτου ὑδροκυανικοῦ ὀξέος σταχθῇ ἐπὶ τῆς γλώσσης μικρῶν κυνῶν, γατῶν, λαγωῶν κ.τ.λ., ἀμέσως ἀποθνήσκουσιν.

Ὁ θάνατος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ταχείας παραλύσεως τοῦ νοτιαίου μυελοῦ, συνοδευμένης μὲ συμπτώματα τιτάνου, δι' ἧς ἀποκρί-

νεται πολὺς σίελος εἰς τὸ στόμα. Μετὰ τὸν θάνατον εὐρίσκονται τὰ αἱματοφόρα ἀγγεῖα ἐξόχως τοῦ νοτιαίου μυελοῦ πρὸς τὸ μέρος τῆς ἱπ-
πούρεως ἐξογκωμένα ἀπὸ μέλαν αἷμα, καὶ ἀνατεταταμένου τοῦ σώματος
ἐκπέμπεται ὁσμὴ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος. Τὸ ὀξὺ τοῦτο ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος μὲ τὴν αὐτὴν ταχύτητα, καθὼς καὶ ἐπὶ τῶν
ζῶων.

Ἐὰν ὁ ἀτμὸς τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἀναμιγνύμενος μὲ πολὺν ἀτμο-
σφαιρικὸν ἀέρα ἀναπνέηται, προξενεῖ ναυτίαισιν, κατῆφραιαν, δριμύεις πόνους
εἰς τὸ ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς, καὶ σημαντικὴν ἐλάττωσιν τοῦ σφυγμοῦ.
Τὰ αὐτὰ συμπτώματα παρατηροῦνται καὶ ἐὰν ληφθῇ ἐσωτερικῶς τὸ
ὑδροκυανικὸν ὀξὺ ἀναμειγμένον μὲ ὕδωρ ἢ οἰνόπνευμα. Εἰς δηλητηριά-
σεις διὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος, αἵτινες δὲν ἐπέφεραν ἀμέσως τὸν θάνα-
τον, ἐπαρατηρήθη προσέτι διαδοχικὸν ῥίγος καὶ θερμὴ καὶ ἐξόγκωσις
σπληνός. Ἐπὶ τῆς συνεχοῦς χρήσεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος εἰς μικρὰς
δόσεις ἐπαρατηρήθησαν καὶ αἱμορραγίαι καὶ ἀποπληξία.

Ἀντίδοτα κατὰ τῆς δι' ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἢ διὰ πικρῶν ἀμυγδάλων δη-
λητηριάσεως εἶναι διάφορα. Τοιαῦτα εἶναι ἡ ἀμμωνία ὑγρὰ, τὸ κάλιον, τὸ
ὄξος, ὁ καφρὲς, ἡ καφουρά, τὸ ἔλαιον τῆς τερεβινθίνης κτλ. Μεταξὺ ὅλων
τούτων ἡ ἀμμωνία κατέχει τὴν πρώτην θέσιν. Εἰς τοιαύτην δηλητη-
ρίαισιν εἶναι ὠφέλιμον νὰ δίδωνται 5—10 σταγόνες καυστικῆς ἀμμωνίας
ἀναμειγμένης μὲ ὀλίγας οὐγγίας ὕδατος. Μετὰ παρέλευσιν $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας
δίδονται πάλιν 3 ἕως 5 σταγόνες, ἐπίσης μεθ' ὕδατος κεκραμένοι, καὶ τοῦτο
δύναται νὰ ἐπαναληφθῇ δις καὶ τρίς. Ὁ δηλητηριασθεὶς ὠφελεῖται προ-
σέτι, ἐὰν εἰσπνέουσι τὴν ἀμμωνίαν εἰς ἀεροειδῆ κατὰστασιν, καθήμενος μὲ
ἀνοικτὸν στόμα πλησίον ἀγγείου περιέχοντος φύραμα ἐξ ὑδροχλωρικῆς
ἀμμωνίας μετὰ τιτάνου ἢ μετὰ καλίου. Ἐν ἐλλείψει ἀλικῆς ἀμμωνίας
δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἀναπνοὴν ἡ ἀμμωνία ὑγρὰ παρατηρη-
τέον ὅμως ὅτι ὁ εἰσπνέων τοὺς ἀτμοὺς τῆς ἀμμωνίας πρέπει νὰ μὴν
ῥῖναι τόσον πλησίον, ἐπειδὴ ἄλλως ἡμπορεῖ νὰ βλαφθῇ.

Συμπτώματα. Ἰδιαιτέρα ὁσμὴ ὡς ἡ τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων, γεῦσις
πικρὰ, δυνατὴ διάκρισις σιέλου, ἔρευγμα, βάρος εἰς τὴν κεφαλὴν, ζάλη,
στενοχωρία εἰς τὸ στῆθος, κατ' ἀρχὰς ἰσχυρὸς καὶ μετὰ ταῦτα ἀσθενὴς
σφυγμός, παραλυσία καὶ ἀποπληξία τῶν νεύρων.

Ἡ νεκροφία μᾶς δεικνύει προσέτι σπανίως συμπτώματα φλεγμονῆς,
καὶ ἀρτηρίαὶ συνήθως κεκενωμέναι ἀπὸ αἵμα, αἱ δὲ φλέβες γεμάται ἀπὸ

βαθυμέλαν και ρευστόν αίμα. Εάν δὲ ἀνατμηθῇ ὁ στόμαχος, ἐκλύεται ὁσμή ὡς τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος.

Ἐξίχνευσις τοῦ δηλητηρίου. Ἡ ἰδιαιτέρα του ὁσμή τὸ προδίδει ἀμέσως, και ἂν ἐνυπάρχη εἰς ἐλαχίστην ποσότητα· ἀλλὰ μετὰ πάσης βεβαιότητος δύναται νὰ ἐξίχνευθῇ κατὰ χημικὴν ὁδόν, ἐκτὸς ἐὰν ἐμπεριέχεται εἰς πολλὰ ὀλίγον ποσόν.

Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι διὰ τῆς ἀνατομίας τῆς γαστρὸς τινὸς αἰφνιδίως ἀποθανόντος ἐκπέμπεται ὁσμή ὡς ἡ τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων, τότε διὰ νὰ ἐξίχνευθῇ ἡ παρουσία τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος πράττομεν κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Τὰ ἐν τῷ στομάχῳ τίθενται εἰς εὐρείαν σικύαν, ἣτις δὲν πρέπει νὰ πληρωθῇ πλεόν ἀπὸ τὸ ἥμισυ· ἐὰν δὲ διὰ τῆς εἰσβολῆς τῶν ὑλῶν τὸ στόμιον ἢ ὁ λαίμηδς τοῦ ἀποστακτικοῦ σκεύους ἤθελε ῥυπωθῇ, ἀποπλύνεται μὲ ὀλίγον ὕδωρ· μετὰ ταῦτα ἀποστάζεται περίπου τὸ ἥμισυ τοῦ ὅλου διὰ πρῶτάτου πυρὸς και ὑπὸ συνεχοῦς τοῦ δοχείου ἀποψύξεως. Τὸ ἀποτελούμενον ἀποστάλαγμα ἐνοῦται μὲ τόσον καυστικὸν κάλιον, ὅσον ἀπαιτεῖται διὰ νὰ προσλάβωσι τὰ ρευστὰ ἀλκαλικά χαρακτηριστικά. Τὸ ρευστόν μετὰ τινα χρόνον ἀναμιγνύεται μὲ καθαρὸν διάλυμα θειικοῦ σιδήρου, μεχρισοῦ ἀποτελεσθῇ καταβύθισμα. Τὸ ἐπιπολάζον ρευστόν μεταγγίζεται και τὸ κατακρήμνισμα, ἀφοῦ πρότερον καλῶς ἀποπλυθῇ δι' ἀπεσταγμένου ὕδατος, κατεργάζεται ἀκολούθως δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δι' ὕδατος κεκραμένου. Εάν τὰ εἰς τὸν στόμαχον ἐμπεριεχόμενα ἐμπεριείχον ὑδροκυανικὸν ὀξύ, λαμβάνει τὸ καταβύθισμα κυανοῦν χρώμα· τὸ καταβύθισμα συναζόμενον ἐπὶ τινος πρότερον ζυγισμένου και λευκοῦ διϋλιστήρος, ἀποπλύνεται και ξηραίνεται ἐντελῶς. Τὸ ληφθὲν κατακρήμνισμα σύγκειται ἐξ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου, τοῦ ὁποίου τὸ ἥμισυ ὡς πρὸς τὸ βάρος δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς καθαρὸν ὑδροκυανικὸν ὀξύ. Πρὸς τελείαν ἀπόδειξιν κατεργάζεται τὸ κυανοῦν κατακρήμνισμα μετὰ τοῦ ἀρκοῦντος ποσοῦ καυστικοῦ καλίου και δι' αὐτοῦ σχηματίζεται ὑδροκυανικὸν κάλιον, και οὕτως ἀποχωρίζεται ὁ σίδηρος ὡς φαιὸν καταβύθισμα. Τὸ ρευστόν διϋλίζεται ἀπὸ τὸ καταβύθισμα και ἐξατμίζεται διὰ πρῶτου πυρὸς εἰς πορφυροῦν ἀγγεῖον, και τὸ ἐπιμένον μέρος λειοτριβήθεν και τεθὲν εἰς ἀποστατικὸν σκεῦος ἐπιχύνεται μὲ τόσον θειικὸν ὀξύ δι' ὕδατος κεκραμένον, ὥστε νὰ ὑπερτερῇ τὸ ὀξύ. Ἀφοῦ ἅπαντες οἱ ἄρμοι τῆς συσκευῆς κλεισθῶσι και περιχρισθῶσι, δύναται νὰ ἀποσταχθῇ περίπου τὸ ἥμισυ τοῦ ὀλικοῦ ποσοῦ. Ἐκ τοῦ εἰς τὸ κέρας ἐπιμένοντος ὑπολείμματος, ἐκ τῆς ἰδιαιτέρας δυνατῆς

ὁσμῆς τοῦ ἀποσταλαγμένου ρευστοῦ ὡς τὴν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος, καὶ τέλος πάντων ἐκ τῆς δηλητηριάσεως τινὸς πτηνοῦ διὰ τοῦ ληφθέντος ὑγροῦ δύναται νὰ ἐξιχνευθῇ τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ μετὰ πάσης βεβαιότητος.

Ὁ κυανοῦχος ὑδράργυρος *Cyanuretum Hydrargyri* ἐγνωρίζετο ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὑδραργύρου. Ἀποτελεῖται δὲ, ἐάν 2 μέρη λειοτριβημένου ὑδροκυανικοῦ σιδήρου καὶ 1 λείου ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου ζέωνται με 8 μέρη ὕδατος. Τὸ ληφθὲν ρευστὸν δι'ὕλίζομενον καὶ ἐξατμιζόμενον δίδει μετὰ τὴν ἀπόψυξιν κρυστάλλους. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἐνοῦται τὸ ὀξυγόνον τοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου μετὰ τοῦ ὑδρογόνου τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος, καὶ τὸ κυάνιον ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὑδραργύρου.

Ἄλλως προάγεται, ἐάν 2 μέρη ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου, ἀφοῦ τεθῶσιν εἰς πορφυροῦν ἀγγεῖον, ἐπιχυθῶσι μετὰ συμμιξέως συνισταμένης ἐκ δύο μερῶν θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου καὶ $\frac{1}{2}$ νιτρικοῦ ὀξέος. Μετὰ τὴν ἐντελῆ διάλυσιν ἐξατμίζεται, ἕως οὗ νὰ ἐπιμείνῃ λευκὴ κόνις. Ἀκολούθως διαλύεται ἐν μέρος ὑδροκυανικοῦ σιδηρίζοντος καλίου εἰς 10 μέρη ζέοντος ὕδατος, καὶ εἰς τὸ εἰσέτι θερμὸν τοῦτο διάλυμα προστίθεται ἴση ποσότης ξηροῦ ὀξειδωμένου θειικοῦ ὑδραργύρου καὶ ζέεται, ἕως οὗ διαλυθῇ τὸ σχηματιζόμενον Ἴζημα· μετὰ ταῦτα δι'ὕλίζεται τὸ θερμὸν διάλυμα καὶ διὰ τῆς ἀποψύξεως καταβυθίζεται ὁ κυανοῦχος ὑδράργυρος εἰς εἶδος λευκῶν, ἀδιαφανῶν καὶ τετραγωνικῶν πρισματῶν.

Ὁ κυανοῦχος ὑδράργυρος εἶναι ἰσχυρὸν δηλητήριο· θερμαινόμενος μελανίζει καὶ ἐκλύει κυάνιον ἀέριον, ὑδράργυρον καὶ νιτρογόνον, ἐπιμέμοντος νιτρογονούχου ἀνθρακος· εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, ἀδιάλυτος δὲ εἰς τὸ οἶνόνπνευμα.

Ἡ ὅσον ἐνεσθι ἀκράτος διάλυσις τῆς ποτάσεως δὲν ἀποσυνθέτει τὸν κυανοῦχον ὑδράργυρον, ἀποσυντίθεται ὅμως διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ καὶ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, καὶ τὸ κυάνιον μεταβάλλεται εἰς ὑδροκυανικὸν ὀξύ. Ἀπὸ τὰ ἄλατα δὲν ἀποσυντίθεται ἐκτὸς διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ καστοτέρου.

Ἡ ζέουσα διάλυσις τοῦ κυανούχου ὑδραργύρου ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ διαλύῃ καὶ ἄλλην ποσότητα ἐρυθροῦ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου, διὰ τοῦ ὁποίου προάγεται εὐδυσυλτώτερόν τι ἄλλας, κρυσταλλούμενον εἰς εἶδος δεσμίδων.

Ὁ κυανούχος ὑδραργυρος συνίσταται ἐξ :

Υδραργύρου 79, 91

Κυανίου 20, 09

100.

Μεταχειρίζεται εἰς τὴν ἰατρικὴν κατὰ τῶν σιφιλιτικῶν παθῶν· εἰς δὲ τὴν χημείαν πρὸς κατασκευὴν τοῦ κυανίου καὶ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος.

Κυάνιον καὶ Χλώριον.

Ἡ ἔνωσις τοῦ χλωρίου μετὰ τοῦ κυανίου ἐγνωρίζετο προηγουμένως ὡς *κυανικὸν ὀξύ ὀξυγονοῦμενον*, ἢ ὡς *χλωροκυανικὸν ὀξύ*. Τὸ ἐγχλώριον κυάνιον κατασκευάζεται, ἐὰν ἐμβάλωμεν τὸν δι' ὀλίγου ὕδατος βραχέντα ἐγκυάνιον ὑδραργυρον εἰς φιάλην πλήρη χλωρίου, καὶ θέσωμεν αὐτὴν εἰς σκοτεινὸν τόπον δώδεκα ὥρας, περιβάλλοντες αὐτὴν μὲ μίγμα χιόνος καὶ ἁλατος, ἕως οὗ τὸ ἐγχλώριον κυάνιον μεταβληθῇ εἰς κρυστάλλους. Μετέπειτα προστίθεται ὑδροχλωρικὴ τίττανος λεῖψυδρος, διὰ νὰ ἀπορροφηθῇ ὅλον τὸ ὕδωρ. Ἀφοῦ προσαρμοσθῇ κυρτὸς σωλὴν εἰς τὴν εἰρημένην φιάλην καὶ θερμανθῇ διὰ πύρου πυρὸς, ἐκλύεται τὸ ἐγχλώριον κυάνιον, τὸ ὁποῖον συνάζεται εἰς κώδωνας πλήρεις ὑδραργύρου.

Τὸ ἀέριον σχηματίζει, ἐὰν ἀποψυχθῇ εἰς 18° R, κρυστάλλους ἔχοντας δυσωδεστάτην ὀσμὴν, διεγείρουσαν δακρῶρήθειαν, ἐνεργεῖ ὡς δηλητηριον, εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα.

Τὸ ἰωδοῦχος καὶ βρωμοῦχος *κυάνιον* σχηματίζονται, ἐὰν ἰώδιον ἢ βρώμιον θερμανθῶσι μετὰ ἐγκυανίου ὑδραργύρου. Αἱ ῥηθεῖσαι ἐνώσεις ἐξαχνίζονται εἰς εἶδος ἀχρόων ἀγκίδων εὐδιαλύτων εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Κυανικὸν ὀξύ.

Τὸ κυάνιον καθὼς δύναται νὰ ἐνωθῇ μετὰ τοῦ ὑδρογόνου πρὸς σχηματισμὸν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος, οὕτως ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὀξυγόνου καὶ ἀποτελεῖ τὸ κυανικὸν ὀξύ.

Κατὰ τὸν Woehler σχηματίζεται τὸ κυανικὸν ὀξύ διὰ τῆς χωνεύσεως τοῦ κυανούχου ὑδραργύρου μετ' ἀνθρακικῆς ποτάσεως. Κατὰ τὸν Döbereiner μεταβάλλεται τὸ κυάνιον διὰ τοῦ ὑπεροξειδίου τοῦ μολύβδου εἰς κυανικὸν ὀξύ. Ὡσαύτως καὶ διὰ τῆς διοχετεύσεως τοῦ

κυανίου διὰ ρευστοῦ καλίου ἢ διὰ τῆς διαλύσεως τῆς βαρείας. Σχηματίζονται δὲ ἐκτὸς τῶν κυανικῶν καὶ κυανοῦχαι ενώσεις. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἀποσυντίθεται ἡ βαρεῖα, μέρος τοῦ κυανίου ἐνοῦται μετὰ τῆς μεταλλικῆς βάσεως τῆς βαρείας πρὸς ἐγκυάνιον βαρεῖαν, καὶ ὡσαύτως σχηματίζεται κυανικὴ βαρεῖα.

Τὸ κυανικὸν ὀξὺ κατασκευάζεται διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ διαλυμένου κυανικοῦ ἀργύρου διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου αερίου, ἢ καὶ δι' ὀλίγης θερμάνσεως τῆς εἰρημένης ενώσεως. Τὸ ὀξὺ, τὸ ὁποῖον τοιουτοτρόπως ἐκτυλίσσεται καὶ διερχόμενον δι' ὕδατος διαλύεται, εἶναι ρευστὸν ἄχρουν, ἔχει καυστικὴν καὶ ὀξεῖαν γεῦσιν.

Κατὰ τὸν Serullas πρὸς κατασκευὴν τοῦ κυανικοῦ ὀξέος ἀποσυντίθεται ὑδατῶδες διάλυμα κυανικῆς βαρείας διὰ τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦθειικοῦ ὀξέος.

Τὸ κυανικὸν ὀξὺ κρυσταλλοῦται ἐκ τοῦ ρευστοῦ εἰς ῥομβοειδεῖς κρυστάλλους, λευκοὺς καὶ διαφανεῖς, ἔχοντας ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καὶ ἐξαχνιζομένους εἰς εἶδος λευκῶν ἀγκίδων, αἵτινες ἐρυθροῦσιν ἰσχυρῶς τὸ τοῦ καγκαμίνου βάμμα. Οἱ κρύσταλλοι οὗτοι εἶναι προσέτι ὀλίγον μόνον εὐδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμοι ὅμως εἰς τὸ ζέον θειικόν καὶ νιτρικὸν ὀξὺ, ἐκ τῶν ὁποίων καταβυθίζεται τὸ ὀξὺ διὰ τοῦ ὕδατος. Σύγκειται δὲ ἐκ:

Νιτρογόνου	33, 33
Ἀνθρακικῆς ὕλης	28, 57
Ὄξυγόνου	38, 10

100.

Τὸ παρὰ τοῦ Davy ἐφευρεθὲν κροτοῦν ὀξὺ ἔχει ὡς πρὸς τὰ στοιχεῖά του τὴν ἰδίαν ἀναλογίαν μὲ τὸ κυανικὸν ὀξὺ, ἀλλ' εἶναι παράδοξον ὅτι αἱ ενώσεις τοῦ κυανικοῦ καὶ τοῦ κροτοῦντος ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων διαφέρουσι πολὺ μεταξύ των· καθότι, ἐνῷ τὰ διὰ τοῦ κροτοῦντος ὀξέος σχηματιζόμενα ἄλατα ἀποσυνθέτονται δι' ἰσχυρᾶς κρούσεως, ἢ δι' αὐξανομένης θερμοκρασίας ὑπὸ δυνατὴν πυρσοκρότησιν, τὰ κυανικὰ ἄλατα δὲν δεικνύουσι κατ' ἐν τῶν εἰρημένων χαρακτηριστικῶν. Ἐὰν τὸ κυανικὸν ὀξὺ ἀποχωρισθῇ ἐκ τῆς μετὰ τῶν βάσεων ενώσεώς του διὰ δυνατοῦ ὀξέος, ἀποσυντίθεται εἰς ἀνθρακικὸν ὀξὺ καὶ ἀμμωνίαν, χωρὶς νὰ σχηματισθῇ ποσὼς ὑδροκυανικὸν ὀξὺ· ἐξ ἐναντίας ἐὰν τὸ κροτοῦν ὀξὺ ἀποχωρισθῇ ἐκ τῶν ενώσεών του διὰ δυνατοῦ ὀξέος, σχηματίζεται ὑδροκυανικὸν ὀξὺ.

Υδροκυανικά ἅλατα.

Αἱ ἐνώσεις τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων ἢ ἐν γένει τὰ ὑδροκυανικά ἅλατα εἶναι ὀλίγον γνωστά. Ἡ συγγένεια τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος πρὸς τὰς βάσεις εἶναι ἐν γένει ἀσθενής, καὶ ἔνεκα τούτου εἶναι ἀδύνατον νὰ οὐδετερωθῇ ἀλκάλιον τι διὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος.

Δι' ὧν τῶν ὀξέων καὶ μάλιστα διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ἐκλύεται ἐκ τῶν ὑδροκυανικῶν ἀλάτων τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ· ἐὰν δὲ τὰ ἅλατα θερμανθῶσι μέχρι βαθμοῦ ζέοντος ὕδατος, ἀποσυντίθεται τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ ἀμμωνίαν. Ἀποσυντίθεται παρομοίως κατ' ὀλίγον εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἀφίνει ἀνθρακικὸν ἅλας μετ' ἀμμωνίας.

Αἱ ἀπλᾶι ἐνώσεις τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν ἀλκαλίων καὶ ἀλκαλικῶν γαιῶν εἶναι εὐδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ· ἐὰν δὲ συμμιχθῶσι μετὰ τῶν διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων, ἀποτελεῖται καταβύθισμα, φαιὸν, μετὰ δὲ τοῦ ὑποξειδίου καταβύθισμα κυανοῦν.

Τὰ ὀξειδια, τὰ ὅποια εὐκόλως ἀποκαθίστανται, δὲν ἐνοῦνται μετὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος, ἀλλ' ἀποσυντίθενται οὕτως, ὥστε σχηματίζεται ὕδωρ καὶ ἐγκυάνιος ἐνώσις.

Ἐκτὸς τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου εἶναι καὶ ἄλλα μεταλλοξείδια, οἷον τοῦ χαλκοῦ, μαγγανησίου, ψευδαργύρου, κοβάλτου, τὰ ὅποια δύνανται νὰ σχηματίσωσι μετὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος καὶ ἀλκαλοειδοῦς τινος βάσεως ἅλατα, θυνάμενα νὰ προαχθῶσιν εἰς οὐδετέραν καὶ κρυσταλλώσιμον κατάρτασιν. Τὰ κυριώτερα εἶναι τὰ ἐμπεριέχοντα σίδηρον.

Περὶ τῶν διὰ τοῦ σιδήρου ὑδροκυανικῶν διπλῶν ἁλῶν.

Εἶναι ἐντελῶς οὐδέτερα, καὶ δὲν ἀποσυντίθενται διὰ τῆς θερμότητος τόσον εὐκόλα, καθὼς τὰ ἀπλᾶ ὑδροκυανικά ἅλατα. Παρά τινων χημικῶν θεωροῦνται εἰς τὴν στερεάν των κατάρτασιν ὡς ἐνώσεις τοῦ κυανίου, εἰς τὰς ὁποίας τὸ κυάνιον εὐρίσκεται ἡνωμένον ὅχι μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, ἀλλὰ μετὰ τοῦ μεταλλικοῦ σιδήρου. Ὁ Poret νομίζει, ὅτι ὁ σίδηρος ὑπάρχει εἰς τὰ εἰρημένα ἅλατα ἡνωμένος μετὰ τοῦ ὀξέος πρὸς ἰδιαιτέρον ὀξύ καλούμενον ὑδροκυανικὸν ὀξύ σιδηρίζον, τὸ ὁποῖον ἐνοῦται μετὰ τῶν βάσεων καὶ σχηματίζει συγχρόνως ἅλατα ὀλιγώτερον εὐμετάβλητα. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην τὸ ὀξύ χάνει πολὺ τὴν δηλητηριώδη ἐνέργειάν του.

Ὁ Poret ἀπεχώρισεν ἐκ τῶν ἀλάτων τούτων ὄξυ ἐπιτήθειον νὰ σχηματίξῃ μετὰ τῶν βάσεων οὐδετέρας ἐνώσεις.

Κάλιον προυσσικὸν σιδηρίζον.

Kali borussicum ferruginosum.

Πρὸς κατὰσκευὴν τοῦ ἄλατος τούτου προυσσικῆς σιδήρου λειοτετριμμένος ἐνοῦται κατ' ὀλίγον μετὰ ζεύσεως διαλύσεως καυστικοῦ καλίου, ἑωστοῦ δὲν μεταβάλλεται τὸ κυανοῦν χρῶμα εἰς φαιὸν, τὸ ὅποιον ἀποτελεῖται συνήθως δι' ἐνὸς μέρους καλίου καὶ 4 μερῶν προυσσικοῦ σιδήρου. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐνοῦται τὸ κάλιον μετὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος καὶ ὀλίγου ὑποξειδωμένου σιδήρου πρὸς σχηματισμὸν οὐδετέρου ἄλατος, ἐνῶ τὸ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἐπιμένει ὡς φαιὰ κόνις. Τὸ διάλυμα διυλίζεται εἰς κατὰλληλα [καὶ εὐρέα ἀγγεῖα καὶ ἐξατμίζεται μέχρι κρυσταλλώσεως.

Εἰς τὰ χημικὰ ἐργαστήρια κατασκευάζεται ἀπὸ ζωϊκῆς ὕλης καιόμενας μὲ ὑπανθρακικὸν κάλιον καὶ σίδηρον. Τὸ διὰ τῆς καύσεως ἀποτελούμενον φύραμα διαλύεται ἀκολούθως δι' ὕδατος, δι' οὗ διαλύεται τὸ σχηματιζόμενον ἄλας, ἐπιμένοντος τοῦ ἀνθρακος. Διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ ῥευστοῦ κρυσταλλοῦται τὸ ἄλας.

Κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα, ὅποτε τὸ εἰρημένον ἄλας ἀνεκαλύφθη, ἐγνωρίζετο ὑπὸ τὸ ὄνομα *Lixivium sanguinis*· συνίσταται ἀπὸ κουστάλλους συνεχομένους, εἶναι ὠχρὸν, σχεδὸν ἀδιαφανές, διαχέεται εἰς τὸν ἀέρα, εἶναι εἰς 4 μέρη ὕδατος διαλυτὸν, καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτον.

Ἐάν τὸ ξηρὸν ἄλας θερμανθῇ εἰς ἀποστατικὸν σκεῦος, τήκεται πρὸ τῆς πυρώσεως, καὶ ἀκολούθως ἐκλύεται νιτρογόνον. Τὸ μέλαν ὑπόλειμμα βραχὲν μεθ' ὕδατος ἐκπέμπει ὁσμὴν ὁμοίαν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος, τὸ ὑδατῶδες διάλυμα εἶναι ἀλκαλοειδές· ἐπιμένουσι δὲ κροκίδες συνιστάμεναι ἐκ σιδήρου καὶ ἀμμωνίας. Πρὸς τελείαν ἀποσύνθεσιν τοῦ ἄλατος ἀπαιτεῖται συνεχὴς πύρωσις. Τὸ θεικὸν ὄξυ ἄκρατον διαλύει τὸ ἄλας ἄνευ ἀποσυνθέσεως· ἐάν δὲ θερμανθῇ τὸ διάλυμα ὑπὲρ τὸν βαθμὸν τοῦ ζέοντος ὕδατος, ἐκτυλίσσεται θειῶδες ὄξυ, ἀνθρακικὸν ὄξυ καὶ νιτρογόνον, καὶ τὸ ὑπόλειμμα ἐμπεριέχει θεικὴν πότασσαν μεθ' ὑπερτεροῦντος ὀξέος, σιδήρου καὶ ἀμμωνίας. Ἐάν θερμανθῇ μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος ἐκτυλίσσεται κυάνιον, νιτρογόνον, ἀνθρακικὸν ὄξυ καὶ ὀξειδίου νιτρογόνου· εἶναι διαλύσι-

μον πρὸς καστανόχρουν ρευστὸν διὰ τῶν ἀλκαλίων, πρὸς πορφυροῦν δι' ὀλίγου ποσοῦ ὑδροθειϊκοῦ ὀξέος, διὰ δὲ πλειοτέρου γίνεται κυανοῦν καὶ πράσινον.

Τὸ ὑπόλειμμα σύγκειται ἐκ νιτρικοῦ καλίου καὶ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου. Διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἐκλύεται ἐκ τοῦ ἁλατος διὰ τῆς θερμότητος ὑδροκυανικὸν ὀξύ.

Ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδηρίζοντος καλίου ἀναμιχθῇ μετὰ τοῦ ἐρυθροῦ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου καὶ θερμανθῇ, σχηματίζεται κίτρινον καταβύθισμα ἐξ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, τὸ ὅποιον ἐμπεριέχει ὀλίγον ποσὸν ὑδροκυανικοῦ ὀξέος.

Εἰς τὸ διάλυμα τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδηρίζοντος καλίου δὲν δύναται νὰ ἐξίχνευθῇ ἡ παρουσία τοῦ σιδήρου διὰ τῶν συνήθων δοκιμαστηρίων, μῆτε διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων, μῆτε διὰ τῶν ὑδροθειωμένων ἀλάτων.

Τὸ διάλυμα τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλίου ἀποσυνθῇτι ἅπαντα τὰ διαλύματα τῶν μεταλλικῶν ἀλάτων, καὶ ἡ ἀποσύνθεσις αὕτη ἀναφαίνεται διὰ τοῦ σχηματισμοῦ διαφόρων κατακρημνισμάτων συγκειμένων ἐξ ὑδροκυανικῶν μεταλοξειδίων καὶ σιδήρου.

Διὰ τῶν δικλύσεων τῆς μηχανισίας, τοῦ ψευδαργύρου, κασσιτέρου, καδμίου, βισμούθιου, μολύβδου, ὑδραργύρου καὶ ἀργύρου ἀποτελοῦνται ἱζηματα λευκά. Τὰ διαλύματα τῶν διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων καταβυθίζονται μὲ βαθύφαιον χρῶμα, τὰ διὰ τοῦ οὐρανίου μὲ σαρκοδαφές, τὰ διὰ τοῦ κοβάλτου μὲ πράσινον, τὰ διὰ μνηακνίου μὲ ἐρυθρόφαιον, τὰ διὰ τοῦ χαλκοῦ μὲ καστανόχρουν καὶ τὰ διὰ νικελίου μὲ πράσινον χρῶμα. Εἰς ὅλα δὲ ταῦτα τὰ καταβυθίσματα εὐρίσκεται καὶ ὁ σίδηρος, ὅστις ἐνυπάρχει εἰς τὸ ὑδροκυανικὸν ἐνσίδηρον κάλιον.

Ὁ Berzelius θεωρεῖ τὸ ἅλας τοῦτο συγκείμενον ἀπὸ:

Ποτάσσιον	37, 27
Σίδηρον	12, 84
Κυάνιον	39, 06
Ἰδωρ	12, 83

100.

Τὸ ὑδροκυανικὸν ἐνσίδηρον κάλιον μεταχειρίζεται ὡς δοκιμαστήριον ἐπὶ τῶν τοῦ σιδήρου, χαλκοῦ καὶ οὐρανίου ἀλάτων. Εἰς τὰ βαφεῖα ἐνούμενον μετὰ τῶν τοῦ σιδήρου ἀλάτων χρησιμεύει πρὸς προαγωγὴν τῶν κυανῶν βαφῶν.

Τὸ ὑδροκυανικὸν ἐνσίδηρον κάλιον ὑπόκειται εἰς ἀξιοπαρατήρητον μεταβολήν, ἐὰν χλώριον διοχετευθῇ διὰ τῆς διαλύσεώς του, μετρίστου τὸ διάλυμα τοῦτο νὰ μὴν καταβυθίζεται πλέον διὰ διαλύματος ὑδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου μετὰ κυανοῦ χρώματος. Μετὰ ταῦτα ἐξατμίζεται τὸ καθαρὸν καὶ διύλισθὲν ῥευστὸν διὰ πύρου πυρὸς, ἐξ οὗ σχηματίζονται κρύσταλλοι, οἵτινες δύνανται νὰ καθαρισθῶσι δι' ἀναδιζύσεως καὶ ἀνακρυσταλλώσεως. Οἱ κρύσταλλοι οὗτοι ἔχουσι ζωηρὸν ἐρυθροῦν χρῶμα, εἶναι διαφανεῖς καὶ ἔχουσιν ἀσθενῆ ἀλατῶδη, καὶ στυπτικὴν γεῦσιν, εἶναι οὐδέτεροι, καὶ δίδουν ὠχρὰν κόνιν. Ὁ ἐφευρετὴς τούτου τοῦ ἀλατος τὸ ὠνόμασε *κάλιον ἐγκυάνιον ἐρυθρόν*. Εἶναι διαλύσιμον εἰς 38 ψυχροῦ ὕδατος, σχηματίζει ἐρυθρόφαιον ῥευστὸν, διαλύεται ὡσαύτως καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, θερμαίνόμενον ἀποτελεῖ ζωηρὸν κρότον, καὶ σχηματίζει φαιὰν κόνιν, καίει μετὰ φλογὸς καὶ ἀκτινοβολίας. Μὲταλλὰ τινα καταβυθίζονται ἐκ τῶν διαλυμάτων των μετὰ φαιοῦ χρώματος, καθὼς τὸ μαγγανήσιον, κοβάλτιον, νικέλιον, βισμούθιον· τὰ διαλύματα τοῦ ἀργύρου καὶ ὑδραργύρου καταβυθίζονται μετὰ ὠχροῦ χρώματος.

Τὸ ἐγκυάνιον κάλιον ἐρυθρὸν σύγκειται ἐκ:

Καλίου	35, 65
Σιδήρου	17, 22
Κυανίου	49, 00

Ὑδροκυανικὸν ράτρον ἐνσίδηρον.

Δύναται νὰ πορισθῇ τοῦτο τὸ ἄλας ὡς καὶ τὸ ὑδροκυανικὸν κάλιον εἰς εἶδος διαφανῶν τετραγωνικῶν πρισμάτων, ὠχρῶν, διαχρεομένων εἰς θερμὸν ἀέρα ὡς λευκὴ κόνις, διαλυσίμων εἰς ἴσον ποσὸν ψυχροῦ ὕδατος καὶ ἀδιαλύτων εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Ὑδροκυανικὴ ἀμμωνία ἐνσίδηρος.

Κατασκευάζεται διὰ τῆς κατεργάσεως τῆς λειοτριβημένης ὑδροκυανικῆς ἐνσιδήρου ποτάσεως μετὰ ἀμμωνίας εἰς κλεισμένον ἀγγεῖον, καὶ διὰ τῆς αὐτομάτου ἐξατμίσεως τοῦ διύλισθέντος ῥευστοῦ. Τὸ ἄλας κρυσταλλοῦται εἰς κίτρινα, λαμπρίζοντα καὶ κανονικὰ ὀκτάεδρα, ἔχοντα ὁσμὴν ὁμοίαν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος καὶ τῆς ἀμμωνίας· ἐὰν ἐπινοτισθῶσιν εἰς τὸν ἀέρα καὶ θερμανθῶσιν, ἐκλύουσιν ὑδροκυανικὴν ἀμμωνίαν, ἡ δὲ ὑδροκυανικὸς ὑποξειδωμένος σίδηρος ἐπιμένει.

Υδροκυανική βαρεία ενσίδηρος.

Αποτελείται, εάν ή υδρομιγής βαρεία ζέεται μετά υδροκυανικοῦ σιδήρου, μεχριστοῦ τὸ ρευστόν ἀποκαθίσταται οὐδέτερον· ἐκ τοῦ διαλυθέντος ρευστοῦ, εἰσέτι θερμοῦ ὄντος, κρυσταλλοῦνται κίτρινα τετράγωνα. Ὁμοίως δύναται νὰ πορισθῇ τὸ εἰρημένον ἄλας διὰ τῆς συμμίξεως εἰσέτι ζέοντος διαλύματος υδροκυανικοῦ καλίου ενσίδηρου μετά ζέοντος διαλύματος ἀλικῆς βαρείας. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην κρυσταλλοῦται τὸ ἄλας εἰς εἶδος μακρῶν ῥομβοειδῶν πρισμάτων, διαλυομένων εἰς τὸν ἀέρα· διαλύεται εἰς 100 μέρη ζέοντος καὶ 1,920 ψυχροῦ ὕδατος. Τὰ διπλᾶ ἄλατα μετά τῆς στροντιανῆς, τῆς τιτάνου κτλ. κατασκευάζονται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, διαφέρουσιν ὅμως, καθότι εἶναι εὐδιαλυτώτερα ἀπὸ τὰ τῆς βαρείας.

Περὶ τῶν μεταλλικῶν υδροκυανικῶν ἀλάτων.

Εἶναι ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ κατασκευάζονται, ἐὰν διάλυμα τοῦ υδροκυανικοῦ καλίου ενσίδηρου ἀναμιχθῇ μετ' διαλύσεις μεταλλικῶν ἀλάτων, τῶν ὁποίων τὰ ὀξειδια εἶναι βάσεις· τὸ ἀποτελούμενον κατακρήμνισμα ἀποπλύνεται διὰ πολλοῦ ὕδατος.

Υδροκυανικὸς ὀξειδωμένος μόλυβδος ενσίδηρος. Κατασκευάζεται διὰ τῆς ἀναμίξεως τοῦ νιτρικοῦ ὀξειδωμένου μολύβδου μετ' ὑπερτερουσίης ποσότητος διαλύματος υδροκυανικοῦ καλίου σιδηρίζοντος· εἶναι λευκὸν καὶ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτον κατακρήμνισμα· εἰς λείψυδρον κατὰστασιν σύγκειται ἐκ 2 ἀτ. υδροκυανικοῦ ὀξειδωμένου μολύβδου καὶ 1 ἀτ. υδροκυανικοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου.

Υδροκυανικὸς ὀξειδωμένος χαλκὸς ενσίδηρος. Κατασκευάζεται ἐκ τῶν διαλύσεων τῶν διὰ τοῦ χαλκοῦ ἀλάτων διὰ τοῦ υδροκυανικοῦ καλίου σιδηρίζοντος ὡς καστανόχρους κόνις, ἥτις θερμανθεῖσα ἐκλύει, ἐκτὸς τοῦ ὕδατος, ἀνθρακικὴν καὶ υδροκυανικὴν ἀμμωνίαν καὶ νιτρογόνον. Τὸ πεπυρωμένον ὑπόλειμμα σύγκειται ἐξ ἀνθρακούχου σιδήρου καὶ ἀνθρακούχου χαλκοῦ. Εἰς κατεργασθῇ μετ' ἀμμωνίας εἰς πρᾶον πῦρ, λαμβάνει πράσινον χρῶμα.

Ἡ ἀμμωνία μεταγγιζομένη εἶναι πρασίνη καὶ ἐμπεριέχει ἐλάχιστον ποσὸν χαλκοῦ διατελυμένου. Ἡ πράσινη κόνις λαμβάνει πάλιν φαιὸν χρῶμα διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος, εἰς τὰ ὅξέα εἶναι ἀδιάλυτος, καὶ μόνον

τὸ θειϊκὸν ὀξύ ἄκρατον διαλύει ὀλίγον ποσὸν αὐτῆς· ἐὰν κατεργασθῇ μετὰ τοῦ καυστικοῦ καλίου, μεταδίδει εἰς αὐτὸ τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ καὶ τὸ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, τὸ δὲ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ ὑδρομιγῆς ἐπιμένει.

Ὑδροκυανικὸν ὀξειδωμένον κόβαλτον ἐνσίδηρον. Εἶναι ὑποπράσινον, καὶ ξηρανθὲν γίνεται ἐρυθρίζον, στακτόχρουν, διὰ θερμάνσεως μεταβάλλεται ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ὑδροκυανικῆς καὶ ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας εἰς ἐγκυάνιον κόβαλτον ἐνσίδηρον, διαλύεται εἰς τὸ ἄκρατον θειϊκὸν ὀξύ μετὰ ἐρυθροῦ χρώματος.

Ὑδροκυανικὸς σίδηρος. Ἀνεκαλύφθη κατὰ τὸ 1704 παρὰ τοῦ Diesbach εἰς Βερολίνον καὶ ἔλαβεν ἀκολουθῶς τὸ ὄνομα κυανοῦν τοῦ Βερολίνου· ἡ κατασκευὴ του ἐδημοσιεύθη παρὰ τοῦ Woodward.

Ὁ ὑδροκυανικὸς σίδηρος δὲν ἀπαντᾷται αὐτοσυστάτως εἰς τὴν φύσιν, ἀλλ' ἀποτελεῖται διὰ τῆς τέχνης. Κατασκευάζεται δὲ διὰ τῆς ἀμέσου συνάψεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου. Εἰς τὰ χημεῖα προάγεται διὰ τῆς ἀμοιβαίας ἀποσυνθέσεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλίου μετὰ τοῦ θειϊκοῦ σιδήρου.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλίου πυροῦται εἰς χύτραν μίγμα συνισταμένον ἐξ ἴσης ποσότητος καλίου καὶ ζωϊκῆς ὕλης, οἷον μετὰ ξηρανθέντος αἵματος ἢ ἀποκομμάτων ὀνύχων καὶ κεράτων, ἢ καὶ ἀνθρακος τοῦ αἵματος μὲ προσθήκην σιδηροῦ, μεχριστοῦ δὲν ἐξέρχεται φλόξ. Μετὰ τὴν πύρωσιν ἐκβάλλεται ἡ χύτρα ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ φυλάττεται καλῶς σκεπασμένη μέχρι ἀποψύξεως.

Τὸ ἀποψυχρανθὲν φύραμα ζέσται δι' ὕδατος, δι' οὗ διαλύεται τὸ διὰ τοῦ πυρὸς σχηματισθὲν ὑδροκυανικὸν κάλιον ἐνσίδηρον. Τὸ διῦλιν ἐν ὑγρὸν εἶναι ἀλκαλοειδὲς καὶ ἀναμιγνύεται μετὰ διαλύματος στυπτηρίας, μεχριστοῦ δὲν ἀποτελεῖται πλέον καταβύθισμα ἀργίλλου· ἀκολουθῶς προστίθεται διάλυμα θειϊκοῦ σιδήρου, ἐνὸςφ προάγεται κυανοῦν ἴζημα.

Κατ' ἄλλον τρόπον ἀναμιγνύεται ὑπὸ συνεχοῦς ἀνακινήσεως τὸ διάλυμα τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλίου μετὰ διαλύσεως συνισταμένης ἐξ 1 μέρους θειϊκοῦ σιδήρου καὶ 4 στυπτηρίας. Διὰ τῆς συμμιξεως ταύτης συμβαίνει δυνατὴ ἀνάξισις ἕνεκα τῆς ἐκλύσεως τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ τοῦ ὑδροθειωμένου αερίου. Τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα σύγκειται ἐξ ἀργίλλου καὶ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου, τὸ ὅποιον ἀποπλυνόμενον πολὺν καιρὸν ἀποχωρίζεται ἐκ τοῦ ἐνυπάρχοντος θειϊκοῦ καλίου. Ἀφοῦ τὸ καταβύθισμα τοῦτο ἐκτεθὲν εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αέρος λάβῃ ἀρκετὰ βαθυκυανοῦν χρῶμα, ἐπιτίθεται ἐπὶ λίγου καὶ

ξηραίνεται, και τὸ ξηραίνόμενον τοῦτο φύραμα εἶναι ὁ ὑδροκυανικὸς σιδή-
ρος ἀγοραῖος.

Ἐὰν θέλωμεν νὰ κατασκευάσωμεν τὸν ὑδροκυανικὸν σιδήρον καθαρὸν,
ἄνευ ἀργίλλου, πρέπει νὰ ἀποσυντεθῇ διάλυμα καθαροῦ θεϊκοῦ σιδήρου
διὰ διαλύματος ὑδροκυανικῆς ποτάσεως, καὶ τὸ ἀποτελούμενον κατακρή-
μνισμα, ἀφοῦ πρότερον ἀποπλυθῇ διὰ θεϊκοῦ ἢ ἀλικοῦ ὀξέος κεκραμένου,
νὰ ξηρανθῇ διὰ πύρου πυρὸς.

Χαρακτηριστικά. Ὁ καθαρὸς ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς εἶναι ἄσμος καὶ
ἄχυμος, βαρύτερος ἀπὸ τὸ ὕδωρ, βαθυκυανοὺς τὸ χρῶμα, εὐθραυστος καὶ
μεταλλικῶς λαμπρίζων. Ὁ δὲ ἀγοραῖος, μετ' ἀργίλλου συμμεμιγμένος,
εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον κυανόλευκος, εἰς τὸ ὕδωρ καὶ τὸ
οἶνοπνευμα πάντῃ ἀδιάλυτος, κατέχει ποσότητά τινα ὕδατος μετ'
ἀρκετῆς συγγενείας, καὶ δύναται νὰ ξηρανθῇ ἐντελῶς, ἐὰν ἐκτεθῇ
εἰς θερμοκρασίαν 135° R. Ἐὰν θερμανθῇ διὰ δυνατοῦ πυρὸς εἰς ἀπο-
στακτικὸν σκεῦος, ἐξέρχεται ἀνθρακικὸν ἀέριον, ὀξειδίου τοῦ ἀνθρα-
κος, ὑδροκυανικὸν ὀξύ καὶ ὑδροκυανικὴ ἀμμωνία, καὶ τὸ ὑπόλειμμα
σύγκειται ἐξ ἀνθρακούχου σιδήρου, ὅστις εὐκόλως ἀναφλέγεται. Ὁ
διὰ δυνατοῦ πυρὸς ἀποξηρανθεὶς ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς ἀναφλέγεται διὰ
τῆς φλογὸς τοῦ κηροῦ καὶ καίει ὡς καὶ ἡ ἴσκα ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν ἀνθρα-
κικῆς καὶ ὑδροκυανικῆς ἀμμωνίας, ἐπιμένοντος τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.

Ὁ ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς δὲν διαλύεται εἰς τὰ δι' ὕδατος κεκραμένα ὀξέα·
διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου διαλύεται πρὸς λευκὸν καὶ γλισχρῶδες φύ-
ραμα, τὸ ὅποιον, ἐὰν ξηρανθῇ ὑπὸ τὸ δοχεῖον τῆς πνευματικῆς ἀντλίας,
παρέχει λευκὴν κρυσταλλώδη κόνιν, ἥτις εἶναι θεϊκὸς ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς·
ἐὰν ἡ οὕτω ληφθεῖσα λευκὴ κόνις βραχὴ μεθ' ὕδατος ἢ οἶνοπνεύματος, σχη-
ματίζεται θεϊκὸν ὀξύ κεκραμένον καὶ ὁ ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς λαμβάνει τὸ
κυανοῦν τοῦ χρῶμα. Ἐὰν ὁ ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς ἀναμιγνύμενος μετὰ θεϊ-
κοῦ καὶ νιτρικοῦ ὀξέος θερμανθῇ, φθείρεται ὁ ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς, καθότι
τὰ εἰρημένα ὀξέα μεταδίδουν μέρος τοῦ ὀξυγόνου των πρὸς αὐτόν.

Τὸ ψυχρὸν ὑδροχλωρικὸν ὀξύ δὲν διαλύει τὸν ὑδροκυανικὸν σιδήρον,
ἀλλὰ θερμαίνόμενον μετ' αὐτοῦ ἐκλύεται ὀλίγον ὑδροκυανικὸν ὀξύ, τὸ δὲ
ἀλικὸν ὀξύ διαλύει τὸ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου. Ἐὰν ὁ πρόσφατως καταβυ-
θιζόμενος ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς συναφθῇ μετὰ τοῦ χλωρίου, μεταβάλλεται
εἰς ἐγγχώριον κυανικὸν σιδήρον, πράσινον τὸ χρῶμα, ἀναλαμβάνοντα
ὅμως τὸ κυανοῦν τοῦ χρῶμα διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀέρος. Ἐὰν ὁ νεαρῶς
καταβυθισθεὶς ὑδροκυανικὸς σιδηρὸς τεθῇ εἰς ἀγγεῖα πλήρη ὑδρο-

θειωμένου αερίου, μεταβάλλεται εἰς τεφρόχρουν μάζαν συγκειμένην ἐξ ὑδροκυανικοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου καὶ θείου, ἥτις κυανίζεται πάλιν διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος.

Τὰ ἀλκάλια καὶ αἱ ἀλκαλικαὶ γαῖαι ἀφαιροῦσιν, ἐὰν συναφθῶσι μετὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου, τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ, τὸ δὲ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου ἐπιμένει.

Χρῆσις. Μεταχειρίζεται πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὑδραργύρου καὶ ἄλλων τινῶν ὑδροκυανικῶν ἀλάτων, πρὸς χρωματισμὸν τῶν ταπήτων ἀναμειγνύμενον μὲ ἔλαιον, δι' οὗ ὅμως κατ' ὀλίγον πρασινίζεται εἶναι χρήσιμος πρὸς χρωματισμὸν τῶν μεταξωτῶν ὑφασμάτων.

Ἐνθειον κυανικὸν ὀξύ.

Πρὸς κατασκευὴν αὐτοῦ θερμαίνεται εἰς τινα χύτραν μίγμα ἐξ ἴσης ποσότητος ὑδροκυανικοῦ καλίου ἐνσιδηρίζοντος καὶ θείου, ἐωσού διαλυθῇ ἐντελῶς. Τὸ τηχόμενον φύραμα λειοτριβεται, ἀφοῦ ψυχρανθῇ, καὶ ζέεται εἰς τὸ οἰνόπνευμα, καὶ τὸ δῦλισθεν ῥευστὸν ἐξατμίζεται μέχρι ξηροῦ. Τοῦ ληφθέντος ὑπολείμματος μία οὐγγία διαλύεται εἰς ἴσην ποσότητα ὕδατος, καὶ τὸ διάλυμα τοῦτο τεθὲν εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος ἀποσάζεται, ἀφοῦ πρότερον ἀναμιχθῇ μετὰ φωσφορικοῦ ὀξέος σεραποειδοῦς. Παρομοίως δύναται νὰ ἀποσταχθῇ διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου, πρότερον κεκραμένου δι' ἴσης ποσότητος ὕδατος. Ἡ ἀπόσταξις ἐξακολουθεῖ, ἐνόσω τὸ ὀξύ ἐξέρχεται ἄχρουν. Τὸ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον κατασκευασθὲν ὀξύ εἶναι ῥευστὸν ἄχρουν, διαπεραστικὸν τὴν ὁσμὴν καὶ ὀξύτατον τὴν γεῦσιν, ἔχει 1,002 εἰδικὴν βαρύτητα, πηγνύται εἰς 12,5° καὶ ζεῖ σχεδὸν εἰς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ζέοντος ὕδατος. Διοχετευόμενον διὰ πεπυρωμένου σίφωνος ἀποσυντίθεται κατὰ μέγα μέρος εἰς ὑδροκυανικὴν ἀμμωνίαν, τὸ δὲ θεῖον ἐλευθεροῦται. Ἐὰν δὲ ὁ σωλὴν ἐμπεριέχῃ σιδηροῦν σύρμα, μεταβάλλεται τοῦτο εἰς ἐνθειον σίδηρον.

Ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος, ἀποσυντίθεται καὶ ἀποχωρίζεται ὡχρὸν τι σῶμα, τὸ ὅποιον ἐκτὸς τοῦ θείου ἐμπεριέχει καὶ κυάνιον· ἐκαλέσθη δὲ ἐνθειοκυανικόν *Sulphocyan*, καὶ θεωρεῖται ὡς βάσις τούτου τοῦ ὀξέος. Ἐξατμιζόμενον ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ αἵρος ὡχροῦται, καὶ ἐπιμένει ἐνθειον ὑδροκυανικὸν ὀξύ.

Τὸ ὅσον ἔστι ἀκράτον ἐνθειον ὑδροκυανικὸν ὀξύ ἀποσυντίθεται μὲ

ταχύτητα, ἐξ αὐτοῦ δὲ ἐκλύεται ὑδροκυανικὸν ὄξυ καὶ νεραντζοειδὴς τις ὕλη ἀποτίθεται· ἡ ὕλη αὕτη προάγεται τᾶχιστα, ἐὰν διὰ διαλύματος τοῦ ἐν-
 θείου ὑδροκυανικοῦ καλίου διοχετευθῇ χλώριον· ἡ ἀποχωρισθεῖσα ὕλη
 καλεῖται *Melon*. Διὰ τῆς διαλύσεως ταύτης εἰς καυστικὸν κάλιον
 καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ ὕδατος προάγεται τὸ ὑδρομελονικὸν ὄξυ,
 τὸ ὁποῖον ἐκ τοῦ ὑδρομελονικοῦ μολύβδου δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ εἰς
 εἶδος λευκῆς κόνεως.

Τὸ ἰδιάζον χαρακτηριστικὸν τοῦ ὀξέος τούτου εἶναι, ὅτι μεταδίδει εἰς
 τὰ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου σχηματιζόμενα ἅλατα αἰμοδαφές
 χρῶμα, χωρὶς νὰ σχηματίζῃ τοιοῦτον ἔζημα. Ὡσαύτως ἐρυθροῦνται
 παρὰ τοῦ εἰρημένου ὀξέος ἐκείναι αἱ ὀργανικαὶ ὕλαι, αἵτινες ἐμπεριέχου-
 σιν ἔχνη σιδήρου, ὡς τὸ σιτάμυλον, ὁ χάρτης κτλ. ἐξαιρουμένης μόνον
 τῆς ζαχάρεως. Τὸ ὄξυ τοῦτο εἶναι, ὡς καὶ τὸ ὑδροκυανικὸν ὄξυ, θανατη-
 φόρον δηλητήριον.

Αἱ ἐνώσεις τοῦ ἐνθείου ὑδροκυανικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων διαφέ-
 ρουσι μεγάλως ἀπὸ τὰ ὑδροκυανικὰ ἅλατα. Αἱ ἐνώσεις αὗται δύνανται νὰ
 κατασκευασθῶσι διὰ τῆς ἐξουδετερώσεως τῶν βάσεων μετὰ τοῦ εἰρημέ-
 νου ὀξέος, ἢ διὰ τῆς ἀναμίξεως ὑδροκυανικοῦ ἐνσιδριζόντος ἁλατος
 μετὰ θείου καὶ τῆς θερμάνσεως τῶν μιγμάτων τούτων μέχρι πυρώ-
 σεως. Τὰ ἀποτελούμενα ἅλατα ἐρυθρίζονται διὰ τῶν ἀλάτων καὶ διὰ
 τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.

Ἐνθειον ὑδροκυανικὸν κάλιον. Πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἁλατος
 τούτου θερμαίνεται διὰ πρᾶου πυρὸς λειοτριβημένον φύραμα ἐξ ἴσων
 μερῶν ὑδροκυανικοῦ καλίου ἐνσιδήρου καὶ θείου εἰς κατάλληλον ὑελίνην
 φιάλην, ἕως οὗ τὸ φύραμα νὰ τακῇ, χωρὶς νὰ σχηματίζῃ πλέον πομφό-
 λυγας. Μετὰ ταῦτα εἰς διάστημα ἡμισείας ὥρας ἀποψυχαίνεται, λειο-
 τρίζεται καὶ ζέεται με ἴσην ποσότητα ὕδατος. Τὸ διῦλισθὲν καὶ ἤδη
 θερμὸν ῥευστὸν εἶναι ἄχρουν, καὶ δὲν ἐμπεριέχει μήτε κάλιον, μήτε
 ὑδροθειωμένον ἀέριον ἐλεύθερον. Ἐὰν ὁμως ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρρῶν τοῦ
 ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, λαμβάνει ἐρυθροῦν χρῶμα διὰ τὸ ἐμπεριεχόμενον
 ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, τὸ ὁποῖον διὰ τῆς ἐπιρρῶς τοῦ ἀέρος ὀξειδου-
 μένον ἐρυθροῖ τὸ ῥευστόν. Διὰ τὴν ἀποχωρισθῇ ὁ σίδηρος ἐκ τοῦ εἰρημέ-
 νου ῥευστοῦ, προστίθεται διάλυμα καυστικοῦ καλίου, ἕως οὗ δὲν γεν-
 νᾶται πλέον ὑποστάθμη πρασίνῃ. Τὸ διῦλισθὲν ῥευστόν ἐξατμισθὲν σχη-
 ματίζει κρυστάλλους εἰς εἶδος παραλληλεπιπέδων πρισματῶν.

Τὸ ἐνθειον ὑδροκυανικὸν κάλιον ἔχει ὀξισιστικήν, ὁμοίαν τοῦ σινάπewς

γεῦσιν, εἶναι δηλητήριο, τήκεται εἰς τὴν θερμότητα πρὸς ἄχρουν ρευστόν, πηγνυται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν πρὸς κρυσταλλώσιμον μάζαν, εἰς τὸν ἀέρα διϋγραινεται ὀλοτελῶς. Τὸ ὕδατῶδες διάλυμα κατ' ὀλίγον ἀποσυντίθεται σχηματίζον ἀμμωνίαν. Εἰς τὸ οἰνόπνευμα εἶναι εὐδιάλυτον καὶ διὰ τοῦ θειικοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δύναται νὰ ἐκλυθῇ τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ ἐνθειον.

Ἐάν εἰς διάλυμα θερμὸν ἐνθείου ὑδροκυανικοῦ καλίου διοχετευθῇ χλώριον, σχηματίζεται τὸ θειικὸν ὑδροκυανικὸν θειοῦχον ὀξύ, τὸ κλοῦμενον παρὰ τοῦ Liebig ἐνθειον κυάνιον. Ἡ ἐνθεις ὑδροκυανικὴ πότασσα εἶναι δοκιμαστήριον πολλὰ κατὰλληλον πρὸς ἐξίχνευσιν σμικροτάτης ποσότητος τῶν τοῦ σιδήρου ἀλάτων εἰς οὐδέτερα ρευστά, ἐπειδὴ λαμβάνουσι παρ' αὐτῆς ἐρυθρὸν χρῶμα. Τὸ ξηρὸν τοῦτο ἄλλας σύγκειται ἐκ

Καλίου	1	ἀτ.	39, 2 — 40
Θειοκυανίου	1	ἀτ.	58, 0 — 59

Τὸ ἐνθειον ὑδροκυανικὸν νάτρον κρυσταλλοῦται εἰς ῥομβοειδεῖς κρυστάλλους, διϋγραινόμενους εἰς τὸν ἀέρα.

Ἐκ τῆς ἀποσυνθέσεως τῆς ἐνθείου ὑδροκυανικῆς ἀμμωνίας ἀποτελεῖται ἕτερον σῶμα καλούμενον *Melam*. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ὑποβάλλεται μίγμα ἐξ ἐνὸς ἐνθείου ὑδροκυανικῆς ἀμμωνίας καὶ ὑδροχλωρικῆς ἀμμωνίας εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν. Ἐάν τὸ μετὰ τὴν ἐκλυσιν τῶν πτητικῶν οὐσιῶν ἐπιμένον μέρος ἐκπλυθῇ δι' ὕδατος ἀπὸ τὴν ὑδροχλωρικὴν ἀμμωνίαν, ἐπιμένει τὸ *Melam*. Ἡ ὕλη αὕτη ζεσθεῖσα διὰ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται εἰς κυανικὸν ὀξύ καὶ εἰς ἀμμωνίαν· ἐάν δὲ ταχῇ μετὰ καυστικοῦ καλίου, ἐκλύεται ἀμμωνία καὶ κυανικὸν κάλιον ἐπιμένει. Διὰ τῆς ζέσεως μετὰ δι' ὕδατος κεκραμένου διαλύματος τοῦ καλίου μεταβάλλεται τὸ *Melam* εἰς δύο ἄλλας ὕλας εἰς *Melamin* καὶ *Amelin*. Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν κρυσταλλοῦται ἐκ τοῦ διαλύματος, ἡ δὲ ἄλλη μένει διαλελυμένη· ἐάν δὲ τὸ *Amelin* κατεργασθῇ δι' ἀκράτου θειικοῦ ὀξέος, μεταβάλλεται ὡσαύτως καὶ προάγεται ἄλλη τις διάφορος τῶν προϋφαισίων ὕλων, καλουμένη *Amelid*.

Αἱ ἐνώσεις τοῦ ἐνθείου ὑδροκυανικοῦ ὀξέος μετὰ τῆς βαρείας, στροντιανῆς καὶ τιτάνου εἶναι ἀδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ, κρυσταλλώσιμοι καὶ διϋγραινόμενοι εἰς τὸν ἀέρα.

Ἄλλα τινὰ τῶν μετάλλων καταβυθίζονται παρὰ τοῦ ἐνθείου ὑδροκυανικοῦ καλίου, καθὼς τὰ τοῦ ἀργύρου καὶ ὑδραργύρου μετὰ λευκοῦ

χρώματος. Τὸ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου διαλύεται εἰς τὸ ἔνθειον ὑδροκυανικόν ὀξύ πρὸς ἄχρουν ρευστόν, τὸ ὅποιον ὅμως ἐρυθροῦται διὰ τῆς ἐπιφθοῆς τοῦ ἀέρος καὶ διὰ τοῦ νιτρώδους ὀξέος· τὸ δὲ ὑδρομιγρὸς ὀξειδίου τοῦ σιδήρου διαλύεται εἰς τὸ ὀξύ τοῦτο πρὸς βαθυερυθροῦν ρευστόν. Τὸ ἐξατμιζόμενον ρευστόν δὲν κρυσταλλοῦται, ἀλλὰ σχηματίζει μελανόφαιον μάζαν, διαλύσιμον εἰς τὸ οἶνόπνευμα καὶ ὑγραينوμένην εἰς τὸν ἀέρα. Τὸ ἐρυθροῦν διάλυμα ἀποβάλλει τὸ χρώμα του διὰ τοῦ ἡλιακοῦ φωτός, διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου καὶ πολλῶν ἄλλων, τὰ ὅποια ἔχουν τὸ ἰδίωμα νὰ ἀφαιροῦν ὀξυγόνον. Τὸ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ διαλύεται εἰς τὸ ἔνθειον ὑδροκυανικόν ὀξύ καὶ σχηματίζει ὑποπράσινον ρευστόν, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀποχωρίζεται τὸ ἔνθειον ὑδροκυανικόν ὑποξειδίου τοῦ χαλκοῦ εἰς εἶδος λευκῆς κόνεως.

Ὁμοίως καταβυθίζονται τὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ ἅλατα διὰ τοῦ ἐνθείου ὑδροκυανικοῦ καλίου μετὰ λευκοῦ χρώματος, καὶ θερμαινόμενα εἰς τὸν ἀέρα καίουσι μετὰ κυανῆς φλογός.

Ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου κατακρημνίζεται ὁ μόλυβδος διὰ τοῦ εἰρημένου ἁλτος εἰς εἶδος κιτρίνων λαμπριζόντων κρυστάλλων, οἵτινες θερμαινόμενοι ἀποσπντίζονται, ἐξαχνιζομένου θείου καὶ ἐπιμένοντος ἐνθείου μολύβδου.

Κροτικόν ὀξύ. Acidum fulminans.

Τὸ ὄνομα τοῦτο ἐδόθη εἰς τὰς ἀκολούθους ἐνώσεις, ἐπεὶ διὰ τῆς κρούσεως, διὰ τῆς τριβῆς, ἢ καὶ διὰ μόνης τῆς θερμάνσεως ἐκπυρσοκροτοῦσι.

Τὸ κροτικόν ὀξύ σχηματίζεται, ἐὰν 1 μέρος καθαροῦ ἀργύρου ἢ $1 \frac{1}{3}$ καθαροῦ ὑδροαργύρου διαλυθῇ εἰς καθαρὸν νιτρικόν ὀξύ 1, 36 εἰδικῆς βαρύτητος καὶ τὸ διάλυμα ἀναμιχθῇ μετὰ 27 μερῶν οἶνοπνεύματος 0, 850 εἰδικῆς βαρύτητος, τὸ δὲ διάλυμα θερμανθῇ εἰς κατάλληλον ἀμμοχωμένην φιάλην μέχρι ζέσεως· ἅμα δὲ τὸ διάλυμα ἀρχίστη νὰ θολοῦται, ἀπομακρύνεται τὸ πῦρ καὶ ἀποψυχραίνεται διὰ προσθήκης σχεδὸν ἴσου ποτοῦ οἶνοπνεύματος, κατὰ μικρὸν προστιθεμένου. Ἡ ζέσις ἐξακολουθεῖ ἀφ' ἐαυτῆς, καὶ τὸ διάλυμα ἤθελεν ἐκχυθῇ, ἐὰν δὲν ἀπεψυχραίνετο διὰ προσθήκης νέου οἶνοπνεύματος. Ἄμα παύσῃ ἡ κίνησις εἰς τὸ ρευστόν, διυλίζεται, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ διυλιστῆρος ἐπιμένον ὑπόλειμμα ἀποπλύνεται δι' ἀπεσταγμένου ὕδατος, ἐνὸς αὐτὸ προσλαμβάνει μέρος ὀξέος,

Τὸ μετὰ τὴν ἐντελῇ ἀπόπλυσιν ἐπιμένον θεωρεῖται ὡς κροτικός ὀξειδωμένος ἄργυρος, ἢ κροτικός ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος. Τὸ ἄλλας τοῦτο δὲν δύναται μῆτε νὰ τριφθῇ, μῆτε νὰ ψαυσθῇ διὰ τινος σκληροῦ σώματος, ἐπεὶδὴ ἄλλως ἤθελε γενῇ ἰσχυροτάτη πυρσοκρότησις.

Ἡ προαγωγή τοῦ κροτικοῦ ὀξέος γίνεται διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τόσον τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, ὅσον καὶ τοῦ οἶνοπνεύματος. Διὰ μὲν τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος παράγεται τὸ νιτρογόνον καὶ μέρος ὀξυγόνου, διὰ δὲ τοῦ οἶνοπνεύματος ὁ ἄνθραξ. Μέχρι τοῦδε δὲν ἐδυνήθησαν ν' ἀποχωρήσουν τὸ κροτικὸν ὀξύ εἰς καθαρὰν κατάστασιν, καθότι ὁσάκις ἔκαμαν το αὐτὴν ἀποπειρᾶν ἠνώθησαν τὰ στοιχεῖα τοῦ κροτικοῦ ὀξέος εἰς ἄλλην ἀναλογίαν. Τὸ δι' ὕδατος κικραμένον κροτικὸν ὀξύ ἔχει ἰδιαιτέραν ὁσμὴν ὁμοιάζουσαν τὴν τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος. Ἐνωθὲν μετὰ διαφόρων ὀξέων ἀποσυντίθεται· τὰ ὀξυγονούχα ὀξέα τὸ μεταβάλλουσιν εἰς ὑδροκυανικὸν ὀξύ καὶ εἰς ἁμμωνίαν, τὰ δὲ ὑδρογονούχα σχηματίζουν νέα ὀξέα ἐμπεριέχοντα τὸ κυάνιον καὶ τὰς βάσεις τῶν μεταχειρισθέντων ὀξέων. Ἐκ τῆς ἐνώσεως τοῦ κροτικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων ἀπολαμβάνονται τὰ κροτικά ἅλατα, ἅτινα ἐκπυρσοκροτοῦσι διὰ τῆς θερμῆς, τῆς τριβῆς, καὶ ἄλλων περιστατικῶν, ὅθεν εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν ἀπαιτεῖται μεγίστη προσοχή.

Περὶ τῶν ζωϊκῶν ρευστῶν.

Αἷμα. Sang.

Εἰς τὰ μεγαλήτερα ἄγγεια τῶν ζώων τῶν ἐχόντων θωρακικοὺς σπονδύλους περιστρέφεται ἐρυθρόν τι ρευστὸν αἷμα καλούμενον, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται εἰς παντοτεινὴν κίνησιν ἐνὸς αὐτὰ ζῶσι, μετὰ δὲ τὴν παῦσιν τῆς ζωῆς πῆγνυται, εἰς διαφόρους ὕλας ἀποχωριζόμενον. Τὸ αἷμα ἐκπέμπεται ἀπὸ τὴν καρδίαν εἰς ἄγγεια, ἀρτηρίας καλούμενα, διεσπαρμένα εἰς ὅλα τὰ τοῦ σώματος μέρη, καὶ πάλιν ἐπιστρέφει εἰς τὴν καρδίαν δι' ἄλλων ἀγγείων, φλέβας καλουμένων. Ἡ ἐκ τῆς καρδίας ἐκπομπὴ καὶ ἡ εἰς αὐτὴν ἐπιστροφή συμπεριλαμβάνονται ὑπὸ τὸ ὄνομα κυκλοφορίας τοῦ αἵματος.

Ἐὰν θέλωμεν νὰ καθυποβάλλωμεν τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν ἐκρέον αἷμα εἰς ἐξετάσεις, πρέπει νὰ ἀναταραχθῇ ἀμέσως διὰ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ τῆς ἐνώδους ὕλης ἀποχώρησις. Ἄν καὶ τὸ πάλαι κἀνεν ἄλλο τῶν ζωϊκῶν ρευστῶν δὲν προσήλωσε τὴν προσοχὴν τῶν φυσιολόγων, τῶν ἱατρῶν καὶ χημικῶν τόσον, καθὼς τὸ αἷμα, ἀλλ' ὅμως μόνον εἰς τοὺς νεωτέρους

χρόνους επέτυχον να ἐξιχνεύσωσι τὰ συστατικά του μετά τινος ἀκριβείας. Εἰς ἕκαστον ζωϊκὸν σῶμα εὐρίσκεται ἀρτηριώδες καὶ φλεβώδες αἷμα· τὸ μὲν πρῶτον εἶναι πορφυροῦν, τὸ δὲ δεύτερον κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον φαιὸν. Πρὸ πολλοῦ οἱ φυσιολόγοι ἀνεκάλυψαν διὰ μικροσκοπικῶν πρκατηρήσεων εἰς τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν πρόσφατον αἷμα σφαιρίδια μικρὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ των φωσφορούσας κηλίδας. Τὰ τοῦ αἵματος σφαιρίδια συνίστανται ἐκ τινος ἐξωτερικοῦ καλύμματος, ἐκ τῆς σφαιροειδοῦς ὕλης, ἐξ αἱματίνης καὶ τοῦ κέντρου. Τὰ μὲν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μασποφύρων σφαιρίδια εἶναι στρογγύλα, τὰ δὲ τῶν πτηνῶν καὶ τὰ τῶν ζῶων τῶν ψυχρὸν αἷμα ἐχόντων εἶναι ἐλλειψοειδῆ. Τὸ σχῆμα τοῦτο μεταβάλλεται εἰς τινας νότους· οὕτως ἐπαρτήρηθησαν τὰ σφαιρίδια τοῦ αἵματος εἰς τὴν νότον τοῦ Bright, ἔχοντα εἰς τὴν ἄκρην των μικρὰς κηλίδας, αἵτινες ἐφαίνοντο διὰ τοῦ μικροσκοπίου ὡς λαμτρίζοντες μαργαρίται. Ἀξιοσημείωτον ἐνταῦθα εἶναι, ὅτι τὸ ποσὸν τῶν σφαιριδίων τούτων ἐλκττοῦται εἰς τὴν προδεδηκυῖαν ἡλικίαν, καθὼς καὶ εἰς τὰς φλογιστικὰς νότους, εἰς δὲ ἡ σφαιροειδὴς ὕλη μεταβάλλεται εἰς ἰνώδη ὕλην, καὶ διὰ τοῦτο ἐκαλέσθησαν αἱ φλεγμοναὶ καὶ Hyperinosis ὑπερίνωσις.

Τὰ τοῦ αἵματος τῶν αἰγῶν σφαιρίδια εἶναι μικρότερα, τὰ δὲ τοῦ αἵματος τῶν πιθήκων εἶναι μεγαλύτερα τῶν ἄλλων. Ὁ K. Müller μετρήσας τὸ μέγεθος τῶν ῥηθέντων σφαιριδίων τοῦ αἵματος ἤρσεν τὰ τοῦ ἀνθρωπίνου αἵματος 0,00023 μέχρι 0,00035 κυβικοῦ δακτύλου. Τὰ τῶν προβάτων 0,00020 κυβικοῦ δακτύλου, τὰ δὲ τῶν ἰχθύων τῶν ἐχόντων χονδροειδὲς σκελετὸν 0,00200 κυβικοῦ δακτύλου.

Τὸ κυριώτερον συστατικὸν τῶν τοῦ αἵματος σφαιριδίων καλεῖται *Globulin*, σφαιροειδὴς ὕλη. Ἡ ὕλη αὕτη ἔχει ὁμοίαν τινα χαρακτηριστικὰ μετὰ τοῦ λευκώματος καὶ ἐνοῦται μετὰ διαφόρων ὀξέων πρὸς ἰδιαιτέρας ἐνώσεις. Ἡ σφαιροειδὴς αὕτη ὕλη ὑπάρχει σχεδὸν εἰς καθαρὰν κατὰστασιν, ἄνευ τῆς τοῦ αἵματος ἐρυθρᾶς βαρικῆς ὕλης καὶ σφαιροειδῶς πεπηγμένη εἰς τὸν φακὸν *Lens crystallina*.

Τὸ αἷμα ἐμπεριέχει κατ' ἐξοχὴν τρία συστατικά: ἰνώδη ὕλην, λεύκωμα καὶ ἐρυθρὰν χρωματιστικὴν ὕλην.

Τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν ἐκρέον αἷμα, ἀφθὲν ἡσύχως, ἀποχωρίζεται εἰς ὀρρώδες μέρος, τὸ ὁποῖον εἶναι ῥευστὸν ὑποκίτρινον, γλισχρῶδες, κατὰ μέγα μέρος ἐκ λευκώματος συνιστάμενον καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ αἵματος ἐπιφανείας ἐπιπολάζον καὶ ἀπὸ πεπηγμένον μέρος ἐξ ἰνώδους καὶ χρωματιστικῆς ὕλης συχγείμενον καὶ σχηματίζον τὸν πλακοῦντα. Τὸ δι' ἀνακί-

νήσεως εἰς ῥευστὴν κατὰστασιν ληφθὲν φλεβῶδες αἷμα ἔχει τὰ ἐφεξῆς χαρακτηριστικά. Ἕναι ἐρυθρόφαιον καὶ ἀδιαφανὲς ῥευστὸν, ἔχει ἀσθενῆ ὀσμὴν καὶ ὀλίγον ἀλατώδη γεῦσιν, ἡ εἰδικὴ βαρύτης τοῦ 1,005, θερμαινόμενον μέχρι ζέσεως ὕδατος πήγνυται, ἔνεκα τοῦ ἐνυπάρχοντος λευκώματος καὶ σχηματίζει ὑπατικὸν φύραμα, ὅπερ ἐντελῶς ξηρανθὲν παριστάνει καστανόχρουν κόνιν, δυναμένην νὰ διατηρηθῇ ἐπὶ πολὺ, χωρὶς νὰ ὑπόκειται εἰς μεταβολήν.

Τὸ αἷμα ἀνakinούμενον μετὰ ὀξυγόνου λαμβάνει πορφυροῦν χρῶμα, μετὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος χρωματίζεται ἐρυθρόφαιον, μετὰ δὲ τῆς ἀμμωνίας ἐρυθροῦν, ὡς τὸ τῶν κερασίων συναφθὲν μετὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου λαμβάνει βαθυ-ιώδες χρῶμα· παρὰ τοῦ χλωρίου πήγνυται κατ' ἀρχάς, καὶ χρωματίζεται μελανόφαιον, ἀκολούθως γίνεται λευκοκίτρινον, καὶ ἀποχωρίζονται πράσιναι κηλίδες. Τὸ αἷμα καταβυθίζεται δι' ὅλων τῶν δοκιμαστηρίων καὶ τῶν ὑλῶν, αἵτινες ἔχουν τὸ ἰδίωμα νὰ πηγνύωσι τὸ λευκώμα, ὡς καὶ διὰ τῶν πλειοτέρων ὀξέων, τῶν μεταλλικῶν ἀλάτων καὶ τοῦ οἶνοπνεύματος· τὸ οἶνόπνευμα ἀποχωρίζει ἐξ αὐτοῦ τὸ λευκώμα, τὴν ἰνώδη ὕλην καὶ τινὰ ἄλατα.

Περὶ τοῦ ὁρρώδους μέρους τοῦ αἵματος.

Τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν ληφθὲν αἷμα, ἀφθὲν ἡσύχως, πήγνυται, σχηματίζον φαιὸν, συνεχῇ καὶ πηκτώδη μάζαν, ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐπιπολάζει ὑποκίτρινον ῥευστὸν, νομιζόμενον πρότερον ῥευστὸν λευκώμα, καὶ ἐνούμενον μετὰ τινων διαλελυμένων ἀλάτων. Ὁ τοῦ αἵματος ὁρὸς ἔχει ὑποκίτρινον χρῶμα, εἶναι θολὸς ἔνεκα τῆς λιπώδους ὕλης, καὶ μεταβάλλει τὸν τῆς κροκοῤῥίζης χάρτην εἰς φαιὸν, ἔνεκα τῆς ἐνυπαρχούσης σόδας, ἐμπεριέχει ἕως 10 τοῖς % λευκώματος, καὶ διὰ τοῦτο πήγνυται διὰ τῆς θερμότητος πρὸς πηκτώδη μάζαν. Ἐὰν ὁ ὁρὸς ἀνακινηθῇ μὲ αἰθέρα καὶ τὸ πηχθὲν μέρος κατεργασθῇ μὲ οἶνόπνευμα, ἀποχωρίζεται ἐξ αὐτῶν τὸ λίπος, τὸ ὁποῖον εἰς τὸ βόειον αἷμα σύγκειται ἐκ στέατος, χολοστέατος καὶ λιπώδους ἐλαίου· ἐκτὸς δὲ τούτων τῶν συστατικῶν εὐρίσκεται γαλακτικὴ, φωσφορικὴ καὶ ὑδροχλωρικὴ σόδα καὶ πτότασσα.

Πήκτωμα τοῦ αἵματος. Πλακοῦς.

Cruor, Placenta, Coagulum.

Τὸ φαιὸν καὶ τρέμον φύραμα τοῦ διὰ ἡσύχου ἀποθέσεως πεπηγμένου

αἵματος, ἐξ οὗ μετεγγίσθη τὸ ὀρρόδες μέρος, καλεῖται πῆκτωμα τοῦ αἵματος, ἢ πλακοῦς, συνίσταται δὲ κατὰ μέγα μέρος ἐξ ἰνώδους ὕλης καὶ ἐρυθρᾶς χρωματιστικῆς ὕλης.

Βαφικὴ ὕλη τοῦ αἵματος.

Ἐπειδὴ εἰς τὸ αἷμα ἐξιχνεύθη ἡ τοῦ σιδήρου παρουσία, ἐθεώρησαν διὰ πολλὸν καιρὸν τὸ μέταλλον τοῦτο ὡς τὴν χρωματιστικὴν ὕλην τοῦ αἵματος, δι' ὁσχυρίζόμενοι ὅτι τοῦ σιδήρου τὸ ὀξειδιον εὐρίσκεται ἡνωμένον μετὰ τινος ὀξέος καὶ μετὰ τῆς σόδας, ἢ ὅτι ὑπάρχει καὶ φωσφορικὸς σίδηρος μετὰ λευκώματος ἡνωμένος. Ἄλλοι ἐνόμισαν ὅτι εὐρίσκεται ὁ σίδηρος εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν μετὰ τοῦ νιτρογόνου, ὀξυγόνου, ὕδρογόνου καὶ τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης, καθὼς καὶ μετ' ὀλίγης ποσότητος τιτάνου καὶ μαγνησίας. Τέλος ἀνεκαλύφθη ὅτι τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἰδιαιτέρα ὕλη. Πρὸς ἀποχώρησιν τῆς τοῦ αἵματος χρωματιστικῆς ὕλης κόπτεται τὸ πεπηγμένον αἷμα εἰς λεπτὰ τεμάχια τιθέμενα ἐπὶ σιβάδων ἐμπορικοῦ χάρτου, ἕως οὗ ὁ χάρτης νὰ μὴν ὑγραίνεται παρ' αὐτοῦ· ἀκολουθῶς ἐκθλίβονται τὰ τεμήματα μεταξὺ χάρτου, δι' οὗ ἀπομακρύνεται ἐντελῶς τὸ ἐμπεριεχόμενον ὀρρόδες μέρος.

Τὰ ἐκθλιφθέντα τεμήματα μαλακὰ ὄντα καὶ εὐλίγιστα δὲν ἐμπεριέχουσιν ἄλλο, εἰμὴ ἰνώδη καὶ χρωματιστικὴν ὕλην. Πρὸς ἀποχώρησιν δὲ τοῦ ἐρυθροῦ χρώματος ἀπὸ τὴν ἰνώδη ὕλην τρίβονται μετὰ ψυχροῦ ὕδατος, δι' οὗ διαλύεται τὸ ἐρυθροῦν χρῶμα, ἐπιμένοντος μόνον τοῦ ἰνικοῦ μέρους. Τὸ μετὰ τοῦ χρώματος κεκορεσμένον καὶ διῦλισθὲν ὑγρὸν ἐξατμίζεται εἰς θερμοκρασίαν 50° R, δι' ἧς ἐπιμένει τὸ χρῶμα εἰς εἶδος ἐρυθροφαίου φυράματος, κογχουσιδοῦς δὲ τὴν θραῦσιν. Τὴν καθαρὰν τοῦ αἵματος βαφικὴν ὕλην ὀνομάζουσιν Hamatosin· μετ' αὐτῆς τῆς βαφικῆς ὕλης φαίνεται ὁ σίδηρος χημικῶς ἡνωμένος, καθότι ἐὰν διὰ καθαρᾶς αἱματίνης μὲ ὕδωρ ἀναμειγμένης διέλθῃ χλώριον, τότε ἡ αἱματίνη σχηματίζει χλωρικὴν αἱματίνην, ὁ δὲ σίδηρος ἀνακαλύπτεται ὡς ὕδροχλωρικὸς σίδηρος.

Κατὰ τὸν K. Simon εὐρίσκονται καὶ ἄλλαι τινὲς βαφικαὶ ὕλαι εἰς τὸ αἷμα ὡς τὸ Hamophain καὶ Hamocyan, Αἱμόφαιον καὶ Αἱμοκυανοῦν.

Ἡ καθαρὰ βαφικὴ ὕλη εἶναι μελανόφαιος μάζα, ὑελοσιδῆς τὴν θραῦσιν, μεταβαλλομένη διὰ τῆς λειοτριβήσεως εἰς βαθυ-ερυθρὰν κόνιν, καὶ διαλύσι-

μος εἰς ψυχρὸν ὕδωρ. Τὸ ἐκ τοῦ φλεβώδους αἵματος κατασκευαζόμενον ἐρυθροῦν χρώμα, τὸ Haemato Globulin ὑπὸ τινων καλούμενον, προσλαμβάνει ζωηρότερον ἐρυθροῦν χρώμα, ἐὰν συναφθῇ ἢ ἀνακινήθῃ μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ὅχι ὅμως καθὼς τὸ ἐκ τοῦ ἀρτηριώδους αἵματος. Τοῦτο δὲ παρατηροῦμεν, ἐὰν τὸ πεπηγμένον αἷμα διατηρηθῇ, καθότι τότε τὸ εἰς τὸ ἔνδον μελανωπὸν αἷμα λαμβάνει ὀλίγον κατ' ὀλίγον ζωηρὸν ἐρυθροῦν χρώμα. Τὸ διάλυμα τοῦτο πηγνύται διὰ τῆς τοῦ οἶνοπνεύματος προσθήκης καὶ ἀποχρωματίζεται διὰ τοῦ χλωρίου καὶ διὰ τῶν μεταλλικῶν ἀλάτων, ἡγουν ὁ ὀξεικὸς μόλυβδος, ὁ ὑδροχλωρικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος, καὶ ὁ θεϊκὸς ψευδάργυρος, σχηματίζουν εἰς τὴν ὑδατώδη διάλυσιν ταύτην ἐρυθροῦν καταβύθισμα.

Ἡ πεπηγμένη ἐρυθρὰ βαφικὴ ὕλη θερμανθεῖσα εἰς ἐλεύθερον πῦρ, ἐξοιδαίνεται καὶ καίει μετὰ φλογό· καὶ σχηματίζει πορώδη ἀνθρακκα, ὅστις ἔλκεται ὑπὸ τοῦ μηχανήτου.

Ἡ διὰ τῆς καύσεως τοῦ βοείου αἵματος ληφθεῖσα τέφρα εἶναι κιτρίνη, ἐμπεριέχει εἰς 100 μέρη: φωσφορικῆς τιτάνου καὶ φωσφορικῆς μαγνησίας μέρη 6, ὀξειδίου τοῦ σιδήρου 50, φωσφορικοῦ σιδήρου 7,5, ἀνθρακικῆς τιτάνου μὲ ἵχνη ἀλικῆς καὶ ἀνθρακικῆς σόδας 36,5. Ὁ Berzelius ἐξετάσας τὸ ἀνθρώπινον αἷμα εὔρεν εἰς 100 μέρη ξηρανθέντος πλακοῦντος: 35 ἰνώδους ὕλης, 58 βαφικῆς ἐρυθρᾶς ὕλης, 1,3 ἀνθρακικοῦ νάτρου καὶ 4 ζωϊκῆς οὐσίας κτλ. Κατὰ τὸν Dumas καὶ Porret ἐμπεριέχει τὸ ἀνθρώπινον αἷμα:

Πλακοῦντος τοῦ αἵματος	12, 92
Ὄρου	8, 69
Ὑδατος	78, 39

100.

Τὸ αἷμα πολλῶν ζώων σύγκειται ἐξ ἐρυθρᾶς βαφικῆς ὕλης, ἐκ λευκώματος, λίπους, ὁμοζωμίου, ἰνώδων μορίων καὶ τινων ἀλάτων εἰς διαφόρους ἀναλογίας. Ὁ Barruel ἐκτὸς τούτων ἀπέδειξε καὶ τὴν ὑπαρξίν πτητικῆς τινος ὕλης ἐχούσης ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ ἰδρώτος καὶ τοῦ ἐκπνεομένου ἀέρος. Ἡ ὕλη αὕτη φαίνεται ὅτι ὑπάρχει χημικῶς ἠνωμένη μετ' ἄλλων τινῶν συστατικῶν τοῦ αἵματος, καὶ δύναται νὰ ὁσφρανθῇ, ἐὰν ἀποχωρισθῇ ἐκ τῶν ἐνώσεών της. Πρὸς ἐκλυσιν τῆς εἰρημένης ὕλης ἐκ τῶν ἐνώσεών της μεταχειρίζεται ὁ Barruel τὸ ἄκρατον θεϊκὸν ὀξύ, οὗ τινος τὸ $\frac{1}{4}$ ἀναμιγνύεται, καὶ οὕτως ἐκλύεται ἡ ῥηθεῖσα ὁσμηρὰ ὕλη. Ἡ διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἐκλυομένη ὁσμὴ εἶναι σφοδρότερη ἐκ τοῦ αἵματος τῶν

ἀρρένων ζώων, παρὰ ἐκ τῶν θηλικῶν. Ὁ Barruel εὗρεν ὅτι τὸ ἀνθρώπινον αἷμα ἀναμιχθὲν μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἐκλύει ὁσμὴν ὁμοίαν κατὰ πάντα μὲ τὴν τοῦ ἰδρωτός· ὁμοίως ἐκλύεται ἡ περὶ ἧς ὁ λόγος ὁσμὴ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν βοῶν, προβάτων, ἵππων, ὀρνέων καὶ τῶν νησσῶν. Τὸ τῶν βατράχων αἷμα ἐκλύει τὴν τοῦ ἔλους ὁσμὴν, τὸ τῶν κυπρίνων αἷμα τὴν ὁσμὴν τῆς βλεννώδους ὕλης, μεθ' ἧς οἱ τῶν ποταμῶν ἰχθεῖς εἶναι ἐσκεπασμένοι.

Μεταβολὴ τοῦ αἵματος εἰς τὰς νόσους.

Εἰς τινὰς νόσους ὑπόκειται τὸ αἷμα εἰς μεταβολάς· οὕτω λ. χ. ὁ ὀρός τῶν ἀπὸ ἱκτερον πασχόντων ἔχει κίτρινον χρῶμα, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰς ἐξετάσεις τοῦ Gmelin καὶ Tiedeman πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὴν τῆς κιτρίνης ὕλης τῆς χολῆς παρουσίαν. Ἀναμιχθέντος τοῦ κιτρίνου ὀροῦ μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, σχηματίζεται ὑακίνθινον διάλυμα κατ' ὀλίγον κυανίζομενον. Ἐὰν ὁ τῶν ἱκτερικῶν ὀρός ἀναμιχθῇ μὲ τόνον μόνον νιτρικοῦ ὀξέος, ὅταν ἀπαιτεῖται πρὸς σχηματισμὸν καταδυθίσματος, χρωματίζεται κιτρινοπράσινος, μετὰ δὲ πλείονος νιτρικοῦ ὀξέος ἀναμιχθεὶς πρασινίζει μετὰ ζωηρότητος, καὶ ἀκολούθως κυανίζεται· ὡσαύτως καὶ ὁ μετὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου ἀναμειγμένος ὀρός πρασινίζει. Κατὰ τὰς χημικὰς παρατηρήσεις τοῦ Lecanu ἐμπεριέχει τὸ αἷμα τῶν ἱκτερικῶν τὴν κυανὴν καὶ πρασίνην βασιλεὴν ὕλην τῆς χολῆς.

Τὸ αἷμα τῶν ἀπὸ φλογιστικῶν πυρετῶν πασχόντων πηγνύται εἰς τρόπον, ὥστε σκεπάζεται μετὰ τεφροχρόου, γλίσχρου καὶ συνεχομένου ὑμένος, τὸν ἐπέταρον φλεγμονώδη, Crusta In flamatoria. Τοῦτο δὲ τὸ φαινόμενον προέρχεται καθότι ἡ ἐνώδης λη ἐπιπολάζει ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ πλακούντος εἰς εἶδος ὑμένος, ὁ δὲ ὀρός μὲ ὀλίγον ποσὸν ἐρυθρᾶς ἐκφυκῆς ὕλης ἐπιμένει. Ὁ ἐπ' παγὸς φλεγμονώδης ἐμπεριέχει ἐνικὴν ὕλην καὶ 2 ½ μέρη λίπους.

Διάφορος εἶναι ἡ κατάστασις τοῦ αἵματος τῶν ἀπὸ στομακάκηρ Scorbutum πασχόντων εἰς ταύτην τὴν νόσον ἐλαττοῦται ἡ ποσότης τῆς ἐνικῆς ὕλης καὶ ἐπεὶ δὲ ἔχει ἀλκαλικά χαρακτηριστικά δὲν ἔχει τὸ ἴδιωμα τοῦ πηγνέσθαι. Ἐνίοτε εὐρίσκεται μετὰ τὸν θάνατον εἰς τὴν καρδίαν καὶ εἰς τὰς μεγαλητέρας φλέβας ἀποχωρισμένη ἐνώδης ὕλη, ἥτις καλεῖται πολυποδες, Polypae.

Εἰς τὴν *Asiatic* χολέραν ὑπόκειται τὸ αἷμα εἰς σημαντικὴν ἀλλοίωσιν

ἐξ αἰτίας τῆς ἐκκρίσεως μεγάλου ποσοῦ ὑδατώδους ρευστοῦ ἐκ τῶν ἐντέρων, διὰ τοῦτο ἀποκαθίσταται τέλος τὸ εἰς τὰς φλέβας ἐπιμένον αἷμα παχύρρευστον, ὥστε χάνει τὸ ιδίωμα τοῦ νὰ ῥέῃ· τοιοῦτον αἷμα ἐμπεριέχει 25—52 μέρη στερεῶν οὐσιῶν καὶ ἀλκαλικά μόρια. Εἰς τὸν ἐκτικὸν πυρετὸν αὐξανόμενης τῆς νόσου, γίνεται τὸ αἷμα πλεόν ὑδατώδες, ἐλαττωμένης δὲ, πυκνότερον.

Τὸ αἷμα ἐμπεριέχει καὶ τινα εἶδη λίπους, τὰ ὅποια δύνανται νὰ ἐκχυλισθῶσιν, ἐὰν τὸ πεπηγμένον αἷμα κατεργασθῇ μετὰ αἰθέρος ἢ οἶνοπνεύματος· ἐξατμισθέντος τοῦ οἶνοπνεύματος ἐπιμένουσι τὰ διαλυθέντα λίπη. Ἐκ τοῦ ἐπι ζέοντος διῦλισθέντος οἶνοπνεύματος ἀποτίθενται διὰ τῆς ἀποψύξεως κροκίδες σερροῦ τινος λίπους, τὸ ὅποιον ἐκαλέσθη Serolin ὀρρέλαιον· τοῦτο τὸ λίπος σχηματίζει μαργαριτοειδῶς λαμπρίζοντα φυλλίδια.

Περὶ τῶν ἐξ αἵματος ἐπὶ τοῦ σιδήρου καὶ ἐπὶ τῶν ἐνδυμάτων.

κηλίδων.

Εἰς ἱατροδικαστικὰς ἐξετάσεις εἶναι πολλάκις σπουδαιότατον ἀντικείμενον νὰ προσδιορισθῇ μετὰ θετικότητος, ἐὰν κηλίδες ἰοῦ ἐπὶ τοῦ σιδήρου προῆλθον ἐξ αἵματος, ἢ ὄχι· διὰ τοῦτο ἀναφέρομεν λεπτομερῶς τὸν τρόπον, τὸν ὅποιον ὁ Orfila προτείνει πρὸς τὴν ἐξέτασιν ταύτην.

Ἡ κηλὶς δι' ὀλίγου ψυχροῦ ὕδατος ἀποπλύνεται ἀπὸ τὸν χάλυβα, καθότι ἡ τοῦ αἵματος ἐρυθρὰ βαφικὴ ὕλη, καθὼς καὶ τὸ λεύκωμα μὴ ὑπάρχοντα εἰς πεπηγμένην κατάστασιν, διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ ὅποιον ἀσθενῶς ἐρυθροῦται παρ' αὐτῶν· τὰ ἀποτελούμενον διάλυμα διαιρεθὲν εἰς πολλὰς μερίδας ἐξετάζεται κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. Διὰ τῆς προσθέσεως ἐγγλωρίου ὕδατος λαμβάνει κατ' ἀρχὰς πράσινον χρῶμα, μετὰ ταῦτα τὸ μὲν χρῶμα διαφθείρεται, ἐκ δὲ τοῦ ρευστοῦ ἀποτίθενται λευκαὶ κροκίδες· ἕτερον μερίδιον τοῦ ἐρυθροποῦ ρευστοῦ ἀναμιχθὲν μετ' ὀλίγων σταγόνων ἀμμωνίας δὲν χάνει τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα· ἐὰν δὲ δὲν προῆλθεν ἐξ αἵματος, ἀλλὰ ἐξ ἀφροψήματος τοῦ ἀνθροκόκκου, τοῦ καμπεχικανοῦ, ἢ τοῦ ἐρυθροῦ ξύλου, ἀποτελεῖται ὑποκυανοῦν χρῶμα. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἀποτελεῖται εἰς τὸ ἐρυθρὸν ρευστὸν τεφρόχρουν, διὰ δὲ τοῦ τῶν κηκκίδων βάμματος ὑπέρυθρον καταβύθισμα. Ἐὰν μέρος τοῦ ρευστοῦ θερμανθῇ μέχρις ἀναζέσεως, πηγνυται, διὰ δὲ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον θολοῦται μόνον.

Ἐὰν κηλὶς τις προερχομένη ἀπὸ αἷμα ἢ ἕτερον ζωϊκὸν ρευστὸν θερ-

μικρῇ εἰς μικρὸν σωλῆνα εἰς τοῦ ὁποίου τὸ στόμιον ἐκρεμάσθῃ ὁ τοῦ καγκαρμίνου ἐρυθρωθεὶς χάρτης, ἐπανέρχεται τὸ κυανοῦν χρώμα ἕνεκα τῆς ἐκλύσεως τῆς ἀμμωνίας, ἐκπεμπομένης διὰ τῆς θερμάνσεως τῆς τοῦ αἵματος κηλίδος· ἐκτὸς τούτου δυνάμεθα νὰ αἰσθανθῶμεν καὶ τὴν ὁσμὴν ζωϊκοῦ ἐμπυρευματικοῦ ἐλαίου. Ἐὰν δὲ ὑποβληθῇ εἰς τοιαύτην ἀπόπειραν κηλὶς προερχομένη παρὰ τινος ὄξυνου ἢ χ. ρευστοῦ παρὰ τοῦ ζωμοῦ τῶν λεμονίων, μεταβάλλεται ὁ κυανοὺς χάρτης εἰς ἐρυθρὸν ἐκ τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, καὶ τότε δὲν ἐκλύεται ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον.

Πρέπει δὲ ἐνταῦθα νὰ σημειώσωμεν ὅτι ὁ τοῦ σιδήρου ἰὺς θερμαινόμενος ἐκδίδει ἀνεπαίσθητα ἔχνη ἀμμωνίας, ὅχι δὲ καὶ τὸ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον. Εἰς ἐξέτασιν ἂν κηλὶς ἐπὶ τῶν φορεμάτων προέρχεται ἀπὸ αἷμα ἐμβαπτίζονται τὰ ἐνδύματα εἰς ὀλίγον ὕδωρ, τὸ ὅποιον χρωματίζεται ἐρυθρὸν χωρὶς νὰ διαλύσῃ τὴν ἰώδη ὕλην. Τὸ ἐρυθρὸν ρευστὸν καθυποβάλλεται ἀκολούθως εἰς τὰς προεκτεθείσας ἐξετάσεις.

Ὁ Lecanu ἐξετάσας τὸ ἀνθρώπινον αἷμα εὔρεν εἰς 1000 μέρη τὰ ἀκόλουθα συστατικά.

ὕδατος	780, 149
ἰώδους ὕλης	2, 100
Λευκώματος	65, 090
Βαρικῆς ὕλης	133, 000
Κρυσταλλωσίμου λίπους	2, 430
Ἐλαίου στερεοῦ	1, 310
Ἐκχυλισματικῆς ὕλης διαλυσίμου εἰς τὸ ὕδωρ καὶ οἰνόπνευμα	1, 790
Λευκώματος μετὰ νάτρου	1, 265
Ὑδροχλωρικῆς ποτάσεως καὶ σόδας	0, 870
Ἀνθρακικῆς φωσφορικῆς καὶ θεικῆς ποτάσεως, Ἀνθρακικῆς τιτάνου καὶ μαγνησίας	2, 100
Φωσφορικοῦ σιδήρου, μαγνησίας καὶ ὀξει- δίου τοῦ σιδήρου	

Χρήσις. Τὸ αἷμα εἶναι χρήσιμον εἰς τὰ ζαχαροποιεῖα διὰ τὴν τῆς ζαχάρους κάθαρσιν ὡς τρόφιμον, καὶ πρὸς κατασκευὴν τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλίου ἐνσιδήρου.

Περὶ ἀναπνοῆς.

Ἐπειδὴ ἡ ἀναπνοὴ καὶ ἡ ζωϊκὴ θερμότης εὐρίσκονται εἰς στενὴν σχέσιν

μετὰ τοῦ αἵματος εἶναι κατάλληλον νὰ ὁμιλήσωμεν ἀμέσως μετὰ τὸ αἷμα περὶ τῶν δύο τούτων ἀντικειμένων.

Τὸ ἀναπνεῖν εἶναι μία τῶν σημαντικωτέρων ἐργασιῶν τῆς ζωῆς τῶν ζώων ὡς συντείνουσα πρὸς διατήρησιν αὐτῶν· συνίσταται δὲ εἰς δύο ἐργασίας, εἰς τὴν εἰσπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν τοῦ ἀέρος. Διὰ τῆς πρώτης πράξεως εἰσέρχεται ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ εἰς τοὺς δύο πνεύμονας ἢ εἰς τὸ τοὺς πνεύμονας ἀναπληροῦν ὄργανον, διὰ τῆς δευτέρας ἐκβάλλεται ὁ ἀναπνεόμενος ἀτμοσφαιρικός ἀήρ. Ἀπὸ τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους εἶναι πασιδῆλον ὅτι ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ εἶναι ἀναγκασιότατος πρὸς διατήρησιν τῆς ζωῆς καὶ ὅτι ζῶον εἰσπνέον πολὺν καιρὸν τὸν ἴδιον ἀέρα ἀποπνίγεται. Εἰς ὑγιεινὴ καὶ ἥσυχον κατάστασιν ἀναπνέει ὁ ἄνθρωπος καθ' ἕκαστον λεπτὸν 18 φοαῖς, ὁ ἐκπνεόμενος ἀτμοσφαιρικός ἀήρ εἶναι μικρότερος ὡς πρὸς τὸν ὄγκον ἀπὸ τὸν εἰσπνεόμενον καὶ ἐμπεριέχει ὀλιγώτερον ὀξυγόνον παρα πρὸ τῆς ἀναπνοῆς, καὶ ἀντὶ τοῦ ἀφανισθέντος ὀξυγόνου ἴσον ποσὸν ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Ὁ Allen καὶ Pepys καὶ ἄλλοι τινὲς χημικοὶ διὰ πολλῶν δοκιμῶν ἤρξαν ὅτι ὁ ἐκπνεόμενος ἀήρ ἐμπεριέχει τόσον ἀνθρακικὸν ὀξὺ, ὅσον ὀξυγόνον ἠφανίσθη, δηλαδὴ ὅτι εὐρίσκονται εἰς αὐτὸν ἀντὶ τῶν $21 \frac{1}{2}$ ὀξυγόνου μόνον 13 ὀξυγόνου καὶ 8 μέρη ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Κατὰ τὰς ἀκριβεῖς παρατηρήσεις τοῦ Allen καὶ Pepys ἀπορροφᾷ ὁ ἄνθρωπος καθ' ἕκαστον λεπτὸν $7 \frac{1}{2}$ κυβικοὺς δακτύλους ὀξυγόνου. Ἐκτὸς τῶν ὑδατῶδων ἀτμῶν, οἵτινες εὐρίσκονται ἀναμεμιγμένοι μετὰ τοῦ ἐκπνεομένου ἀέρος, ἐμπεριέχονται εἰς αὐτὸν καὶ τινες ζωϊκαὶ καὶ πτητικαὶ οὐσίαι περὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν ὁποίων δυνάμεθα νὰ βεβαιωθῶμεν, ἐάν οἱ ἐκπνεόμενοι ὑδατῶδεις ἀτμοὶ διοχετευθῶσιν εἰς κλεισμένον ἀγγεῖον, καὶ ἐπιπυκνωθῶσι ταχέως· οὕτω σχηματίζεται ρευστὸν θολούμενον καὶ λαμβάνον ἀηθὴ ὁσμὴν. Μετὰ τὴν χρῆσιν οἰνωδῶν ποτῶν, αἰθέρος, ἀρωματικῶν ἐλαίων, ὑδροβειωμένου ἀερίου κτλ. εὐρίσκονται ἴχνη αὐτῶν εἰς τὸν ἐκπνεόμενον ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Διὰ τῆς ἐκπνοῆς τῶν πνευμόνων ἐκπνέει ὁ ἄνθρωπος καθ' ἑκάστην ἡμέραν μίαν λίτρην ὑδατος.

Τὰ ἀμφίβια ἀπαιτοῦσιν ὀλιγώτατον ποσὸν ἀέρος πρὸς διατήρησιν τῶν. Αἱ χελόναὶ καὶ βάτραχοι δύνανται νὰ ζήτωσιν πολὺν καιρὸν καὶ ὑπὸ τὸ κενὸν τῆς πνευματικῆς ἀντλίας καθὼς καὶ εἰς ἀέρια, ἅτινα εἶναι ἐπιβλαβῆ δι' ἄλλα ζῶα. Αἱ χελόναὶ ἐμβυθιζόμεναι εἰς ἔλαιον ἀποθνήσκουσι μετὰ 24 ἕως 26 ὥρων διάστημα. Ἄν καὶ οἱ ἰχθῦες ἀπαιτοῦσιν μόνον ὀλίγον ποσὸν ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος διὰ τὴν ζωὴν των, μόνον

τοῦτο ἀποπνίγονται ταχέως εἰς ὕδωρ, τὸ ὁποῖον ζεόμενον ἢ ἐγκλειόμενον εἰς ἀγγεῖα στερεῖται ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Κατὰ τὰς παρατηρήσεις τοῦ Perceval καὶ Humboldt οἱ ἰχθεῖς εἰς τὴν ἀναπνοὴν ἀπορροφοῦσι καὶ νιτρογόνον, πρὸς τούτοις παρατήροῦμεν ὅτι ἀφανίζεται μεγαλύτερον ποσὸν ὀξυγόνου παρ' ὅσον ἀνθρακικὸν ὀξύ σχηματίζεται. Εἰς ὕδωρ μὴ ἐμπεριέχον ἀέρα ζῶσιν οἱ ἰχθυεὶς ὀλίγον καιρὸν· καὶ διὰ τοῦτο ἀποθνήσκουσιν εἰς λίμνην πολλὴν καιρὸν παγωμένην, καὶ ἐὰν ὁ πάγος διατρυπηθῇ εἰς τι μέρος, συνάζονται ὅλοι οἱ ἰχθυεὶς τῆς λίμνης εἰς τὴν ὀπὴν ταύτην διὰ νὰ ἀναπνεύσωσιν.

Τὰ ἔντομα καθὼς καὶ τὰ ἑρπετὰ ἀποσυνθέτουσιν ἐπίσης τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα καὶ γεννῶσιν διὰ τῆς ἀπορρόφησης τοῦ ὀξυγόνου ἀνθρακικὸν ὀξύ. Τὰ πρῶτα ἀναπνεύουσι διὰ ὀπῶν, αἵτινες εὐρίσκονται εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ σώματος καὶ διὰ τῶν ὁποίων εἰσέρχεται ὁ ἀήρ δι' ἰδιαιτέρων βρόγχων. Ἐὰν οἱ βρόγχοι οὗτοι κλεισθῶσιν δι' ἐλαίου, τὰ ἔντομα ἀποπνίγονται ταχέως· ὡσαύτως τεθέντα εἰς ἔλαιον παραχρῆμα ἀποθνήσκουσιν. Εἰς μέρος κενὸν ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος δύνανται νὰ ζῶσιν πολλὴν καιρὸν, καὶ ἐκ τούτου ἐξάγεται ὅτι ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ δὲν ἀναγκαιεῖ τόσον εἰς τὰς τάξεις τῶν κατωτέρων ζώων, ὅσον εἰς τὰ ἀνώτερα ζῶα.

Περὶ τῆς θερμότητος τῶν ζώων.

Αἱ διάφοροι τάξεις τῶν ζώων ἔχουσιν καὶ διάφορον ἐσωτερικὴν θερμότητα· ἡ θερμότης τῶν μαστοφόρων καθὼς καὶ τῶν πτηνῶν εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος εἰς τὸν ὁποῖον ζῶσιν. Τὴν αἰτίαν τῆς ἀμεταβλήτου θερμότητος ἐπάσχισαν νὰ ἐξηγήσωσιν κατὰ διαφόρους τρόπους οἱ φυσικοὶ, καὶ μολονότι ἐγίνην ἀναρίθμητοι δοκιμαὶ περὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου, μολοντούτο δὲν ἐξηγήθη ἡ αἰτία τῆς ζωϊκῆς θερμότητος τόσον ἀκριβῶς, ὥστε νὰ δύναται νὰ θεωρηθῇ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀμφιβολίας.

Ὁ Lavoisier καὶ Laplace καὶ οἱ ὁπαδοὶ των ἀπέδιδον τὴν θερμότητα εἰς τὴν ἀναπνοὴν τῶν ζώων, ἄλλοι δὲ εἰς τὴν σῆψιν, εἰς τὴν ἐξομώσιν καὶ εἰς τὴν διὰ τῆς κυκλοφορίας σύντριψιν τῶν τοῦ αἵματος κυλίδων. Ὁ Larive καὶ ἄλλοι ἤσαν τῆς γνώμης ὅτι ἡ ἐκλυσις τῆς θερμότητος, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἄλλων φαινομένων τῆς ζωῆς, πρέπει ν' ἀποδοθῇ εἰς τὸ

σύστημα τῶν νεύρων, λέγοντες ὅτι ζῶον τοῦ ὁποίου ὁ ἐγκέφαλος νοσεῖ δὲν ἐκλύει θερμότητα, ἂν καὶ ἐξακολουθῇ ἡ εἰσπνοὴ καὶ ἐκπνοή. Τὰ διάφορα μέρη τοῦ αὐτοῦ ζώου δεικνύουσιν διάφορον βαθμὸν θερμότητος· νοσερόν τι μέρος εἶναι πολλάκις ψυχρότερον τοῦ ὑγιoῦς καὶ εἰς ἀπὸ φλεγμονὴν προσβεβλημένον ὄργανον εἶναι ἡ θερμοκρασία μεγαλητέρα τῶν ἄλλων μερῶν.

Κατὰ τὰς παρατηρήσεις τινῶν φυσιολόγων ἔχομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα ἐπὶ τῆς θερμοκρασίας καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῶν παλμῶν τῶν ἀναφερομένων ζώων.

	Θερμοκρασία.	Παλμοὶ εἰς ἑκα- στον λεπτόν.	Ἀναπνοαί.
Ἄνθρωπος	31, 2°	72	18
Πίθηξ	28, 4	90	30
Ἴππος	29, 4	56	16
Γαλῆ	31, 6	100	24
Αἶξ	31, 3	84	24
Νῆσσα	34, 4	110	24
Περιστερά	32,	136	34
Χοῖρος	30, 4	140	36
Ἀλεκτρυὼν	33, 2	140	30
Ῥοδὶς	32, 8	200	22

Λύμφη. *Lympha.*

Ἡ λύμφη εἶναι ῥευστὸν ἰδιαιτέρον ἐμπεριεχόμενον εἰς ἀγγεῖά τινα καλούμενα *λυμφατικὰ ἀγγεῖα*, *Vasa Lymphatica*· τοῦτο τὸ ῥευστὸν εἶναι ἐρυθροκίτρινον, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον θολὸν καὶ γλισχρῶδες, ἐνεργεῖ ὡς ἀλκάλιον καὶ πηγνύται μετὰ τὸν θάνατον τῶν ζώων πρὸς ἐρυθρόλευκον πλακοῦντα. Συνίσταται ἐξ ἰνώδους ὕλης, χρωματιστικῆς ὕλης καὶ λίπους. Διὰ τῆς πύξεως ἀποχωρίζεται κιτρινωπὸς ὀρός, ὅστις ἐμπεριέχει σχεδὸν τὰ συστατικὰ τοῦ ὀροῦ τοῦ αἵματος· ἐν γένει ἀπαντῶνται εἰς τὴν λύμφην τὰ συστατικὰ τοῦ αἵματος, ὡς ἰνώδες μέρος, λεύκωμα καὶ τινα ἅλατα, ἐξαιρουμένου τοῦ ἐρυθροῦ χρώματος, ἢ τοῦλάχιστον εἰς μικρὰν ποσότητα.

Ἡ λύμφη ἐκ τῶν γαλακτοφόρων ἀγγείων τῶν κυνῶν εἶναι διαφανής, κιτρινωπή καὶ πήγνυται πρὸς πηκτώδες φύραμα, ἡ δὲ ἐκ τῶν λυμφα-
τικῶν ἀγγείων τοῦ σπληνὸς τοῦ ἵππου εἶναι ἀνοικτοσευθρὰ, διὰ τῆς θερ-
μότητος ἀποχωρίζεται, ἐπιμένοντος πεπηγότος ὁροῦ. Ἡ τοῦ προβάτου
λύμφη εἶναι ἄχρους, πήγνυται ὅχι ἐντελῶς, καὶ παρέχει ἐρυθρωπὸν πλα-
κοῦντα καὶ ἄχρους ὁρὸν εἰς τὴν λύμφην τὴν ἐκ τῶν λυμφατικῶν ἀγ-
γείων τοῦ λαίμου ἵππου τινὸς ληφθεῖσαν, εὐρέθησαν ἐκτὸς τῆς ἰνώδους
ὕλης καὶ τινων ἀλάτων, σχεδὸν 6 μέρη λευκώματος.

Τὰ εἰς τὸν ἀδένα τῶν νηπίων Glandula Thymus ἐμπεριεχόμενα ῥευστὰ
ἐξετάσθησαν καὶ ἐν αὐτοῖς εὐρέθησαν ἰνώδης ὕλη, λευκώμα, ὁσμοζώμιον,
φωσφορικὴ σόδα καὶ φωσφορικὴ τίτανος.

Ἡ ἀνθρώπινος λύμφη ἐξετασθεῖσα ὑπὸ τινων χημικῶν εἶναι 1,037
εἰδικῆς βαρύτητος, καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς ἰνώδους ὕλης ἔχει
ἐλαιώδη σύστασιν. Εἰς 100 μέρη ταύτης εὐρέθησαν :

Ἰδατος	96, 926
Λευκώματος	0, 434
Ἰνώδους ὕλης	0, 520
Ἐκχυλισματικῶν μορίων	0, 312
Λίπους κρυσταλλωσίμου καὶ ῥευστοῦ . .	0, 264
Ἵδροχλωρικῆς σόδας, ὕδροχλωρικοῦ κα- λίου, ἀνθρακικοῦ καὶ γαλακτικοῦ καλίου, φωσφορικῆς καὶ θεικῆς τιτάνου, ὀξειδίου τοῦ σιδήρου	1, 514

100.

Οἱ ἀδένες τοῦ λυμφατικοῦ συστήματος ἔχουν τὸ περίεργον ἰδίωμα νὰ
ἀπορροφῶσι διάφορα σώματα, τὰ ὅποια ἐπιτρίβονται ἐπ' αὐτῶν, καὶ ἐπ'
αὐτοῦ τοῦ ιδιώματος ἐπιστηρίζεται ἡ χρῆσις τῶν ἱατρικῶν διὰ τῆς ἐν-
δερματικῆς μεθόδου, λ. χ. ἡ μορφίνη ἐντριβεῖσα εἰς τὸ δέριμα διεγείρει
ὑπνον, ὡσὰν νὰ ἐμεταχειρίσθῃ ἐσωτερικῶς, ἡ ἐντριβεῖσα κινεῖται παύει τὸν
πυρρετὸν, ἡ ἐντριψις τοῦ δι' ὕδραργύρου ἀλείμματος πτυαλισμὸν κ. τ. λ.

Ἡ ἀπορροφητικὴ ιδιότης τῶν λυμφατικῶν ἀδένων δὲν παρεδέχετο
ἀπὸ πολλοὺς φυσιολόγους, οἵτινες ἐξηγοῦν καὶ τὰ προσεκτεθέντα φαινό-
μενα διὰ τοῦ Endosmose καὶ Exosmose, ἐμμυζήθους καὶ ἐκμυζήθους
οὕτως ὀνομάζουσι τὸ ἰδίωμα τῶν ζώντων καὶ σκληρῶν ὀργάνων τοῦ νὰ ἀφί-
γουν νὰ διέρχωνται διὰ τῶν πόρων τῶν διαλυθέντα σώματα. Ἐὰν π. χ. ὑπὸ

ὕδωρ ἀκριβῶς πληρωθεῖσα ὑέλινος φιάλη δεθῇ μετὰ βοείας κύστεως, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ μείνῃ κενόν τι διάστημα μεταξύ ὕδατος καὶ τῆς ἐπιτεθείσης κύστεως, καὶ τεθῇ ἐπὶ τῆς ἀνω ἐπιφανείας αὐτῆς ἄλλας τι, τότε τὸ διὰ τῶν πόρων τῆς κύστεως διερχόμενον ὕδατῶδες ὕδωρ διαλύει τὸ ἄλλας καὶ τὸ διάλυμα μεταδίδεται εἰς τὸ ὑπὸ τὴν κύστιν ὕδωρ τῆς φιάλης. Οὕτως ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἀπορρόφησης τῶν ἐντριφθέντων ἱατρικῶν.

Γάλα. Lac.

Κατὰ τὴν κυοφορίαν τῶν θηλικῶν μαστοπόρων ζώων ἀναπτύσσεται εἰς τοὺς μαστοὺς ἰδιαίτερός τις ἀδὴν, ὑπὸ τοῦ ὁποίου μετὰ τὴν γέννησιν ἀποκρίνεται τὸ γάλα, ῥευστὸν λευκόν, ἀδιαφανές, ὑπόγλυκον, ἔχον ἀσθενῆ ὀσμὴν καὶ προσδιοριζόμενον ὡς πρώτη τροφή τῶν νεογνῶν.

Ἡ ἀδιαφάνειά του ἀποδίδεται εἰς γαλακτώδη τινὰ ἔνωσιν τῆς τυρώδους ὕλης καὶ τοῦ βουτύρου, πλέουσιν εἰς τὸ ῥευστόν. Τὸ βόειον γάλα, περὶ οὗ κυρίως πρόκειται, ἐμπεριέχει, ἐκτὸς τῆς τυρώδους ὕλης καὶ τοῦ βουτύρου, ζάχαριν τοῦ γάλακτος, ἐκχυλισματικὰ μόρια, διάφορα ἅλατα, καὶ γαλακτικὸν ὀξύ εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν, ἕνεκα τοῦ ὁποίου ἐρυθροῦται παρὰ τοῦ νεαροῦ γάλακτος ὁ διὰ τοῦ καγκαμίνου κυανοῦς χάρτης. Εἰς τὸ μέχρι ξηροῦ ἐξχυμισθὲν γάλα εὐρίσκονται $\frac{100}{100}$ ξηροῦ ὑπολείμματος· δύναται δὲ νὰ ὑπάρξῃ σημαντικὴ διαφορὰ ὡς πρὸς τὸ τῶν συστατικῶν ποσὸν εἰς τὸ αὐτὸ ζῶον, προερχομένη ἀπὸ τὸ εἶδος καὶ ποσὸν τῆς τροφῆς καὶ ἀπὸ τοῦ ποτοῦ τὸ ποσὸν καὶ ποιόν.

Τὸ γάλα εἶναι ὀλίγον βαρύτερον ἀπὸ τὸ ὕδωρ, πηγνύται εἰς τὸν 0° R. καὶ ζεεῖ εἰς θερμοκρασίαν 80° R. Ἐὰν τὸ πρόσφατον γάλα θερμανθῇ μέχρι βαθμοῦ ζέσεως, σχηματίζεται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του ὑμὴν τις ἐκ τυρώδους ὕλης, ὅστις ἀφαιρεθεὶς ἀντικαθίσταται ταχέως δι' ἄλλου. Ἐὰν τὸ γάλα ζεσθῇ εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος, λαμβάνεται εἰς τὸ δοχεῖον ἄχρουν ῥευστόν, ἄχυμον, τὴν τοῦ γάλακτος ὀσμὴν ἔχον καὶ ὑποκείμενον εἰς ταχεῖαν σήψιν. Μετὰ τὴν τελείαν τοῦ γάλακτος ἐξάτμισιν ἐπιμένει κόνις ξηρὰ καλουμένη ἐκχύλισμα τοῦ γάλακτος ἢ Frangipane. Διὰ τῆς δι' ὕδατος τοῦ ἐκχυλίσματος τούτου λεπτύνσεως δύναται νὰ ἀποτελεσθῇ ῥευστὸν ὅμοιον τοῦ φυσικοῦ γάλακτος πλὴν τῆς ἀρωματικῆς ὁσμῆς· ἀφεθὲν τὸ γάλα εἰς συνήθη θερμοκρασίαν, εἴτε εἰς ἐλευθέρον ἀέρα ἢ εἰς κλεισμένα ἀγγεῖα, χωρίζεται εἰς διάστημα 24—48 ὥρων εἰς τρεῖς

στιβάδας ἐξ ὧν ἡ μὲν ἄνω στιβάς εἶναι ὑποκίτρινος, ἀδιαφανής καὶ λιπώδης, καὶ καλεῖται ἄνθος γάλακτος, συνισταμένη ἐξ ὅχως ἐκ βουτύρου, τυρώδους ὕλης καὶ τοῦ ὁροῦ τοῦ γάλακτος· ὑπ' αὐτὴν δὲ εὐρίσκεται ἄλλη λευκοτέρα, ὁμοίως ἀδιαφανής, ὅμως ὄχι λιπώδης, δηλ. τὸ τυρώδες μέρος· ἡ δὲ τρίτη στιβάς εἶναι ὑποκίτρινον καὶ διαφανές ρευστὸν, ἀσθενῶς τὸ τοῦ καγκαμίνου βάμμα ἐρυθρίζον καὶ καλούμενον ὁρὸς γάλακτος, Serum lactis.

Διὰ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ τοῦ γάλακτος πῆξις ἀναζέεται πρῶτον, καὶ ἀκολούθως καθ' ἑκάστην ἡμέραν θερμαίνεται μέχρι 50° R. οὕτω δύναται νὰ φυλαχθῇ τὸ γάλα διὰ τινας μῆνας εἰς νεαρὰν κατάστασιν, χωρὶς νὰ ὑπόκηται εἰς πῆξιν.

Ἡ τοῦ γάλακτος πῆξις δύναται νὰ ἐπιταχυνθῇ διὰ πολλῶν οὐσιῶν ὡς διὰ τῶν ὀξέων ἐνουμένων μετὰ τοῦ τυρώδους μέρους, πρὸς ἀδιάλυτον ἔνωσην, ὡς καὶ διὰ πολλῶν οὐδετέρων καὶ ἀδιαλύτων μεταλλικῶν ἀλάτων, π. χ. διὰ τοῦ ἀλικοῦ κασσιτέρου· ὁμοίως πῆγνυται διὰ τῶν θεικῶν ἀλάτων τῶν μετάλλων, διὰ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου καὶ ὑδραργύρου, ὡσαύτως διὰ τοῦ κόμμεως, τοῦ οἶνου πνεύματος καὶ διαφόρων φυτῶν. Ἐπίσης ἡ τοῦ τετάρτου στομάχου τοῦ μοσχάρου βλεννομεμβράνα χρησιμεύει πρὸς πῆξιν τοῦ γάλακτος, καὶ διὰ τὸν ῥηθέντα σκοπὸν ἐνταριχεύεται μεθ' ἁλάτος καὶ ἀρωμάτων. Ἡ πῆξις τοῦ γάλακτος προέρχεται εἰς τὴν ῥηθεῖσαν περίστασιν, ὄχι ἀπὸ τὰ ἐμπεριεχόμενα ὀξέα, ἀλλὰ ἀπὸ ἰδιαιτέραν τινὰ οὐσίαν καλουμένην Chymosin, ἥτις ἐκτὸς διαφόρων ἀλάτων εὐρίσκεται εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ στομάχου ἀποκρινομένην ἐλένναν. Διὰ τῆς ζέσεως τοῦ γάλακτος μετὰ τῶν εἰρημένων ὑλῶν ἐπιταχύνεται ἡ πῆξις αὐτοῦ. Ἐξ ἐναντίας ἐμποδίζουν τὰ ἀλκάλια οὐ μόνον τὴν τοῦ γάλακτος πῆξιν ἀλλὰ μεταφέρουσι καὶ τὸ δι' ὀξέων πεπηγμένον γάλα εἰς ὁμοιομερές τι ρευστὸν, διαλύοντα τὴν παρ' αὐτῶν ἀποχωρισθεῖσαν τυρώδη ὕλην. Τὰ ὀξέα τὰ πρὸς ἐπιτάχυνσιν τῆς τοῦ γάλακτος πῆξεως μεταχειριζόμενα, ἐὰν προστεθῶσιν εἰς θερμὸν γάλα, ἐνοῦνται μετὰ τῆς τυρώδους ὕλης, δι' ἧς συγχρόνως ἀποχωρίζεται καὶ τὸ βούτυρον, καὶ ἐπὶ τούτου θεμελιούται ἡ τοῦ ὁροῦ τοῦ γάλακτος κατασκευή· ὡς δὲ πρὸς τὸ μεταχειρισθὲν ὄξυ δὲν ὑπάρχει διαφορὰ, ἀρκεῖ μόνον νὰ προστεθῇ εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα, ἐπειδὴ τὸ τοῦ ὀξέος ὑπερτεροῦν ποσὸν μένει εἰς τὸ ρευστὸν, καὶ μόνον τὸ πρὸς πῆξιν ἀπαιτούμενον ἐνοῦται μετὰ τοῦ τυρώδους μέρους πρὸς ἀδιάλυτον ἔνωσιν. Διὰ μικροῦ ποσοῦ τοῦ εἰρημένου στομάχου δύναται νὰ πηχθῇ μέγα

ποσὴν γάλακτος· εἰς τοιαύτην περίστασιν εἶναι ὁ ὁρὸς γλυκὺς καὶ λέγεται Serum lactis dulce.

Πρὸς κατασκευὴν ὁροῦ καθαρωτάτου καὶ τῆς ἐν αὐτῷ ἐπιπλεούσης τυρώδους ὕλης ἀποχώρησιν, ἀναζέεται τὸ παρὰ τοῦ πεπηγμένου τυρώδους μέρους ἀποχωρισθὲν ῥευστὸν καὶ διυλίζεται μετὰ τεταραγμένου τῶν ὠν λευκώματος ὁ δὲ μετὰ τὴν διάλυσιν ληφθεὶς τοῦ γάλακτος ὁρὸς καλεῖται petit lait clarifié καθαρὸς ὁρὸς. Ὁ ὁρὸς ἔχει ὑποκίτρινον χρῶμα καὶ γλυκεῖαν γεῦσιν, ἐμπεριέχει ὀλίγον ποσὸν τυρώδους ὕλης διακελυμένης καὶ καταβυθιζομένης διὰ τοῦ τῶν κηκίδων βάμματος, ἔτι ἐμπεριέχει ζάχαριν τοῦ γάλακτος, καὶ γαλακτικὸν ὀξύ, ὁσμοζώμιον, διάφορα ἄλλα ἐκ γαλακτικῶν, ὑδροχλωρικῶν καὶ φωσφορικῶν ἐνώσεων συνιστάμενα.

Ὁ Berzelius ἀνεκάλυψεν εἰς 100 μέρη βοείου γάλακτος τὰ ἀκόλουθα συστατικά. Τυρώδους ὕλης ἀναμειγμένης μὲ βούτυρον 2, 600. Ζαχάρεως τοῦ γάλακτος 3, 500. Γαλακτικοῦ ὀξέος, γαλακτικῶν ἀλάτων καὶ ἐκχυλισματικῆς ὕλης 0, 600. Ἀλικοῦ καλίου, 0, 170. Φωσφορικοῦ καλίου 0, 025. Φωσφορικῆς τιτάνου, τιτάνου μὲ τυρώδη ὕλην καὶ ἔχνη ὀξειδίου σιδήρου 0, 230. Ὑδατος 92, 875. Ἐπειδὴ δὲ ἡ τυρώδης ὕλη, τὸ βούτυρον, τὸ γαλακτικὸν ὀξύ καὶ ἡ ζάχαρις τοῦ γάλακτος εἶναι τὰ κύρια αὐτοῦ συστατικά, προβαίνομεν εἰς τὴν ἐξέτασιν ἐκάστου ἰδιαιτέρως.

Τυρώδης ὕλη. Caseum. Matiere caseuse.

Πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ τυροῦ ἐκ τοῦ παρὰ τῶν ἐλαιωδῶν μορίων ἀποχωριζομένου γάλακτος, ἀναμειγνύεται μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος δι' ὕδατος κεκραμένου· τοῦτο ἐνούμενον μετὰ τοῦ τυροῦ τὸν καταβυθίζει· ὁ δὲ καταβυθισθεὶς τυρὸς ἐνούμενος μεθ' ὕδατος ἀποχωρίζεται ἐκ τοῦ ὁροῦ διὰ συνεχῶς ἀπολύσεως, ἀκολούθως ἀναμειγνύεται μετ' ἀνθρακικῆς βαρέας, δι' ἧς τὸ μετὰ τοῦ τυροῦ ἐνούμενον θεϊκὸν ὀξύ ἀποχωρίζεται πρὸς ἀδιάλυτόν τι ἄλλας, ὁ δὲ ἀποχωρισθεὶς τυρὸς διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ. Τὸ διυλισθὲν ῥευστὸν ἐξατμισθὲν σκεπάζεται μετὰ τινοῦ λευκοῦ ὑμένος, καὶ τὸ τυρώδες μέρος ἐπιμένει εἰς εἶδος κίτρινης μάζης διαλυσίμου εἰς τὸ ὕδωρ. Ὁ ἐκ τοῦ διαλύματος δι' ἐξατμίσεως ληφθεὶς καὶ ξηρανθεὶς τυρὸς εἶναι ἄχρουν καὶ ἀδιαφανὲς φύραμα, ὅμοιον μὲ τὸ ἀραβικὸν κόμμι, ἀμετάβλητον εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐρυθρίζον τὸ καγκάμι-

νον βάμμα. Εάν ένωθῇ μὲ οινόπνευμα, αποκαθίσταται ἀδιαφανὲς καὶ ὅμοιον τοῦ λευκώματος. Τὸ οινόπνευμα καὶ μάλιστα τὸ θερμὸν διαλύει τὴν τυρώδη ὕλην, ἥτις διὰ τῆς τοῦ διαλύματος, ἀποφύξεως, ἢ διὰ τῆς προσθήκης τοῦ ὕδατος καταβυθίζεται.

Ἡ τυρώδης ὕλη διαφέρει ἀπὸ τὸ λευκωμα ὡς καταβυθιζομένη ἐκ τοῦ διαλύματός της δι' ὀξικοῦ ὀξέος, δι' οὗ ἀναδιαλύεται εἰς ὑπερτεροῦν ποσόν.

Μετὰ τοῦ καλίου, νάτρου καὶ ἀμμωνίας ἡ τυρώδης ὕλη σχηματίζει εὐδιαλύτους κομμώδεις ἐνώσεις, μετὰ δὲ τῶν γαιῶν, καθὼς καὶ μετὰ τῶν ὀξειδίων τῶν μετάλλων, ἀδιαλύτους. Αἱ ῥηθεῖσαι ἐνώσεις τῆς τυρώδους ὕλης μετὰ τῶν διαφόρων ὀξειδίων δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ἀλατώδεις ἐνώσεις καὶ καλοῦνται τυρικά ἄλατα .λ. χ. τυρικός ὑδράργυρος, τυρικός χαλκός, τυρικός μόλυθος. *Caseas hydrargyrus*; *Caseas Cupricus*, *Caseas plumbicus*. ἀπολαμβάνονται δὲ, ἐάν τὸ ἀπὸ τὸ βούτυρον ἀποχωρισθὲν γάλα ἀναμιχθῇ μετὰ τῶν ἐκτεθέντων μεταλλικῶν ἢ γαιωδῶν ἀλάτων. Ἡ σκυτοδεψικὴ ὕλη καταβυθίζει τὴν τυρώδη ὕλην ἐκ τῆς εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οινόπνευμα διαλύσεώς της.

Εάν ὁ τυρὸς ἀποτεφρωθῇ, ὑπολείπεται τέφρα συνισταμένη ἐκ φωσφορικῆς καὶ καυστικῆς τιτάνου, ἀπὸ ἔχνη σιδήρου καὶ μαγνησίας.

Τὰ διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως ἀπολαμβανόμενα πτητικὰ μόρια ὁμοιάζουσι μὲ τὰ ἐκ τοῦ πηκτώματος λαμβανόμενα· τὸ γάλα φυσιολογικῶς θεωρούμενον εἶναι περίεργον διὰ τὸ σημαντικὸν ποσὸν τῆς ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένης φωσφορικῆς τιτάνου, καθότι αὐτὸ χρησιμεύει πρῶτη τροφὴ εἰς τὰ νεογνά καὶ δι' αὐτοῦ ἐπιταχύνεται ὁ σχηματισμὸς καὶ ἡ αὔξησις τῶν ὀστέων.

Ἡ πεπηγμένη τυρώδης ὕλη διαλύεται εἰς τὸ θεϊκὸν ὀξύ ἄκρατον πρὸς βαθὺ ἐρυθρόν, καὶ εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ πρὸς κίτρινον ῥευστὸν, εἰς δὲ τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ διαλύεται μετὰ τινὰς ἡμέρας ὑπὸ κυανοῦ χρώματος. Ἡ τυρώδης ὕλη διαλύεται καὶ ἀπὸ τὰ ἀλκάλια, εἰς ὀλίγον δὲ ποσὸν καὶ βραδέως παρὰ τῆς ἀμμωνίας.

Ἡ μὴ ἀκριβῶς ξηρανθεῖσα τυρώδης ὕλη ὑπόκειται εἰς σημαντικὰς μεταβολὰς, λαμβάνει δηλ. μὲ τὸν καιρὸν ἰδιαιτέραν ὀσμὴν, καὶ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον δριμεῖαν γεῦσιν· καὶ τοῦτα προέρχεται ἀπὸ τὸν σχηματισμὸν ἰδιαιτέρου τινὸς ὀξέος καλουμένου τυρικὸν ὀξύ· καὶ τινος ὀξειδίου ὀνομαζομένου ὀξειδίου τοῦ τυροῦ.

Τὸ τυρικὸν ὀξύ συνίσταται ἐκ τινος ζωϊκῆς ὕλης καὶ ἐξ ὀξικοῦ

όξέος. Τὸ δὲ τοῦ τυροῦ ὀξειδιον δύναται νὰ κατασκευασθῇ διὰ τῆς τοῦ προσφάτου τυροῦ ὑπὸ τὸ ὕδωρ σήψεως, δι' ἧς κατ' ὀλίγον διαλύεται. Τὸ διύλισθὲν ῥευστὸν, ἐξατμισθὲν μέχρι συστάσεως σερapiίου, πηγνυται πρὸς θρομβώδη μάζαν, διαλύσιμον κατὰ μέγα μέρος εἰς τὸ οἰνόπνευμα· τὸ δὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτον μέρος διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐάν τὸ ῥευστὸν ζεσθῇ μετὰ ζωάνθρακος καὶ ἐξατμισθῇ, ἀποτίθεται τὸ τοῦ τυροῦ ὀξειδιον εἰς ἐλαφροὺς καὶ λευκοὺς κρυστάλλους. Ἡ ὕλη αὕτη καλεῖται παρὰ τοῦ Braconot Aposepedin, καὶ σχηματίζεται διὰ τῆς σήψεως. εἶναι δὲ εὐθραστός, τρίζει μεταξὺ τῶν ὀδόντων, εἶναι ἄοσμος, ἔχει πικρὰν γεῦσιν, θερμαινομένη ἐντὸς σίφωνος ἐξαχνίζεται κατὰ μέγα μέρος εἰς εἶδος λεπτῶν ἀγγιδίων. Ἐάν καθυποβληθῇ εἰς ξηρὰν ἀπόστειξιν, ἐκλύει ἀνθρακικὴν καὶ ἐνθεῖον ἀμμωνίαν καὶ ἔλαιον λιποειδοῦς συστάσεως. συνίσταται δὲ ἐκ :

Νιτρογόνου	21, 381
Ἀνθρακος	59, 781
Ἵδρογόνου	7, 429
Ὄξυγόνου	11, 409
	100.

Βούτυρον.

Beure. Matiere bulireuse.

Τὸ βούτυρον εἶναι τὸ κυριώτερον συστατικὸν τοῦ ἄνθους τοῦ γάλακτος, δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὴν τυρώδη ὕλην, ἐάν ἀνακινήται εἰς κεκλεισμένα ἀγγεῖα ἢ εἰς μέρος κενὸν ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἢ πεπληρωμένον ἀπὸ ἄλλα αἲρια. Ἡ πράξις αὕτη δύναται νὰ θεωρηθῇ μόνον ὡς μηχανικὴ, καθότι δὲν ἀπορρόφᾶται ὀξυγόνον· τὸ ἐπιμένον ὑπ' λευκὸν καὶ ὑπόξυγον ῥευστὸν, ἀφοῦ διὰ τῆς ἀνακινήσεως τοῦ γάλακτος ἀπεχωρίσθῃ τὸ βούτυρον, ἐμπεριέχει τὴν τυρώδη ὕλην καλουμένην βουτυρώδες γάλα.

Τὸ πρόσφατον καὶ καλῶς ἀποπλυθὲν βούτυρον ἐμπεριέχει πάντοτε τυρώδη τινὰ μόρια καὶ ὀρόν τοῦ γάλακτος, ἅτινα δύνανται νὰ ἀποχωρισθῶσι διὰ τῆς τοῦ βουτύρου τήξεως. Τὸ διατελυμένον καὶ διὰ τῆς καταβυθίσεως μεταγγιζόμενον βούτυρον δύναται νὰ διατηρηθῇ πολὺν καιρὸν χωρὶς νὰ ταχγίσῃ, ἐάν εἰς αὐτὸ προστεθῇ ἄλας. Τὸ διὰ τῆς τήξεως καθαρισθὲν βούτυρον σύγκειται ἐκ στέατος, μαργαρώδους ὕλης,

κιτρίνης βαφικῆς ὕλης, ἀρωματικῆς οὐσίας καὶ βουτυρικοῦ ὀξέος, οὗτινος ἡ παρουσία εἶναι τὸ αἷτιον τῆς ἐρυθρώσεως τοῦ βάρμματος τοῦ καγκαμίνου. Τὸ ταχὲν βούτυρον πηγνύται εἰς 32° R. ὁ Chevreuil ἀπεχώρισεν ἐκ τοῦ βουτύρου ἰδιαιτέρον λίπος καλούμενον κατὰ τὸν ἐφευρετὴν *βουτυρίνη*, *Butirin*, ἢ λίπος τοῦ βουτύρου. Πρὸς κατασκευὴν τούτου φυλάττεται τὸ ταχὲν βούτυρον διὰ τινος ἡμέρας εἰς μέρος ἔχον θερμοκρασίαν 19° R. ἀκολούθως μεταγγίζεται τὸ ρευστὸν ἀπὸ τὸ ἀποχωριζόμενον στέαρ, τὸ δὲ ὑγρὸν σύγκειται ἐκ τοῦ λίπους τοῦ βουτύρου (*Butirin*) καὶ ἐλαίνης (*Elain*). Ἐπειδὴ τὸ λίπος τοῦ βουτύρου εἶναι εὐδιαλυτώτερον εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀπὸ τὴν ἐλαίνην, διὰ τοῦτο ἀναταράσσεται μὲ ἴσην ποσότητα οἰνοπνεύματος O, 795 εἰδικῆς βαρύτητος, δι' οὗ διαλύεται σχεδὸν μόνον τὸ λίπος· ἀφοῦ ἀκολούθως ἀποσταχθῇ τὸ οἰνόπνευμα, ἐπιμένει τὸ λιπῶδες μέρος, ἢ ἡ *βουτυρίνη*. Ἡ *βουτυρίνη* παρουσιάζεται εἰς εἶδος ὑποκιτρίνου ἐλαίου, ἔχει O, 908 εἰδικὴν βαρύτητα· πηγνύται, ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς θερμοκρασίαν τοῦ 0° R ἔχει τὴν ὁσμὴν τοῦ θερμαινόμενου βουτύρου· ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὸν ἀέρα, ταγγίζει καὶ κοκκινίζει τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου, καὶ τοῦτο ἐξ αἰτίας τοῦ σχηματισμοῦ ἰδικιτέρου ὀξέος, δηλ. τοῦ βουτυρικοῦ. Ἡ ὕλη αὕτη διαλύεται ἀπὸ τὸ καυστικὸν κάλιον, μεταβαλλομένη εἰς σάπωνα, δι' οὗ σχηματίζεται βουτυρικὸν ὀξύ.

Ἐὰν διὰ τοῦ καυστικοῦ καλίου ἐπὶ τῆς βουτυρίνης σχηματισθῇ σάπων, καὶ ἀναμιχθεῖς μετὰ τρυγικοῦ ὀξέος ἀποσταχθῇ, ἐξέρχονται τρία διάφορα ὀξέα καλούμενα βουτυρικὸν ὀξύ, αἰγικὸν ὀξύ καὶ τραγικὸν ὀξύ. Τὸ βουτυρικὸν ὀξύ εἶναι ἄχρουν ρευστὸν, ὅμοιον τὴν σύστασιν μὲ τὰ αἰθέρια ἔλαια, ἔχει πολλὰ διαπεραστικὴν καὶ ὀξειαν ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ ταγγίζοντος βουτύρου, εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν αἰθέρα· ἐνούμενον μετὰ τῶν βάσεων σχηματίζει ἰδιαιτέρα ἅλατα. Ἐὰν ἡ βουτυρικὴ βαρεῖα ἀποσταχθῇ, ἀπολαμβάνεται ἐλαῖον τι δυσῶδες καὶ μέλαν, δυνάμενον νὰ καθαρισθῇ δι' ἀποστάξεως ἐπὶ κεκαυμένης τιτάνου ἢ ὑδροχλωρικῆς τιτάνου καὶ καλούμενον *Butyron*. Εἶναι δὲ λεπτόρρευστον, διαυγές, ἐλαφρότερον τοῦ ὕδατος καὶ καίει μὲ λαμπρὰν φλόγα· ὅμοια χαρακτηριστικὰ ἔχουσιν καὶ τὰ ἄλλα δύο ὀξέα, τὸ αἰγικὸν δηλ. καὶ τὸ τραγικὸν ὀξύ.

Γαλακτικὸν ὀξύ. Acide lactique.

Τὸ ὀξύ τοῦτο ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Scheele εἰς τὸ γάλα, μολονότι

εἰς πολλὰ ὀλίγην ποσότητα εἰς τὸ πρόσφατον γάλα. Αὐξάνει ὅμως τὸ ποσὸν μετὰ τινὰς ἡμέρας διὰ τῆς τοῦ γάλακτος ζυνίσεως· μέρος τοῦ ὀξέος ἐνοῦται μετὰ τοῦ τυροῦ συντείνον εἰς τὴν πῆξιν του, τὸ δὲ περισσότερον ἐπιμένει διακλυμένον εἰς τὸν ὀρόρον.

Τὸ ὀξύ τοῦτο ἀπαντᾷται εἰς πολλὰς φυτικάς οὐσίας, λ. χ. εἰς τὰ ἐμετικά κάρυα, εἰς τὸν ὀξυνίζόμενον ζωμὸν τῶν τεύτλων, ἐπίσης καὶ εἰς ἄλλας ζωϊκὰς οὐσίας, καθὼς εἰς τοὺς μῦας, εἰς τὸν ἰδρωτα, εἰς τὸ οὖρον κ.τ.λ. ἔτι δὲ σχηματίζεται διὰ πολλῶν ὀργανικῶν ὑλῶν ὀξύνισις ἐπιδεκτικῶν, καθὼς διὰ τοῦ τῶν ἀμυγδαλῶν γαλακτώματος, ἐγγύματος τινος συνισταμένου ἐξ ἀλεύρου ὀρύζης, βρωμίου καὶ βεβινθίων. Τὸ ἐξ ἀλεύρου τῆς ὀρύζης μεθ' ὕδατος σχηματιζόμενον ὀξύ ἐκλήθη ὀξύ τῆς ὀρύζης.

Τὸ τοῦ γάλακτος ὀξύ θεωρεῖτο πολὺν καιρὸν ὡς ἔνωσις τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος μετὰ τινος ζωϊκῆς ὕλης, τὰ δὲ ἰδιαιτέρᾳ του χαρακτηριστικὰ ἀνεκαλύφθησαν καὶ ἀπεδείχθησαν πρὸ ὀλίγου.

Τὸ τοῦ γάλακτος ὀξύ εἶναι ἄχρουν ρευστὸν, σεραποσιδὲς τὴν σύστασιν, ἄοσμον καὶ ὀξύ τὴν γεῦσιν, ἐξατμίζεται σχεδὸν μέχρι ξηροῦ, καὶ ἀπορροφῶν ὑγρασίαν ἐκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος δι' ὑγραίνεται· ἐὰν θερμανθῇ, ἐξοιδαίνεται καὶ λαμβάνει φαιὸν χροῶμα, καὶ ἐκλύει ἐμπυρευματικούς ἀτμούς, οἵτινες συνίστανται ἀπὸ ὀξικὸν ὀξύ καὶ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον. Πρὸς τούτοις ἐξαχνίζονται κρύσταλλοι εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς κερατίνης οἵτινες διαλυθέντες εἰς οἰνόπνευμα παρέχουσιν λαμπρίζοντα φυλλίδια· οἱ κρύσταλλοι οὗτοι εἶναι τὸ *πυρογαλακτικὸν ὀξύ*, *Acidum pyrolacticum*. Τοῦτο τὸ ὀξύ διαφέρει ἀπὸ τὸ γαλακτικόν, διότι κρυσταλλοῦται εὐκολώτατα.

Τὰ γαλακτικά ἅλατα μέχρι τοῦδε ὀλίγον μόνον γνωρίζονται· τὰ διὰ τῆς ἐξουδετερώσεως τοῦ γαλακτικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων ἀποτελούμενα ἅλατα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ κατὰ μέγα μέρος εἰς τὸ οἰνόπνευμα, ἐκτὸς τῆς γαλακτικῆς μαγνησίας καὶ τοῦ γαλακτικοῦ ψευδαργύρου· ἐκ τῶν γαλακτικῶν ἀλάτων εἰσῆχθη πρὸ ὀλίγου εἰς χρῆσιν τῆς ἱατρικῆς ὁ γαλακτικὸς σίδηρος, *Ferrum lacticum* ὅστις ἀποτελεῖται, ἠνωμένος μετὰ ἐκχυλισματικῆς ὕλης ἐὰν ὁ ὀξυνίζόμενος ὀρόρος τοῦ γάλακτος κατεργασθῇ μετὰ ῥινισμάτων τοῦ σιδήρου. Τὸ ἀποτελούμενον διάλυμα ἐξατμίζόμενον παρέχει κομμώδη μάζαν.

Ζάχαρις τοῦ Γάλακτος. Saccharum Lactis

Ἐπειδὴ ἡ ζάχαρις αὕτη μὴ ὑποκειμένη εἰς ζύμωσιν δὲν ἔχει τὰ

τῆς ζαχάρως χαρακτηριστικὰ, ἐπροτάθη νὰ καλεσθῇ *Lactin*. Ἡ ζάχα-
ρις αὕτη εὑρίσκεται εἰς τὸ γάλα τῶν μαστοφόρων ζώων, καὶ συντείνει
τὰ μέγιστα διὰ τὴν τροφὴν τῶν νεογνῶν. Τὸ ποσὸν τῆς ἐμπεριεχομένης
ζαχάρως διαφέρει εἰς τὰ διάφορα ζῶα καὶ μεταβάλλεται κατὰ τὰς πε-
ριστάσεις. Κατὰ τὰς ἀναλύσεις τῶν διαφόρων ἀλάτων ἡ μεγαλύτερα πο-
σότης ἐμπεριέχεται εἰς τὸ γάλα τῶν γυναικῶν, ἡ δὲ ὀλιγωτέρα εἰς τὸ
γάλα τῶν κυνῶν.

Κατασκευάζεται εἰς τὴν Ἑλβετίαν ἀπὸ τοὺς ποιμένας ἀπὸ τὸν τοῦ
νεαροῦ γάλακτος ὁρρόν διὰ τῆς ἐξατμίσεως καὶ κρυσταλλώσεως. Ἡ λη-
φθεῖσα κρυσταλλώσιμος μάζα εἶναι ἀκάθαρτος ζάχαρις, διὰ δὲ δευτέ-
ρας διαλύσεως καὶ κρυσταλλώσεως καθαρίζεται. Ἡ τοῦ γάλακτος ζάχαρις
εἶναι πυκνὴ, κρυσταλλώδης, λευκὴ, σκληρὰ, τρίζει μεταξὺ τῶν ὀδόντων,
εἶναι ὑπόγλυκος, διαλύσιμος εἰς ὀκτὼ μέρη ὕδατος, εἰς δὲ τὸ οἰνόπνευμα
καὶ τὸν αἰθέρα ἀδιάλυτος. Ἐὰν τεθῇ ἐπὶ διαπύρου σιδήρου, καίει μετὰ λευ-
κῆς φλογὸς καὶ ὑπολείπει πλείοντον ποσὸν ἄνθρακος παρὰ τὴν κοινὴν
ζάχαριν. Ἡ ζάχαρις τοῦ γάλακτος ἀπορροφᾷ μετὰ βραδύτητος ἀρκε-
τὸν ποσὸν ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἀεροειδοῦς καὶ μεταβάλλεται παρ' αὐτοῦ
εἰς τεφρόχρουν καὶ ξηρὰν κόνιν, ἐξ ἧς τὸ εἰρημένον ἀέριον ἐκλύεται,
ἐὰν ἐπιχυθῇ μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου.

Ἡ τοῦ γάλακτος ζάχαρις ἐὰν διαλυθῇ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἀναμιχθῇ μὲ
ζύμην, δὲν ὑπόκειται εἰς οἰνώδη ζύμωσιν· ἐὰν ζεσθῇ μετὰ θεϊ-
κοῦ ὀξέος καὶ μὲ τὸ ἀρκούν ποσὸν ὕδατος, ἡ καὶ δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος
κεκραμένου, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξουδετερωθῇ διὰ τινων βάσεων, ἐπιμένει
ῥευστὸν, γλυκὺ τὴν γεῦσιν, τὸ ὁποῖον ὁμῶς ἀναμιγνύμενον μετὰ ζύμης
ὑπόκειται εἰς οἰνώδη ζύμωσιν. Διὰ συνεχοῦς ζέσεως τῆς ζαχάρως τοῦ
γάλακτος μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος, μεταβάλλεται εἰς μηλικὸν, ὀξαλικὸν καὶ
εἰς ἰδιαιτερόν τι ὀξύ, ζαχαρογαλακτικὸν ὀξύ καλούμενον.

Ἡ κρυσταλλωμένη ζάχαρις τοῦ γάλακτος ἐμπεριέχει 88 μέρη ξηρᾶς
ζαχάρως καὶ 18 ὕδατος, καὶ συνίσταται ἐκ τῶν ἐξῆς συστατικῶν :

Ὑδρογόνου 6, 00

Ὄξυγόνου 48, 06

Ἀνθρακος 45, 94

100.

Χρῆσις. Εἰς τὴν ἰατρικὴν πρὸς ἐσωτερικὴν χρῆσιν καθ' ὃν καιρὸν
ἡ τιμὴ τῆς καλαμοζαχάρως εἶχεν πολὺ ἀναβῆ, μετεχειρίσθησαν τὴν ζά-
χαριν τοῦ γάλακτος πρὸς νόθευσιν· ἡ δὲ νόθευσις αὕτη δύναται νὰ ἐξι-

χνευθῇ διὰ τοῦ οἶνοπνεύματος, δι' οὗ διαλύεται ἡ κοινὴ ζάχαρις οὐχὶ δὲ καὶ ἡ τοῦ γάλακτος· εὐκολώτερα δὲ δύναται νὰ ἐξιχνευθῇ διὰ τῆς διαλύσεως τῆς ζαχάρους τοῦ γάλακτος, δι' ἧς διαλύεται ἡ καλαμοζάχαρις, οὐχὶ δὲ καὶ ἡ τοῦ γάλακτος.

Περὶ τῶν ἐκχυλισματικῶν ὑλῶν τοῦ γάλακτος.

Εἵπομεν ὅτι ὁ τοῦ γάλακτος ὁρρὸς ἐμπεριέχει, ἐκτὸς τῶν διαφορῶν ὑδροχλωρικῶν καὶ φωσφορικῶν ἀλάτων, καὶ ἐκχυλισματικὴν τινα ὑλὴν. Πρὸς ἀποχώρησιν δὲ ταύτης ὁ ὁρρὸς ἐξατμίζεται μέχρι συστάσεως σερραπίου· ἀφοῦ ἡ ἐνυπάρχουσα ζάχαρις τοῦ γάλακτος κρυσταλλωθῇ, ἐκχυλίζεται τὸ ἐπιμένον ῥευστὸν δι' οἶνοπνεύματος O, 833 εἰδικῆς βαρύτητος, δι' οὗ διαλύεται ἡ τοῦ γάλακτος ἐκχυλισματικὴ ὑλὴ, ἐξατμισθέντος δὲ τούτου τοῦ ῥευστοῦ, ἐπιμένει ἡ τοῦ γάλακτος ἐκχυλισματικὴ ὑλὴ, ὁμοιάζουσα τὰ μέγιστα μὲ τὸ ὁσμοζώμιον τοῦ κρέατος.

Τὰ περὶ τοῦ γάλακτος ῥηθέντα ἀνήκουσιν ὄχι μόνον εἰς τὸ βόειον γάλα, ἀλλ' ἐν γένει εἰς ὅλα, ἐπεὶδὴ τὰ αὐτὰ συστατικὰ ὑπάρχουσιν εἰς ἅπαντα τὰ τοῦ γάλακτος εἶδη. Πρὸς τούτοις σχεδὸν ἕκαστον εἶδος γάλακτος περιέχει ἰδιαιτέρον ἄρωμα, ἐξ οὗ δύναται νὰ γνωρισθῇ.

Γάλα τῶν γυναικῶν. Εἶναι λεπτότερον καὶ γλυκύτερον ἀπὸ τὸ βόειον καὶ ἀποθέτει ἄνθος τοῦ γάλακτος, ἐξ οὗ δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ βούτυρον· δὲν πήγνυται τόσον εὐκόλως καθὼς τὸ βόειον, καὶ ἂν ἀναμιχθῇ μετ' ὀξέων καὶ ἀλάτων. Τὸ γάλα τοῦτο ἐμπεριέχει 11—12 τοῖς ἑκατὸν στερεῶν οὐσιῶν, ἐν γένει ὁμοίων μὲ τὰς τοῦ βοείου γάλακτος, ἀλλ' εἰς ἄλλας καὶ διαφορὰς ἀναλογίας· τὸ γάλα τῶν πρωτογεννουσῶν γυναικῶν ἐμπεριέχει μέγα ποσὸν βουτύρου καὶ ὀλίγον τυρὸν, καὶ τοιοῦτον εἶναι ἰδίως τὸ τινὰς ἡμέρας μετὰ τὴν γέννην ἀποκρινόμενον πρωτόγαλα, Colostrum, καλούμενον.

Γάλα τῆς ἵππου. Ὡς πρὸς τὴν σύστασιν εἶναι μετὰ τοῦ γάλακτος τῶν γυναικῶν καὶ τοῦ βοός, ἐμπεριέχει μόνον ὀλίγον καὶ δυσκόλως εἰς βούτυρον μεταβαλλόμενον ἄνθος τοῦ γάλακτος, ἐξ ἐναντίας δὲ ἀρκετὸν ποσὸν ζαχάρους τοῦ γάλακτος, καὶ θειικὴν καὶ ὑδροχλωρικὴν τίτανον.

Γάλα τῆς ὄνου. ἔχει ὁμοιότητα μὲ τὸ τῆς γυναικὸς γάλα, καὶ ἐκ τοῦ ἄνθους δύναται ν' ἀποχωρισθῇ βούτυρον λευκὸν καὶ ἄσμον. Τὸ γάλα τοῦτο, καθὼς καὶ τὸ τῶν ἵππων, ὑπόκειται εὐκόλως εἰς οἰνώδη ζύμωσιν, καὶ ἕνεκα τούτου κατασκευάζεται ἐξ αὐτοῦ εἰς τὴν Περσίαν καὶ Ταρταρίαν

μεθυστικὸν ποτὸν καλούμενον *Kumis*. Εἰς τὴν ἐκτεθεισαν οἰνώδη ζύμωσιν δὲν ὑπόκειται τὸ βόειον γάλα, ἢ τοῦλάχιστον μόνον εἰς ἀσθενῆ βαθμὸν ὥστε ἐξ αὐτοῦ τοῦ φαινομένου δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ἐμπεριέχεται ζάχαρις εἰς τὸ τῆς ἵππου καὶ τῆς ὄνου γάλα, καὶ ὅτι ἡ ἐνυπάρχουσα ζάχαρις μετεβλήθη εἰς ἕτερον ζαχάρεως εἶδος ἐπιδεκτικὸν ζυμώσεως.

Γάλα τῶν προβάτων. Περιέχει ἄνθος ὑποκίτρινον, ἐξ οὗ δύταται ν' ἀποχωρισθῇ βούτυρον κιτρινίζον, μαλακὸν καὶ ὑποκειμένον εἰς ταγκίσις. Ὁ ἐκ τοῦ γάλακτος τῶν προβάτων κατασκευαζόμενος τυρὸς εἶναι πολλὰ λιπώδης.

Γάλα τῶν αἰγῶν. ἔχει πλειοτέραν σύστασιν ἀπὸ τὸ βόειον, δὲν εἶναι ὀξύνην, ἀλλὰ γίνεται ὑπόξυνον διὰ τῆς ἐξατμίσεως· τὸ ἐκ τοῦ ἄνθους ἀποχωριζόμενον βούτυρον ἐμπεριέχει ἰδιαίτερον ὀξύ καλούμενον ὀξύ τῶν αἰγῶν, καὶ μεταδίδει εἰς τὸ γάλα ἰδιαίτερον ὀσμήν.

Συστατικὰ τοῦ γάλακτος ἐρίοτε ἀπαιτούμενα.

Καθὼς τὸ οὖρος διὰ διαφορῶν τροφίμων δύναται νὰ προσλάβῃ ἑκτακτικὰ συστατικὰ, οὕτω συμβαίνει καὶ εἰς τὸ γάλα, καὶ συνήθως ἀπαντῶνται εἰς αὐτὸ αἱ αὐταὶ οὐσίαι, αἱ ὁποῖαι καὶ εἰς τὸ οὖρος· οὕτω λ. χ. διὰ τῆς ἀμύνης λαμβάνει καὶ τὸ γάλα πικρὰν γεῦσιν, διὰ τῆς τροφῆς τῆς ἡρακλείας πόας, *Herba gratiolae* καὶ πολλῶν εἰδῶν τοῦ ἐφοβίου ἀποκαθίσταται τὸ γάλα ἐκκοπρωτικόν· διὰ τῆς τροφῆς διαφορῶν σκοροδοειδῶν φυτῶν λαμβάνει καὶ τὸ γάλα ἰδιαίτερον ὀσμήν καὶ γεῦσιν ὡς τὴν τοῦ σκοροδοῦ· ἐὰν εἰς τὴν τῶν βοῶν τροφήν ἐμπεριέχεται ἐρυθρόδανον, κρόκος, ἢ εὐδιάλυτος βαφικὴ ὕλη τοῦ Ἰνδικοῦ, χρωματίζεται τὸ γάλα ἐρυθροῦν, ἢ κίτρινον, ἢ κυανῶν ἀπὸ τῆς τροφῆς διαφορῶν φυτῶν ἐμπεριεχόντων πτητικὰ ἔλαια λαμβάνει καὶ τὸ γάλα τὴν τῶν αἰθερίων ἐλαίων ὀσμήν καὶ γεῦσιν. Οὐκ ὀλίγην ἐπιρροὴν ἐπὶ τῆς ποιότητος καὶ ἐπὶ τῆς ἀναλογίας τῶν ἐμπεριεχομένων συστατικῶν τοῦ γάλακτος τῶν γυναικῶν ἔχουν αἱ ψυχικαὶ καταστάσεις, ὡς φόβος, λύπη, ἀδιαθεσία, καὶ ἡ μεταβολὴ αὕτη τοῦ γάλακτος δηλοῦται ταχέως διὰ διαφορῶν, καὶ πολλάκις κινδυνωδῶν ἀσθενειῶν τῶν παίδων. Ὡσαύτως μεταβαίνουνσι διάφορα ἄλατα εἰς τὸ γάλα, λ. χ. τὸ κοινὸν ἅλας καὶ ἡ ἀνθρακικὴ πότασσα, ὅχι ὅμως θεικῶν νάτρων, εἰς ἐλάχιστην δὲ ποσότητα ἀπαντᾶται καὶ τὸ ὑδριωδικὸν κάλιον, ἐὰν αὐτὸ δοθῇ εἰς μεγάλην ποσότητα· δὲν εὐρίσκονται ὅμως ἡ νιτρικὴ

πότασσα καὶ τὰ θειοῦχα ἀλκάλια· τὰ ἅλατα τοῦ σιδήρου, τοῦ ψευδαργύρου καὶ τοῦ βισμούθιου μόνον εἰς μικρὰν ποσότητα εὐρίσκονται, διόλου δὲ ὑδράργυρος καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ.

Αἱ διαφοροὶ ἀλλοιώσεις τοῦ γάλακτος ὡς πρὸς τὴν σύστασιν, τὸ χρῶμα καὶ τὰ λοιπὰ χαρακτηριστικά, ἅτινα ἐπαρατηρήθησαν ὑπὸ τῶν παθολόγων, δὲν ἐξετάσθησαν εἰσέτι χημικῶς.

Χρῆσις. Ἀρκετὰ γνωστὴ εἶναι ἡ χρῆσις τοῦ γάλακτος πρὸς τροφήν. Τὸ καλοκαίριον ὑπόκειται τὸ γάλα εὐκόλως εἰς ὀξίνισιν, καὶ τότε ζέονμενον πῆγνυται. Ἡ τοῦ γάλακτος πῆξις δύναται νὰ ἐμποδισθῇ διὰ τῆς τοῦ γαλακτικοῦ ὀξέος ἀκριβοῦς κόρου διὰ διαλύματος ἀνθρακικῆς σόδας. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν προσθέτομεν ὑπὸ συνεχῇ ἀνακίνησιν, καὶ κατὰ σταλαγμὸν τοῦ ῥηθέντος διαλύματος τόσον, ὅσον ἀρκεῖ πρὸς ἐντελῇ τοῦ γάλακτος ἐξουδετέρωσιν. Τὴν τοῦ γάλακτος μετὰ τοῦ ὕδατος νόθευσιν γνωρίζομεν, ἐὰν τεθῇ σταγὼν τοῦ γάλακτος ἐπὶ τοῦ ὄνυχος τοῦ δακτύλου· ἐὰν ὁ σταγὼν μένῃ ὑψωμένος θεωρεῖται τὸ γάλα ἀνόθευτον, διαχεομένου δὲ τοῦ σταγόνος, νοθευμένον· διὰ νὰ μὴ φανῇ ἡ κράσις τοῦ γάλακτος μὲ ὕδωρ, ἀναμιγνύουσιν ἐνίοτε τὸ γάλα μὲ ζέον ἀφέψημα τῆς ὀρύζης, καὶ ἡ νόθευσις αὕτη ἀνακαλύπτεται διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰώδους, δι' οὗ χρωματίζεται κυανοῦν· ἄλλαι νοθεύσεις μετὰ γαλακτωμάτων τοῦ σπέρματος τῆς μηκῶνου καὶ κανάβεως ἀνακαλύπτονται διὰ τῆς ὁσμῆς καὶ γεύσεως. Εἶναι χρήσιμον πρὸς κατὰσκευὴν τοῦ βουτύρου, τυροῦ, τοῦ ὀρέου καὶ τῆς ζαχαρέως τοῦ γάλατος, καὶ πρὸς καθαρισμὸν θολῶν ῥευστῶν. Ὡσαύτως μετεχειρίσθησαν τὸ ζέον γάλα μεμιγμένον μετὰ τῆς τιτάνου πρὸς χρωματισμὸν.

Χολή. Bile. Fiel. Fel.

Ἡ χολὴ εἶναι ῥευστὸν ἀποκρινόμενον εἰς τὸ ζῶϊκὸν σῶμα διὰ τοῦ ἥπατος, καὶ διερχόμενον διὰ μικρῶν ὀχετῶν τῶν χοληδόχων πόρων εἰς τὴν δωδεκαδάκτυλον ἀπόφυσιν, συνάγεται εἰς τὴν κύστιν τὴν χοληδόχον λεγομένην· τὴν κύστιν ταύτην δὲν ἔχουσιν ἅπαντα τὰ ζῶα χ. π. ἡ ἔλαφος, ὁ ἐλέφας, οἱ ἔλμινθες καὶ τὰ ἔντομα. Ἐπειδὴ ἡ τῶν βοῶν χολὴ δύναται νὰ προμηθευθῇ εὐκολώτερον τῶν ἄλλων, διὰ τοῦτο ἅπασαι αἱ δοκιμαὶ ἐγίναν ἐπ' αὐτῆς. Ἡ χολὴ εἶναι κιτρινοπράσινον ῥευστὸν, γλίσχρον καὶ πηκτὸν τὴν σύστασιν, ἀφρίζει ὡς ἡ τοῦ σάπωνος διάλυσις ταραχθεῖσα, ἔχει ἰδιαιτέραν ἀηδῆ ὁσμὴν· τινῶν ζῶων ἡ χολὴ ἐξατμισθεῖσα μέχρι ξηράναι

σεως ἢ ἀποσυντεθεῖσα ἐκπέμπει ἰδιαίτεραν ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ μόσχου. Ἡ γεῦσίς της εἶναι πικρά καὶ ὀλίγον κεντητική, διὰ τῆς ἀναξέσεως δὲν πήγνυται, ἐξατμισθεῖσα δὲ ἐντελῶς ἀφίνει $\frac{1}{3}$ ὑπολείμματος καὶ ξηρανθεῖσα δύναται νὰ φυλαχθῇ διὰ πολὺν καιρόν. Ἡ ἐξατμισθεῖσα ἐβόιος χολὴ εἶναι ἐν χρήσει εἰς τὴν ἱατρικὴν καὶ γνωστὴ ὑπὸ τὸ ὄνομα *χολὴ ταυρεῖα πεπυκνωμένη*, *Fel tauri inspissatum*. Ἐὰν ἀποσταχθῇ ἐξέρχεται ἄχρουν ρευστὸν λαμβάνον μετὰ τινα καιρὸν ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ μόσχου. Ἐνεκα τῶν ὠφελίμων αὐτῆς καὶ ἀναγκαίων ἐπὶ τοῦ ζῶντος σώματος ἐνεργειῶν καθυπεβλήθη πολλάκις καὶ παρὰ πολλῶν χημικῶν εἰς χημικὰς ἀναλύσεις. Οἱ πρόγονοι ἡμῶν τὴν ἐθεώρησαν ὡς σαπωνώδη ἔνωσιν ῥητινώδους τινὸς ὕλης.

Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ἔγινεν ἡ τῆς χολῆς ἀνάλυσις παρὰ τοῦ Thenard, Berzelius καὶ Gmelin· ὅμως τὰ τόσον ἀλλήλων διαφέροντα ἀποτελέσματα ἐπροξένησαν ἀρκετὴν σύγχυσιν εἰς τὰς περὶ τῆς φύσεώς της θεωρίας. Ἡ τῆς χολῆς χημικὴ ἀνάλυσις δύναται νὰ γένῃ διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἢ διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, καὶ δι' ἀμφοτέρων δὲ ἀποχωρίζονται διάφορα ὀξέα καὶ διάφοροι βαφικαὶ ὕλαι. Ἐσχάτως ἀνεκαλύφθησαν τρία διαφορετικὰ ὀξέα *Acidum cholicum, cholanicum et fellanicum* καλούμενα.

Διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς καὶ τῆς καθαρᾶς βαρείας ἀποχωρίζονται καὶ διάφοροι βαφικαὶ ὕλαι, τουτέστι τὸ *χολόχλωρον* *Choloverdin*, τὸ *χολόφαιον* *Biliphain*, καὶ τὸ *χολόκίτριον* *Bilifulvin*. Πρὸς τούτοις ἀποχωρίζεται καὶ ἰδιαίτερα τις ἀδιάλυτος ὕλη *Dyslysin δυσδιάλυτος ὕλη* τῆς χολῆς καλουμένη, ἥτις εἰς πολλὰς περιστάσεις δίδει τὴν πρώτην αἰτίαν τοῦ σχηματισμοῦ τῶν τῆς χολῆς συγχιμαμάτων. Τὸ κυριώτερον ὅμως τῆς χολῆς συστατικὸν εἶναι ἰδιαίτερα ὕλη *Bilin ταυρεῖα ὕλη* καλουμένη, τὰ δὲ προῤῥηθέντα ὀξέα εἶναι μόνον μεταμορφώσεις τῆς ὕλης ταύτης. Κατὰ τὴν τοῦ Berzelius τῆς χολῆς ἀνάλυσιν ἐμπεριέχονται τὰ ἀκόλουθα: ὕδατος 90, 44· ἰδιαίτερας ὕλης τῆς χολῆς 8, 00· βλέννης τῆς χοληδόχου κύστεως 0, 30· ὁσμοζώμιου, ὑδροχλωρικῆς σόδας καὶ γαλακτικῆς σόδας 0, 74· νάτρου, φωσφορικῆς σόδας, φωσφορικῆς τιτάνου μὲ ἔχνη τινὸς εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλυσίμου ὕλης 0, 11.

Εἰς τὴν χολὴν κατὰ τὰς τοῦ Gmelin ἐξετάσεις ἐμπεριέχονται τὰ ἀκόλουθα συστατικά· ἰδιαίτερα ὕλη ἐκδίδουσα ὁσμὴν μὲ μόσχον καὶ ἐκλυομένη δι' ἀποστάξεως, χολοστέαρ ἢ λίπος χολῆς, ῥητίνη τῆς χολῆς, πικρόμελι, ζάχαρις τῆς χολῆς, ταυρεῖα ὕλη, φαιὰ χρωματιστικὴ ὕλη, ὁσμοζώμιον, σιελώδης ἢ τυρώδης ὕλη, βλέννα τῆς χοληδόχου κύστεως, ἀνθρακικὸν

νάτρον, άνθρακική άμμωνία, καθώς και όξιόν στεατικόν, χολικόν, φωσφορικόν, θειικόν, και ύδροχλωρικόν νάτρον, και όλίγον ποσόν καλίου· 100 μέρη χολῆς έξατμισθέντα δίδουσιν υπόλειμμα ξηρόν 8 — 9 ιού ινώδη. Εάν ζεσθῇ ἡ χολή, ένεργεϊ άλκαλικώς ένεκα τῆς τοῦ άνθρακικοῦ νάτρου διά τῆς θερμότητος άποσυνθέσεως.

Ἡ άνθρόπιнос χολή έξετάσθη παρὰ τοῦ Berzelius, και Thenard, οἳτινες άνεκάλυσαν εἰς αὐτὴν λίπος τῆς χολῆς, ρητίνην, πικρόμελι, όσμοζώμιον, σιελώδη και τυρώδη ὕλην, βλένναν, στεατικόν, χολικόν, φωσφορικόν, ύδροχλωρικόν και θειικόν νάτρον, μετ' όλίγου ποσοῦ καλίου, άνθρακικῆς, φωσφορικῆς και θειικῆς τιτάνου.

Ἡ τῶν κυνῶν χολή εἶναι ένιοτε φαίᾳ, κιτρίνη ἢ πρασίνη, διαφανής, γλίτχρα, ζεομένη δὲ δέν γίνεται άλκαλική, λαμβάνει ζωηρόν πράσινον χρώμα διά τοῦ νιτρικοῦ όξέος, τὸ όποῖον άκολούθως γίνεται κυανοῦν και έρυθροῦν, έμπεριέχει εκτός τῆς δυσώδους ὕλης, λίπος τῆς χολῆς, όλίγον ποσόν ρητίνης τῆς χολῆς, πικρόμελι, φαίαν χρωματιστικὴν ὕλην, σιελώδη και τυρώδη ὕλην και διάφορα έλκτα.

Ἡ τοῦ χοίρου χολή δέν έμπεριέχει σχεδόν διόλου έλκχριν, τῆς χολῆς, αλλά μεγαλότερον ποσόν ρητίνης τῆς χολῆς μετὰ νάτρου. Ἡ ρητίνη καταβυθίζεται εκ τῆς χολῆς σχεδιν δι' άπάντων τῶν όξέων, καθώς και διά τοῦ όξικοῦ. Κατὰ τὸν Gmelin και Tiedeman διαφέρει ἡ τῶν όρνέων χολή μεγάλως άπό τὴν τῶν άλλων ζώων, τὸ χρώμά της εἶναι ένιοτε βυθυπράσινον, ένιοτε άνοκτοπράτινον και άλλοτε όμοιάζει με τὸ χρώμα τοῦ όξειδίου τοῦ χαλκοῦ. Ὁ Berzelius έξετάσας τὴν χολὴν όρεως τινος Python amethystinus, εἶρεν εν αὐτῇ ιδιαιτέραν ὕλην τῆς χολῆς μετὰ χρωματιστικῆς ὕλης, ἥτις μήτε διά τῶν όξέων, μήτε διά τῶν άλκαλίον δέν καταβυθίζεται, προ τούτοις σιελώδη ὕλην, λεύκωμα, λιπαρὰ όξέα, και τὰ έτερα συνθως ενυπάρχοντα όξέα.

Χρησις τῆς χολῆς. Ὡς ίσχυατικόν μέσον πρὸς έξωτερικὴν και έσωτερικὴν χρῆσιν κατὰ τινων τοῦ ἥπατος άβρωστίων, ὡς διαλυτικόν και δυναμωτικόν μέσον, ὡσαύτως πρὸς κάθαρσιν τῶν ὕφασμάτων άπό τὰ τοῦ ελαίου σπιλώματα.

Περὶ τῶν εκ τῆς χολῆς λίθων και συγκριμάτων.

Εκ τῆς χολῆς άποτίθενται ένιοτε άδιάλυτα μόρια, έξ ὧν σύγκεινται οἱ τῆς χοληδόχου κύστεως λίθοι. Οἱ τῆς άνθρωπίνου χολῆς λίθοι συνίσταν-

και συνήθως ἐκ τοῦ τῆς χολῆς στέατος καὶ τῆς χρωματιστικῆς ὕλης εἰς διάφορον ἀναλογίαν, πρὸς τοῦτοις ἐμπεριέχουσιν πεπηγμένην τῆς χολῆς βλένναν καὶ ἐξηραμμένην χολήν. Ἔνεκα τοῦ διαφρορετικοῦ τῆς χρωματιστικῆς ὕλης ποσοῦ λαμβάνουσιν οἱ εἰρημένοι λίθοι λευκὸν, κίτρινον, φαιὸν καὶ βαθυπράσινον χρῶμα. Συνήθως εἶναι στρογγύλοι καὶ λαμβάνουσιν ἐνίοτε μεγέθος ὡς περιστερᾶς. Ἐὰν ἐμπεριέχουσι μέγα ποσὸν στέατος τῆς χολῆς, εἶναι λευκοί, κρυσταλλώδεις, ἐλαφρότεροι τοῦ ὕδατος καὶ δίδουν διὰ λεπτριβήσεως λιπώδη κόνιν.

Πρὸς ἀνάλυσιν λειοτριβονται καὶ ἐκπλύνονται διὰ ψυχροῦ ὕδατος, δι' οὗ διαλύεται ἡ χολή, τὸ δὲ ξηρὸν ὑπόλειμμα ζέεται μετὰ οἶνοπνεύματος· τὸ ζέον ῥευστὸν διύλιζεται, καὶ ἐξ αὐτοῦ κρυσταλλοῦται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τὸ τῆς χολῆς στέαρ, Cholestearin καλούμενον. Οἱ τῆς χολιδόχου κύστεως τῶν χείρων λίθοι εἶναι νεραντζοειδεις τὸ χρῶμα, ῥυτιδιώδεις τὸ σχῆμα καὶ εὐθρυπτοι. Ὁ Lassaigne εὑρεν ἐν αὐτοῖς ἄχρουν ῥητίνην μετὰ φωσφορικῆς τιτάνου καὶ ὅζε διου σιδήρου, καὶ ὀλίγον ποσὸν χολῆς καὶ στέατος τῆς χολῆς. Οἱ τῆς χολιδόχου κύστεως τῶν βωθῶν λίθοι σύγ-κεινται σχεδὸν ἐκ τῆς φαιᾶς χρωματιστικῆς ὕλης τῆς χολῆς, εἶναι ἄο-σμοι, ἄχυμοι, ἐρυθρόφαιοι καὶ δίδουν νεραντζοειδῆ κόνιν.

Τὸ φαιὸν τῆς χολῆς χρῶμα ἐκ τῶν συγκριμάτων τῶν λίθων μεταχει-ρίζονται οἱ ζωγράφοι πρὸς βαφήν.

Οὔρος. *Urina.*

Τὸ οὔρος εἶναι ῥευστὸν ἀποκρινόμενον ἐκ τοῦ ἀρτηριώδους αἵματος διὰ τῶν νεφρῶν, καὶ διὰ τῶν οὔροτῆρων διοχετεύεται εἰς τὴν οὔροδόχον κύστιν, ἐξ ἧς διὰ τῆς οὔρηθρας ἐξέρχεται.

Διὰ τοῦ οὔρου ἐκκενοῦνται διάφορα εἰς τὸ σῶμα περιττὰ καὶ ἐπιβλαβῆ συστατικά. Τὸ ποσὸν τοῦ οὔρου εἶναι τόσον πλεόντερον, ὅσον περισσό-τερον εἶναι τὸ πινόμενον ὕδωρ καὶ ὅσον ὀλιγώτερος ὁ ἐξερχόμενος ἰδρῶς.

Τὸ νεκρὸν οὔρος τοῦ ὑγειοῦς δύναται νὰ θεωρηθῇ ὑπὸ διπλῆν ἐποψιν ὡς ἀποκρινόμενον ἀμέσως μετὰ τὴν κατάποσιν τῶν τροφίμων εἰς τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας *Urina cruda*, καὶ ὡς οὔρος ἐπεξεργασμένον *Urina cocta*, ἀπο-κρινόμενον τὴν πρῶτην μετὰ τὸν ὕπνον καὶ μετὰ τὴν τελείαν πέψιν.

Τὸ πρόσφατον ἀνθρώπινον οὔρος εἶναι ῥευστὸν ὑπωχρον καὶ διαφανές, ἔχει ἰδιαίτεράν ὀσμήν, ἥτις ἐξαλείφεται κατὰ μέγα μέρος διὰ τῆς ἀποψύ-ξεως, καὶ ἐπανερχόμενη διὰ τῆς θερμάνσεως, ἔχει ἐιδικὴν βαρύτητα 1,025.

Τὸ οὔρος ἔχει τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ ἐρυθροῦ τὸν καγκάμινον χάρτην. Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦτο ἀποβάλλεται μὲν μετὰ παρέλευσιν τινῶν ἡμερῶν, καθὼς καὶ ἐὰν θερμανθῇ μέχρι ζέσεως, ἐξεναντίας ὅμως τότε ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ τῆς κροκορρίζης χάρτου ὡς τὰ ἀλκάλια.

Ἐὰν τὸ οὔρος ἀφεθῇ τινὰς ἡμέρας, σχηματίζεται ἐν αὐτῷ τόση ποσότης ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας, ὥστε διὰ τῆς προσθήκης τῶν ὀξέων ἐκλύεται ἀνθρακικὸν ὀξύ. Διὰ τῆς αὐτομάτου μεταβολῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπόκειται τὸ οὔρος, ἢ διὰ τῆς ἐξατμίσεως γεννᾶται καταβύθισμα συνιστάμενον ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος, ἐκ τινων φωσφορικῶν ἀλάτων, ἐξ ἀλικῆς σόδας ὑπὸ μορφὴν ὀκταέδρων κρυστάλλων καὶ ἀλικῆς ἀμμωνίας· προσέτι κρυσταλλοῦται ἄλλας διπλοῦν ἐκ φωσφορικῆς σόδας καὶ φωσφορικῆς ἀμμωνίας, καλούμενον *Sal microcosmicus*· ἢ δὲ ἐπιμένουσα διάλυσις εἶναι ῥευστὸν φαιὸν, δυσῶδες καὶ σεραποειδοῦς συστάσεως· ἐὰν τὸ οὔρος ζεσθῇ, ἐν μέρει πῆγνυται, ἐν μέρει δὲ ἀποσταλάξει ὑγρὸν ἄχρουν καὶ δυσῶδες, ἐμπεριέχον τὴν διὰ τῆς ζέσεως προαχθεῖσαν ἀνθρακικὴν καὶ ὀξικὴν ἀμμωνίαν. Τὸ ῥευστὸν τοῦτο καλεῖται *Spiritus Urinae*.

Ἐξαιρουμένου τοῦ ὀξάλικοῦ ὀξέος, δι' οὗ καταβυθίζεται ἡ τίτανος, δὲν θολοῦται τὸ οὔρος δι' οὐδενὸς ἄλλου ὀξέος. Διὰ τῶν ἀλκαλίων καταβυθίζεται ἐκ τοῦ οὔρου φωσφορικὴ τίτανος. Τὸ διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου καταβυθίζει τὰ ὑδροχλωρικὰ ἄλατα ὃ δὲ ὀξικός μόλυβδος μεταβάλλεται εἰς θεικὸν καὶ φωσφορικὸν μόλυβδον. Παρὰ τοῦ διαλύματος τῆς βυρσοδεψικῆς ὕλης καταβυθίζεται τὸ οὔρος μόνον ὀλίγον, ἐὰν δὲν ἐμπεριέχῃ λεύκωμα.

Αἱ κυριώτεραι ὕλαι, αἵτινες συνήθως ἀπαντῶνται εἰς τὸ οὔρος τοῦ ὑγιоῦς ἀνθρώπου εἶναι αἱ ἐφεξῆς: Οὐρικὸν ὀξύ, γαλακτικὸν ὀξύ εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν, καὶ ἠνωμένον μετὰ τῆς ἀμμωνίας, οὐρικὴ ὕλη, ὁσμωζώμιον καὶ διάφορα ἄλατα.

Οὐρικὸν ὀξύ.

Acide urique, acide lithique.

Τὸ ὀξύ τοῦτο γνωρίζεται ὑπὸ τὸ ὄνομα οὔρολιθικόν, οὐρικόν, ἢ καὶ λιθικόν ὀξύ, καὶ ἀνεκκλύφθη παρὰ τοῦ Scheele κατὰ τὸ 1776 ἔτος διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν λίθων καὶ τῶν συγκριμμάτων τῆς οὐροδόχου κύστεως. Τὸ ὀξύ τοῦτο εὑρέθη εἰς τὸ οὔρος τῶν ἀνθρώπων, τῶν λεόντων, τῶν

τίγρεων, όφέων, κροκοδείλων, χελονών, βομβύκων, κ.τ.λ. όχι όμως και εις τὸ οὖρος τῶν χορτοφάγων μαστοφώρων.

Εάν τὸ οὖρος αποψυχθῇ, κατακρημνίζεται μέρος τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος, μέρος δὲ ἀπιμένει εἰς τὴν διάλυσιν.

Επὶ τινων νήσων τῆς νοτίου θαλάσσης ἀπαντᾷ τὸ οὐρικόν ὀξύ εἰς ἀρκετὰ ἐκτεταμένας στιβάδας γνωστὰς ὑπὸ τὸ ὄνομα Guano. Τὸ φύραμα τοῦτο συνίσταται ἐκ τῶν συγκριμμάτων πολλῶν θαλασσίων ὀρνέων, τῶν μόνων κατοίκων ἐκείνων τῶν νήσων. Διὰ τῆς αὐτομάτου καὶ βραδείας ἀποσυνθέσεως τῶν ἄλλων συστατικῶν τῶν περιττωμάτων, ἀπιμένει τὸ ἀκάθαρτον οὐρικόν ὀξύ ἠνωμένον μετ' ἀμμωνίας καὶ σχηματίζει τὸ Guano.

Τὸ οὐρικόν ὀξύ. *Acidum uricum* κατασκευάζεται, ἐάν τὸ ἐκ τοῦ οὔρου κατακρημνισμα διαλυθῇ, ἀφοῦ ἀποπλυθῇ ἀρκούντως δι' ὕδατος εἰς καυστικὸν κάλιον ὑγρὸν, καὶ ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου καταβυθίζεται τὸ οὐρικόν ὀξύ διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος.

Χαρακτηριστικά. Σχηματίζει λεπίδια λεπτά, λευκά τὸ χρῶμα καὶ μαργαριταροειδῶς λαμπρίζοντα, ἄσπρα καὶ ἄχρμα, τὰ ὅποια διαλυόμενα εἰς ζέον ὕδωρ ἐρυθροῦσιν ἀσθενῶς τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου. Πρὸς τελείαν διάλυσίν του ἀπαιτεῖ 1400 μέρη ζέοντος ὕδατος· εἶναι δὲ ἀδιάλυτον εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ αἰθέρα, ριπτόμενον ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων μελανίζεται καὶ ἐκδίδει ὀσμὴν ὁμοίαν τῶν κεκχυμένων ὀστέων. Θερμαινόμενον εἰς τὸν ἀέρα ἐκλύει ὀσμὴν ὡς τὴν τοῦ ὑδροκυανικοῦ καὶ κυανικοῦ ὀξέος, καθυποβληθὲν εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν ἀποσυντίθεται, χωρὶς νὰ τηχθῇ, ἐκλύον κατ' ἀρχὰς ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν, ἀκολούθως ὑδροκυανικόν ὀξύ καὶ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον, καὶ τέλος οὐρικόν ὀξύ ἐμπυρευματικόν, εἰς εἶδος κρυσταλλωσίου ὕλης. Τὸ ἐμπυρευματικὸν οὐρικόν ὀξύ εἶναι κατὰ τὰς νεωτέρας ἐξετάσεις τοῦ K. Wähler κυανικόν ὀξύ συγχέμενον ἐξ ὀξυγόνου 1 ἀτ: καὶ κυανίου 2.

Τὸ οὐρικόν ὀξύ διαλύεται καὶ εἰς τὸ θεϊκόν ὀξύ ἄκρατον διὰ τῆς θερμότητος, καὶ καταβυθίζεται ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ ὕδατος.

Τὸ οὐρικόν ὀξύ διαλύεται ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν τοῦ νιτρώδους ὀξέος καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς θερμὸν νιτρικόν ὀξύ κεκραμένον. Τὸ διὰ πρᾶον πυρὸς μέχρι ξηροῦ ἐξατμισθὲν ρευστὸν ἀφίνει ὑπόλειμμα ἐρυθρωπὸν, τὸ ὅποιον ἀποβάλλει τὸ χρῶμά του διὰ τῆς εἰς ὀλίγον ὕδωρ ἀναδιαλύσεως, καὶ δι' αὐτοῦ δύναται εὐκόλως νὰ γνωρισθῇ τὸ οὐρικόν ὀξύ. Ἡ ἐρυθρὰ ὕλη, ἥτις σχηματίζεται διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος, εἶναι τὸ πορφυ-

ροῦν ὀξύ. Διὰ συνεχοῦς ἐνεργείας τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τοῦ οὐρικοῦ γεν-
νᾶται τέλος τὸ ὀξαλικόν ὀξύ· ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιφόρῃν τοῦ χλωρίου,
ἀποσυντίθεται εἰς ἀνθρακικὸν καὶ κυανικόν ὀξύ, καὶ συγχρόνως σχημα-
τίζεται ὀξαλικόν ὀξύ καὶ ὑδροχλωρικὴ ἀμμωνία.

Ἐὰν διὰ οὐρικοῦ ὀξέος διαλελυμένου εἰς 20 μέρη ὕδατος διέλθῃ χλώ-
ριον, τότε διαλύεται κατὰ μέγα μέρος ὑπὸ ἀσθενῆ ἀνάξενιν, καὶ διὰ
τῆς ἐξατμίσσεως τοῦ ρευστοῦ ἐπιμένουσιν ὑδροχλωρικὴ καὶ ὀξαλικὴ ἀμ-
μωνία, μηλικόν, πορφυροῦν, καὶ ὀξουρικόν ὀξύ. Ἐὰν ὅμως ὑπερτερῇ τὸ
χλώριον, ἀποσυντίθενται πάλιν ἀμφοτέρω τὰ τελευταῖα ὀξέα. Διὰ τῆς
ζέσεως τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ ἰώδους μεταβάλλεται ὡσαύτως
κατὰ μέγα μέρος εἰς πορφυρικὴν ἀμμωνίαν.

Τὸ οὐρικόν ὀξύ σύγκειται ἐξ·

Ἰδρογόνου	2, 00
Νιτρογόνου	37, 40
Ὄξυγόνου	20, 81
Ἀνθρακος	39, 71

Τὰ διὰ τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος ἅλατα Urates, ἐξαιρουμένων μόνον ἐκείνων,
ἅτινα ἔχουσιν τὸ κάλιον ἢ τὸ νάτρον διὰ βάσιν, εἶναι σχεδὸν ἀδιάλυτα
εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ καὶ σχηματίζουν λευκὰς ἀχύμους καὶ γαιώδεις
κόνεις.

Οὐρικὸν κάλιον. Τὸ οὐρικόν ὀξύ διαλύεται εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον
θερμὸν καὶ ἀποψυχαινομένου τοῦ ρευστοῦ, ἐναποτίθεται τὸ οὐδέτερον
ἅλας εἰς εἶδος ἐλαφρῶν κρυσταλλωσίων σφαιριδίων ἢ εἰς εἶδος ἐλαφρῶν
λεπιδίων. ἔχει ἀλκαλῶδη γλυκίσαν γεῦσιν, ἀπορρόφᾷ ἐκ τοῦ αἵρος τὸ
ἀνθρακικόν ὀξύ καὶ διαλύεται εἰς 480 μέρη ψυχροῦ ὕδατος· εἶναι εὐδιά-
λυτον εἰς τὸ θερμὸν ὕδωρ, καὶ τόσον περισσότερον, ὅσον ὑπερτερῇ τὸ
κάλιον, δι' οὗ σχηματίζεται οὐρικὸν κάλιον μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως.

Διὰ θερμάνσεως τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος μετὰ καυστικοῦ καλίου ξηροῦ με-
ταβάλλεται τὸ οὐρικόν ὀξύ ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν ἀμμωνίας εἰς ὀξαλικόν ὀξύ.

Οὐρικὸν νάτρον. Κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, καθ' ὃν
καὶ τὸ οὐρικὸν κάλιον, καὶ ὁμοιάζει μὲ αὐτὸ ὡς πρὸς τὰ χαρακτηριστικά
του. Τὸ ἅλας τοῦτο ἐνυπάρχει εἰς τὸ οὖρος, καὶ ὡσαύτως ἀπαντᾷται
εἰς τὰ ἀρθριτικὰ συγκρίμματα.

Τὸ οὐρικόν ὀξύ εἶναι πολλὰ εὐδιάλυτον εἰς διάλυμα τοῦ βορικοῦ

νάτρου, καὶ ἐκ τῆς διαλύσεως ἀποτελεῖται ἄλλας διπλοῦν μετὰ δύο ὀξέων.

Οὐρική ἀμμωνία. Αὕτη ἐμπεριέχεται εἰς τὸ οὖρον τῶν ὀρνέων, ὡς οὐρική ἀμμωνία μεθ' ὑπερτερουόντος ὀξέος, καὶ σχηματίζει γαιώδη καὶ λευκὴν κόκκιν. Διαλύεται εἰς 480 μέρη ψυχροῦ ὕδατος. Ἐὰν ἀναμιχθῇ μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, σχηματίζεται ὑδροχλωρική ἀμμωνία, ἐπιμένοντος τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος. Τοῦτο τὸ ἄλλας ὑπάρχει καὶ εἰς τινὰς λίθους τῆς ὑδροδόχου κύστεως.

Οὐρική τίτανος. Ἐὰν οὐρικὸν ὀξύ ζέηται μετ' ἀνθρακικῆς τιτάνου, εὐρίσκεται εἰς τὸ διυλισθὲν ρευστὸν οὐρική τίτανος· εἰς τὸ ζέον τιτάνιον ὕδωρ διαλύεται τὸ οὐρικὸν ὀξύ, καὶ διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ ρευστοῦ κρυσταλλοῦται ἡ οὐρική τίτανος εἰς εἶδος λευκῶν λαμπρίζουσων ἀγκιδῶν ἢ φυλλιδίων. Ἐκ τοῦ ὕδατος δὲ διαλύματος κατακρημνίζεται διὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος ἡ οὐρική τίτανος ὀξεϊα.

Ροδόχρουν ὀξύ ἢ Οὐροερυθροῦν.

Uroerythrin.

Εἰς διαλείποντας πυρετοὺς καὶ ἄλλας τινὰς νόσους κατακρημνίζεται τὸ οὐρικὸν ὀξύ ἐκ τοῦ οὐρου, ὅχι ὡς λευκόν, ἀλλ' ὡς ἐρυθρὸν ἵζημα, τὸ ὁποῖον καλεῖται πτερθεοειδὲς ἀπόστασις *Sedimentum latericium*. Τὸ ἵζημα τοῦτο σύγκεται ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος, φωσφορικῆς τιτάνου, καὶ ἰδίως ἐκ τοῦ κυρίως ροδόχρου ὀξέος. Ἐὰν τὸ ἵζημα τοῦτο ζεσθῇ με ὕδωρ ἢ οἰνόπνευμα, διαλύεται τὸ ροδόχρουν ὀξύ, καὶ ἐπιμένει εἰς εἶδος πορφυρᾶς κόκκιν, ἀφοῦ ἐξατμισθῇ τὸ οἰνόπνευμα. Τὸ ὀξύ τοῦτο εἶναι ἄσπρον καὶ λευκαίνεται διὰ τοῦ χλωρίου, διαλύεται εἰς τὸ θεϊκόν ὀξύ, ἄρκετον πρὸς βαθυερυθρὸν ρευστὸν, ἐκ τοῦ ὁποῖου διὰ προσθήκης ὕδατος καταβυθίζεται τὸ οὐρικὸν ὀξύ· διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ θεϊκῶδους ὀξέος λαμβάνει ἀνοιχτο-ερυθρὸν χρῶμα, τὸ ὁποῖον ἀποβάλλει διὰ τῶν ἀλκαλίων ὑπὸ ἔκλυτον ἀμμωνίας. Ἀπὸ τὸν Prout ἐθεωρεῖτο ἡ ἐρυθρὰ αὕτη ὡς ἰδιαιτέρον ὀξύ, μετὰ ταῦτα ὅμως ἀπέδειξεν ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι ἑνώσις τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος μετὰ τινος ἰδιαιτέρας ἐρυθρᾶς βαφικῆς ὕλης.

Περὶ τῆς μεταβολῆς τοῦ οὐρου διὰ τῶν ὀξέων.

Διὰ τῆς ἀμμοδιαίας ἐπιρροῆς τοῦ οὐρικοῦ καὶ νιτρικοῦ ὀξέος προάγονται

νέει ενώσεις, τῶν ὁποίων ὁ σχηματισμὸς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δύναμιν τοῦ ὀξέος, ἀπὸ τὸν πολὺν ἢ ὀλίγον καιρὸν τῆς ἐπενεργείας καὶ ἀπὸ τὴν θερμοκρασίαν. Πολλοὶ χημικοὶ ἐνησχολήθησαν περὶ τούτου τοῦ ἀντικειμένου, ἀλλὰ δὲν ἐπέτυχον καθὼς ὁ Liebig καὶ ὁ Woehler, τῶν ὁποίων αἱ περὶ τούτου ἐξετάσεις εἶναι τῶντι παραδείγματα τῆς ἀκριβείας καὶ ἐπιμελείας.

Πρὶν ὁμιλήσωμεν διεξοδικώτερον περὶ αὐτῶν τῶν ενώσεων εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναφέρωμεν τὰ ὀνόματά των·

Ἀλλόξανον, *Ἀλλόξαντον*, *Ἀλλοξάνταρον*, *Ἀλλοξαντοραμίδιον*, *Παραβαϊρικόν* ὀξύ, ὀξாலουρικόν ὀξύ, ἁλλοξανικόν ὀξύ, μυκομελικόν ὀξύ, οὐραμῆλιον, οὐραμηλιθειϊκόν ὀξύ, οὐραμηλικόν ὀξύ, μισοξαλικόν ὀξύ, θειοουρικόν ὀξύ, *Μουρεξίδιον*, *Μουρεξάνιον*.

Οὐρικόν ὀξύ μὲ κεκραμένον νιτρικόν ὀξύ.

Τὸ ξηρὸν οὐρικόν ὀξύ, συμμιχθὲν μὲ χλιαρὸν καὶ πολὺ κεκραμένον νιτρικόν ὀξύ διαλύεται μὲ ἀναθρασμὸν, ἐκλύον ἀνθρακικόν ὀξύ καὶ νιτρογόνον, καθὼς καὶ ὀλίγον νιτρογονοξείδιον. Ἐὰν προστεθῇ οὐρικόν ὀξύ, ἕως οὗ δὲν διαλύεται πλέον, λαμβάνομεν ῥευστὸν διαφανές, ὑποκίτρινον καὶ ὀξινόν· ἐξατμιζομένου δὲ τούτου, παρατηρεῖται ἀκόμη ἀσθενὴς ἀναθρασμός, τὸ ῥευστὸν λαμβάνει ἐρυθρόφαιον χρῶμα, καὶ μετὰ τὴν ψύξιν ἀποθέτει σκληροὺς διαφανεῖς κρυστάλλους δυσδιαλύτου τινὸς σώματος, τὸ ὅποιον ὠνομάσθη *ἀλλόξαντον* λέξις σχηματισμένη ἐκ τῶν πρώτων συλλαβῶν τοῦ ὀξάλιον καὶ *ἀλαντοῖνιον*· μετὰ τὴν ἀποχώρησιν αὐτοῦ λαμβάνει τὸ μέχρι συστάσεως σερapiοῦ ἐξατμιζόμενον ῥευστὸν κόκκινον χρῶμα, καὶ κρυσταλλοῦται ἐξ αὐτοῦ νιτρικὴ καὶ ὀξινὴ ὀξελικὴ ἀμμωνία, καθὼς καὶ οὐρικὴ ὕλη ἠνωμένη μετὰ τῶν εἰρημένων ὀξέων.

Ἐὰν ἡ προεξηρημένη διάλυσις τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος εἰς τὸ νιτρικόν συμμιχθῇ μετὰ τὴν ψύξιν μὲ ἀμμωνίαν εἰς ὑπερτεροῦν ποσὸν, τότε γίνεται ἄχρους, ἀποθέτει δὲ μετ' ὀλίγον συνεχεῖς κροκίδας ἢ καὶ κιτρίνας ἢ ὑπερύθρους βελόνας, συγκειμένας ἐξ ἀμμωνίας καὶ νέου τινὸς ὀξέος, τοῦ λεγομένου ὀξாலουρικοῦ. Ἐὰν ὅμως ἡ διάλυσις ὑπερκορεσθῇ μὲ ἀμμωνίαν πρὶν τῆς ἀποστάξεως, λαμβάνει εὐθὺς πορφυροῦν χρῶμα, τὸ ὅποιον ἐξαλειφεται πάλιν κατ' ὀλίγον.

Ἐὰν ἡ διάλυσις δὲν συμμιχθῇ μὲ ἀμμωνίαν, εἰμὴ ἀφοῦ λάβῃ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ἐρυθρόφαιον χρῶμα, τότε μεταβάλλεται τοῦτο εἰς βαθυπορφυ-

ροῦν. Συμμιχθείσης δὲ τῆς διαλύσεως μόνον μὲ τὴν πρὸς κόρον τοῦ ὀξέος απαιτουμένην ποσότητα ἀμμωνίας, ἀποθέτει κρυστάλλους, πρασίνοὺς καὶ λαμπρίζοντας, οἵτινες εἶναι ἡ πορφυρικὴ ἀμμωνία τοῦ Prout, συγχρόνως μὲ αὐτὴν ἀποχωρίζεται παλλάκις ὠχροκόκκινος κόνις, ἥτις ὡς νέον σῶμα ὠνομάσθη οὐραμίλιον.

Οὐρικὸν ὀξύ μὲ ἀκρατον νιτρικὸν ὀξύ.

Ἐάν τὸ οὐρικὸν ὀξύ διαλυθῇ εἰς ψυχρὸν νιτρικὸν ὀξύ 1,425 εἰδικῆς βαρύτητος, ἐκλύονται ὑπὸ συνεχῇ ἀναβρασμὸν ἀνθρακικὸν καὶ νιτρώδες ὀξύ· μετὰ δὲ τὴν παῦσιν τοῦ ἀναβρασμοῦ συμπηγνύεται ἡ μάζα πρὸς πόλτον συνιστάμενον ἀπὸ μικροῦς διαφανεῖς κρυστάλλους, οἵτινες ὡς μέχρι τοῦδε ἄγνωστον σῶμα ἐπωνομάσθησαν ἀλλόξανον.

Ἐάν τὸ οὐρικὸν ὀξύ θερμανθῇ μέχρι ζέσεως μὲ ὑπερτεροῦν ποσὸν νιτρικοῦ, σχηματίζονται μετὰ τὴν ψύξιν πρισματικοὶ ἢ καὶ λεπιδοειδεῖς κρυστάλλοι, ὁμοιάζοντες κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν τὸ ὀξalikὸν ὀξύ· εἶναι δὲ νέον ὀξύ, καὶ καλεῖται παραβαινικὸν (ἀπὸ παραβαίνω).

Αἱ ἐκτεθεῖσαι ὕλαι προάγονται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς τὸ οὐρικὸν ὀξύ· αἱ δὲ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως αὐτῶν τῶν ὑλῶν εἶναι αἱ ἐξῆς.

Ἐάν τὸ ἀλλόξανον συναφθῇ μὲ βάσιν τινα, ἐξαιρουμένης τῆς ἀμμωνίας, ἀποτελεῖται νέον σῶμα, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει 1 ἄτ. ὀξυγόνου καὶ 2 ἄτ. ὑδρογόνου ὀλιγώτερον τοῦ ἀλλοξάνου, καὶ τὸ ὁποῖον ἐνοῦται ὡς ὀξύ μὲ τὴν βάσιν. Τοῦτο τὸ νέον σῶμα ἢ ὀξύ λέγεται ἀλλοξανικὸν ὀξύ.

Ἐάν ὅμως ἡ διάλυσις τοῦ ἀλλοξάνου συμμιχθῇ μὲ ἀμμωνίαν, καὶ θερμανθῇ, πηγνύεται μὲ τὴν ψύξιν πρὸς κιτρίνην διαφανῇ πηκτὴν, ἥτις εἶναι ἄλας συγκείμενον ἐξ ἀμμωνίας καὶ νέου ὀξέος, τοῦ μυκομελικοῦ (ἀπὸ μῦκος καὶ μέλι). Ἐκ τοῦ εἰς ὕδωρ διαλελυμένου ἁλατος δύναται ν' ἀποχωρισθῇ τὸ μυκομελικὸν ὀξύ διὰ κεκραμένου θεϊκοῦ ὀξέος.

Ἐάν διοχετευθῇ εἰς διαλελυμένον ἀλλοξάνον θειῶδες ὀξύ καὶ μετὰ ταῦτα προστεθῇ εἰς τὸ μίγμα ὑπερτεροῦσα ποσότης ἀμμωνίας, ἀποβάλλει τὸ μέχρι ζέσεως θερμανθὲν, ἔπειτα δὲ ἀποψυχρὰθὲν ῥευστὸν κρυστάλλους συγκειμένους ἐξ ἀμμωνίας καὶ τοῦ θειοουρικοῦ ὀξέος (ἀπὸ θεῖον καὶ οὐρος). Τοῦτο τὸ νέον ὀξύ δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὴν ἀμμωνίαν δι' ὀξικοῦ μολύβδου, ἀπ' αὐτὸν δὲ δι' ὑδροθειωμένου ἀερίου.

Σχηματίζεται ἐπίσης διὰ τῆς ἐγώσεως τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος μετὰ τινοῦ

ὀργανικῆς ὕλης, ἥτις δὲν δύναται ν' ἀποχωρισθῇ διὰ τῶν βάσεων, ἀλλὰ διὰ τῆς ζέσεως τοῦ ἐνυδρίου θειουρικοῦ ὀξέος· ἐπεὶ δὲ τότε σχηματίζεται ἐνυδριον θειικόν ὀξύ, καὶ ἡ πρότερον μὲ αὐτὸ ἐνωθεῖσα ὕλη ἀποχωρίζεται ὡς ἀδιάλυτος· εἶναι δὲ αὕτη τὸ ἤδη εἰρημένον οὐραμῆλιον, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται καὶ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἀμμωνιακοῦ ὕδατος ἐπὶ τοῦ ἀλλοξάντιου.

Δι' ἀκράτου καὶ ψυχροῦ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλεται τὸ οὐραμῆλιον εἰς ἀλλόξανον, ἀλλὰ διὰ τῆς ζέσεως μὲ κεκραμένον νιτρικὸν ὀξύ ἀποσυντίθενται τὰ στοιχεῖά του εἰς τρόπον, ὥστε σχηματίζεται νέον ὀξύ, τὸ οὐραμῆλικόν, κρυσταλλούμενον εἰς τετράγωνα πρίσματα.

Ἐάν σταλαζώμεν διαλελυμένον ἀλλόξανον εἰς ζέον διάλυμα τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, σχηματίζεται κρυσταλλώδης κόνις, ἥτις εἶναι μολύβδουχον ἄλας διὰ τοῦ αὐτοῦ ὀξέος, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται διὰ τῆς ζέσεως τῶν δι' ἀλλοξανικοῦ ὀξέος ἀλάτων, δηλαδή τοῦ μετοξχλικοῦ ὀξέος. Εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν μεταβάλλεται λοιπὸν τὸ ἀλλόξανον εἰς ἀλλοξανικὸν ὀξύ, αὐτὸ δὲ εἰς μισοξαλικὸν ὀξύ καὶ οὐρικὴν ὕλην. Τοῦτο τὸ νέον ὀξύ σύγκειται ἐκ 3 ἀτ. ἀνθρακος καὶ 4 ἀτ. ὀξυγόνου· ὡς πρὸς τὸ ποτὸν τοῦ ἐν αὐτῷ ὀξυγόνου πρέπει νὰ καταριθμηθῇ λοιπὸν μεταξὺ τοῦ ὀξειδίου τοῦ ἀνθρακος καὶ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος καὶ διὰ τοῦτο ὠνομάσθη μισοξαλικόν.

Ἐάν διαλύσωμεν τὸ ἀλλοξάντιον εἰς ζέον ὕδωρ καὶ προσθέσωμεν ἀμμωνίαν, ζέοντες αὐτὴν μεχριστοῦ ἀφανισθῇ τὸ ροδόχρουν χρῶμα, βάφεται τὸ ρευστὸν βαθυπορφυροῦν, μετὰ δὲ τὴν ψύξιν ἀποχωρίζονται μικροὶ κρύσταλλοι, πράσινοι εἰς τὸ ἀντανακλώμενον φῶς, κόκκινοι δὲ εἰς τὸ ἐμπύπτον. Τοῦτο τὸ πράσινον ἢ κόκκινον σῶμα ὠνομάσθη παρὰ τοῦ Liebig καὶ Woehler μουρεξείδιον ἀπὸ τὸ λατινικὸν *Murex* πορφύρα. Τὸ μουρεξείδιον σχηματίζεται καὶ ἐκ τῶν περισσοτέρων προηγουμένων ὑλῶν καὶ διὰ μικρᾶς αἰτίας· ἀπ' αὐτὸ προέρχεται, ὡς φαίνεται, τὸ ἰδίωμα τοῦ νὰ λαμβάνωσι μερικαὶ ὕλαι πολλάκις κόκκινον χρῶμα, π. χ. διὰ τῆς ἀποξηράνσεως εἰς τὴν 100°. Ἐάν τὸ μουρεξείδιον διαλύηται εἰς καυστικὸν κάλιον, καὶ βράζηται μεχριστοῦ ἀποβάλλῃ τὸ κυανοῦν χρῶμα, ἀποχωρίζεται διὰ τῆς κορέσεως τοῦ καλίου μετὰ τινος ὀξέος, τὸ πορφυρικὸν ὀξύ τοῦ Prout, τὸ ὁποῖον ὁμως ὡς μὴ ἔχον τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ὀξέων ὠνομάσθη ἔπειτα μουρέξανον (μουρεξάνιον).

Οὐρική ὕλη. *Urée, Urea.*

Ἡ ὕλη αὕτη εἶναι ἀγαμφεβόλως ἐν τῶν κυριωτέρων καὶ σημαντικῶν

τέρων συστατικῶν τοῦ οὔρου, ὡς δίδουσα εἰς αὐτὸ ἰδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά. Τὴν ὕλην ταύτην ἀναφέρει κατὰ τὸ 1773 ὁ Rouelle,
ὑπὸ τὸ ὄνομα ἐκχύλισμα σαποροειδὲς τοῦ οὔρου *Extractum Urinae*
saponaceum, καὶ ἐδειξεν ὅτι, ἐὰν ἡ ὕλη αὕτη κατεργασθῇ μετὰ νιτρικοῦ
ὀξέος σχηματίζει κρυσταλλώδη ἔνωσιν. Ἡ ὕλη αὕτη δὲν ἀπαντᾷται μόνον
εἰς τὸ οὔρον τῶν σαρκοφάγων, ἀλλὰ καὶ τῶν χορτοφάγων ζώων, καθὼς
καὶ τινων ἄλλων.

Ὁ Woehler ἀνεκάλυψεν ὅτι δύναται νὰ σχηματισθῇ διὰ τῆς συμμιξεως
τοῦ κυανικοῦ ὀξέος μετὰ τῆς ἀμμωνίας, καθὼς καὶ διὰ τῆς ξηρᾶς ἀπο-
στάξεως τοῦ οὔρικοῦ ὀξέος. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν σχηματίζε-
ται κυανῶδες ὀξύ, τὸ ὁποῖον ἐνούμενον μετὰ τῆς συγχρόνως προαγομέ-
νης ἀμμωνίας σχηματίζει τὴν οὔρικὴν ὕλην.

Πρὸς ἀποχώρησιν τῆς οὔρικῆς ὕλης ἐξατμίζεται τὸ οὔρον διὰ πρᾶου
πυρὸς μέχρι ξηροῦ, καὶ χωρὶς νὰ θερμανθῇ μέχρι βαθμοῦ ζέσεως· τὸ
ὑπόλειμμα ἐκχυλίζεται μετὰ ταῦτα δι' οἶνοπνεύματος λειψύδρου. Τὸ
ληφθὲν δι' οἶνοπνεύματος διάλυμα ἀποστάζεται διὰ μετρίου πυρὸς, καὶ
τὸ ἐπιμένον μέρος διαλύεται εἰς ὀλίγον ποσὸν ὕδατος, καὶ κατεργάζεται
μετὰ λείων ζωανθράκων, δι' ὧν ἀποκαθίσταται τὸ ρευστὸν σχεδὸν
ἄχρουν. Τὸ διὰ πρᾶου πυρὸς μέχρι συστάσεως θεραπείου ἐξατμιζόμενον
ρευστὸν ἀναμιγνύεται ἀκολουθῶς με' ἴσον ποσὸν νιτρικοῦ ὀξέος, ἀκολου-
θῶς ἐκτίθεται τὸ μίγμα εἰς δυνατὴν ἀπόψυξιν. Ἡ τοιουτοτρόπως κρυαλ-
λουμένη νιτρικὴ οὐρίνη ἀποπλύνεται με' ὀλίγον ψυχρὸν ὕδωρ, καὶ ἐκ θλί-
βεται μετὰ ξύ ἐμπορικοῦ χάρτου. Μετὰ ταῦτα διαλύεται ἡ ἔνωσις αὕτη
εἰς θερμὸν ὕδωρ καὶ ἀποσυντίθεται δι' ἀνθρακικοῦ καλίου, ἐξατμιζόμενον
δὲ μέχρι ξηροῦ κατεργάζεται τὸ ἐπιμένον μέρος δι' οἶνοπνεύματος, δι' οὗ
διαλύεται τὸ ἀποχωρισθὲν οὔριον καὶ ἐπιμένει τὸ σχηματιζόμενον νι-
τρικὸν κάλιον. Διὰ προσκεκτικῆς ἐξατμίσεως τοῦ δι' οἶνοπνεύματος ρε-
υστοῦ δύναται νὰ ληθῇ ἡ οὐρίνη εἰς κρυσταλλώσιμον κατάστασιν.

Χαρακτηριστικά. Ἡ οὔρικὴ ὕλη εἶναι ἄχρουν καὶ οὐδέτερον σῶμα,
ἄοσμον, ἔχει δροσιστικὴν γεῦσιν ὡς τὸ νίτρον, κρυσταλλοῦται εἰς τε-
τράγωνα καὶ διαφανῆ πρίσματα, ἢ εἰς εἶδος μεταξοειδῶς λαμπρίζουσῶν
ἀγκίδων. Καυτοβληθεῖσα εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν ἐξαχνίζεται ἐξ αὐτῆς
ἀνθρακικὴ ἀμμωνία, ἐπιμενούσης ὕλης τινὸς τεφροχρόου, ἥτις ἔχει χα-
ρακτηριστικὰ ὅμοια με' τὸ κυανικὸν ὀξύ. Ἐὰν πυρωθῇ εἰς τὴν ἀτμοσφαῖ-
ραν, ἐξατμίζεται ἡ οὔρικὴ ὕλη ὀλοτελῶς, ἐκλύουσα ἀμμωνιακὴν ὁσμὴν. Εἰς
τὴν ὑγρὰν ἀτμοσφαῖραν διυγραίνεται καὶ διαλύεται εἰς ὀλιγώτερον τοῦ

βάρους ψυχροῦ ὕδατος. Εἶναι διαλύσιμος εἰς 5 μέρη ψυχροῦ καὶ εἰς ὀλιγώτερον 1 μέρους ζέοντος οἰνοπνεύματος 0, 816· εἰδικῆς βαρύτητος μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τοῦ διαλύματος κρυσταλλοῦται ἡ οὐρίνη, εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸν αἰθέρα, ὅχι ὁμῶς καὶ εἰς τὰ πτητικὰ ἔλαια. Ἡ οὐρίνη ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ ἐνοῦται ὅχι μόνον μετὰ τῶν ὀξέων ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν βάσεων, χωρὶς ὁμῶς νὰ δύναται νὰ ἐξουδετερώσῃ κἀνὲν ἐξ αὐτῶν. Διὰ τῶν ἀκράτων ὀξέων ἀποσυντίθεται, καὶ τὸ ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τῆς διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως σχηματισθείσης ἀμμωνίας καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ ἐκλύεται. Διὰ τῶν δι' ὕδατος κεκραμένων ὀξέων ἀποτελεῖται ἀποσύνθεσις μόνον διὰ τῆς ζέσεως. Εἰς δὲ τὸ ψυχρὸν κεκραμένον θεϊκὸν ὀξύ διαλύεται χωρὶς ν' ἀποσυντεθῇ. Τὸ νιτρικὸν ὀξύ ἐνσταλαζόμενον εἰς δι' ὕδατος κεκραμένην διάλυσιν τῆς οὐρίνης, ἐνοῦται μετ' αὐτῆς πρὸς νιτρικὴν οὐρίνην, ἥτις σχεδὸν, καθ' ἣν στιγμὴν σχηματίζεται, κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος λευκῶν μαργαριταροειδῶς λαμπρίζουσῶν λεπίδων, φαινόμενον δι' οὗ χαρακτηρίζεται ἡ οὐρίνη. Οἱ ληφθέντες κρύσταλλοι εἶναι ὀξεῖς τὴν γεῦσιν, καὶ ἀμετάβλητοι εἰς τὸν ἀέρα, πυρσοκροτοῦν ῥιπτόμενοι ἐπὶ ἐλάσματος ἐκ λευκοχρύσου, εἶναι διαλύσιμοι εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εὐδιάλυτοι εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦτο ζέται διὰ τινὰ καιρὸν, ἐξέρχεται ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ συγχρόνως γεννᾶται νιτρικὴ καὶ ἀνθρακικὴ ἀμμωνία. Ἡ νιτρικὴ οὐρίνη μεταδίδει εἰς τὰ ἀλκάλια, μετὰ τῶν ὁποίων συνάπτεται, τὸ νιτρικὸν ὀξύ χωρὶς νὰ σχηματισθῇ ἀμμωνία.

Ἡ νιτρικὴ οὐρίνη σύγκριται ἐξ:

Οὐρίνης 52, 63

Νιτρικοῦ ὀξέος 47, 37

100.

Ἐὰν τὸ ὑδατῶδες διάλυμα τῆς οὐρίνης ἀναμιχθῇ μὲ ὀξάλικόν ὀξύ γεννᾶται ἔνωσις κρυσταλλουμένη εἰς σχῆμα ἐπιμήκων φυλλοειδῶν κρυστάλλων. Ἡ ὀξάλικη οὐρίνη εἶναι ὀλίγον μόνον διαλύσιμος εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, καθὼς καὶ εἰς τὸ ψυχρὸν οἰνόπνευμα. Τὸ ζέον ὕδωρ διαλύει πολλὰ μεγαλύτερον ποσὸν τῆς ὀξάλικης οὐρίνης, καὶ μέγα μέρος αὐτῆς κρυσταλλοῦται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τοῦ ρευστοῦ τούτου. Ἡ ὀξάλικη οὐρίνη δὲν ἐμπεριέχει κρυσταλλώσιμον ὕδωρ, καὶ συνίσταται ἐξ ὀξάλικοῦ ὀξέος 47, 436 καὶ οὐρίνης 62, 564. Καὶ τὸ τρυγικὸν ὀξύ ἐνοῦται μετὰ τῆς οὐρίνης πρὸς στερεὰν ἔνωσιν.

Αἱ βάσεις καὶ μάλιστα τὰ ἀλκάλια ἀποσυνθέτουσιν τὴν οὐρίνην διὰ

τῆς θερμάνσεως, ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ ἀμμωνίας. Τὸ ὕδα-
τῶδες διάλυμα τῆς οὐρίνης κατεργασθὲν μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύ-
βδου καὶ ἀργύρου ἐνοῦται μετ' αὐτῶν. Ἐκτὸς τούτων ὅμως δὲν ἀπο-
συντίθεται τὸ ὕδατῶδες διάλυμα δι' ἄλλων μεταλλικῶν ἀλάτων, μήτε
θολοῦται διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηλίδων.

Τινὰ ἄλατα διὰ τῆς οὐρίνης μεταβάλλονται ὡς πρὸς τὸ σχῆμα τῶν
κρυστάλλων των. Ἐὰν ὑδροχλωρική σόδα διαλυθῇ εἰς ὑγρὸν ἐμπεριέχον
οὐρίνην δὲν κρυσταλλοῦται πλεόν εἰς κυβικοὺς κρυστάλλους, ἀλλὰ εἰς
ὀκταέδρους. Ἡ ἀλικὴ ἀμμωνία κρυσταλλοῦται ἐκ τοῦ μετὰ οὐρίνης ἀνα-
μιγνυομένου διαλύματος εἰς κύβους ἀντὶ εἰς ὀκταέδρα.

Ἡ οὐρίνη ἐμπεριέχει μετὰξὺ ὄλων τῶν ἄλλων ζωϊκῶν ὑλῶν τὸ πλεόν
μεγάλον ποσὸν νιτρογόνου· σύγκειται ἐκ:

Νιτρογόνου	46, 65
Ὄξυγόνου	26, 63
Ἀνθρακος	19, 97
Ἵδρογόνου	6, 61

Ἡ καθαρὰ καθὼς καὶ ἡ νιτρικὴ οὐρική ὕλη ὡς ἔχουσα διουρητικὴν δύ-
ναμιν, μεταχειρίζονται ἐνίοτε εἰς τὴν ὑδροπικίαν καὶ δυσουρίαν. Τὸ δὲ
οἶνοπνευματῶδες ἐκχύλισμα τοῦ οὔρου Extractum Urinae alcoholicum
ἐνεκὰ τοῦ μεγάλου ποσοῦ τοῦ ἐμπεριεχομένου νιτρογόνου κατὰ τοῦ διαβήτου.

Βλέννα τοῦ οὔρου.

Ἡ εἰς τὸ οὔρος εὕρισκομένη βλέννα καταβυθίζεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον
εἰς εἶδος θρόμβων. Ἐὰν τὸ οὔρος μεταγγισθῇ ἀπ' αὐτοῦς καὶ ἡ καταβυ-
θιζομένη βλέννα συναχθῇ ἐπὶ τοῦ διῦλιστῆρος, ξηραίνεται πρὸς στιλπνὴν
μάζαν. Τὸ ὑδροχλωρικὸν καὶ ὀξικὸν ὀξύ διαλύουσιν μέγα ποσὸν αὐτῆς,
εἶναι εὐδιάλυτος εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον, δι' οὗ δύναται ν' ἀποχωρισθῇ
ἀπὸ τὰ συγχρόνως καταβυθιζόμενα γαιώδη μόρια.

Γαλακτικὸν ὀξύ εἰς τὸ οὔρος.

Ὁ Proust καὶ Thenard ὑπέθεσαν τὸ εἰς τὸ οὔρος τοῦ ὑγιεοῦς ἀνθρώπου
ἐμπεριεχόμενον ἐλεύθερον ὀξύ, ὡς ὀξικὸν ὀξύ, κατὰ δὲ τὸν Berzelius
τὸ εἰρημένον ὀξύ εἶναι γαλακτικὸν ὀξύ, δι' οὗ διελύθησαν καὶ μερικὰ φωσ-
φορικά ἄλατα. Ὁ Berzelius ἀνεκάλυψεν ὅτι τὸ εἰς τὸ οὔρος ἐνυπάρχον

ὄξυ δὲν εἶναι πτητικόν· καθότι ἂν τὸ οὖρος τεθῇ εἰς ἀτμοσφαῖραν ἀμμωνίαν ἐμπεριέχουσαν δὲν σχηματίζεται ὄξις ἀμμωνία, ὡς ἤθελε σχηματισθῇ ἂν ἦτον ὄξις ὄξυ, ἀλλὰ γαλακτική ἀμμωνία· ἐκ τούτου δὲ ἀπεδείχθη τὸ ὄξυ ὡς γαλακτικόν.

Ἐκχυλισματικά μόρια εἰς τὸ οὖρος.

Ἐὰν τὸ μέχρι συστάσεως σερραπίου ἐξατμισθὲν οὖρος ἀναταραχθῇ με αἰθέρα θερμόν, δίδει εἰς αὐτὸν κίτρινον χρῶμα. Ἐὰν μέρος τοῦ μετὰ τὴν ἀπόψυξιν μεταγγίζομένου αἰθέρος ἀποσταχθῇ, εὐρίσκονται δύο στιβάδες εἰς τὸ δοχεῖον, ἡ ἄνω κιτρίνη τὸ χρῶμα, καὶ ἡ κάτω ἄχρους. Ἀφοῦ ἀποχωρισθῶσιν ἀμφοτέρω τὰ ρευστὰ ἐξατμίζονται μετὰ ταῦτα ἕκαστον κατὰ μέρος, καὶ ἡ μὲν στιβάς τοῦ ρευστοῦ ἐξατμιζομένη ἀφίνει ἐκχυλισματικὴν ὕλην, πικράν τὴν γεῦσιν καὶ ἐρυθροῦσαν τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου. Ὁ Berzelius ἐξετάσας τὰς ῥηθείας ὕλας ἀνεκάλυψεν ἐν αὐταῖς μίγμα ἐμπεριέχον γαλακτικὸν ὄξυ, καὶ γαλακτικὴν τίτανον, γαλακτικὴν ἀμμωνίαν, καὶ πικράν ἐκχυλισματικὴν ὕλην. Τὸ ὑπόλειμμα τοῦ διαλύματος τοῦ αἰθέρος εἶναι φύραμα κίτρινον, διαφανές, γλίσχρον, ἀηδές καὶ πιπερώδες τὴν ὁσμὴν, καὶ δριμύ ἀρωματικὸν τὴν γεῦσιν.

Παρά τοῦ ψυχροῦ ὕδατος δὲν καταθρέχεται, διαλύεται ὁμως εἰς ὀλίγον ποσόν, ἐπιμένοντος φαιοῦ τινος ἐλαίου. Ἐκ τοῦ διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ οὖρου ληφθέντος ὑπολείμματος ἐξεχύλισεν ὁ Berzelius διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος, ἐκτὸς τῆς οὐρίνης καὶ τοῦ γαλακτικοῦ νάτρου, ἰδιαιτέραν ἐκχυλισματικὴν ὕλην, ὁμοιάζουσαν εἰς τὴν καθάραν κατάστασιν μετὰ τὸ ὁμοζώμιον. Ἡ ὕλη αὕτη ἐνοῦται μεθ' ἀλάτων καὶ μεταβάλλει τὴν εἰς τὸ οἶνοπνευμα διχλωσιμότητά των, καὶ ἕνεκα τούτου ἐκκλέσθη παρὰ τοῦ Berzelius *ἀλόφιλος ὕλη*, Halophil. Πρὸς τούτοις εὐρέθη ὑπὸ τοῦ Proust ἰδιαιτέρα τις ῥητίνη οὐρορητίνη καλουμένη, ἥτις ἀποτίθεται, ἔὰν τὸ μέχρι σερραπίου συστάσεως ἐξατμισθὲν οὖρος, ἐξ ὧν τὰ ἐμπεριεχόμενα ἅλατα ἐκρυσταλλώθησαν, ἀναμιχθῶσιν μετὰ θειικοῦ ἢ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. Τοιοῦτοτρόπως ἀποχωρίζεται μέλαινα καὶ ἐλαιώδης ὕλη, ἥτις ἀποπλυθεῖσα δι' ἀρκοῦντος θερμοῦ ὕδατος, καὶ ἀποψυχρανθεῖσα φαίνεται ὡς ῥητίνη. Διαλύεται κατὰ μέγα μέρος εἰς τὸ οἶνοπνευμα καὶ εἰς τὰ ἀσθενέστερα ἀλκάλια, εἰς τὰ ὅποια δίδει κιτρινωπὸν ἢ φαιὸν χρῶμα. Εἰς τὴν ὕλην ταύτην ἀποδίδεται τὸ χρῶμα τοῦ οὖρου.

Οὐσία τις ἐμπεριεχομένη εἰς τὸ οὖρος τῶν κυοφορουσῶν γυναικῶν ἀνε-

καλύφθη πρὸ ὀλίγου καὶ καλεῖται *Kyestein*, *κυστίνη* ἀπὸ τὸ *κύνειν* καὶ *εσθής*. Ἡ ὕλη αὕτη ἀποχωρίζεται ἐκ τοῦ οὔρου τῶν ἐγκύων γυναικῶν ἡμέρας τινὰς μετὰ τὴν σύλληψιν εἰς σχῆμα λεπτοῦ καλύμματος ἔχοντος πάχος ὀλίγας γραμμάς. Τοῦτο τὸ κάλυμμα σύγκειται ἐκ πλέγματος κροκίδων καὶ κλωστῶν. Ἡ παρουσία τῆς ῥηθείσης ὕλης θεωρεῖται ἀσφαλὲς μέσον πρὸς διάκρισιν, ἐὰν γυνή τις εἶναι ἔγκυος, καὶ μάλιστα εἰς τὸ διάστημα τῶν τριῶν πρώτων μηνῶν μετὰ τὴν σύλληψιν.

Ὁ Berzelius ἐξετάσας τὸ ἀνθρώπινον οὔρος ἔλαβε τὰ ἐφεξῆς ἀποτελέσματα·

Ἰδατος 933, 006. Οὐρίνης 30, 10. Γαλακτικοῦ ὀξέος ἐλευθέρου, γαλακτικῆς ἀμμωνίας, ἐκχυλίσματος διαλυσίμου μόνον εἰς τὸ οἰνόπνευμα, καὶ διαλυσίμου εἰς τὸ ὕδωρ 17, 14. Οὐρικοῦ ὀξέος 1, 000. Βλέννας ἐκ τῆς οὐροδόχου κύστεως 0, 032. Θεϊκοῦ καλίου 3, 071. Νάτρου 3, 16. Φωσφορικοῦ νάτρου 2, 94. Διττὸ φωσφορικῆς ἀμμωνίας 1, 65. Ἀλικοῦ νάτρου 4, 45. Ἀμμωνίας 1, 50. Φωσφορικῆς τιτάνου καὶ μαγνησίας 1, 000. Χάλικος 000, 3.

Περὶ τοῦ οὔρου τινῶν ζώων.

Τὸ πρόσφατον οὔρος τῶν σαρκοφάγων ζώων εἶναι ὀξινόν, γίνεται δὲ ταχέως ἀλκαλικόν διὰ τοῦ σχηματισμοῦ τῆς ἀμμωνίας. Εἰς τὸ οὔρος τῶν ζώων τούτων ἀπαντᾷται ἡ οὐρίνη καθὼς καὶ ὀλίγον ποσὸν οὐρικοῦ ὀξέος.

Εἰς τὸ οὔρος τῶν χορτοφάγων ζώων λείπει τὸ οὐρικὸν ὀξύ καθὼς καὶ ἡ φωσφορικὴ τίτανος. Εἰς ἐναντίας δὲ ὑπάρχει τὸ οὐρικὸν ὀξύ εἰς τὸ οὔρος τῶν πτηνῶν, τῶν ἀμφιβίων καὶ ἰχθύων καὶ κατὰ τὰς ἐξετάσεις τοῦ *Iakobson* εὑρίσκεται καὶ εἰς τοὺς νεφροὺς τῶν μαλακῶν ζώων.

Οὔρος τοῦ *λέοντος*. Εἶναι ῥευστὸν κίτρινον, διαυγές, ἔχει δυνατὴν ἀηδὴ ὀσμὴν· τὸ πρόσφατον εἶναι ὀξινόν, γίνεται ὁμῶς ἀμμωνιώδες· ἐμπεριέχει 13 τοῖς 0/0 οὐρίνης, ἠνωμένης μὲ γαλακτικὸν ὀξύ καὶ ὀσμωζώμιον. Τὸ οὔρος τῶν τίγρεων καὶ λεοπαρδάλεων ὁμοιάζει τὸ τῶν λεόντων.

Οὔρος τῶν ἵππων. Εἶναι ὑπόχρον καὶ πολλάκις θολόν, ἡσύχως ἀφεθὲν ἀποθέτει φύραμα ἐξ ἀνθρακικῆς τιτάνου καὶ μαγνησίας, τὸ ὁποῖον μελανίζεται, ἐὰν πυρωθῇ. Εἰς τὸ εἰρημένον οὔρος ἐκτεθῇ εἰς τὸν ἀέρα,

λαμβάνει φαιόν χρώμα, και ζεόμενον καθιζάνει μεγαλύτερον ποσόν άνθρακιῆς τιτάνου, μετά ζωϊκῆς τινος ὕλης. Ἐάν εξατμισθῶσι 100 μέρη, ὑπολείπονται μόνον 5 μέρη στερεοῦ ὑπολείμματος. Ἐάν τὸ εξατμιζόμενον οὖρος ἀναμιχθῇ μὲ ὕδροχλωρικὸν ὀξύ, καταβυθίζεται τὸ ἱπποδενζοϊκὸν ὀξύ. Κατὰ τὸν Foucroy καὶ Vanquelin ἐμπεριέχει τὸ οὖρος τῶν ἵππων: Οὐρίνης 0, 7. Βενζοϊκὸν νάτρον 2, 4. Ἀνθρακικοῦ νάτρου 0, 9. Ἀλικοῦ καλίου 0, 9. Ἀνθρακιῆς τιτάνου 0, 2. Ὑδατος μετά φλέγματος καὶ ἐλαιώδους ὕλης 94, 0. Κατὰ δὲ τὸν Chevreuil ὑπάρχει καὶ ὀλίγον ποσὸν θειικῆς τιτάνου.

Οὖρος τῶν βοῶν. Ἐμπεριέχει οὐρικὴν ὕλην, βενζοϊκὸν νάτρον, μετά ἀνθρακιῆς, ὕδροχλωρικῆς καὶ θειικῆς ποτάσσης· πρασινίζει τὸ θερᾶ-
πιον τῶν ἱών, καὶ διὰ τῶν ὀξέων ἀναβράζει.

Οὖρος τῶν καμήλων. ἔχει ὑπόφαιον χρώμα, καὶ ὁμοιάζει ὡς πρὸς τὴν ὁσμὴν τὸ τῶν βοῶν. Διὰ τῆς ἀποστάξεως ἐκδίδει ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν, καὶ ἐρυθρὸν πτητικὸν ἔλαιον, καὶ ἰδιαιτέραν ὁσμὴν. Δὲν ἐμπεριέχει φωσφορικὰ ἅλατα, μήτε οὐρικὸν ὀξύ. Ὁ Chevreuil ἀνεκάλυψεν εἰς τὸ οὖρος τῶν καμήλων τὰς ἐφεξῆς ὕλας: λεύκωμα, ἀνθρακικὴν τίτανον, ἀνθρακικὴν μαγνησίαν, ἔχνη γύψου καὶ σιδήρου, ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν, ἔχνη ὕδροχλωρικῆς ποτάσσης, θειικὸν νάτρον, ἀνθρακικὸν κάλιον, θειικὸν κάλιον εἰς ἀρκετὴν ποσότητα, βενζοϊκὸν ὀξύ, οὐρικὴν ὕλην καὶ ἐρυθρὸν πτητικὸν ἔλαιον.

Οὖρος τοῦ ρινοκέρου. Εἶναι θολὸν καὶ ἀποθέτει ταχέως καὶ εἰς ἀρκετὴν ποσότητα ἱζημα ὠχρόν. Τὸ δὲ διῴλισθὲν οὖρος ἔχει ἐπίσης βαθυκίτρινον χρώμα καὶ ὁσμὴν ἰδιαιτέραν ὡς τῶν μυρμηκῶν. Συναπτόμενον μετά τῶν ὀξέων ἀναζέει ἰσχυρῶς, εἰς τὸν ἀέρα γίνεται φαιὸν καὶ σκεπάζεται μὲ κρυσταλλώσιμον ὑμένια ἐξ ἀνθρακιῆς τιτάνου καὶ βλέννας, θερμαινόμενον μέχρι ἀναξέσεως ἀφρίζει δυνατὰ καὶ ἐκλύει πολὺ ἀνθρακικὸν ὀξύ. Τὸ ὕδατῶδες ἀποστάλαγμα ἐμπεριέχει ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν. Ἐκ τοῦ διὰ τῆς εξατμίσεως πεπυκνωμένου οὖρου κατακρημνίζεται διὰ τοῦ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος ποσὸν τι βενζοϊκοῦ ὀξέος.

Εἰς τὸ οὖρος τοῦ ρινοκέρου ἐξιχνεύθη: Ἀνθρακικὴ τίτανος καὶ ἀνθρακικὴ μαγνησία, χάλιζ, γύψος, ὀξειδίου σιδήρου, ἀνθρακικὴ ἀμμωνία, ὕδροχλωρικὸν κάλιον, θεῖον, βενζοϊκὸν ὀξύ καὶ οὐρίνη.

Τὸ οὖρος τοῦ ἐλέφαντος ὁμοιάζει κατὰ τι μὲ τὸ τοῦ ρινοκέρου, ἐμπε-

ριέχει ὅμως ὀλιγώτερον ποσὸν ἀνθρακικῶν γαιῶν, πλειοτέραν οὐρίνην, καὶ διόλου βενζοϊκὸν ὀξύ.

Οὖρος τῶν πτηνῶν. Ἐμπεριέχει μέγα ποσὸν οὐρικῆς ἀμμωνίας· εἰς τὸ οὖρος τῶν ἀετῶν εὐρίσκεται ἐκτὸς αὐτῆς καὶ πρασίνη τις ὕλη. Τὸ οὖρος τοῦ Στρουθίου ἔμπεριέχει κατὰ τὸν Foucroy καὶ Vauquelin οὐρικὸν ὀξύ, ζωϊκὴν τινα ὕλην, θειϊκὴν τίτανον καὶ θειϊκὸν κάλιον, ὑδροχλωρικὴν ἀμμωνίαν καὶ ἐλαϊώδη ὕλην.

Τὸ οὖρος τοῦ ἀετοῦ ἔμπεριέχει οὐρικὴν ἀμμωνίαν μετὰ φωσφορικῆς τιτάνου. Τὸ οὖρος τῶν ἐκ τῶν φυτικῶν σπόρων τρεφομένων πτηνῶν, εἶναι λευκόν, καὶ λιπώδες τὴν ἀφὴν καὶ ἔμπεριέχει: Ἀμμωνίας 8, 47. Οὐρικοῦ ὀξέος 88, 47. Φωσφορικῆς τιτάνου 1, 48.

Τὸ οὖρος τῶν ὄψεων εἶναι σχεδὸν ἄχρουν ρευστὸν, καὶ πηγνύται εἰς τὸν ἀέρα πρὸς λευκὴν γαιώδη μάζαν· συνίσταται ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος καὶ οὐρικῶν ἀλκαλίων.

Τὸ οὖρος τῶν βατράχων ἔμπεριέχει ὑδροχλωρικὸν νάτρον, οὐρίνην καὶ φωσφορικὴν τίτανον.

Χρήσις τοῦ οὖρου. Τὸ οὖρος μεταχειρίζεται ποικίλως εἰς τὰς τέχνας· ἐξόχως μεταχειρίζεται τὸ σεσηπὸς οὖρος, ἕνεκα τῆς διὰ τῆς σήψεως ἀποσυνθετομένης οὐρικῆς ὕλης καὶ τῆς μεταβολῆς αὐτῆς εἰς ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν πρὸς κατασκευὴν τῆς ὑδροχλωρικῆς ἀμμωνίας, πρὸς γνάψιν τῶν μαλίνων ὑφαγμάτων, καὶ πρὸς διάλυσιν διαφόρων χρωμάτων εἰς τὴν βαφικὴν. Τὸ βόειον οὖρος πρὸς κατάβρεξιν τῆς νιτρογόνου γῆς εἰς τὰ τὸ νίτρον κατασκευάζοντα καταστήματα, ἐπειδὴ τὸ νιτρογόνον ὀξειδούμενον ὀλίγον κατ' ὀλίγον μεταβάλλεται εἰς νιτρικὸν ὀξύ, τὸ ὅποῖον ἐνοῦται μετὰ τῶν διαφόρων βάσεων· τέλος μεταχειρίζεται τὸ οὖρος ὡς κόπρος τῶν ἀγρῶν. Λέγουσιν ὅτι νομάδες τινὲς λαοὶ ἐξατμίζουν εἰς τὸ οὖρος μέχρι ξηροῦ, καὶ ἀφοῦ τὸ καίουσιν, ἐκχυλίζουν τὸ ἐν τῇ τέφρᾳ ἔμπεριεχόμενον ἄλας, τὸ ὅποῖον δὲν δύνανται νὰ πορισθῶσι κατ' ἄλλον τρόπον.

Περὶ τῶν λίθων τῆς οὐροδόχου κύστεως.

Calculs urinaires.

Συγκρίματα τῆς οὐροδόχου κύστεως. Ἄπασαι αἱ εἰς τὸ ἀνθρώπινον οὖρος εὐρισκόμεναι δυσδιάλυτοι καὶ ἀδιάλυτοι ὕλαι, δύνανται νὰ καταβυθισθῶσιν ἐξ αὐτοῦ ἐκτὸς τῶν οὐροποιητικῶν ὀργάνων, καὶ νὰ προά-

ξωσι διάφορα συγκρίματα. Τὰ συγκρίματα ταῦτα γεννῶνται καὶ εἰς τὴν οὐροδόχον κύστιν, καὶ εἰς τοὺς νεφροὺς, ὅπου συνήθως μικρόν τι σῶμα σχηματίζει τὸ κέντρον, περὶ τὸ ὅποιον ἐναποτίθενται ἕτερα σῶματα, αὐξάνοντα τοιουτοτρόπως τὸ μέγεθος τοῦ συγκρίματος. Τὰ εἰς τὴν κύστιν, εἰς τοὺς νεφροὺς, εἰς τοὺς οὐρητῆρας καὶ εἰς τὸν καυλῶνα εὐρισκόμενα συγκρίματα, τῶν ὁποίων τὰ μικρότερα εἶναι γνωστὰ ὑπὸ τὸ ὄνομα ἄμμος τοῦ οὔρου, ἔχουν διάφορα σχήματα· ἐνίοτε εἶναι κονιοειδῆ κατασταλάγματα, ἄλλοτε κρυσταλλώδη καταβυθίσματα καὶ τέλος πάντων, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον μεγάλοι στερεοί, ἢ μαλακοὶ λίθοι.

Ἐὰν εἰς τὴν κύστιν ὑπάρχει εἰς μόνον λίθος, ἔχει συνήθως σχῆμα ὠοειδές, εἶναι λευκός, ἢ κιτρινωπός, τεφρόχρους ἢ φαιός τὸ χρῶμα, ἢ ἐπιφάνειά του εἶναι ὁμαλὴ ἢ τραχεῖα, καὶ εἰς τὴν περίστασιν ταύτην καλοῦνται οἱ λίθοι *συκαμυαῖοι*· πολλάκις ἀπαντῶνται μὲ ἐπιφανεῖαν πορώδη ὡς βεβρωμένοι· ἐνίοτε εἶναι πολλὰ μικροὶ ἄλλοτε ἔχουσι τὸ μέγεθος ὡοῦ τῆς νήσσης.

Ὡς πρὸς τὴν χημικὴν των σύθεσιν διαφέρουσιν τὰ μέγιστα ἀπ' ἀλλήλων. Αἱ κυριώτεραι ὕλαι, αἵτινες εὐρέθησαν εἰς τοὺς λίθους τῆς οὐροδόχου κύστεως, εἶναι αἱ ἑξῆς.

Οὐρικὸν ὁξὺ, τὸ ὅποιον συχνότατα ἀπαντᾶται ἡνωμένον μετὰ λευκώματος καὶ βλέννης, τῆς κύστεως. Τοιοῦτοι λίθοι διαλύονται εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον, καὶ ἐκ τοῦ ἀποτελουμένου ὑγροῦ δύναται νὰ καταβυθισθῇ τὸ οὐρικὸν ὁξὺ διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὁξέος· πολλάκις ἐμπεριέχουσι μικρὰν ποσότητα φωσφορικῶν ἀλάτων καὶ ὀξυχλικῆς τιτάνου.

Οὐρικὴ ἀμμωνία. Οἱ λίθοι οἱ ἐμπεριέχοντες τοῦτο τὸ ἄλας εἶναι συνήθως μικροί, πλατεῖς, κίτρινοι ἔξωθεν καὶ φαιοὶ ἔσωθεν, γαιώδεις τὴν θραῦσιν, καὶ εὐδιάλυτοι εἰς τὰ καυστικὰ ἀλκάλια ὑπὸ ἐκλυσιν ἀμμωνίας. Δὲν ἀπαντῶνται τόσον συχνὰ ὡς οἱ ἐκ καθαροῦ οὐρικοῦ ὁξέος συγκείμενοι καὶ ἡ καλουμένη ψάμμος τῆς οὐροδόχου κύστεως σύγκειται ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἁλτος.

Ὅχι σπανίως ἀπαντῶνται λίθοι ἐξ οὐρικοῦ νάτρου, φωσφορικῆς τιτάνου, μετὰ φωσφορικῆς ἀμμωνίας καὶ μαγνησίας. Τοιαύτης φύσεως λίθοι εἶναι λευκοὶ τὸ χρῶμα, εὐθραυστοὶ καὶ ἐγκλείουσι μικροὺς διαφανεῖς κρυστάλλους ἐκ φωσφορικῆς ἀμμωνίας καὶ φωσφορικῆς μαγνησίας. Διὰ τοῦ σαλπιγγίου τίθενται εὐκόλως· ἕνεκα τούτου ἐκαλέσθησαν παρὰ τοῦ Wollaston *εὐτήκτοι λίθοι*. Διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὁξέος διαλύεται ἐξ αὐτῶν ἡ φωσφορικὴ μαγνησία ἐναμμώνιος, τὸ δὲ ὑδροχλωρικὸν ὁξὺ

τούς διαλύει έντελώς· εάν δὲ ὑπάρχη μεγαλύτερον ποσὸν τιτάνουχου ἄλατος, τότε οἱ εἰρημένοι λίθοι δὲν τήκονται διὰ τοῦ σαλπιγγίου. Ἡ φωσφορικὴ τίτανος ἀναμεμιγμένη μετὰ ζωϊκῆς ὕλης ἀπαντᾷται σπανίως, καὶ ἀκόμη σπανιότερα ἔχνη χάλικος.

Ἐκ τῶν προσεκτεθέντων ἀλάτων σύγκεινται τὰ εἰς τὴν οὐροδόχον κύστιν τῶν ἀνθρώπων ἀπαντῶμενα συγκροίματα, καθὼς καὶ ἡ λεγομένη ψάμμος.

Ἀνθρακικὴ τίτανος. Λίθοι ἐκ τοιοῦτου ἄλατος ἀπαντῶνται σπανίως εἰς τὴν τῶν ἀνθρώπων οὐροδόχον κύστιν, καὶ ένωμένοι μετὰ ζωϊκῆς θλέννης. συχνότερα δὲ ἀπαντῶνται τοιοῦτοι λίθοι εἰς τὴν κύστιν τῶν χορτοφάγων ζώων· εἶναι λευκοί, στακτόχροες, ένίοτε ὠχρόφαιοι μετ' ἀνωμάλου ἐπιφανείας, διαλύονται εἰς τὸ ὕδροχλωρικὸν ὀξύ μετὰ ἀναζέσεως, καὶ πυρούμενοι ἀποθέτουσιν καυστικὴν τίτανον. Ὁ Fromherz ἀνέλυσεν λίθον συνιστάμενον ἐξ ἀνθρακικῆς τιτάνου O, 91, φωσφορικῆς τιτάνου, O, O3, λευκώματος μετὰ φαιᾶς χρωματιστικῆς ὕλης, καὶ ἐξ ὀξειδίου σιδήρου, ένίοτε εὐρίσκεται καὶ ὀλίγον ποσὸν ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας.

Ὁξαλικὴ τίτανος. Οἱ λίθοι, οἵτινες σύγκεινται ἐξ ὀξαλικῆς τιτάνου, ἐμπεριέχουσιν πολλάκις καὶ ὀλίγον ποσὸν οὐρικοῦ ὀξέος καὶ φωσφορικῆς τιτάνου. Εἶναι φαιοὶ τὸ χρῶμα καὶ ἀνωμάλου ἐπιφανείας· ένίοτε εἶναι τόσοι μικροὶ ὥς ὁ σπόρος τοῦ καννάβεως σκληροὶ καὶ στιλπνώσεως ἐπιδεκτικοί, καὶ ἐκπέμπουσι· εάν διασχισθῶσι διὰ πριονίου, ὁσμήν ὁμοίαν τοῦ λίπους τοῦ κήτους. ἔχουσι μετὰξὺ ὧν τῶν ἄλλων λίθων τῆς οὐροδόχου κύστεως τὸ μεγαλύτερον εἰδικὸν βάρος, μετὰ τὴν πύρωσίν των ἐπιμένει ἡ τίτανος εἰς καθαρὰν κτάστασιν, εἶναι διαλύσιμοι εἰς τὸ ὕδροχλωρικὸν ὀξύ ἀνευ ἀναζέσεως καὶ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ διαλύματος ἀποτίθεται τὸ ἄλας εἰς εἶδος μικρῶν κρυστάλλων. δὲν ἐξιχνεύθη εἰσέτι· εάν τὸ ὀξαλικὸν ὀξύ εἰσέρχεται εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα διὰ τῶν τροφίμων ἢ σχηματίζεται εἰς τὸ σῶμα· μόνον τοῦτο ἐπαρτηρήθη, ὅτι λίθοι ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος μετεβλήθησαν διὰ τῆς τροφῆς τῶν σταφυλῶν εἰς λίθους ἐξ ὀξαλικοῦ ὀξέος.

Βλέμμα τῆς κύστεως. Cystin.

Οἱ ἐκ τοῦ ὀξειδίου τῆς θλέννης συνιστάμενοι λίθοι εἶναι μικροὶ κιτρινωποί, ὁμαλῆς ἐπιφανείας, ὄχι στιβαδωτοί, λαμπρίζοντες καὶ κρυσταλλῶσιμοι τὴν θραυσίν των. Ἡ ὕλη αὕτη ἀνεκαλύφθη παρὰ τοῦ Wollaston εἰς τοὺς λίθους.

Πρὸς ἀποχώρισιν τῆς εἰρημένης ὕλης διαλύονται οἱ λίθοι εἰς τὴν ὑγρὰν ἀμμωνίαν καὶ τὸ διῦλισθὲν ῥευστὸν ἐξατμίζεται εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἐξ αὐτοῦ κρυσταλλοῦται ἡ *κυστίνη*· κατὰ τὸν Lassaigne διαλύονται οἱ λίθοι εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον καὶ ἐκ τοῦ διῦλισθέντος ὑγροῦ καταβυθίζεται ἡ *κυστίνη* διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος. Ἐάν τὸ ζέον διάλυμα ἀναμιχθῇ μετὰ ὑπερτεροῦντος ποσοῦ ὀξους, κρυσταλλοῦται ἡ *κυστίνη* μετὰ τὴν ἀπόψυξιν εἰς εἶδος ἀχρόων καὶ διαφανῶν φυλλιδίων.

Ἡ κρυσταλλώσιμος *κυστίνη* εἶναι οὐδετέρη καὶ ἄτηκτος ὕλη, καίει μετὰ πρασίνης φλογός, καὶ ἐκπέμπει διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποσταξέως ἀνθρακικὴν ἀμμωνίαν καὶ δυσῶδες ἔλαιον, εἶναι σχεδὸν ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ καθὼς καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Τινὰ ὀξέα καθὼς τὸ θεικόν, νιτρικόν, ὑδροχλωρικόν, φωσφορικόν καὶ ὀξαλικόν ὀξύ διαλύουσιν τὴν *κυστίνη*ν καὶ παρέχουσιν, ἐάν ἐξατμισθῶσι, μικροὺς καὶ ὀξεῖς κρυστάλλους. Εἰς τὸ ὀξικόν καὶ τρυγικόν ὀξύ δὲν διαλύεται. Παρομοίως αἱ ἐνώσεις τῆς *κυστίνης* μετὰ τοῦ καλίου καὶ σόδας δὲν κρυσταλλοῦνται. Ὁ Wollaston ἐξέτασεν τινὰ λίθον, ὅστις ἐμπεριείχεν:

Κυστίνης 97, 5

Φωσφορικῆς τιτάνου 2, 5

Ὁ Marcet ἐξετάσας λίθον ξανθόφαιον ἀνεκάλυψεν εἰς αὐτὸν ἰδιαιτέραν ὕλην τὴν ὁποίαν καλεῖ *ξανθοξείδιον* Xantikoxyd. Ἡ λειοτετριμμένη κόνις τοῦ λίθου τούτου διαλύεται εἰς τὸ ζέον ὕδωρ καὶ ἐκ τοῦ διαλύματος καθιζάνει μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τὸ *ξανθοξείδιον* εἰς εἶδος κρυσταλλωσίου ὑμένος. Εἶναι πολὺ εὐδιάλυτότερον εἰς τὸ ὕδωρ παρὰ τὴν *κυστίνη*ν καὶ λαμβάνει διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος κίτρινον χρῶμα. Πρὸς τούτοις εὐρέθησαν εἰς τὸν εἰρημένον λίθον καὶ λεύκωμα, βλέννα τῆς οὐροδόχου κύστεως, καὶ ὀλίγη ποσότης λίπους.

Περὶ τῶν λίθων τῶν εἰς τὴν οὐροδόχον κύστιν τῶν ζώων.

Καὶ εἰς τὴν οὐροδόχον κύστιν διαφόρων ζώων ἀπαντῶνται λίθοι, τῶν ὁποίων τὰ συστατικὰ εἰς ὀλίγην μόνον ποσότητα ἀπαντῶνται εἰς τὸ οὐρὸς των, καὶ σχηματίζονται διὰ τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος καὶ τῆς φωσφορικῆς τιτάνου. Οἱ λίθοι τῶν χορτοφάγων ζώων ἐμπεριέχουσιν συνήθως ἀνθρακικὴν τίτανον,

Εἰς τοὺς λίθους τῶν κυνῶν εὐρέθησαν ἐξόχως βλέννα τῆς οὐροδόχου κύ-

στεως, κυστίνη, ούρικὸν ὀξύ, φωσφορικὴ τίτανος, φωσφορικὴ μαγνησία μετ' ἀμμωνίας καὶ ὀξικὴ τίτανος.

Οἱ λίθοι τῶν ἵππων ἐμπεριέχουσιν συνήθως ἀνθρακικὴν καὶ φωσφορικὴν τίτανον, φωσφορικὴν ἀμμωνίαν, μαγνησίαν, γύψον, χάλικα, βλένναν τῆς κύστεως καὶ λίπος.

Εἰς τοὺς λίθους τῆς οὐροδόχου κύστεως τῶν βοῶν εὐρίσκονται παρομοίως ἀνθρακικὴ καὶ φωσφορικὴ τίτανος, φωσφορικὴ μαγνησία, χάλιξ, καὶ βλέννα.

Ὁ Angelini εὔρεν εἰς τὸν λίθον τινὸς χοίρου ῥητινώδη ὕλην διαλύσιμον εἰς τὸ οἰνόπνευμα, τὸν αἰθέρα καὶ τὰ ἔλαια μετὰ ἐρυθροῦ χρώματος. Εὐρίσκειται προσέτι εἰς τοὺς λίθους τῶν χοίρων φωσφορικὴ τίτανος, φωσφορικὴ μαγνησία ἐναμμώνιος, καὶ τινα ἄλλα ἄλατα.

Οἱ λίθοι τῶν γαλῶν ἐμπεριέχουσιν φωσφορικὴν τίτανον καὶ οἱ τῶν κυνέλων ἀνθρακικὴν τίτανον.

Εἰς τοὺς νεφροὺς τῶν ποντικῶν ἀπαντῶνται συχνάκις λίθοι συγχεύμενοι ἐξ ὀξυλικῆς, φωσφορικῆς καὶ ἀνθρακικῆς τιτάνου. Καὶ εἰς τὰ οὐροποιή-
τικὰ ὄργανα μεγάλων ἰχθύων, καθὼς εἰς τὴν κύστιν τῶν ἐλόπων καὶ τῶν ἀντακαίων ἀπαντῶνται πολλάκις μεγάλα συγκρίματα ζυγιάζοντα $\frac{1}{2}$ λί-
τραν. Εἶναι σκληρά, εὐθραυστα καὶ ἀκτινοειδῆ τὴν θραύσιν, καίόμενα λαμ-
βάνουν λευκὸν χρῶμα καὶ διαλύονται εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ ἄνευ ἀναζέ-
σεως. Ὁ Klaproth ἐξετάσας τοιοῦτον λίθον ἀνεκάλυφεν ἐν αὐτῷ.

Φωσφορικῆς τιτάνου 75, 05

Γύψου 0, 05

Λευκώματος καὶ ὕδατος 24, 00

100.

Ἐὰν σχηματισθῶσι μικρὰ συγκρίματα εἰς τοὺς νεφροὺς, δύνανται πολ-
λάκις νὰ διαλυθῶσι διὰ τῆς χρήσεως τῶν ἀνθρακικῶν ἀλκαλίων, καθὼς καὶ
τοῦ βορικοῦ νάτρου, ὅστις ἔχει εἰδικὴν διαλυτικὴν δύναμιν ἐπὶ τοῦ οὐρικοῦ
ὀξέος καὶ τῶν ἀλάτων αὐτοῦ. Δι' αὐτῶν διαλύονται ἐντὸς τῆς κύστεως οἱ
λίθοι, μεταφέρονται εἰς τὸ οὖρας καὶ οὕτως ἐκκενοῦνται. Ἐὰν ὅμως ἐσχη-
ματίσθῃ ἤδη λίθος εἰς τὴν οὐροδόχον κύστιν, πρέπει νὰ ἐκβληθῇ ἐξ αὐτῆς
ὅσον ἐνεστι τάχιστα, διὰ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ αὔξησις του.

Διὰ νὰ διαλυθῶσι τοιαῦτα συγκρίματα δι' ἐγγύσεως, μεταχειρίζοντα
κεκραμένα διαλύματα ἀνθρακικοῦ καλίου ἢ βόρακος, δι' ὧν ὀλίγον κατ'
ὀλίγον διαλύεται ὁ λίθος.

Τὸ πρὸς ἐγγυσιν καταλλήλοτερον μέσον εἶναι ὑπόθερμον διάλυμα συνιστάμενον ἐξ ἑνὸς μέρους ἀνθρακικῆς ποτάσεως εἰς 90 — 100 μέρη ὕδατος, προστιθεμένου ἀφελήματος τοῦ σπέρματος τῶν κυδωνίων ἢ τοῦ λίνου. Τοῦτο τὸ διάλυμα ἐνεργεῖ ἐπὶ τῶν λίθων ὁποιασδήποτε συνθέσεως. Πρέπει ὅμως νὰ σημειώσωμεν ὅτι ἡ ἐπιτυχία ταιούτων ἐγγύσεων ἐξαρτᾶται πολὺ ἀπὸ τὴν ὥς ἐγγιστα γνῶσιν τῆς συνθέσεως τῶν συγκριμάτων. Ἐὰν τὸ οὖρος εἶναι ὀξινόν, τότε ὑποτίθεται ὁ λίθος συνιστάμενος ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος ἢ ἐξ ὀξαλικοῦ τιτάνου. Ἐὰν εὐρεθῇ ἀλκαλικόν ἢ οὐδέτερον, παραδεχόμεθα τοὺς λίθους συνισταμένους ἐκ φωσφορικῶν γαιῶν. Αἱ εἰρημέναι ἐγγύσεις σπανίως ἐπέτυχον, καὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπαιτοῦνται χειρουργικαὶ ἐγχειρίσεις, ἢ γουν ἢ λιθοτομία ἢ λιθοτριψία.

Μεταβολὴ τοῦ οὔρου διὰ νόσων ἢ ἄλλων αἰτιῶν.

Ἐνίοτε ἐμπεριέχει τὸ οὖρος λεύκωμα καὶ τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα ἁσθενοῦς καταστάσεως τοῦ ὑποκειμένου. Εἰς τοιαύτην περίσσειαν ἀνακαλύπτεται τὸ λεύκωμα διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηλίδων, δι' οὗ τὸ οὖρος καταβυθίζεται.

Διὰ τῆς τροφῆς τῶν σπαράγγων λαμβάνει τὸ οὖρος ἰδιαιτέραν ἀηδῆ ὀσμὴν, ἥτις δὲν ὁμοιάζει μὲ τὰς ἐν τοῖς σπαράγγοις ἐμπεριεχομένας ὕλας.

Τὸ ἔλαιον τῆς τερεβινθίνης καὶ διάφορα θάλασσα καὶ ρητίναι, πινόμενα ἢ ἐξωτερικῶς μόνον ἐντριβόμενα μεταδίδουσιν εἰς τὸ οὖρος ἰδιαιτέραν ἀρωματικὴν ὀσμὴν ὁμοίαν τῶν ἔλκων. Διὰ τῆς καταπόσεως τοῦ ὀπίου ἢ τῶν μανιταριῶν λαμβάνει τὸ οὖρος ναρκωτικὴν ὀσμὴν· διὰ δὲ τῆς τῶν ἐλαίων τοῦ νάρδου, τοῦ σκυρόδου ὁμοίαν αὐτῶν. Διὰ τῆς καταπόσεως τῆς ῥίζας ῥᾶς λαμβάνει τὸ οὖρος τὸ ἰδιαιτέρον κίτρινον χρῶμα τῆς ῥᾶς, δυνάμενον νὰ ἀνακαλυφθῇ διὰ τῶν ἀλκαλίων. Ἐπίσης ἡ βαφικὴ ὕλη τῶν κερασίων, τῶν συκαμίνων καὶ ἄλλων τινῶν καρπῶν μεταβαίνει εἰς τὸ οὖρος, ὥστε ἐρυθροῦται δι' ὀξέων καὶ προσινίζει δι' ἀλκαλίων. Διὰ συνεχοῦς χρήσεως τῶν διὰ τοῦ σιδήρου ἀλάτων καταβυθίζεται ἐνίοτε ἐκ τοῦ οὔρου τῶν ἀνθρώπων κυανοῦν καταβύθισμα, τὸ ὁποῖον συνίσταται ἐξ ὕδροκυανικοῦ σιδήρου. Εἰς διαφόρους νόσους τὸ οὖρος δὲν εἶναι ὀξὺ, ἀλλ' ἀλκαλοειδές· τὸ οὖρος τῶν μεταχειριζομένων κατασκευασίας ἐξ ὑδραργύρου ἐμπεριέχει ὑδράργυρον.

Πολλὰ φυτικὰ ὀξέα, καθὼς τὸ ὀξαλικόν, τρυγικόν, βενζοϊκόν, ἡλε-

κτρικὸν ὀξύ κ. τ. λ. μεταβαίνουν εἰς τὸ οὖρος, ἐπίσης μεταβαίνουν εἰς αὐτὸ τὰ ἰωδικὰ ἄλατα. Μετὰ τὴν κατάποσιν τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος καὶ ἄλλων τινῶν στυπτικῶν μέσων καταβυθίζεται τὸ οὖρος μὲ μέλαν χρῶμα διὰ τῶν τοῦ σιδήρου ἀλάτων. Παρομοίως πολλὰ ἄλλα ἄλατα, τὰ ὁποῖα καταπίνονται, καθὼς τὸ ὑδροκυανικὸν κάλιον ἐνσίδηρον, δύνανται νὰ εὐρεθῶσιν εἰς τὸ οὖρος.

Πρὸς τούτοις ἀνεκάλυψεν ὅτι τὰ οὐδέτερα ὀργανικὰ ἄλατα καταπίνον-
μενα ἀποσυντίθενται διὰ τῆς ζωικῆς δυνάμεως οὕτως, ὥστε τὰ κάλια μεταβάλλονται εἰς ἀνθρακικά, καὶ ὡς τοιαῦτα ἀνκαλύπτονται εἰς τὸ οὖρος. Ἔνεκα τούτου μετὰ τὴν βρῶσιν τῶν μήλων, τῶν κερασίων, τῶν τοῦ βάτου καρπῶν εἶναι τὸ οὖρος ἀλκαλικόν, ἐπεὶ οἱ ῥηθέντες καρποὶ ἐμπεριέχουσιν μηλικὸν καὶ κιτρικὸν κάλιοι μεταβαλλόμενα εἰς ἀνθρακικά. Δι' αὐτοὺς τοὺς λόγους θεωροῦνται οἱ καρποὶ οὗτοι ἐπωφελεῖς κατὰ τῆς λιθιάσεως, ἰδίως δὲ, ἐὰν οἱ λίθοι σύγκηνται ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος.

Ἐὰν τὸ ἀνθρώπινον οὖρος εἶναι γαλακτώδες, τότε ἐξίχνυεται εἰς αὐτὸ ἡ τυρικὴ ὕλη καθὼς καὶ λίπος. Τὸ οὖρος τῶν ὑπὸ νευρικῶν πυρετῶν νοσούντων ἔχει ξανθὸν χρῶμα, καθιζάνει κιτρίνην ἢ ἐρυθρὰν κόνιν, συνισταμένην σχεδὸν ὁλοτελῶς ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος μετὰ χρωματιστικῆς ὕλης καὶ βλέννης, ὀλίγης οὐρίνης, φωσφορικῆς τιτάνου καὶ φωσφορικῆς μαγνησίας.

Οὖρος κυανοῦ.

Σπάνιως εἶναι τὸ οὖρος κυανοῦν, χωρὶς νὰ ἐμπεριέχεται ὑδροκυανικὸς σίδηρος. Πρὸς ἀποχώρησιν λοιπὸν τῆς κυανῆς ταύτης ὕλης διαλύεται τὸ κυανοῦν ἴζημα εἰς οἰνόπνευμα, καὶ ἐξάτμισθέντος τοῦ ὑγροῦ τούτου ἐπιμένει ἡ κυανὴ ὕλη, ἥτις καλεῖται *κυανουρίνη Cyanuric*. Παρὰ τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος διαλύεται ἡ κυανουρίνη πρὸς ἐρυθρὸν ρευστόν. Διαλύεται ἀπὸ τὸ θεϊκὸν ὀξύ κεκραμένον, καὶ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τῆς διαλύσεως ἐπιμένει πορφυρὰ ὕλη, ἥτις εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ εἰς τὸν ζέοντα αἰθέρα μετὰ κυανοῦ χρώματος.

Οὖρος μέλαρ. Ὁ K. Marcel ἐξέτασεν παιδίου τινὸς τὸ οὖρος, τὸ ὁποῖον ἐνῶ δὲν ἐμπεριεῖχεν οὐρικὸν ὀξύ μήτε οὐρίνην, ἦτον μέλαν ὡς ἡ μελάνη. Ὁ Prout θεωρεῖ τὴν ὕλην ταύτην ὡς ἰδιαιτέραν, καὶ τὴν καλεῖ *Melanitic Acid*.

Εάν προστεθῇ εἰς τοιοῦτον οὖρος ὄξύ τι, κατακρημνίζεται ἡ ὕλη αὕτη εἰς εἶδος μελανῶν κροκίδων, καὶ τὸ οὖρος λαμβάνει ἀνοικτότερον χρώμα. Τὸ μέλαν τοῦτο καταβύθισμα εἶναι ὀλίγον διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα, παρὰ δὲ τοῦ νιτρικοῦ καὶ θειικοῦ ὀξέος διαλύεται πρὸς μέλανα ρευστὰ ἐκ τῶν ὁποίων καθίζανει ἡ μέλανα ὕλη δι' ὕδατος εἰς ἀμετάβλητον κατάστασιν. Τὰ καυστικά κάλια καὶ ἀνθρακικά τὴν διαλύουσιν πρὸς βαθέως χρωματισμένα ρευστὰ, ἐκ τῶν ὁποίων καταβυθίζεται διὰ τῶν ὀξέων.

Τὸ διάλυμα τῆς μελανῆς ταύτης ὕλης διὰ τῆς ἀμμωνίας, παρέχει, ἐάν ἐξατμισθῇ, στιλπνὴν, μελανὴν καὶ εὐθραυστον μάζαν, εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ. Τὸ διάλυμα τῶν μετάλλων καταβυθίζεται διὰ τῆς λεχθείσης διαλύσεως καὶ μετὰ φαιοῦ χρώματος. Ἐκ τῶν γενομένων παρατηρήσεων ἔπεται ὅτι ἡ μέλαινα ὕλη ἔχει ἀναλογίαν τινὰ μετὰ τοῦ εὐρώτος.

Οὖρος τῶν ἱκτερικῶν. Τὸ οὖρος τοῦτο εἶναι κίτρινον ὡς ὁ κρόκος καὶ πικρὸν τὴν γεῦσιν, καθότι ἐμπεριέχει τινὰ συστατικὰ τῆς χολῆς. Παρὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καταβυθίζεται ἐνίοτε μετὰ πρασίνου, καὶ ἄλλοτε μετὰ φαιοῦ χρώματος.

Ὁ Braconot ἔλαβεν ἐκ τοῦ οὖρους τῶν ἱκτερικῶν διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος πρᾶσινον κατακρημνισμα, τὸ ὁποῖον ἀποπλυνόμενον ἦτον ἄχρυσον, ἄοσμον καὶ ἐρυθροχρωματιζέτο διὰ τοῦ θειικοῦ καὶ νιτρικοῦ ὀξέος. Εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ θερμὸν ὕδωρ, πρὸς κίτρινον καὶ ὄχι πικρὸν ρευστόν, καὶ καταβυθίζεται διὰ τῶν ὀξέων μετὰ πρασίνου χρώματος.

Τὸ καταβύθισμα τοῦ οὖρους τῶν ἱκτερικῶν συνίσταται κατὰ τὸν Gmelin ἀπὸ κιτρίνην κόκκιν, διαλυτὴν κατὰ μέγα μέρος εἰς τὸ κάλιον, μεταβαλλομένη δὲ εἰς κυανὴν, καὶ ἀκολουθῶς εἰς ἐρυθράν διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος.

Τὸ οὖρος τῶν ἱκτερικῶν χρωματίζει τὸ ἐστυμμένον ἔριον μετὰ ζωηροῦ κιτρίνου χρώματος, τὸ ὁποῖον ὅμως φθείρεται διὰ τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου. Τὸ οὖρος τῶν ἀπὸ χρονικὴν ἀρθρίτιδα πασχόντων ἐμπεριέχει λεύκωμα, ἔχνη οὐρικοῦ ὀξέος καὶ οὐρίνην καὶ μόνον ὀλίγα ἄλατα.

Οὖρος τῶν ἀπὸ διαβήτην πασχόντων. Εἰς τὴν διαβήτην νόσον Diabetes mellitus διαφέρει τὸ οὖρος ἀπὸ τὰ λοιπὰ διὰ τὴν γλυκεσίαν του γεῦσιν, καὶ καθότι ἐμπεριέχει ἀντὶ τῆς οὐρίνης ζάχαριν. Δὲν ἔχει τὴν εἰς τὸ οὖρος ἀνήκουσαν ὀσμὴν, εἶναι σχεδὸν ἄχρουν, δὲν σήπεται, ὑπόκειται ὅμως ὑπὸ καταλλήλους περιστάσεις εἰς οἰνώδη ζύμωσιν, ἥτις ταχύνεται διὰ τῆς προσθήκης τῆς ζύμης. Εάν ἡ νόσος ἐφθασεν εἰς τὸν

ανώτατόν της βαθμὸν, ἐμπεριέχει τὸ οὔρος ἐκτὸς τῆς ζαχάρως καὶ ἔχνη ζωϊκῶν καὶ ἀλλοκληκῶν ὑλῶν.

Οἱ ἀπὸ διαβήτην προσβεβλημένοι ἔχουσιν ἀκέρεστον δῖψαν, καὶ ἀποκρίνουσι εἰς 24 ὥρας τὸ ὀλιγώτερον 16 περίπου ὀκάδας οὔρους. Μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ οὔρου ἐπιμένει ἡ ζάχαρις, ἥτις δύναται νὰ καθαρισθῇ δι' ἀνχιδιαιλύσεως καὶ ζέσεως μετὰ ζωάνθρακος, ἀφοῦ μεταγχισθῇ τὸ ἐπιπολῶζον ῥευστόν. Ἡ ἀποτελουμένη ζάχαρις εἰς καθαρὰν κατάστασιν δὲν διαφέρει ποσῶς ἀπὸ τὴν ἐκ τῶν σταφυλῶν. Τὸ ποσὸν τῆς εἰς τὸ τοιοῦτον οὔρου ἐμπεριεχομένης ζαχάρως μεταβάλλεται κατὰ τὰς περιόδους τῆς νόσου, καὶ εἰς 100 μέρη εὐρίσκονται ἕως ἐπτὰ κρυσταλλωσίμου ζαχάρως· οἱ φυσιολόγοι ἀνεκάλυψαν τὴν ζάχαριν καὶ εἰς τὸ αἷμα τῶν ἀπὸ διαβήτην πασχόντων, καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον εὐρίσκειται πλεῖστον ποσὸν ζαχάρως παρὰ τὴν πρωΐαν. Ἡ ἔδρα τῆς νόσου εἶναι εἰς τοὺς νεφροὺς, οἵτινες μεταβάλλουσιν ἕνεκα τῆς νοσερᾶς καταστάσεώς των τὰ εἰς αὐτοὺς εἰσερχόμενα εἰς ζάχαριν. Διὰ τῆς μεταβολῆς τῶν τροφίμων, καθὼς διὰ τροφῆς ζωϊκῶν νιτρογονούχων ὑλῶν ἰδίως διὰ τῆς πόσεως τοῦ ἐξατμισθέντος οὔρου ὡς τοῦ πλέον νιτρογονούχου σώματος δύναται νὰ θεραπευθῇ ἡ ἐπικίνδυνος αὕτη νόσος. Τὴν δὲ ἀνάρρωσιν ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνον ταύτην νόσον ἀνακαλύπτομεν ἐκ τῆς ἐπαυξήσεως τοῦ ποσοῦ τῆς οὔρικῆς ὑλης. Ἡ ἀκριβεσττέρα ἀνάλυσις τοῦ διαβητικοῦ οὔρου εἶναι ἡ ἐξῆς:

Ζαχάρως	4, 900
Οὔρικῆς ὑλης	0, 006
Ἐχυλισματικῶν μορίων διαλυσίμων εἰς οἶνονπνευμα	4, 420
Ἐχυλισματικῶν μορίων διαλυσίμων εἰς ὕδωρ	0, 360
Λευκόματος	0, 029
Βλίννης	0, 021
Θεικοῦ καλίου	0, 021
Ἰδροχλωρικοῦ καλίου	0, 015
Ἰδροχλωρικοῦ νάτρου	0, 054
Φωσφορικοῦ νάτρου	0, 110
Ἰδροχλωρικῆς ἀμμωνίας	0, 033
Φωσφορικῆς τιτάνου	0, 028
Χάλικος	0, 004
Ἰδατος	93, 766

100,

Κατὰ τὸν Rostoc ὑπάρχει καὶ ἄλλη νόσος ὁμοία μὲ τὴν προῤῥηθεῖσαν. Διαβήτης ἄργυρος Diabetes insipidus καλουμένη, δι' ἧς γεννᾶται μὲν τὸ οὔρος εἰς μεγάλην ποσότητα, δὲν ἔχει ὅμως γλυκεῖαν γεῦσιν, εἰς αὐτὸ δὲν εὐρίσκεται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οὐρικὸν ὀξύ, ἀλλὰ μόνον ἔχνη οὐρίνης. Μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ οὔρου ἐπιμένει τούτου φαῖον σερᾶπιον μὴ κρυσταλλώσιμον, καὶ ἐκ τοῦ ἐπιμένουτος ὑπολείμματος διακρίει μόνον τὸ οἰνόπνευμα ἐκχυλισματικὴν ὕλην ἀνάλογον μὲ τὸ ὁτυζώμιον.

Διὰ τὸν ἱατρὸν εἶναι πολλάκις ἀναγκαιότατον νὰ ἐξετάσῃ ἂν τὸ οὔρος ἐμπεριέχῃ ζάχαριν. Ὁ εὐκολώτερος τρόπος τῆς ἐξετάσεως ταύτης εἶναι ὁ ἐξῆς: Τοῦ ὑπόπτου οὔρου 3 ἕως 4 οὔγγιας ἀναμιγνύονται μὲ ὀλίγην ποσότητα ζύμης καὶ τὸ μίγμα ἐκτίθεται εἰς θερμοκρασίαν 20 — 25° R. Ἐνυπαρχούσης ζαχάρως, γίνεται ζύμωσις, ἥτις ἄλλως δὲν ἀποτελεῖται.

Ἄλλη μέθοδος εἶναι ἡ ἐξῆς: τινὲς σταγόνες τοῦ ὑπόπτου οὔρου τεθεῖσαι ἐπὶ τρυβλίου ἐξατμίζονται διὰ πρᾶστατου πυρὸς μέχρι ξηροῦ. Ἀφοῦ ἀποξηρανθῇ τὸ οὔρος, προστίθενται τινὲς σταγόνες θειικοῦ ὀξέος κεκραμένου καὶ ἀκολούθως θερμαίνεται τὸ μίγμα στιγμῆς τινας. Εἰς περίστασιν καθ' ἣν τὸ οὔρος ἐμπεριέχει ζάχαριν, μελανίζεται τὸ ὑπολείμμα, γίνεται δὲ νεραντζουίδες, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ αὐτή. Ἡ δοκιμασία αὕτη εἶναι τόσον ἀκριβὴς ὥστε καὶ $\frac{1}{100}$ ζαχάρως εἰς τὸ ὕγιες οὔρος δύναται ν' ἀνακαλυφθῇ. Ὡσαύτως ἀνακαλύπτεται ἡ ζάχαρις εἰς τὸ διαβητικὸν οὔρος, ἐὰν εἰς αὐτὸ διαλυθῇ χρωμικὸν ὀξύ, καὶ τὸ διάλυμα ἐκτεθῇ εἰς τὸ φῶς. Τὸ ἐρυθροῦν διάλυμα μεταβάλλεται εἰς φαῖον καὶ πράσινον.

"Εκτακτα συνστατικά τοῦ οὔρου εἰς νόσους.

Οὔρος εἰς πυρετούς. Εἰς τὴν πρώτην περίοδον τοῦ πυρετοῦ, ὅστις ἔρχεται μὲ ρίγος, ἐμποδίζεται ἡ τοῦ δέρματος διαπνοή καὶ τὸ οὔρος γίνεται πλέον ὑδατώδες ἐπειδὴ τὸ ὕδωρ τὸ ὁποῖον ἐξέρχεται πρῶτον διὰ τοῦ δέρματος, ἀποκρίνεται διὰ τοῦ οὔρου. Εἰς τὴν μετὰ θερμῆς καὶ ταχυτέρου σφυγμοῦ συνοδευομένην νόσον γίνεται τὸ οὔρος βαθύτερον κατὰ τὸ χρῶμα χωρὶς ν' ἀποτεθῇ καταβυθισματί· τὸ ἐλεύθερον ὀξύ ἐλαττοῦται ὅσον τὸ χρῶμα γίνεται βαθύτερον καὶ τότε ἄρχεται νὰ καταβυθίζεται διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ διττοχλωρίου ὑδραργύρου, τὸ ὁποῖον δὲν γίνεται, ἐὰν τὸ οὔρος ἐμπεριέχῃ ἀρκετὸν ποσὸν ἐλευ-

θέρου ὀξέος· ὅσον περισσότερον ἢ νόσος αὐξάνει, τόσον πλέον βαθύ-
χρουν γίνεται τὸ οὔρος καὶ ἄρχεται νὰ καταβυθίζεται παρὰ τοῦ δια-
λύματος τῆς στυπτηρίας καὶ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, δι' ὃν φανεροῦται
ἡ ἐμπεριεχομένη λευκωματώδης ὕλη. Ἐάν ὁ πυρετὸς μετὰ τινος
ἡμέρας λ. χ. μετὰ τὴν ἐβδόμην παρέρχεται, ἐπανέρχεται τὸ ἐλευ-
θερον ὀξύ τοῦ οὔρου, τὸ χρῶμά του ἀνοίγεται καὶ ἀποφυχραι-
νόμενον θολοῦται.

Οἱ ἱκτροὶ καλοῦσι τὰ φαινόμενα ταῦτα κρίσιν τῆς νόσου, διὰ τὸ οὔρος
τὸ ἀποτιθέμενον καταβύθισμα δὲν ἐμπεριέχει ἀποκριθείσας ὕλας ὑπὸ
τῆς νόσου, ἀλλὰ μόνον ὀλίγον τι περισσότερον τῆς συνήθους ἐρυθρᾶς
βαφικῆς ὕλης, καὶ ὀλίγον ποσὸν νιτρικοῦ ὀξέος εἰς ἄγνωστόν τινα
ένωσιν.

Εἰς συντηκτικούς νευρικούς πυρετοὺς (*Lenta nervosa*) σχηματίζεται
δυνατὸν ἐρυθρόφαιον ἕζημα, συνιστάμενον ἐξ οὔρικοῦ ὀξέος καὶ ὀλίγης βα-
φικῆς ὕλης τὸ οὔρος ἐμπεριέχει πολλὴν οὔρικὴν ὕλην καὶ ὀλίγην φωσ-
φορικὴν τίτανον.

Εἰς τὸν ὕδρωπα τὸν καλούμενον ἀνασάρκα, ὅστις εἶναι ἀποτέ-
λεσμα γενικῆς ἀτονίας, ἀποκρίνεται τὸ ὀρώδες ρευστὸν διὰ τῶν
οὔροποιῦτι-ῶν ὀργάνων, καὶ οὕτως ἀποκαθίσταται τὸ οὔρος λευκωματώ-
δες· καταβυθίζεται διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ διττοχλωρίου ὑδραργύρου,
ἂν καὶ δεικνύη ὀξέα χαρακτηριστικά. Ἀπὸ προχωρήτη ἡ νόσος, ἀπο-
κρίνουσιν οἱ νεφροὶ λευκωματώδες ρευστὸν, τὸ ὁποῖον καταβυθίζεται διὰ
τῆς στυπτηρίας καὶ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, πῆγνυται διὰ τῆς ζέσεως, καὶ ὅσον
περισσότερον αὐξάνει τὸ ποσὸν τοῦ λευκόματος, τόσον περισσότερον
ἐλαττοῦται τὸ ποσὸν τῆς οὔρικῆς ὕλης, ἥτις τέλος ἐξέλκεται ὀλοτελῶς.

Εἰς τὴν χρονικὴν φλεγμονὴν τοῦ ἥπατος μὲ δυσπεψίαν, καθὼς πρὸς
τὸ τέλος τῶν φθισικῶν νόσων ἐμπεριέχεται εἰς τὸ οὔρος λεύκωμα.

Εἰς ἰδιαιτέραν τινὰ νόσον τῶν νεφρῶν καλουμένην νόσος τοῦ Bright,
ἀπικρίνεται καὶ μέρος τοῦ ὀρόου τοῦ αἵματος μετὰ τοῦ οὔρου. Τὸ
οὔρος ἐμπεριέχει τόσον λεύκωμα, ὥστε θερμαινόμενον μέχρι 66 R
πῆγνυται ἀπὸ τὸ πηγνύμενον λεύκωμα.

Ἐνίοτε εὐρέθῃ ἡ γνώδης ὕλη εἰς τὸ οὔρος, ἥτις ὀλίγον καιρὸν μετὰ
τὴν ἐκκένωσίν της πῆγνυται καὶ ἀποτίθεται εἰς εἶδος πηκτῆς. Ἐπί-
σης εὐρίσκονται ἐνίοτε τὰ σφαιρίδια τοῦ αἵματος διαλυμένα, ὑπὸ τῶν
ὁποίων χρωματίζεται τὸ οὔρος καὶ τότε λέγεται τὸ οὔρος αἵματηρόν οὔρος.

Γαλακτώδες οὔρος ἐπατηρήθη ἐπίσης ἐνίοτε· τοιοῦτον οὔρος,

ἀποθέτει ἄνθος, πηγνυται ζεόμενον, καὶ τὸ πεπηγμένον μέρος ἔχει τὰ ιδιώματα τῆς τυρικῆς ὕλης, ἐξ ἧς ὁ αἰθήρ διαλύει λίπος· τοιοῦτον οὖρος ἐπαρτηρήθη τόσον εἰς ἄνδρας, καθὼς καὶ εἰς γυναῖκας δυνάμει ἀγνώστων αἰτιῶν.

Εἰς περιττάσεις δυνατῆς ἐμέσεως ἀπὸ ἡμικράνειας (Micrania), εἰς σκίρον τοῦ στομάχου κ.τ.λ. γίνεται τὸ οὖρος ἐνίοτε θολὸν καὶ ἀποκρινόμενον φαίνεται γαλακτώδες· ἀποθέτει λευκὸν ἕζημα, τὸ ὁποῖον συνίσταται ἐκ βλέννης καὶ φωσφορικῆς τιτάνου.

Εἰς τὴν ἀρθρίτιδα εἶναι τὸ οὖρος ὀξινώτερον ἀπὸ τὸ σὺνήθες, σχηματίζον κατασταλάγματα ἐξ οὐρικοῦ ὀξέος.

Εἰς τὴν χολέραν εὐρίσκεται τὸ οὖρος ὅλως διόλου ἡλλοιωμένον· εἰς τὰς πρώτας 24 ὥρας εὐρίσκεται ἡ βαφικὴ ὕλη τῆς χολῆς, ἥτις κατ' ἀρχὰς μὲν πρασινίζεται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, ἐπομένως ὅμως ἐρυθροῦται. Πρὸς τούτοις ἐξαλείφονται τὰ ἄλατα, ἀντ' αὐτῶν φαίνονται εἰς ἀρκετὴν ποσότητα, φωσφορικὸν καὶ γαλακτικὸν ὀξύ.

Εἰς σπασμωδικὰς καὶ ὑστερικὰς νόσους ἀποκαθίσταται τὸ οὖρος ἐντελῶς ἄχρουν καὶ διαυγές· τότε ἐκλείπει ὀλοτελῶς ἡ οὐρική ὕλη καὶ τὰ ὀργανικὰ συστατικὰ, καὶ εὐρίσκονται μόνον τὰ συνήθη ἄλατα.

Περὶ τῆς χημικῆς ἀναλύσεως τοῦ οὔρου.

Ἡ ἀνάλυσις τοῦ οὔρου εἶναι πολλάκις πολὺ ἀναγκασία εἰς τὸν ἱατρόν. Μεταξὺ τῶν διαφόρων δοκιμαστηρίων τὰ ὁποῖα μεταχειρίζονται ἀναφέρονται τὰ ἀκόλουθα:

Τὸ νιτρικὸν ὀξύ χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος. Εἰς τὸ οὖρος, τὸ ὁποῖον δὲν ἀποθέτει ἀπόστασιν, δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ οὐρικὸν ὀξύ, προσθέτοντες εἰς ἡμισείαν λίτρον οὔρου 2—3 δράμια νιτρικοῦ ὀξέος. Μετὰ 12 ὥρας ἐκκενοῦται τὸ ὑέλινον ἀγγεῖον, τοῦ ὁποίου ὅλον τὸ ἔνδον μέρος εὐρίσκεται σκεπασμένον μὲ τεφρόχρουν κόνιν, ἥ καὶ μὲ μικροὺς ἐρυθροφαίους κρυστάλλους, ἐὰν τὸ οὖρος ἐμπεριέχῃ οὐρικὸν ὀξύ. Διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἀνακαλύπτεται καὶ τὸ λεύκωμα. Ἐὰν τὸ οὖρος ἐμπεριέχῃ λεύκωμα, καταβυθίζεται διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος λευκὸν ἢ τεφρόχρουν κροκιδῶδες ἕζημα, τὸ ὁποῖον ἀποπλυθὲν διαλύεται εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον, ἀλλὰ δὲν δύναται πλέον ν' ἀποχωρισθῇ ἐξ αὐτοῦ δι' οὐρικοῦ ὀξέος. Ὡσαύτως χρησιμεύει τὸ νιτρικὸν ὀξύ πρὸς ἐξίχνευσιν τῆς χρωματιστικῆς ὕλης τῆς χολῆς. Ἡ παρουσία αὐτῆς γνωρίζεται, ἐὰν τὸ οὖρος ἀναμιχθῇ

μέ ἔσον ὄγκον τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, δι' οὗ λαμβάνει πρότερον πρασινίζον, ἔπειτα βαθυπράσινον, τέλος ἐρυθρόν καὶ μετὰ τινα καιρὸν φαιδν χρώμα. Πρὸς ἀνακάλυψιν ὅμως μικρᾶς ποσότητος τῆς εἰρημένης ὕλης πρέπει νὰ μεταχειρίζωμεθα τὸ διὰ λειψύδρου οἰνοπνεύματος ληφθὲν ἐκχύλισμα τοῦ ἐξατμισθέντος οὔρου. Ἀνακαλύπτεται δι' αὐτοῦ καὶ ἡ οὐρική ὕλη. Τὸ οὔρος ἐμπεριέχει ἐνίοτε παρὰ πολὺ, ἄλλοτε πολλὰ ὀλίγην οὐρικήν ὕλην· διὰ τοῦτο τὸ νιτρικὸν ὀξύ σχηματίζει ἐν αὐτῷ κρυστάλλους νιτρικῆς οὐρίνης, καὶ χωρὶς τὸ οὔρος νὰ ἐξατμισθῇ πρότερον, πολλάκις δὲ δὲν σχηματίζονται οἱ κρύσταλλοι, εἰμὴ ἐξατμισθέντος τοῦ οὔρου.

Ἀμμωνία. Ἡ ἀμμωνία καταβυθίζει τὴν εἰς τὸ ὑπερτεροῦν ὀξύ τοῦ οὔρου, διαλελυμένην φωσφορικὴν τίτανον Πρὸς τούτοις χρησιμεύει καὶ διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν ὀξινὴν κατάστασιν τοῦ οὔρου, σταθμίζοντες δηλαδὴ τὸ ποσὸν τῆς πρὸς κόρον τοῦ ἐλευθέρου ὀξέος ἀπαιτουμένης ἀμμωνίας καὶ οὕτως δύναται νὰ ἐξιχνευθῇ καὶ τὸ ποσὸν τοῦ ἐμπεριεχομένου οὐρικοῦ ὀξέος.

Τὸ τιτάνιον ὕδωρ. Τοῦτο καταβυθίζει ἐκ τοῦ οὔρου φωσφορικὴν τίτανον δεικνύει τὴν παρουσίαν διαλυσίμων φωσφορικῶν ἀλάτων. Τὸ ἀνθρώπινον οὔρος πρέπει νὰ κρυσθῇ πρότερον μὲ ἀμμωνίαν καὶ νὰ διυλισθῇ διὰ νὰ ἀποχωρισθῇ ἡ εἰς τὸ ἐλεύθερον ὀξύ διαλελυμένη φωσφορικὴ τίτανος· τὸ δὲ οὔρος τῶν ἄλλων ζώων οὐδετεροῦται πρότερον μὲ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, καὶ θερμαίνεται ὀλίγον, πρὶν νὰ προστεθῇ τὸ τιτάνιον ὕδωρ διὰ νὰ ἐξαχθῇ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ.

Ὁξαλικὴ ἀμμωνία. Καταβυθίζει τὴν ἐν τῷ οὔρῳ ἐμπεριεχομένην τίτανον, μάλιστα ἐὰν τὸ μίγμα θερμανθῇ. Ἐὰν μετὰ ταῦτα προστεθῇ ἀμμωνία, κατακρηννίζεται ἱζημα, συγκείμενον ἐκ φωσφορικῆς μαγνησίας ἐναμμωνίου. Εἰς τὴν περίστασιν δὲ, καθ' ἣν δὲν γεννᾶται ἱζημα διὰ τῆς ἀμμωνίας, προσθέτομεν φωσφορικὸν νάτρον, διὰ νὰ γνωρίσωμεν ἂν τὸ ἱζημα δὲν ἐσχηματίσθῃ ἕνεκα τῆς ἀπουσίας τῆς μαγνησίας ἢ τῶν διὰ φωσφορικοῦ ὀξέος ἀλάτων.

Ἡ ὑδροχλωρικὴ βαρεῖα, ἡ καλῆτερον ἡ ὀξική, δεικνύει τὰ διὰ θειικοῦ ὀξέος ἅλατα. Τὸ οὐδέτερον καθὼς καὶ τὸ ἀλκαλικὸν οὔρος, πρέπει νὰ συμμιχθῇ πρότερον μὲ ὀξικὸν ὀξύ.

Οὐδέτερος ὀξικὸς μόλυβδος. Οὗτος χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος εἰς τὸ ἀπὸ τὸ προηγούμενον ἱζημα ἀποχωρισθὲν οὔρος. Διὰ νὰ ἤμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ καταβυθιζόμενος φωσφορικὸς μόλυβδος δὲν

ἐμπεριέχει καὶ ὑδροχλωρικὸν μόλυβδον, πρέπει νὰ ἀποπλυθῇ μὲ ζέον ὕδωρ, καὶ μετὰ ταῦτα νὰ τηχθῇ διὰ τοῦ φουσητηρίου.

Ἡ τῆς στυπτηρίας διάλυσις θολώνει ἕκαστον οὖρος, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει λευκώμα ἢ ἰνώδη ὕλην.

Ὁ διττοχλωρίος ὑδράργυρος δὲν μεταβάλλει τὸ οὖρος, τὸ ἐμπεριέχον ἐλεύθερον ὀξύ, δεικνύει δὲ τὴν ἐλαχίστην ποσότητα λευκώματος ἢ τυρώδους ὕλης. Ἐκ τοῦ οὐδετέρου οὖρους καταβυθίζονται μερικὰ τῶν κοινῶν συστατικῶν τοῦ οὖρους.

Ὁ νιτρικὸς ἄργυρος καταβυθίζει τὰ ὑδροχλωρικὰ καὶ φωσφορικά ἅλατα, ὁ δὲ φωσφορικὸς εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ.

Τὸ βυρσοδειψικὸν ὀξύ κατ' ἐξοχὴν τὸ τῶν κηκίδων βάμμα καταβυθίζει δύο συστατικὰ τοῦ οὖρους, τὴν διαλελυμένην βλένναν καὶ τὴν ἐκχυλισματικὴν ὕλην, ἥτις καταβυθίζεται διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου. Εἰς ὑγεινὸν οὖρος ζυγίζει τοῦτο τὸ ἴζημα μόλις 0,02 — 0,93 καὶ δὲν φαίνεται εἰμὴ μετὰ τινα καιρὸν. Ἐὰν τὸ ποσὸν τοῦ ἰζήματος ᾖ πολὺ, ἐμπεριέχει τὸ οὖρος καὶ λευκώμα.

Ὁ διὰ καγκαμίνου κυανὸς χάρτης, δεικνύει ἂν τὸ οὖρος ᾖ ὀξιγόν, ὁ δὲ ἐρυθρωθεὶς χάρτης ἂν ᾖ ἀλκαλικόν. Πολλάκις ὁ κυανοὺς χάρτης δὲν ἐρυθροῦται καὶ δι' ὀξινῶν οὖρους, εἰμὴ μετὰ τὴν ἀποξήρανσιν τοῦτο προέρχεται ἀπὸ τὰ ἐν τῷ οὖρῳ ἐμπεριεχόμενα ἅλατα δι' ἀμωνίας.

Ἡ ἔσμη χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ζαχάρως, καὶ τότε τοιοῦτον οὖρος δεικνύει τὰ τῆς οἰνοζυμώσεως φαινόμενα. Ἐκ τοῦ ἐκλυομένου ἀνθρακικοῦ ὀξέος δυνάμεθα νὰ λογαριάσωμεν καὶ τὸ εἰς ὀρισμὲνον ὄγκον οὖρους ἐμπεριεχόμενον ποσὸν ζαχάρως.

Περὶ τῆς πέψεως καὶ τῶν δι' αὐτῆς προϊόντων.

Ἀφοῦ τὰ μασηθέντα καὶ μετὰ τοῦ σιέλου καὶ τοῦ ἀφθίνως ἀποκρινομένου φλέγματος ἀναμιχθέντα βρώματα φθάσωσιν εἰς τὸν στόμαχον, ἐνοῦνται μετὰ τοῦ γαστρικοῦ χυλοῦ (*Succus gastricus*) καὶ μένουσιν ἐνταῦθα πλειοτερον ἢ ὀλιγώτερον καιρὸν κατὰ τὴν ἡλικίαν, κατὰ τὰς δυνάμεις, καὶ τὴν τῆς ὑγείας κατάστασιν τῶν ὑποκειμένων, ἐνταυτῷ δὲ ἀποσυνθετόμενα μεταβάλλονται εἰς μαλακὸν λευκωματωσιδὲς φύραμα καλούμενον *χυμόν*.

Ὁ χυμὸς οὗτος μεταβαίνει εἰς τὴν δωδεκαδάκτυλον ἀπόφυσιν, ὅπου ἀνα-

μιγνύεται με τὴν χολήν, με τὸν παγκρεατικὸν χυλὸν καὶ με τὸ φλέγμα τῶν ἐντοσθίων, δι' ὧν ἀλλοιοῦται ἐκ νέου καὶ μεταβάλλεται εἰς χυλὸν καὶ εἰς περιττώματα. Εἰς τὰς ἐργασίας τούτης καὶ μεταβολὰς συνίσταται ἡ πέψις. Ὁ χυλὸς ἀπὸρροᾶται ἀκολούθως διὰ πολλῶν ἀγγείων, καὶ οὕτως ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὰ περιττώματα.

Ὁ χυλὸς ὅστις λαμβάνεται ἐκ τινὸς σκύλου εἶναι ἐρυθρωπὸς ἢ γαλακτόχρους, ἔχει ἀσθεῖ ἢ ἀλκαλικὰ χαρακτηριστικὰ, καὶ πηγνυται ἀφ' ἐαυτοῦ ὡς τὸ αἶμα· ὁ χυλὸς τῶν ἵππων ἢ ἄλλων ζώων εἶναι διαφανής· ἡ γαλακτοειδὴς κατάστασις τοῦ χυλοῦ πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὰς ἐνυπαρχούσας λιπαρὰς ὕλας.

Τὰ εἰς τὸν στόμαχον ἐμπεριεχόμενα ἐξετάσθησαν παρὰ τινων χημικῶν, καὶ ἐξ αὐτῶν ἐξήχθη ὅτι ὁ χυλὸς συνίσταται ἐκ βλέννης καὶ γαστρικοῦ χυλοῦ, ἐκ τῶν μεταχειριζομένων βρωμάτων, εὐρισκομένων εἰς μᾶλλον ἢ ἥττον ἀποσυνθεμένην κατάστασιν καὶ ἐκ χολῆς. Ὁ διὰ τῆς ἐμέσεως ἐκκενούμενος γαστρικὸς χυλὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐμπεριέχει κατὰ τὸν Prout ἐλευθέρου ἀλικὸν ὀξύ, ἀλικὰ ἄλατα, καὶ ὀξικὸν ὀξύ. Ὁ γαστρικὸς χυλὸς τοῦ κονίκλου (λαγιδίου) ἐμπεριέχει, ἐκτὸς τοῦ ἐλευθέρου ἀλικοῦ ὀξέος καὶ τῶν ἀλικῶν ἁλμάτων, καὶ ἄλλας ἀμμωνιακὰς. Εἰς τὸν τέταρτον στόμαχον προβάτου τινὸς, τὸ ὅποιον μετὰ νηστείας ἡμερῶν τινων ἔλαβεν ὀλίγον ποσὸν χλόης πρὸς τροφήν, εὗρέθη μόνον λεπτὸν καὶ φαιόκτρινον φύραμα, ἀλικὸν καὶ ὀξικὸν ὀξύ, ζωϊκὴ τις ὕλη καὶ φωσφορικὴ, θεικὴ, καὶ ἀλικὴ σόδα, πότασσα, καὶ φωσφορικὴ τίτανος.

Ἐσχάτως ἀνεκαλύφθη εἰς τὸν γαστρικὸν χυλὸν ἰδιαιτέρα ὀργανικὴ ὕλη, ἥτις καλεῖται πεψίνη *Pepsin*, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἀποδίδουσιν τὴν καταλυτικὴν δύναμιν.

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν τεχνητῶς τὸν γαστρικὸν χυλὸν, συμμιγνύομεν 100 μέρη ὕδατος με $\frac{1}{50}$ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος 0, 13 εἰδικῆς βαρύτητος, διαβρέχομεν με αὐτὸ τὴν βλεννομαεθράνην τοῦ στομάχου 24 ὥρας· τὸ διωλισθὲν ὑγρὸν ἔχει ὡς ὁ γαστρικὸς χυλὸς τὴν δύναμιν τοῦ διαλύειν τὰ τρόφιμα.

Ἄπαντα τὰ τρόφιμα εἶναι ὀργανικῆς καταγωγῆς, τινὰ ζῶα τρέφονται ἀπὸ φυτικὰς οὐσίας μόνον, ἄλλα ἀπὸ ζωϊκὰς καὶ ἄλλα ἐξ ἀμφοτέρων, ὡς ὁ ἄνθρωπος. Ἄπαται αἱ φυτικαὶ καὶ ζωϊκαὶ οὐσαὶ δὲν δύνανται νὰ χρησιμεύωσιν πρὸς τροφήν. Ἡ πέψις κυρίως συνίσταται εἰς τὴν ἐκχύλισιν τῶν χρησίμων καὶ τὴν ἀποχώρησιν τῶν περιττῶν οὐσιῶν.

Ἐκ τῆς βασιλείας τῶν φυτῶν χρησιμεύουσιν ἰδίως ἐκείναι αἱ οὐσαί,

αἵτινες ἐμπεριέχουσιν νιτρογόνον, λ. χ. τὸ φυτικὸν λεύκωμα, φυτοκόλλα κ.τ.λ. ἅτινα εὐρίσκονται εἰς τὰ σπέρματα τῶν δημητριακῶν καρπῶν, εἰς τοὺς καυλοὺς καὶ φύλλα τῶν λαχάνων. Ὀλιγώτερον θρεπτικαὶ εἶναι αἱ μὴ ἐμπεριέχουσαι νιτρογόνον, καθὼς τὸ ἄμυλον, κόμμι, βλέννα, ζάχαρις καὶ λιπαρὰ ἔλαια. Εἰς τὴν αὐτὴν κατηγορίαν ἀνήκουσιν τὸ ὀξικόν, τρυγικόν, κιτρικόν καὶ ἄλλα φυτικά ὀξέα, προσέτι αἱ ἀρωματικαὶ οὐσαί, αὗται δὲ ἐν μέρει εἶναι χρήσιμοι πρὸς τροφήν, ἐν μέρει δὲ χρησιμεύουσιν πρὸς βελτίωσιν τῆς γεύσεως τῶν τροφίμων, ἢ πρὸς ἐρεθισμὸν τῶν πεπτικῶν ὀργάνων. Μὴ ἐπιδεκτικαὶ ἐξομοιώσεως δύνανται νὰ θεωρῶνται ἐκεῖναι αἱ φυτικά καὶ ζωϊκὰ οὐσαί, αἵτινες εἶναι ἀδιάλυτοι τόσον εἰς τὸ ὕδωρ καθὼς εἰς τὰ ὀξέα λ. χ. ἡ φυτικὴ ἰνώδης ὕλη, τὰ τῶν καρπῶν περικάρπια. αἱ πλειότεραι ῥητίναι, αἱ ἐκχυλισματικά καὶ βαφικὰ ὕλη· ἐντελῶς δὲ ἀπεπτα εἶναι τὸ κέρας, αἱ τρίχες, τὰ πτερὰ, οἱ ὄνυχες, τὰ λέπνη, τὰ ὀστρακα κτλ.

Αἱ ζωϊκὰ οὐσαί, ἐξαιρουμένων ὀλίγων τινῶν, εἶναι εὐπεπτοί, καὶ διαλυόμεναι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος χυμῶν ἐξομοιοῦνται· διὰ τοῦτο τὰ ἐντόσθια τῶν σαρκοφάγων ζώων εἶναι μικρά, τὰ δὲ τῶν χορτοφάγων ὄχι μόνον μεγάλα, ἀλλὰ καὶ τὰ πεπτικά τινος ὄργανα πλέον σύνθετα ὥς ἔχοντα πλειότερους στομάχους· ἡ δὲ τάξις αὐτῶν τῶν ζώων καλεῖται *Ruminantia agrammascōrta*.

Ὁ Magendie θρέψας κύνας μὲ φυτικὴν μόνον τροφήν, μὲ ζάχαριν, δηλ. κόμμι, ἔλαιον καὶ ἀπεσταγμένον ὕδωρ ἐπαρτήρησεν, ὅτι ταχέως ἀδυνάτισαν, καὶ ἅπαντες ἀπέθνησκον μετὰ παρέλευσιν 30 — 36 ἡμερῶν.

Ὁ Chevreuil ἐξετάσας τὸ οὖρος τούτων τῶν σκύλων, εὔρεν αὐτὸ ἀλλοιωσιδοῦς φύσεως, ἐλεύθερον ἀπὸ οὐρικόν ὀξύ, καὶ φωσφορικά ἅλατα. καὶ ἐπομένως ὅμοιον μὲ τὸ οὖρος τῶν χορτοφάγων ζώων, τὴν δὲ χολὴν εὔρεν ὑπεργέμουσαν ἀπὸ ζάχαριν τῆς χολῆς.

Οἱ Tiedeman καὶ Gmelin ἐθρέψαν χῆνας μετὰ σιταμύλου καὶ κόμμεως, ζαχαρέως μεμιγμένης μὲ ἄμυλον· αὗται δὲ ἀφοῦ κατ' ὀλίγον ἔχαναν $\frac{1}{3}$ ἕως $\frac{1}{2}$ τοῦ βάρους των, ἀπέθνησκον μετὰ παρέλευσιν 16 — 26 ἡμερῶν. Ὁμοίαν ἐπιβλαβὴ ἐπὶρρόην εἶχεν εἰς αὐτάς ὕλη ἐμπεριέχουσα μέγα ποσὸν νιτρογόνου, καὶ χῆνα τραφεῖσα μὲ λειοκεκομμένον λεύκωμα ὧν τῶν ὀρνέων, ὀλιγόστειυσε τὸ ἥμισυ βάρους της καὶ ἀπέθανε τὴν 46 ἡμέραν.

Ἐξ αὐτῶν τῶν πειραμάτων εἰκάζομεν ὅτι αἱ ζωϊκὰ οὐσαί διατηροῦσιν καλλήτερα τὴν ζωὴν παρὰ αἱ φυτικά, συγχρόνως δὲ παρατηροῦμεν ὅτι μὴτε μόναι αἱ νιτρογονοῦχαι ὕλαι ἐπαρκοῦσιν, μῆτε

τροφή συνισταμένη ἐκ μόνης μιᾶς ὕλης· καὶ ἐπομένως ὅτι τὰ τροφίμα πρέπει νὰ συνίστανται ἐκ διαφορῶν καὶ συνθέτων ὑλῶν.

Κατὰ τὸ διάστημα τῆς πέψεως σχηματίζονται ἐκτὸς τῶν περιττωμάτων καὶ διαφορὰ ἀέρια, τὰ ὁποῖα συνάζονται ἐν μέρει μὲν εἰς τὰ λεπτὰ ἐντόσθια ἐν μέρει δὲ εἰς τὰ παχέα ἔντερα.

Ὁ Chevreuil καὶ Magendie ἐξέτασαν τὸ εἰς τὰ ἐντόσθια τινὸς λαμιουτετ-μημένου εὐρισκόμενον ἀέριον καὶ εὗρον ὅτι ἐσύγκειτο ἐξ: Ὄξυγόνου 11, 00. Νιτρογόνου 71, 45. Ὑδρογόνου 3, 55. Ἀνθρακικοῦ ὀξέος 14. Εἰς τὸ λεπτόν ἔντερον τοῦ ἰδίου ὑποκειμένου ἐμπεριείχετο: Ἀνθρακικοῦ ὀξέος 24, 39. Νιτρογόνου 20, 08. Ὑδρογόνου 55, 53. Τὸ κῶλον ἐμπεριείχεν: Νιτρογόνου 51, 03. Ἀνθρακικοῦ ὀξέος 43, 50. Ὑδρογονοανθρακούχου ἀερίου μὲ ἔχνη ὑδροθειωμένου ἀερίου 5, 47. Εἰς δὲ τὰ ἐντόσθια τινὸς μετὰ τὸ γεῦμα λαί σπληνθέντος εὐρέθησαν: Ἀνθρακικοῦ ὀξέος 42, 86. Νιτρογόνου 45, 96. Ὑδρογονοανθρακούχου ἀερίου μὲ ἔχνη ὑδροθειωμένου ἀερίου 11, 18. Ἐξ αὐτῶν παρατηροῦμεν ὅτι τὰ ἀέρια τῶν παχέων ἐντέρων διαφέρουσιν ἀπὸ τὰ τῶν λεπτῶν, καθότι δὲν ἔχουσιν ὀξυγόνον, ἀλλὰ ἀντ' αὐτοῦ ὑδρογόνον, ὑδρογονοανθρακούχον καὶ ὑδροθειωμένον ἀέριον.

Ἐὰν αἱ δαμάλεις τραῦσι μετὰ χλωροῦ τριφύλου, οἰδαίνονται-συχνάκις τοιουτοτρόπως, ὥστε ἀποθνήσκουσι πολλάκις αἰφνιδίως ἀπὸ νόσον τινὰ τυμπανίτην καλουμένην. Τὸ ἐξερχόμενον ἀέριον ἐξετασθὲν ἐσυνίστατο ἐξ ἴσων μερῶν ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ ἐκ διπλασίου ὑδρογονο-ανθρακούχου ἀερίου καθὼς καὶ ἀπὸ ἀρκετὸν ποσὸν ὀξειδίου τοῦ ἀνθρακος. Ἀντίδοτον κατὰ τῆς νόσου ταύτης εἶναι τὸ τιτάνιον ὕδωρ, ἢ τὸ διάλυμα τῆς ποτάσσης, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἐγχυθῇ εἰς ἀρκετὸν ποσὸν εἰς τὰ ζῶα, τοιουτοτρόπως γίνεται ἀπορρόφησις τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος παρὰ τῆς τιτάνου ἢ παρὰ τῆς ποτάσσης.

Περὶ τῶν περιττωμάτων.

Τὰ περιττώματα διαφέρουσιν ὡς πρὸς τὴν σύνθεσίν των, ἥτις ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν φύσιν τῶν τροφίμων καὶ ἀπὸ τὴν ταχύτητα τῆς πέψεως, καθὼς καὶ ἀπὸ πολλὰς ἄλλας περιστάσεις· μέρος δὲ τῶν τροφίμων ἀποχωρίζεται χωρὶς ν' ἀποσυντεθῇ διὰ τῆς πέψεως.

Ὁ Berzelius ἔκαμεν ἤδη τὸ 1804 ἐξέτασιν περὶ τῆς συνθέσεως τῶν τοῦ ἀνθρώπου περιττωμάτων· ἐξετάσας τὰ περιττώματα ἀνθρώπου τροφόμενου ἀπὸ μέγα ποσὸν σκληροῦ ἄρτου μὲ ζωϊκὰς ὕλας

εὔρεν ὅτι δὲν μετέβαλλον μήτε τὸν τοῦ καγκυμίνου, μήτε τὸν τῆς κροκορίτζης χάρτην· ζέομενα μὲ ὕδωρ εἰς ἀποστακτικὸν ἀγγεῖον ἔδωσαν βρωμερὸν στάλαγμα, τὸ ὁποῖον καταβυθίζει τὰ διὰ μολύβδου ἄλατα μὲ φαιὸν χρῶμα ἕνεκα τοῦ ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένου ὑδροθειωμένου ἀερίου· διὰ δὲ τῆς ἀποστάξεως ἀπέβαλλον τὴν ἰδιαιτέραν ὁσμὴν τῶν, καὶ τὸ ἐπιμένον εἰς τὴν κερατίνην εἶχε τὴν ὁσμὴν βρασμένων χοιρίνων ἐντέρων· ξηραίνόμενα μεταβάλλονται εἰς βαθύφαιον ἐλαφρὰν μάζαν, ἥτις πυρωθεῖσα ἀνθρακοῦται, ὀξυδαίνεται, καπνίζει, ἔχει τὴν ὁσμὴν τοῦ κεκαυμένου κάρτου καὶ ἀναφλεχθεῖσα καίει πολὺν καιρὸν μὲ καθαράν καὶ λαμπρὰν φλόγα· μετὰ τὴν ἀπόσβεσιν τῆς φλογὸς δὲν ἐπιμένει ἀνθράξ, ἀλλὰ τέφρα δυσκόλως λευκαίνουμένη διὰ τῆς καύσεως. Διὰ τοῦ χλωρίου λευκαίνονται τὰ περιττώματα, διὰ δὲ τοῦ οἰνοπνεύματος εὐχυλίζεται ἐξ αὐτῶν ἄχρουν λίπος καὶ ῥητίνη. Ἄκρατα ὀξεία κατ' ἐξοχὴν τὸ θεϊκὸν καὶ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, ἐκλύουν ἐξ αὐτῶν πρῶτον τὴν ἰδιαιτέραν ὁσμὴν τῶν περιττωμάτων, μετὰ ταῦτα δὲ τὴν τῆς χολῆς· εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν ἡ μάζα θάφεται ἰώδης, ὅχι δὲ μέλανη. 100 μέρη τῶν ἐξετασθέντων περιττωμάτων ἐμπεριέχουν: ὕδατος 75, 3. Χολῆς 0, 9. Λευκώματος 0, 9. Ἐκχυλισματικῆς ὕλης 2, 7. ὑδροχλωρικῶν καὶ θεϊκῶν Ἀλάτων 1, 2. Ἀδικλύτου ὑπολείμματος τῶν τροφίμων 7, 0. Ἀδικλύτων ὑλῶν ἐκ τῶν ἐντέρων καὶ φλέγματος, χοληρητίνης, λίπους, ἰδιαιτέρας ζωϊκῆς ὕλης κ.τ.λ. 1, 40.

Ἡ διὰ τῆς καύσεως τοῦ ὑπολείμματος ληφθεῖσα τέφρα ἐτύγκειτο ἐξ :

Ἀνθρακικοῦ νάτρου προσερχόμενον ἐκ τοῦ γαλακτικοῦ	3, 5 κόκκων
Ὑδροχλωρικοῦ νάτρου	4, 0
Θειικοῦ νάτρου	2, 0
Φωσφορικῆς μαγνησίας	2, 0
Φωσφορικῆς τιτάνου	4, 0

15, 5

Τὸ μέγα ποσὸν φωσφορικῆς μαγνησίας εἶναι τῶντι ἀξιοπαρατήρητον· προσέρχεται δὲ ἀπὸ τὸν ἄρτον, ὅστις ἐμπεριέχει σημαντικὴν ποσότητα ταύτης. Ἐπειδὴ τὰ ὀστέα καὶ τὰ στερεὰ μέρη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἐμπεριέχουσιν ἐν γένει πολὺ ὀλιγώτερον φωσφορικῆς μαγνησίας παρὰ τὰ τῶν χορτοφάγων, φαίνεται ὅτι τὰ ἀπορρόφητικὰ ἀγγεῖα τῶν ἐντέρων τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι τόσον ἐπιτήδεια πρὸς ἀπορρόφησιν αὐτῆς, ὅσον τὰ τῶν χορτοφάγων. Πρὸς τούτοις αἱ φωσφορικαὶ γαῖαι εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ

πλείστον μηχανικῶς μόνον μεμιγμένοι μετὰ τὰ περιττώματα καὶ τοιαῦται ἐπαρτηρήθησαν δὲ καὶ ὑπ' ἄλλων χημικῶν διὰ τοῦ μικροσκοπίου ἐν μορφῇ μικρῶν κρυστάλλων.

Τὰ τῶν βοῶν περιττώματα ἐξετάσθησαν πρὸ ὀλίγου παρὰ τοῦ Morin, ὅστις ἀπεχώρησεν ἐξ αὐτῶν ἰδιαιτέραν φαῖν ὕλην ἀνάλογον μετὰ τὴν ἐκ τῶν τοῦ ἀνθρώπου περιττωμάτων, καὶ τὴν ὠνόμασε *βοείον ὕλην* (*Bubuline*), ἀπὸ τοῦ λατινικοῦ *Bubulus* (βόειος)· ἀλλὰ τὸ ὄνομα τοῦτο δὲν εἶναι τόσον κατάλληλον, καθότι ἡ εἰρημένη ὕλη φαίνεται ὅτι εἶναι συστατικὸν ὅχι μόνον τῶν περιττωμάτων τῶν βοῶν, ἀλλὰ καὶ διαφόρων ἄλλων ζώων· 100 μέρη ἐμπεριέχουσι κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Morin:

ὕδατος	70, 00
φυτικῶν ἰνῶν	24, 08
Πρασίνης ῥητίνης καὶ λιπαρῶν ὀξέων . . .	1, 52
Χολικῆς ὕλης	0, 60
βοεΐας ὕλης	1, 60
λευκώματος	0, 40
Χολορητίνης	1, 80

Εἰς τὴν τέφραν εὐρέθη θεικὸν κάλιον, ὑδροχλωρικὴ, ἀνθρακικὴ καὶ φωσφορικὴ τιτάνος, χαλκικὴ, ἄργιλος καὶ ὀξείδιον τοῦ σιδήρου.

Τὰ περιττώματα τῶν κυνῶν εἶναι συνήθως λευκὰ, καὶ ἐμπεριέχουσιν, ἐὰν οἱ κύνες τρέφονται δι' ὀστέων, μέγα ποσὸν φωσφορικῆς τιτάνου. Οἱ Λατίνοι ὠνόμασαν τὴν ὕλην ταύτην *Album graecum*. Δὲν ἔγιναν δὲ εἰσέτι ἀκριβεῖς ἐξετάσεις περὶ τῶν περιττωμάτων μήτε τῶν κυνῶν μήτε τῶν λοιπῶν μαστοφόρων.

Τὰ περιττώματα τῶν ὀρνέων καὶ ἀμφιβίων δὲν δύνανται νὰ ἐξετασθῶσι τόσον ἀκριβῶς ὥς πρὸς τὴν σύνθεσίν των, ἐπεὶ εἰς ταῦτα τὰ ζῶα συμμιγνύεται τὸ οὖρος μετὰ τὰ περιττώματά των εἰς τὴν οὕτω καλουμένην *κωλεῶρα*, *Cloaca*, εὐρισκομένην πλησίον τοῦ κώλου. Ἐμπεριέχουσι λοιπὸν καὶ τὰ συστατικὰ τοῦ οὐροῦ, καὶ πολλάκις τὰ περιττώματά τοιούτων κροεοράγων ζώων εἶναι μεμιγμένα μετὰ τόσον οὐρικὸν ὅξυ, ὥστε φαίνεται ὅτι σύγκεινται μόνον ἐξ αὐτοῦ· τὰ δὲ τῶν χορτοφάγων ἔχουσιν ἐξ αἰτίας αὐτοῦ λευκὸν περιβάλλυμμα.

Ὁ Braconnot ἐξέτασε τὰ περιττώματα ἀηδόνης τινὸς τρεφομένης μετὰ κεκομμένην βοεΐαν καρδίαν, μάλιστα διὰ νὰ συγκρίνῃ τὴν ιδιότητα τροφῆς μετὰ τὴν τῶν περιττωμάτων·

100 μέρη αὐτῶν ἐμπεριεῖχαν :

Οὐρικοῦ ὀξέος με οὐρικήν πότασσαν καὶ ἀμμωνίαν ὀξινήν	52, 7
Ἐχχυλίσματος ἀδιχλύτου εἰς τὸ οἶνόπνευμα	33, 3
Φωσφορικῆς τιτάνου σιδηρούχου	4, 3
Θειικοῦ καλίου	3, 3
Βηλιχολικοῦ ὀξέος (Bilifellinsaure)	2, 8
Ἵδροχλωρικοῦ καλίου	0, 8
Φωσφορικῆς ποτάσσης καὶ ἀμμωνίας	0, 9
ὀργανικοῦ τινὸς ὀξέος ἠνωμένου με ἀμμωνίαν	0, 7
Φωσφορικῆς μαγνησίας ἐναμμωνίου	0, 2
Γαλκτικικοῦ ὀξέος καὶ ὀλίγου ὀξικοῦ	0, 3
Φλέγματος	0, 3
Λιπαρῶν ὀξέων	0, 2
Ἀμμωνιακοῦ ἄλατος	0, 2

100.

Σπανίως μὲν εἰς τὰ ἐντόσθια τῶν ἀνθρώπων, συχνότερα δὲ εἰς τῶν χορτοφάγων ἀπαντῶνται συγκρίματα *concrementa*) συνιστάμενα κοινῶς ἀπὸ φωσφορικὴν τίτανον ἠνωμένην μετὰ μαγνησίας καὶ ἀμμωνίας.

Εἰς τὰ ἐντόσθια τῶν νηπίων, καθὼς καὶ τῶν ζώων εὐρίσκονται πολ-
λάκις συμπεπλασμένα σφαιρίδια ἀπὸ περιπλεγμένης τρίχας, ἄχρουν καὶ
ξυλώδεις ἵνας· τοιαῦτα δὲ συγκρίματα λέγονται *Aegagropilae*. Ἰδιαιτέ-
ρον εἶδος συγκριμάτων εἶναι τὰ λεγόμενα *Bezoares*, τὰ ὅποια ἔχουσι
μεγάλην τιμὴν εἰς τινὰ μέρη τῆς Ἀσίας· εἰς τὴν Περσίαν λ. χ. δύνανται
νὰ ληφθῶσι μόνον ὡς χαρίσματα ἀπὸ τὸν βασιλέα ἢ ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν
του. Εὐρίσκονται δὲ αὐτὰ εἰς τὰ ἐντόσθια τινὸς χορτοφάγου εἰς τὴν Περ-
σίαν, Τιβέτην κ.τ.λ. ζῶντος. Εἶναι στρογγυλὰ ἢ ἰνυειδῆ τὸ σχῆμα,
βαθυπράσινα, μέλαινα ἢ φαιὰ, στιλπνὰ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ συνίσταν-
ται ἀπὸ ἀμόρφους στιβάδας. Τινὰ μὲν διαλύονται ἐν μέρει διὰ τοῦ
οἶνοπνεύματος, ἄλλα δὲ ὄχι. Ἀπαντα εἶναι διαλύσιμα εἰς τὰ καυστικά
ἀλκάλια. Πολλοὶ χημικοὶ ἐξέτασαν τὰ συγκρίματα ταῦτα, ἀλλὰ αἱ
ἐξετάσεις ἔγιναν εἰς καιρὸν, ὅποτε τὰ προϊόντα τῶν ἐντοσθίων δὲν ἐγνω-
ρίζοντο ἀκόμη τόσον ἀκριβῶς. Πιθανῶς δὲν εἶναι ἄλλο, εἰμὴ προϊόντα
τοῦ λίπους, τῆς ῥητίνης ἐκ τῆς χολῆς, καὶ ἄλλων ὁμοίων λιπαρω-
δῶν ὑλῶν, ἴσως καὶ τοῦ τῶν ἐντοσθίων φλέγματος, αἵτινες ἀντὶ νὰ συμ-
μιχθῶσι μετὰ τὰ ὑγρά περιττώματα ἀποχωρίζονται καὶ συγκολλῶνται·

τὰ συγκρίματα ταῦτα ὁμοιάζουσι μὲν μεταξύ των, ὡς πρὸς τὰ ἐξωτερικά, διαφέρουσι πολλάκις ὡς πρὸς τὰ χημικὰ χαρακτηριστικά των.

Μηκώριον. Meconium.

Λέγεται πιστώδης τις ὕλη ἐπισωρευμένη εἰς τὸ κῶλον τοῦ ἐμβρύου, καὶ ἐκκενουμένη τινὰς ἡμέρας μετὰ τὴν γέννησίν του διὰ τῆς ἐκκοπρωτικῆς ἐνεργείας τοῦ πρωτογάλακτος. Τὸ χρῶμα εἶναι φαιὸν ἢ κίτρινον, ἔχει δὲ σύστασιν μέλιτος, σπανίως ἐκπέμπει ὁσμὴν καὶ εἶναι ἄχυμον, ἐπὶ λίνου προξενεῖ σπιλώματα κίτρινα, δυσκόλως ἀποπλυνόμενα. Τὸ μηκώριον θεωρεῖται ὡς εἰς τὰ ἐντόσθια ἐμπεριεχομένη καὶ ὀλίγον κατ' ὀλίγον μεταβληθεῖσα χολή του βρέφους.

Πρὶν πιύτωμεν τὰς περὶ πέψεως παρατηρήσεις ἐκθέτομεν ἐν συντόμῳ τινὰς, νοσερὰς ἀλλοιώσεις, περὶ τῶν ὁποίων ἔγιναν ἐξετάσεις. Εἰς ἀταξίας τῶν πεπτικῶν ὀργάνων ἀλλοιοῦται τὸ χρῶμα τοῦ ἄνω μέρους τῆς γλώσσης, γίνεται λευκόν, στακτόχρουν, πρασινωπὸν, πράσινον, καὶ εἰς πυρετοὺς μέλαν· τοῦτο λέγεται γλώσσα φορτωμένη, καὶ ἡ κατάστασις αὕτη προέρχεται ἀπὸ τὴν τῆς βλεννομεμβράνης τοῦ στομάχου· ἐὰν εἰς τὸν στόμαχον εἰσέλθῃ χολή, τότε καὶ ἡ τῆς γλώσσης βλέννα γίνεται κίτρινῃ καὶ πικρᾷ. Ἡ ἀποκρινομένη αὕτη βλέννα εἶναι διαλύσιμος ἐν γένει εἰς τὸ ὕδροχλωρικὸν ὀξύ, καὶ σύγκριται ἐκ βλέννης, φωσφορικῆς καὶ ἐκ μέρους ἀνθρακικῆς τιτάνου. Τοῦτο τὸ τῆς γλώσσης κάλυμμα εἶναι τὸ αἷτιον τοῦ σχηματισμοῦ τῶν πέριξ τῶν ὀδόντων συγκριμάτων.

Εἰς τινὰς νότους ὡς εἰς τὴν γαστροδυνίαν, εἰς τὴν ἡμικρανίαν κ.τ.λ. ἀποκρίνεται ὁ γαστρικὸς χυλὸς εἰς μεγαλητέραν τοῦ δέοντος ποσότητα καὶ προσλαμβάνει τόσον ὅξος χαρακτηριστικὰ, ὥστε ἐκκενούμενος διὰ τὸν ἐρεθισμὸν τοῦ στομάχου προξενεῖ αἰμωδιασμὸν εἰς τοὺς ὀδόντας. Τὰ συστατικὰ τοῦ χυλοῦ τούτου εἶναι γαλακτικόν, ὀξικόν καὶ ὕδροχλωρικὸν ὀξύ. Εἰς τινὰς νότους ἐξεμείττει μέλαν τι ῥευστὸν, συνηθὺς κακὸς τις προάγγελος. Εἰς τοιαύτην περίστασιν εἰσῆλθεν αἷμα μετὰ τῆς βαφικῆς τοῦ ὕλης εἰς τὸν στόμαχον καὶ ὑπόκειτο εἰς ἀλλοίωσιν, ὁποῖαν πάσχει τὸ αἷμα, ἐὰν ζεσθῇ.

Εἰς νότους τῶν ἐντοσθίων εἶναι τὰ περιττώματα κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον ἡλλοιωμένα.

Εἰς τὰς διάρροιας ἐμπεριέχουσιν πλειοτέραν ποσότητα γαστρικοῦ χυλοῦ, εἶναι λεπτόρρευστα καὶ ἐμπεριέχουσιν ἐνίοτε ἀμετάβλητον χολήν, ἕνεκα τῆς ὁποίας εἶναι καὶ πράσινα. Εἰς τὸν ἥκτερον εἶναι τεφρόχροα καὶ δὲν

ἐμπεριέχουσιν χολήν διόλου. Εἰς τὴν Ἀσιατικὴν χολέραν εἶναι θοὰ, ὁμοιάζουν τὸ ἀφέψημα τῆς οὐρῆς, καὶ εἶναι τόσον ἀλκαλικὰ, ὥστε βάφουσιν τὸν τῆς κροκορρίζης χάρτην φαιὸν, καὶ ἀναβράζουσιν διὰ τῶν ὀξέων· τοῦτο δὲ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐμπεριεχομένην ἀνθρακικὴν ἀμ-
μωνίαν.

Γεννητικὰ μόρια τοῦ ἄρρεος τῶν μαστοφόρων.

Ταῦτα συνίστανται ἀπὸ τοὺς ὄρχεις μὲ τοὺς ἀγωγούς των, τὰς σπερ-
ματικὰς κύστιγκας, τοὺς προστάτας καὶ τὰ σπυγγώδη σώματα. Οἱ
ὄρχεις εἶναι τὰ διακριτικὰ τοῦ σπερματικοῦ ὑγροῦ ὄργανα. Τὰ μαστοφόρα
ζῶα φέρουσιν ταῦτα ἐν γένει ἐκτὸς τῆς κοιλίας, ἡ δὲ διακρινομένη ἐκ
τούτων ὑγρότης εἰσάγεται εἰς τὸ κύτος τῆς κοιλίας δι' ἐνὸς μακροστένου
ἀγωγοῦ, ὅστις ἀναστομῶται εἰς τὴν οὐρήθραν εἰς τὸ μέρος καθ' ὃ συνέ-
χεται μετὰ τοῦ τραχήλου τῆς οὐροδόχου κύστεως. Οἱ προστάται εἶναι
ὁμοίως ὄργανον διακριτικὸν ὑγροῦ τινος, τὸ ὅποιον περικλίζει τὸ σπέρμα
ἐξακοντιζόμενον καὶ τὸ ὅποιον εἶναι, ὡς φαίνεται, προωρισμένον νὰ καθιστᾷ
ὀλισθηροτέραν τὴν οὐρήθραν.

Τὸ σπερματικὸν ρευστὸν τῶν ἀνθρώπων ἐξετάσθη παρὰ τοῦ Vau-
quelin, Iohn καὶ ἄλλων. Εἶναι βλενωδές, παχύρρευστον, σχεδὸν δια-
φανές, πολλάκις κιτρινίζον καὶ ἰδιαίτερον τὴν ὀσμὴν, μετὰ δὲ συχνὰς
κενώσεις γίνεται γαλακτόχρουν καὶ ὄχι τόσον παχύρρευστον καὶ βερύοσ-
μον. Ἡ ὀσμὴ τοῦ σπερματικοῦ ρευστοῦ δὲν προέρχεται ἀπὸ ἰδιαίτεραν
πτητικὴν ὕλην, δὲν ἀποχωρίζεται διὰ τῆς ἀποξηράνσεως, ἐπ' ἀνέρ-
χεται ὁμως καὶ μετὰ διάστημα μερικῶν μηνῶν ἀντὶ τοῦ ξηρὸν σπέρμα ἐμ-
βραχῇ μὲ ὕδωρ. Διὰ τοῦ μικροσκοπίου διακρίνονται εἰς τὸ σπέρμα
πλήθος σπερματικῶν ζωῶν, τὰ ὅποια κινοῦνται ἐν αὐτῷ μὲ μεγάλην
ζωηρότητα. Κατὰ τὰς ἐξετάσεις τοῦ Dumas καὶ Brevost εὐρίσκονται
μὲν τὰ ζωῶνα ταῦτα εἰς τὸ σπερματικὸν ρευστὸν πάντων τῶν ζώων, δια-
φέρουν ὁμως ὡς πρὸς τοὺς χαρακτῆρας εἰς ἕκαστον ζῶον. Ὁ Orphila
ἀναφέρει ὅτι κηλίδες προερχόμεναι ἀπὸ σπερματικὸν ρευστὸν καὶ ἀπο-
ξηρανθεῖσαι ἐπὶ λινῷ ὑφάσματος ἐκλύουν τὴν χαρακτηριστικὴν ὀσμὴν
τοῦ σπέρματος, ἀφοῦ βραχὺν μεθ' ὕδατος. Ἐν εἰς ἱατροδικαστικὰς
περιστάσεις πρόκειται νὰ προσδιορισθῇ, ἂν κηλὶς τις προέρχεται ἀπὸ
σπέρμα, ἐκκόπτεται τὸ μέρος αὐτὸ, καὶ ἐκτίθεται εἰς ἀποστακτικὸν
σκεῦος καὶ ἀφοῦ βραχῇ μεθ' ὕδατος, ὑποβάλλεται εἰς ἀπόσταξιν, δι' ἧς ἀπο-
λαμβάνεται ρευστὸν ἔχον τὴν τοῦ σπέρματος ὀσμὴν.

Τὸ σπερματικὸν ῥευστὸν κατακρηνίζεται εἰς τὸ ὕδωρ, ἀνακινουμένου δὲ αὐτοῦ ἀποχωρίζεται εἰς νήματα. Κατὰ τὸν Vauquelin πρασινίζει τὸ διὰ ἰὼν σεράπιον· τινὲς νομίζουν ὅτι αὐτὸ τὸ ἰδίωμα ἀνήκει ὅχι εἰς τὸ σπερματικόν, ἀλλὰ εἰς τὸ τοῦ προστάτου ῥευστόν. Κατ' ὀλίγον γίνεται ἐντελὲς διαφανὲς καὶ ῥευστόν, καὶ εἰς ταύτην τὴν κατάστασιν εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ. Αὕτη ἡ μεταβολὴ τοῦ σπέρματος συμβαίνει τόσον εἰς τὸ ἀερόκενον, καθὼς καὶ εἰς τὰ μὴ ὀξυγονοῦχα ἀέρια. Τὰ ζῶντα ἐξακολουθοῦν νὰ ζῶσι καὶ νὰ κινοῦνται, καὶ μετὰ τὴν εἰρημένην μεταβολὴν τοῦ σπέρματος.

Ἐκ τοῦ οὕτω μεταβαλλομένου ῥευστοῦ σχηματίζονται μικροὶ κρύσταλλοι, ἂν ἐμποδισθῇ ἡ ἐξάτμισις του. Οἱ κρύσταλλοι συνίστανται κατὰ τὸν Vauquelin ἀπὸ φωσφορικὴν τίτκον, εἶναι ὅμως πιθανώτερον ὅτι σύγκεινται ἀπὸ φωσφορικὴν μαγνησίαν ἐναμμόνιον, ἥτις κρυσταλλοῦται αὐτομάτως καὶ ἐξ ἄλλων ζωϊκῶν ῥευστῶν. Ἐξατμιζομένου καὶ ἀποξηρανομένου τοῦ σπερματικοῦ ῥευστοῦ, ἐπιμένει μάζα ὑποκίτρινος, διαφανῆς καὶ ῥηγματώδης, ἔχουσα τὸ $\frac{1}{10}$ τοῦ βάρους τοῦ ῥευστοῦ. Τοῦτο τὸ ὑπόλειμμα ἀναθυμιάται διὰ τῆς πυρώσεως, ἐκλύον κίτρινον καπνόν, ὅστις ἔχει τὴν ὁσμὴν τοῦ κεκαυμένου κέρματος. Πρὸς τοῦτοις ἐκλύει πολλὴν ἀμμωνίαν καὶ παρέχει καὶ ἄνθρακα δύσκαυστον, ὅστις ἀποτεφρωθεὶς δίδει φωσφορικὴν τίτκον. Τὸ νεκρὸν ῥευστὸν διαλύεται εἰς ἅπαντα τὰ ὀξέα καὶ εἰς τὰ πλέον ἀσθενέστερα, ὡς εἰς τὸ οὐρικὸν ὀξύ, καὶ εἰς ὀξινὸν ὕδωρ, δὲν καταβυθίζεται δὲ ἐκ τούτων τῶν δαλυμάτων διὰ τῶν ἀλκαλίων. Ἐξ ἐναντίας διαλύεται μὲν εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον, ἀλλὰ δὲν καταβυθίζεται ἐξ αὐτοῦ διὰ τῶν ὀξέων. Διὰ τοῦ ἐγγλωρίου ὕδατος μεταβάλλεται εἰς πηκτὴν λευκὴν, ἀδιάλυτον τόσον εἰς τὰ ὀξέα ὅσον καὶ εἰς τὸ ὕδωρ. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Vauquelin τὸ σπερματικὸν ῥευστὸν σύγκειται ἐξ :

Ἰδιαιτέρας ἐκχυλισματικῆς ὕλης	6
Φωσφορικῆς τιτάνου	3
Νάτρου	1
ὕδατος	90

100.

Ἡ ἀπόκρισις τοῦ σπερματικοῦ ῥευστοῦ γίνεται μὲ μεγάλην φειδωλίαν. Οἱ ὄρχεις εὐρίσκονται ἐκτὸς τοῦ σώματος διὰ νὰ μὴ θερμαίνωνται τόσον καὶ οὕτως ἐλαττοῦνται ἡ ἐνέργειά των. Ἡ ἀπόκρισις δὲν γίνεται πρὶν τὸ ἀνθρώπινον σῶμα φθάσῃ εἰς βαθμὸν τινα ῥώμης, ἀφοῦ δὲ ἀρχίσῃ ἡ ἀπό-

κρισίς του, προσλαμβάνει τὸ σῶμα ἐκείνας τὰς ιδιότητας, δι' ὧν διακρίνεται ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ θήλεως, ἀναφύονται π. χ. αἱ τρίχες τοῦ προσώπου, λαμβάνει βαρυτέραν φωνήν· ἐὰν δὲ οἱ ὄρχεις τμηθῶσιν πρὸ τῆς περιόδου ταύτης, τότε δὲν συμβαίνουν αἱ ἐκτεθεῖσαι ἀλλοιώσεις. Τὰ ἐνυπάρχοντα ἐγχυματικά ζυῶφια θεωροῦνται ἀναγκασιότατα διὰ τὴν γέννησιν, τὸ ὅποion ὅμως δὲν ἀπεδείχθη.

Σμῆγμα τῆς ποσθῆς. *Smegma Praeputii*

Οἱ ὑποκάτω τῆς ποσθῆς εὐρισκόμενοι σμηγματοποιοὶ ἀδένες *Glandulae Tyssonianae* ἀποκρίνουσιν ῥευστόν τι γλίσχρον, τὸ ὅποion ἐμπεριέχει ὕδωρ, ζωϊκὴν βλένναν, λίπος, ἰδιαιτέραν δυσώδη ὕλην, ἰνώδη ὕλην, γαλακτικὸν ὀξύ, γαλακτικὴν ἀμμωνίαν, φωσφορικὴν τίτανον, ὑδροχλωρικὸν καὶ θεικὸν νάτρον, ἐκτὸς τούτων ἐκλύουσιν ὑδροθειωμένον ἄεριον· τοῦτο δὲ ἀποδεικνύεται, ἐὰν θέσωμεν ἐπ' αὐτῶν ὑφασμα ἀλειμμένον μὲ ἀλειφὴν τινα ἐκ μολύβδου, ἡ ὁποία μετὰ 24 ὥρας μελανίζεται.

Γεννητικὰ ὄργανα τοῦ θήλεως τῶν μαστοφόρων.

Συνίστανται ταῦτα ἀπὸ τὸν κωλῶν, τὴν μήτραν, τοὺς γυναικίους ὄρχεις μὲ τὰς σάλπιγγας, τὰς θυσάνους καὶ τοὺς μαστοὺς· Ἐκ τῶν ἀπείρων φυσιολογικῶν παρατηρήσεων ἐξήχθη ὅτι διὰ τοῦ ἐρεθισμοῦ τῆς συμπλοκῆς ἐξοιδοῦνται ἐν ἡ πλείωτερα ὥρια, τὸ ὅποion ἐπὶ τῆς συμπλοκῆς ἀπολύεται, καὶ διὰ τῆς σάλπιγγος εἰσέρχεται εἰς τὴν μήτραν, εἰς ἣν συνάπτεται μετὰ τοῦ ἐν αὐτῇ ἐγκλεισμένου σπερματικοῦ ῥευστοῦ. Τοῦτο τεθέμενον ἐπὶ τοῦ ὥριου τοῦ ἄρρενος, ἀρ' οὗ φθάσῃ εἰς τὴν μήτραν, προάγει τὴν πρώτην ἀρχὴν τοῦ ἐμβρύου. Τὸ ὧν προτιολλάται ἐπὶ τινος μέρους τῆς μήτρας, ὅπου γεννᾶται ἰδιαιτέρον φλεβώδες ὑφασμα, τὸ ὅποion καλεῖται πλακούς. Τὸ ἔμβρυον περιβλημένον ὑπὸ τινος ῥευστοῦ κεῖται εἰς τὸ ὧν κρεμάμενον διὰ τρογγύλου καὶ ἐπιμήκους σώματος τοῦ ὀμφαλικοῦ λώρου καὶ συνέχεται μετ' ἐκείνου τοῦ μέρους τῆς μήτρας, εἰς τὸ ὅποion ἐστερεώθη τὸ ὧν. Ἐκεῖ ἀναπτύσσονται συγχρόνως τόσον οἱ περιβάλλοντες τὸ ἔμβρυον ὑμένες, καθὼς καὶ τὸ ῥευστόν εἰς τὸ ὅποion πλέει τὸ ἔμβρυον. Μετὰ τὸν ὠρισμένον χρόνον σχηματίζεται τὸ ἔμβρυον καὶ εἶναι ἑτοιμον διὰ τὴν γέννησίν του. Ὡς πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὀργάνων τοῦ ἐμβρύου ἀναφέρω μόνον ὅτι, ἐκ τῶν σκληρῶν ὀργάνων σχηματίζονται πρότερον ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νοτιαῖος μυελός, τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος ἔχει κατ' ἀρχὰς τὸ σχῆμα τοῦ ἐγκεφάλου

τῶν ἰχθύων· τὸ δὲ αἷμα περιστρέφεται πρὸ τοῦ σχηματισθῆ ἡ καρδιά. Διὰ ποίᾳς ὁδοῦ τὰ πρὸς τροφήν τοῦ ἐμβρύου εἰσέρχονται, δὲν ἀπεδείχθη εἰσέτι ἀρκούντως· πιθανὸν εἶναι ὅτι τὴν λαμβάνει διὰ τῶν μετὰ τοῦ πλακούντος ἀνοστομωτικῶν ὀργάνων. Ἀποῦ τὸ ἐμβρυον σχηματισθῆ, διαρρήγνυνται οἱ τὸ ἐμβρυον περιβάλλοντες ὑμένες, καὶ ἐκρέει ὀλίγον τινα χρόνον πρὸ τῆς γεννήσεως τὸ ἀμνιοτικὸν ῥευστόν.

Εἰς πολλὰ ζῶα περιβάλλονται καὶ οἱ τὸ ἀμνιοτικὸν ῥευστόν ἐγκλείοντες ὑμένες ἀπὸ ἄλλους ὑμένας ἐγκλείοντας ἕτερον ῥευστόν, τὸ τῆς ἀλλακτοειδοῦς κύστεως, τὸ ὁποῖον διὰ τινος ἰδιαιτέρου σωλήνος, δηλαδὴ τοῦ οὐράχου, κοινωνεῖ μετὰ τῆς οὐροδόχου κύστεως τοῦ ἐμβρύου. Ἐπὶ ἀμφοτέρων τῶν ὑμένων κεῖται τὸ ἐξωτερικὸν κάλυμμα τοῦ ὠοῦ· εἰς δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐκλείπει ὁ ἀλλαντικὸς ὑμὴν, καθὼς καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ ἀποκρινόμενον ῥευστόν.

Τὸ ἀμνιοτικὸν, καθὼς καὶ τὸ ἀλλαντοϊκὸν ῥευστόν ἐξετάσθησαν παρὰ πολλῶν χημικῶν.

Τὸ ἀμνιοτικὸν ῥευστόν τῶν ἀνθρώπων εἶναι θολῶδες, πλήρες τυρωδῶν κροκίδων εὐκόλως ἀποχωριζομένων διὰ τῆς διύλισεως, ὡχρὸν τὸ χρῶμα, ἀηδὲς τὴν ὄσμην καὶ γεῦσιν, καὶ μεταβάλλει τὸν τῆς κροκοφύλλης χάρτην ὡς τὰ ἀλκάλια, ἕνεκα τῆς ἐν αὐτῷ ἐμπεριεχομένης ἀμμωνίας. Τὸ ῥευστόν δύναται νὰ συμπηχθῇ τόσον διὰ τῆς ζέσεως, ὅσον καὶ διὰ τοῦ οἰνόπνευματος. Τὸ διὰ τῆς ἀποσταλάξεως ληφθὲν ἐμπεριέχει ἀρκετὸν ποσὸν ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας καὶ ὀλίγην ἔνθειον ἀμμωνίαν.

Διύλισθὲν τὸ ἀμνιοτικὸν ῥευστόν ἀποθέτει, προστιθεμένου καυστικοῦ καλίου, φωσφορικὴν τίτανον καὶ τίτχον, καὶ τὰς δύο ἡνωμένας μὲ ζωϊκὴν τινα ὕλην. Τὸ οἰνόπνευμα διαλύει ἐκ τοῦ ἀπεξηραμμένου ἀμνιοτικοῦ ῥευστοῦ κιτρίνην ἐκχυλισματικὴν ὕλην, ὁμοιάζουσαν τὸ τοῦ κρέατος ἐκχύλισμα. Τὸ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτον μέρος φαίνεται συγκείμενον ἐκ τυρώδους, βλεννώδους καὶ μάλιστα ἐκ λευκωματώδους ὕλης. Τινὲς χημικοὶ εὗρηξαν καὶ βενζοϊκὸν ὀξύ καὶ οὐρίον· ὁ δὲ Proust ἀναλύσας τὸ ἀμνιοτικὸν ῥευστόν βοός τινος ἀνεκάλυψεν ἐν αὐτῷ καὶ ζάχαριν τοῦ γάλακτος.

Τὸ ἀλλαντοϊκὸν ῥευστόν τῶν βοῶν, δηλαδὴ τὸ οὖρον τοῦ ἐμβρύου, εἶναι διαφανές, ὡχρόφαιον, ἀλμυρόπικρον καὶ κοκκινίζει τὸν τοῦ καγκρινίου χάρτην. Ἐξατμιζομένου τοῦ ῥευστοῦ σχηματίζεται εἰς τὴν ἐπιφανείαν του φαιὰ ἐπιδερμὶς καταβυθιζομένη μετὰ ταῦτα ἐν μορφῇ κροκίδων, αἵτινες συνίστανται ἀπὸ λευκωματώδη ὕλην καὶ φωσφορικὰ γαιώ-

δη ἄλατα. Μικρὸν μέρος μόνον τοῦ ξηροῦ ὑπολείμματος εἶναι διαλύσιμον εἰς τὸ οἰνόπνευμα, τὸ δὲ ὠχροφαιον δάλυμα ἐπιλείπει διὰ τῆς ἐξατμίσεως φαιὸν καὶ ὀξινὸν ἐκχύλισμα μεμιγμένον μὲ μαργαριτοειδεῖς κρυστάλλους. Ἡ δι' οἰνόπνευματος διάλυσις ἐμπεριέχει κοινὸν ἄλας, γαλακτικὰ ἀλάλια, ὀλίγον ἀμμωνιακὸν ἄλας καὶ ἐκχυλισματικὰς ὕλας ὁμοιοζούσας τὸ δι' οἰνόπνευματος ἐκχύλισμα τοῦ κρέατος· τὸ δὲ δι' ὕδατος ἐκχύλισμα ἐμπεριέχει θειϊκὸν καὶ φωσφορικὸν νάτρον, φωσφορικὴν τίτανον, μαγνησίαν, ζωϊκὴν τίτανον καὶ φαιὴν ὕλην. Οἱ εἰρημένοι κρυστάλλοι εἶναι ἡ *allantoin*, τὸ ἀμνιοτικὸν ὀξύ, *Acide amniotique* τοῦ Vauquelin, ἢ τὸ ἀλλαντοϊκὸν ὀξύ τοῦ Lassaigne.

Εἰς καθαρὰν κατὰστασιν σχηματίζει πρισματικούς κρυστάλλους διαφανεῖς, ἀχρόους, σκληροὺς καὶ λαμπρίζοντας, εἶναι ἄχυρον καὶ ἄοσμον, δὲν μεταβάλλει τὸν τοῦ καγκρέμινου χάρτην, διαλύεται εἰς 160 μέχρι ψυχροῦ, εἰς πολὺ ὀλιγώτερον δὲ ζέοντος ὕδατος, καθὼς καὶ εἰς τὸ οἰνόπνευμα.

Ἡ ἀλλαντοΐνη δὲν ἔχει μὲν τὰ τῶν ὀξέων χαρακτηριστικὰ, δύναται δὲ νὰ ἐνωθῇ, ὡς ἡ ζάχαρις, ἡ ζάχαρις τοῦ γάλακτος κτλ. μὲ διάφορα μεταλλικὰ ὀξειδια, π. χ. μὲ τὰ ὀξειδια τοῦ ἀργύρου καὶ μολύβδου. Διὰ τῶν ἀκράτων ὀξέων, καὶ διὰ τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων ἀποσυντίθεται εἰς ἀμμωνίαν καὶ ὀξαλικὸν ὀξύ.

Ὁ Liebig καὶ ὁ Wöhler ἔκαμαν τὴν ἀξιόλογον ἀνακάλυψιν, ὅτι ἡ ἀλλαντοΐνη δύναται νὰ κατασκευασθῇ καὶ τεχνητῶς, ἐὰν τὸ οὐρικὸν ὀξύ θερμανθῇ μὲ ὕδωρ καὶ ὑπεροξείδιον τοῦ μολύβδου.

Περὶ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῶν ἰχθύων καὶ ἀμφιβίων.

Εἰς τὰ ἀμφίβια, καθὼς καὶ εἰς τοὺς ἰχθεῖς, διαφέρουν τὰ προεκτεθέντα φαινόμενα, καθότι τὸ ἄρρεν ἐπισπερματίζει τὰ ὠὰ τοῦ θήλεως ἐκτὸς τοῦ σώματος καὶ καθ' ἣν στιγμὴν τὰ ὠὰ ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θήλεως ἐξέρχονται. Τὸ ὄργανον, τὸ ὁποῖον εἰς τοὺς ἰχθεῖς ἀναπληροῖ τοὺς ὄρχεις, καλεῖται *θορός*. Ἐὰν μεθ' ὕδατος εἰς ὄλμον ἀναμιχθῇ, μεταβάλλεται εἰς γαλακτώδες ρευστὸν, τὸ ὁποῖον διῦλιζόμενον ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὸ ἐπὶ τοῦ διῦλιστήρος ἐπιμένον ζωϊκὸν ὕφασμα· ἐὰν τὸ δάλυμα τοῦτο ζεσθῇ πήγνυται πρὸς μαλακὴν τινα πηκτὴν. Ἡ πηκτὴ αὕτη σύγκειται ἐκ λευκώματος ἠνωμένου μετὰ λίπους ἐμπεριέχοντος τόσην ποσότητα

τητα φωσφόρου, ὥστε ὁ μετὰ τὴν καῦσιν ἐπιμένων ἀνθραξ εἶναι ὀξύτατος ἀπὸ τὸ σχηματιζόμενον φωσφορικὸν ὀξύ.

Τὸ καλούμενον Caviar σύγκειται εἰς 100 μέρη ἐκ:

Λευκωματώδους ὕλης	6, 2.
Βουτυρώδους λίπους	4, 3.
Ἵδροχλωρικῆς σόδας*	6, 7.
Φωσφορικῆς τιτάνου μὲ ἔχνη ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.	0, 5.
Πεπηγμένου λευκώματος καὶ μεμβράνης . . .	24, 3.
Ἵδατος	58, 0.

100.

Εἰς ἄλλα ὡς εὗρέθη τὸ λίπος φωσφοροῦχον.

*Περὶ τῶν εἰς τὴν ἐκλέπτειν τῶν πτηνῶν φυσιολογικῶν καὶ
χημικῶν φαινομένων.*

Εἰς τὰ πτηνὰ γνωρίζεται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἐμβρύου καλῆτερα. Ἀφ' οὗ τὸ εἰς τὴν μήτραν κεκλεισμένον ὦν ἀποκατασταθῇ καρποφόρον, περιβάλλεται μετὰ τινος σκληροῦ καλύμματος, διὰ νὰ δυνηθῇ ἀκολούθως ἐντὸς τοῦ σώματος νὰ ἐπωασθῇ.

Τὸ ὦν σύγκειται ἐκ τριῶν κυρίων συστατικῶν: ἐκ τοῦ λευκώματος, τοῦ λεκίθου καὶ τοῦ κελύφους. Τὸ κέλυφος τῶν ὦν πολλῶν πτηνῶν εἶναι κατάλευκον, ἄλλων εἶναι ποικίλως κεχρωματισμένον· ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας εὐρίσκεται πλῆθος πόρων, δι' ὧν διέρχεται ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ. Τὸ κέλυφος σύγκειται ἐξ ἀνθρακικῆς τιτάνου 89, 6, φωσφορικῆς τιτάνου, φωσφορικῆς μαγνησίας 5, 7, ἐκ τινος κολλητικοῦ μέσου ἐμπεριέχοντος θείου 4, 7. Ὑποκάτω τοῦ κελύφους εὐρίσκεται λεπτὸς ὕμνη, μεμβράνα τοῦ κελύφους, Membrana Putaminis καλούμενη καὶ συνισταμένη ἐκ πεπηγμένου λευκώματος. Εἰς τὴν μίαν ἄκραν εὐρίσκεται μετὰξὺ τοῦ κελύφους καὶ τοῦ ὕμενος κενόν τι μέρος πληρωμένον ὑπὸ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐμπεριέχοντος πλείοτερον ὀξυγόνου τοῦ συνήθους ἀέρος, δηλαδή 21, 23 τοῖς ἑκατόν.

Τὸ λεύκωμα τοῦ ὦου εἶναι πεπικνωμένον διάλυμα τοῦ λευκώματος καὶ ἐγκλεισμένον, καθὼς τὸ ὑελῶδες βυστὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ, εἰς κυψέλας συνισταμένας ἀπὸ λεπτότατον ὕμνην. Αἱ πρὸς τὸ κέλυφος καίμεναι κυψέλαι ἐμπεριέχουσι πλέον λεπτόρρευστον λεύκωμα ἀπὸ τὸ πρὸς τὴν λέ-

κιθον κείμενον. Εάν τὸ λεύκωμα θερμανθῇ μέχρι 75° R, πήγνυται πρὸς συνεχομένην μάζαν· ἐμπεριέχονται εἰς τὸ λεύκωμα νάτρον, ἔχνη υδροχλωρικής σόδας καὶ ἐκχυλισματικῆς τινος ὕλης.

Ἡ λέκιθος τοῦ ὠοῦ ὑρίσκεται εἰς τὴν μέσῃν τοῦ ὠοῦ περιβεβλημένη ἀπὸ ἰδιαίτερον ὑμένα, συνδεδεμένον διὰ δύο ἄλλων στιγμαίων (Chalazae) μετὰ τῆς μεμβράνης, ἥτις σχηματίζει τὰς κυψέλας τοῦ λευκώματος. Εἰς ἄλλο μέρος αὐτοῦ εὐρίσκεται ἡ λέκιθος γαλακτοχρους καὶ περιβεβλημένη ἀπὸ ὁμοκέντρους κυκλοειδεῖς ἐπουλίδας (Cicatriculae).

Ἡ λέκιθος δύνανται νὰ θεωρηθῇ ὡς γαλάκτωμα συνιστάμενον ἐξ ὕδατος 54, λευκώματος 17, κιτρίνου ἐλαίου 29· τὸ δὲ ἔλαιον τοῦτο ἐμπεριέχει φώσφορον, καὶ ἀνθρακωμένον παρέχει ἀνθρακκ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐμπεριέχεται πολὺ φωσφορικὸν ὀξύ.

Εάν τὸ ὠὸν ἐκτεθῇ συνεχῶς εἰς θερμοκρασίαν 40° R, διὰ τοῦ ἐπωάζοντος πτηνοῦ ἢ διὰ τινος ἄλλου μέσου, τότε ἄρχεται ἡ ἐπιρρόη τοῦ σπερματικοῦ ρευστοῦ καὶ τὸ ἔμβρυον ἀναπτύσσεται.

Τὰς πέντε ὥρας ἀναπτύσσονται αἱ ἐκπυλίδαι ἔτι περισσότερον καὶ περιβάλλονται ἀπὸ κύκλους (αὐλῶνας), γίνονται κυρτότεραι, ἐξογκοῦνται καὶ διαχωρίζονται εἰς ὀρέωδη τινὰ ὑμένα (Lamina serosa) καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὑμένος σχηματίζεται ἀκολούθως τὸ οὐρικὸν σύστημα καὶ τὸ σκελετὸν, καὶ εἰς ἄλλον ἐσωτερικὸν ἐπὶ τῆς λεκίθου κείμενον ἐλαιώδη ὑμένα, Lamina mucosa, ὅστις μεταβάλλεται εἰς τὰ ἔντερα. Μεταξὺ τῶν δύο τούτων γεννᾶται τρίτη στιβάς ἐκ σφαιριδίων συνισαμένη, μεταβαλλομένη εἰς τὸ ἐλαιῶδες καὶ ἀρτηριῶδες σύστημα καὶ καλουμένη ἀγγειακὸς ὑμὴν, Lamina choroidea. Ἀπὸ τὴν οὐλὴν ἐπωλίδα μέχρι τοῦ κέντρου τῆς λεκίθου διέρχεται ὀχετὸς, δι' οὗ τὰ πρὸς ἀνάπτυξιν τοῦ γεννηθησομένου ἐμβρύου χρήσιμα ἐκ τοῦ κέντρου τῆς λεκίθου ἀνυψοῦνται.

Τὴν 15 ὥραν γίνεται εἰς τὴν μέσῃν τῆς ἐπωλίδος, εἰς τὸν ὀρέωδη ὑμένα γραμμὴ τις ὀριζόντειος· ἐξ αὐτῆς τῆς γραμμῆς σχηματίζεται ἡ ραχιτικὴ χορδὴ, ἐξ ἧς σχηματίζονται αἱ σπονδυλικαὶ ἐξογκώσεις. Ἐκατέρωθεν ἐκάστου τῶν σωμάτων τούτων προβαίνουσιν αἱ ἀποφύσεις, σχηματίζουσαι ἀκολούθως τὰ τοξοειδῆ σώματα, λεγόμενα πλευράς, καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης ἡμέρας φαίνονται ἔχνη ἐκάστου ἰδιαίτερου σπονδύλου. Τὴν 33 ὥραν διακρίνονται καὶ διάφορα μέρη τοῦ ἐγκεφάλου, καὶ εἰς τὴν 36 οἱ ὀφθαλμοί. Τὴν δευτέραν ἡμέραν ἄρχεται ὁ σχηματισμὸς τῶν ἐντοσθίων καὶ ἡ καρδιά. Ἡ καρδιά σχηματίζεται ἐκ τοῦ ἀγγειακοῦ ὑμένος καὶ ἤδη εἰς τὴν πρώτην τῆς γέννησιν ἄρχεται ὁ παλμὸς. Πρὸς τὸ τέλος

τῆς τρίτης ἡμέρας φαίνεται ἀκριβῶς ἡ πάλλουσα καρδιά, ἣτις ἔχει τρεῖς συνεσταλμένας κοιλότητας, τῶν ὁποίων δύο σχηματίζουν τὰς ἄνω κοι-
λιάς, ἡ δὲ τρίτη σχηματίζει τὸν βολβὸν τῆς ἀορτῆς. Ἡ σπονδυλικὴ σύ-
λη κυρτοῦται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν σπονδύλων αὐξάνει· τὴν τετάρτην ἡμέ-
ραν ἔχει τὸ ἔμβρυον τέσσαρας γραμμὰς μῆκος, παρουσιάζει στόμαχον, ἑν-
τερον, πρὸς τὸ μέρος τῆς λεκάνης φαίνεται ἀγγειοφόρος τις κύστις καλουμένη
allantois, *Allantois*, ἣτις τὰς ἐπομένας ἡμέρας ἐπαισθητῶς ἐπαυξάνει.
Εἰς αὐτὴν τὴν κύστιν εἰσέρχεται τὸ αἷμα τοῦ ἐμβρύου φλεβῶδες, καὶ ἐξέρ-
χεται ἐξ αὐτῆς ἀρτηριῶδες, καὶ ἡ μεταβολὴ αὕτη γίνεται διὰ τῆς διὰ
τῶν πόρων τοῦ κελύφους εἰσερχομένης ἀτμοσφαίρας. Εἰς τὴν μεμ-
βράνιν, ἣτις ἐπίκειται ἐπὶ τοῦ κελύφους, σχηματίζονται ὡσαύτως
πλήθος αἱματοφόρων ἀγγείων, συγκοινωνούντων μετὰ τῆς καρδίας καὶ χρη-
σίμων πρὸς ἀναπνοὴν τοῦ ἐμβρύου· ἐὰν τὸ ὡὸν περιχρισθῇ μὲ διάλυσιν
ἀραιικοῦ κόμματος ἢ μὲ ἔλαιον, ἀποπνίγεται τὸ ἔμβρυον. Τὴν πέμπτην ἡμέ-
ραν ἄρχεται ὁ σχηματισμὸς τῶν πνευμόνων, οὔτινες ὅμως κεῖνται ἀνεργοί,
μέχρις οὗ διαρραγῇ τὸ κέλυφος· τὴν ἐξοδόμην ἡμέραν φαίνονται τὰ πρῶ-
τα σημεῖα τῆς κινήσεως τοῦ ἐμβρύου, τὴν ἐννεάτην ἄρχεται ὁ σχηματι-
σμὸς τῶν ὀστέων, τὴν δεκάτην τετάρτην ἐκφύονται τὰ πτερά, καὶ ἂν
εἰς αὐτὴν τὴν ἐποχὴν τὸ ἔμβρυον ἐκβληθῇ ἐκ τοῦ κελύφους, προσπαθεῖ
νὰ ἀναπνεύσῃ. Τὴν δεκάτην ἐννάτην ἐκβαλλόμενον ἐκ τοῦ κελύφους κολά-
πτει τὴν τροφὴν, καὶ τὴν εἰκαστὴν πρώτην τὸ ἴδιον ἔμβρυον διαρρήγνυει
τὸ κέλυφος.

Σίελος.

Ὁ σίελος διακρίνεται εἰς τὰ μαστοφόρα ζῶα ἀπὸ ἀδένας, οὔτινες ἔχου-
σι σιελοχόους πόρους εἰς τὸ κύτος τοῦ στόματος ἀναστομουμένους· κεῖν-
ται δὲ οὗτοι, οἱ μὲν παρὰ τὸ οὖς (παρωτίδες λεγόμενοι) καὶ ἐκχέουσι
τὸν σίελον δι' ἐνὸς ἀγωγοῦ εἰς τὴν ἐντὸς πλευρὰν τῆς ἰγνάτου κειμένου,
οἱ δὲ ὑπὸ τὴν κάτω σιαγῶνα (ὑπογένειοι καὶ υπογλώσσιοι ἀδένες λεγόμε-
νοι), τῶν ὁποίων οἱ σιελοχοὶ πόροι ὑπὸ τὴν γλῶσσαν καὶ παρ' αὐτὴν
ἀναστομοῦνται.

Ὁ σίελος, καθὼς πτύεται ἐκ τοῦ στόματος, εἶναι κοινῶς μίγμα ἐκ
τοῦ σιέλου καὶ ἐκ τοῦ φλέγματος, τοῦ ἀποχωριζομένου διὰ τῆς βλεννο-
μεμβράνης ἐκ τοῦ λάρυγγος. Ἐὰν συναχθῇ εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον μακρὸν
καὶ στενὸν ἀποχωρίζεται κατ' ὀλίγον εἰς δύο στρώματα, τὸ μὲν ἄνω
ρευστὸν, εἶναι διαφανές, ἄχρουν καὶ ὀλίγον βλενωδές, τὸ δὲ κάτω ἐμπεριέ-

χον τὸ αὐτὸ ρευστὸν, ἀλλὰ μεμιγμένον μὲ λευκὴν τινα ἀδιαφανῇ μάζαν. Ἐὰν ὁ σιέλως ἀνακινηθῇ μὲ ὕδωρ, ἀραιοῦται τὸ φλέγμα αὐτὸ καὶ κατακαθίζεται παντελῶς εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἀγγείου. Διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ σιέλου λαμβάνομεν ὑπόλειμμα ἄχρους, διαφανές, καὶ κομμώδες. Τὸ οἰνόπνευμα διαλύει ἐξ αὐτοῦ ὀλίγον ὁσμοζώμιον, ὑδροχλωρικὸν νάτρον, ὑδροχλωρικὸν κάλιον καὶ γαλακτικὰ ἀλαλία. Τὸ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτον εἶναι ὀλίγον ἀλκαλικόν· ἐὰν κορεσθῇ μὲ ὀξικὸν ὀξύ καὶ μετὰ τὴν ἀποξήρανσιν ἐμβραχῇ πάλιν μὲ οἰνόπνευμα διαλύεται δι' αὐτοῦ ὀξικὸν νάτρον, τὸ ὅποιον ἦτον πρότερον ἠνωμένον μὲ ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἢ μὲ ζωϊκὰς ὕλας, ἢ καὶ μὲ τὰ δύο. Τὸ οὕτω ἐκχυλισθὲν ὑπόλειμμα συνίσταται ἀπὸ φλέγμα καὶ ἰδιαιτέραν ζωϊκὴν ὕλην, ἥτις ὡς κυριώτερον συστατικὸν τοῦ σιέλου ὀνομάζεται *σιελίνη* Ptyalin.

Τὸ εἰς ὕδωρ διάλυμα τῆς ὕλης ταύτης εἶναι ὀλίγον βλενωδές, ἐξατμιζομένου δὲ τοῦ ὕδατος, καθίσταται ἡ σιελίνη ἄχρους καὶ διαφανής. Εἰς ταύτην τὴν κατάστασιν ἡ σιελίνη ἐπιχυθεῖσα μὲ ὕδωρ γίνεται λευκὴ, ἀδιαφανὴς καὶ βλενωδής, σχηματίζουσα μετὰ ταῦτα καθαρὸν ρευστὸν, τὸ ὅποιον δὲν μεταβάλλεται μήτε διὰ τοῦ τῶν κικιδῶν βάμματος, μήτε διὰ τοῦ διττοχλωρίου ὑδροργύρου καὶ τοῦ βασικοῦ ὀξικοῦ μολύβδου, μήτε διὰ τῶν δυνατωτέρων ὀξέων. Διὰ τούτων τῶν χαρακτηριστικῶν διαφέρει ὁ σιέλως ἀπὸ τὰς ἄλλας ζωϊκὰς ὕλας.

Τὸ ἐπιμένον φλέγμα μετὰ τὴν δι' ὕδατος ἐκχύλισιν τῆς σιελίνης εἶναι ἀδιαφανές, ὡς νῦν ἦτον μεμιγμένον μὲ φωσφορικὰς γαίας, καὶ ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ· συμπήγνυται δι' ὀξικοῦ, καθὼς διὰ θειικοῦ καὶ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος· ἐκ δὲ τῶν διαλυμάτων τούτων τὰ ἀλαλία δὲν καταβυθίζουσι τὸ παραμικρὸν ἴζημα, ἀπόδειξις, ὅτι τοῦτο τὸ φλέγμα δὲν ἐμπεριέχει φωσφορικὴν τίτανον εἰς ἐλευθέρην κατάστασιν. Διὰ τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων διαλύεται μὲν, καταβυθίζεται δὲ πάλιν διὰ τῶν ὀξέων· τὸ μικρὸν μέρος αὐτοῦ, τὸ ὅποιον μένει ἀδιάλυτον εἰς τὸ ἀλαλίον, διαλύεται εἰς τὰ ὀξέα, ἀλλὰ δὲν ἀποχωρίζεται ἐξ αὐτῶν διὰ τῶν ἀλκαλίων, ὥστε καὶ αὐτὸ δὲν δύναται νὰ ἦναι φωσφορικὴ τίτανος. Μ' ὅλον τοῦτο ἐμπεριέχει τὸ εἰρημένον φλέγμα σημαντικὸν ποτὸν φωσφορικῆς τιτάνου ἥτις ἐπιμένει μετὰ τὴν καῦσιν τοῦ φλέγματος καὶ σχηματίζει, ὡς φαίνεται, τὸν οὕτω λεγόμενον *σιελόλιθον* τῶν ὀδόντων. Ἐν γένει τὸ φλέγμα αὐτὸ ἔχει μεγάλην ὁμοιότητα μὲ τὴν βλένναν τῶν ἐντέρων καὶ τοῦ στομάχου, ἀλλὰ χαρακτηριστικὴν διαφορὰν ἀπὸ τὴν τῆς ρι-

νός, μ' ὅλον ὅπου ἀμφότερα ταῦτα τὰ διακριτικὰ ὄργανα κείνται τόσον πλησίον· τὸ τῆς ῥινὸς φλέγμα διαφέρει καθότι εἶναι διαλύσιμον εἰς τὰ ὀξεῖα.

Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Berzelius σύγκειται ὁ τοῦ ἀνθρώπου σίελος εἰς 1000 μέρη ἐξ:

ὕδατος	992, 9.
Πτυαλίου	2, 9.
Φλέγματος	1, 4.
Ἐκχυλίσματος τοῦ κρέατος με γαλακτικά ἀλκάλια	0, 9.
Ἵδροχλωρικοῦ νάτρου	1, 7.
Νάτρου	0, 2.
1000.	

Κατὰ δὲ τὴν ἀνάλυσιν, τὴν ὁποίαν ἔκαμεν ὁ Gmelin καὶ ὁ Tiedemann, ἐμπεριέχει καὶ ὑδροθειοκυανικὸν κάλιον, καθὼς καὶ φωσφοροῦχον λίπος, τὸ ὁποῖον νομιζοῦσιν αἷτιον τῆς φωσφορώδους ὁσμῆς, τὴν ὁποίαν ἔχει ἡ ἀναπνοὴ τινῶν ἀνθρώπων.

Ἰδρώς. Sueur.

Ὁ ἰδρώς τῶν ἀνθρώπων, καθὼς καὶ τῶν ζώων, ἔχει σχεδὸν πάντοτε ὀξεῖα χαρακτηριστικὰ καὶ ἰδιαιτέραν ὁσμὴν. Ὁ Thenard ἐσύναξε τὸν ἰδρώτα τῶν ἀνθρώπων ἐνδύσας τοὺς ἀνθρώπους μετὰ μάλλινον χιτῶνα φορεμένον κατὰ σάρκα· τοῦτον πλήρη μετὰ τὸν ἰδρώτα τινὸς δυνατὰ ἐθρώνοντος ἀνθρώπου ἐκχύλισε μετὰ ἀποσταγμαμένον ὕδωρ καὶ τὸ ἀποτελούμενον ρευστὸν ἐξτμησθέν εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος ἐξάγει ρευστὸν, τὸ ὁποῖον ἔχει δυνατὴν ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ ἰδρώτος. Τὸ διὰ τῆς ἀποστάξεως ἐξαγόμενον ρευστὸν εἶχεν δυνατὴν ὁσμὴν τοῦ ἰδρώτος, καὶ ἐκακύνιζε τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην. Τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ληφθὲν ὑπόλειμμα ἐμπεριέχει ὑδροχλωρικὴν σόδα, φωσφορικὴν σόδα, ἔχνη φωσφορικῆς τιτάνου, ὀξείδιον σιδήρου καὶ ζωϊκὴν τινα οὐσίαν, ἥτις καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύματός της διὰ βυρσοδεψικῆς ὕλης. Ὁ Berzelius ἐκτὸς τῶν ἤδη ἀναφερθεῖσων ὑλῶν, εὑρεν καὶ ὁσμοζώμιον, γαλακτικὸν ὀξύ καὶ ὑδροχλωρικὴν ἀμμωνίαν.

Κατὰ τὰς παρατηρήσεις τοῦ Anselminos ὁ διὰ ἀτμώδους λουτροῦ ἐξαγόμενος ἰδρώς ὑγιῶν ἀνθρώπων εἶναι θολὸν ρευστὸν, ἐκ τοῦ ὁποῖου ἐξατμίζεται ὀξικὴ ἀμμωνία. Ἐάν καθυποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν, ἐπιμένει μετὰ τὴν

ἐξάτμισιν υπόλειμμα ἐμπεριέχον: Ὑδροχλωρικὴν σόδα, ὁσμοζώμιον, γαλακτικὸν ὀξύ καὶ γαλακτικὰ ἄλατα, ζωϊκὴν οὐσίαν, τιτανώδη καὶ θειϊκὰ ἄλατα.

Ὁ Anselminos ἐξετάσας τὸν ἰδρώτα τῶν ἵππων, εὔρεν εἰς αὐτὸν λίπος πράσινον, ὁσμοζώμιον, σιελώδη ὕλην, λεύκωμα καὶ ὀξικὸν ὀξύ. Ἡ τέφρα τοῦ ἰδρώτος ἐμπεριέχει ὕδροχλωρικὴν καὶ θειϊκὴν πότασσαν, νάτρον, ἀνθρακικὴν καὶ φωσφορικὴν τίτανον, φωσφορικὴν μαγνησίαν καὶ ὀξειδίον τοῦ σιδήρου.

Εἶναι πολλὰ πιθανόν, ὅτι ὁ ἰδρῶς διαφόρων μερῶν τοῦ σώματος ἐμπεριέχει διαφόρους ὕλας. Ἡ ἔκκρισις τῶν ποδῶν ἔχει πολὺ διάφορον ὁσμὴν ἀπὸ τὴν τῶν ἄλλων ὀργάνων τοῦ σώματος. Ὁ ὑποκάτω τῶν μασχαλῶν ἀποκρινόμενος ἰδρῶς ἔχει ὁσμὴν ὡς τὴν τῆς ἀμμωνίας, καὶ ὁ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων παχέων ἀνθρώπων ἐμπεριέχει βουτυρικὸν ὀξύ. Εἶναι ὡσαύτως πιθανόν, ὅτι διὰ τῆς τοῦ σώματος ἀδήλου διαπνοῆς διακρίνονται πτητικαὶ τινες ἐνώσεις, αἵτινες, ἐὰν καὶ εἰς ἐλαχίστην ποσότητα ἐπιμένουσιν εἰς τὸ σῶμα προκαλοῦσιν ἀλλοιώσεις, ὡς γίνεται διὰ τῆς ἀπορρόφησεως μiasμάτων. Μόνον κατ' αὐτὸν τὸν λόγον δύναται νὰ ἐξηγηθῇ ὡς αἰτία τόσων βαρέων νόσων ἢ μὴ ἔκκρισις τοῦ ἰδρώτος.

Ὅλον τὸ γένος τῶν σκύλων καὶ γατῶν δὲν ἀποκρίνουν ἰδρώτα, καὶ ἐξ ἐναντίας εἶναι καθ' ὑπερβολὴν ἰσχυρὰ ἢ ἔκκρισις τοῦ ἰδρώτος, εἰς τὸ γένος τὸ καλούμενον *Belluae* καὶ *Pecora*.

Δάκρυον.

Τὸ ἐξωτερικὸν μέρος τοῦ σκληρωτικοῦ ὑμένης τοῦ ὀφθαλμοῦ διῶγραινεται διὰ πχντὸς διὰ τῶν δακρύων, τὸ ῥευστὸν τοῦτο ἀποκρίνεται δι' ἰδιαιτέρου ἀδένος εὐρισκομένου εἰς τὸ ἐνδότερον μέρος τοῦ ὀφθαλμοῦ. Εἰς περιπτώσεις ψυχικῆς ἀθυμίας, ἢ λυπηρᾶς διαθέσεως τῆς ψυχῆς ἀποκρίνεται τοῦτο τὸ ῥευστὸν εἰς μεγάλην ποσότητα καὶ εὐκόλως δύναται νὰ συναχθῇ. Ἐξετάσθη δὲ μόνον παρὰ τοῦ Foudroy καὶ Vauquelin καὶ ἐκ τῆς ἐξετάσεως ταύτης φαίνεται, ὅτι τὸ ῥευστὸν εἶναι ὅμοιον μὲ τὸ ὑδατώδες, *Humor aqueus*, καὶ τὸ ὑελώδες τῶν ὀφθαλμῶν, *Humor vitreus*. Ἐξάτμιζόμενον δίδει περίπου ἐν τοῖς ἑκατὸν στερεᾶς ὕλης, ἥτις συνίσταται κατὰ μέγα μέρος ἐξ ἄλικῆς σόδας, καὶ ἄλλης κιτρिनωποῦ ἐκχυλισματικῆς ὕλης, εἰς δὲ τὸ ὑελώδες ὑγρὸν ὑπάρχει κατὰ τὸν Berzelius καὶ ἔχνος λευκώματος. Τὰ αὐτὰ συστατικὰ ἐμπεριέχει τὸ κρυστάλινον ῥευστὸν Morgagni Sicuor εἰς τὴν ἐξῆς ἀναλογίαν.

Ἰδιαιτέρας λευκωματώδους ὕλης	35,9.
Ἐκχυλισματικῆς ὕλης ὁμοῦ με ἄλλατα διαλύσιμα εἰς ὕδωρ	2,4.
Ἰδατώδους τινὸς ἐκχυλίσματος με ἄλλατα φωσφορικὰ καὶ	
ὕδροχλωρικὰ	1,3.
Ἰνώδους ὕλης σχηματιζούσης κελλὰς	2,4.
Ἰδατος.	58,0.
	100.

Ενίοτε ἀποκαθίσταται τὸ ὑελῶδες ρευστὸν ἀδιαφανές, καὶ ἐκ τούτου γεννᾶται εἶδος τι τυφλότητος, ἥτις καλεῖται *καταόρακτης* καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν πῆξιν τοῦ λευκώματος, ἀδιαλύτου νῦν εἰς τὸ ὕδωρ.

Περὶ τοῦ ἰοῦ τῶν ὄψεων.

Οἱ ἰοβόλοι ὄφεις ἔχουσι δύο πολλὰ αἰχμηροὺς κοίλους ὀδόντας, ἀνοίγοντας εἰς τὰ ἄκρα. Τὸ κοῖλον τοῦ ὀδόντος συγκοινωνεῖ με κύστιν τινά, εἰς ἣν ἐμπεριέχονται 3—4 σταγόνες ρευστοῦ, ἀποκρινομένου ὑπὸ ἰδιαιτέρων ἀδένων καὶ ἐκκριπτομένου ἐκ τοῦ ὀδόντος, ἀφοῦ τὸ ζῶον δαγκάσῃ.

Τοῦτο τὸ φαρμακερὸν ρευστὸν εἶναι κίτρινον, βλενωδές, ἐλαιῶδες τὴν σύστασιν, ἄοσμον καὶ ἰδιαιτέρας γεύσεως, μήτε ἀλκαλικόν, μήτε ὀξινόν, μήτε δριμύ, ἀλλὰ διεγείρον μόνον ἐπὶ τῆς γλώσσης ἀσθενῶς στυπτικὴν γεῦσιν.

Εἰς τὸν ἀέρα ξηραίνεται πρὸς διαφανῇ κιτρίνῃν μάζαν κατέχουσιν τὴν φαρμακεράν του δύναμιν, ἐὰν καὶ ξηρὸν ὀλόκληρον ἔτος· εἶναι βαρύτερον τοῦ ὕδατος καὶ κατακάθεται εἰς αὐτὸ, ζεόμενον δὲ πήγνυται.

Ὁ ἰὸς τῶν ὄψεων, καθὼς καὶ ἄλλα ζωϊκὰ φάρμακα, καὶ εἰς σμικρὰν δόσιν δύνανται νὰ προξενήσωσιν ἐπικίνδυνον ἐνέργειαν· τὸ τῶν ὄψεων δηλητήριον ἔχει πρὸς τούτοις καὶ τὸ παράδοξον ἰδίωμα, ὅτι δύναται νὰ καταπίνεται ἀνευ βλάβης, ἐνῷ ἐγγυνόμενον εἰς τραῦμα ἢ εἰς φλέβας δυνάμει κινδυνώδη ἐνέργειαν καὶ ἐπιφέρει θάνατον. Ἐὰν τὸ ὑπὸ τινος ἰοβόλου ὄψεως προξενηθῇ τραῦμα ἐκτιμηθῇ πάραυτα καὶ ἡ κατὰ καυστικῷ καλίῳ, ἀποφεύγει ὁ δαγκασθεὶς τὸν κίνδυνον· τοῦτο δὲ πρέπει νὰ παραχθῇ ἐντὸς ἡμίσεως λεπτοῦ.

Ἵδρωπικὸν ρευστόν.

Ἵδρωψ λέγεται νόσος τις, εἰς ἣν αἱ κυψέλαι τοῦ κυψελώδους ἱστοῦ

ὑπεργεμίζονται διὰ τινος ῥευστοῦ καὶ οὕτως ἐξοιδοῦνται. Ἡ νόσος αὕτη γίνεται ἐνίοτε ἐντὸς σάκκων, σχηματίζομένων ἀπὸ τοὺς ὀρρώδεις ὑμένους ὁλόγυρα τῶν πνευμόνων, εἰς τὸν γαστέρα, εἰς τὰς κοιλίας τοῦ ἐγκεφάλου, περὶ τοὺς ὄρχεις κτλ. καὶ τότε λέγεται ἡ νόσος τοπικὴ ὑδροπικία.

Τὰ συστατικά τοῦτο τοῦ ῥευστοῦ ἐν γένει εἶναι τὰ ἐξῆς καὶ εἰς τοιαύτην ὡς ἔγγιστα ἀναλογίαν·

Λευκώματος 0, 549.

Λίπους 0, 070.

Γαλακτικοῦ νάτρου ὁμοῦ μὲ εἰς τὸ οἰνόπνευμα . .

διαλύσιμα μόρια 2, 538.

Ἵδροχλωρικοῦ νάτρου 6, 553.

Θειικοῦ νάτρου 0, 146.

Ἀνθρακικοῦ νάτρου 0, 057.

Φωσφορικῆς τιτάνου ἢ μαγνησίης 0, 090.

Ἰδατος 989, 997.

1000.

Ἐνίοτε εὐρέθῃ καὶ ἔχνης οὐρικῆς ὕλης, καὶ εἰς φλογιστικὰς περιστάσεις ἐμπεριέχεται ἰνώδης ὕλη, ἥτις συμπηγνυομένη σχηματίζει νέαν ψευδῆ μεμβράναν, δι' ἧς τὰ μέρη, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐγένετο ἡ ἔκκρισις, συγκολλῶνται.

Ἀρθριτικὸς χυμὸς. Synovia.

Αἱ ἀρθρώδεις κεφαλαὶ τῶν ὀστέων διαλισθαίνουσι πρὸς ἀλλήλας εἰς τὰς ἀρθρώσεις, αἱ ὁποῖαι ὑπαλείφονται μὲ τοὺς ἥδη μνημονευθέντας χόνδρους καὶ περιβάλλονται μὲ τὸν οὕτω λεγόμενον ἀρθρώδῃ ὑμένει, ὅστις ἐκφέρεται ἀπὸ τὰς οἰκείας ἀρθρώδεις κεφαλὰς καὶ ἀποτελεῖ, καθὼς οἱ ὀρρώδεις ὑμένες, θύλακα ἄτρυτον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐμπεριέχεται τὸ ἄρθρον. Ἐκτὸς δὲ τούτων τὰ ὀστᾶ συνέχονται εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλα θέσιν των δι' ἰδίων συνδέσμων, ἀρθριτικῶν συνδέσμων καλουμένων. Ἡ ἐντὸς ἐπιφάνεια τοῦ θυλακοειδοῦς κύτους ὑπαλείφεται μὲ ὑμένει κατὰ τινὰ τρόπον ὀρρώδῃ, ὅστις εἶναι πάντοτε κάθυγρος καὶ ὀλισθηρός. Τὸ ὑπ' αὐτῶν τῶν ὑμένων ἀποκρινόμενον ὑγρὸν εἶναι ἰξῶδες, διαφανές, ὑποκίτρινον, ἔχει γεῦσιν ἀλατώδῃ καὶ ὀσμὴν ὀρρώδῃ· τὰ κυριώτερα συστατικά εἶναι λευκωματώδης ὕλη, ἔχνη ὑδροχλωρικῆς σόδας καὶ φωσφορικῆς τιτάνου.

Παγκρεατικὸν ὑγρὸν.

Τοῦτο τὸ ἰδιαιτέρον ῥευστὸν ἀποκρίνεται ἀπὸ ἀδένα τινὰ παγκρέα κα-

λούμενον, εύρισκόμενον μεταξύ τῆς δωδεκαδακτυλοειδοῦς ἀποφύσεως καὶ τῆς σπληνός. Τὸ βευστόν τοῦτο εἶναι ἄχρουν, γλίσχρον, ἀλατῶδες τὴν γεῦσιν, κοκκινίζει ἀσθενῶς τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου, καὶ πήγνυται ὡς τὸ λεύκωμα. Ἐκτὸν μέρη ἐξατμίζόμενα δίδουσιν 8, 72 ξηροῦ ὑπολείμματος, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει ὁσμώζωμιον, διὰ τοῦ χλωρίου κοκκινίζουσιν ὕλην, τυρώδη ὕλην, λεύκωμα, ὀξικὴν, ὑδροχλωρικὴν καὶ θεϊκὴν σόδαν.

Ἐγκέφαλος καὶ νοτιαῖος μυελός.

Ὁ ἐγκέφαλος κεῖται εἰς τὸ κρανίον, καὶ περιτυλίσσεται ἀπὸ σκληρὰ καὶ δυνατὰ ὀστέα, δι' ὧν προφυλάττεται ἀπὸ τὰς ἔξω προσβολάς· διακρίνεται εἰς τὸν ἰδίως ἐγκέφαλον καὶ τὴν παρεγκεφαλίδαν, Cerebrum et Cerebellum. Ὁ ἐγκέφαλος εἶναι διηρημένος εἰς δύο στιβάδας, τὴν ἐξωτερικὴν, ἥτοι τεφρόχρουν, καὶ τὴν λευκὴν, ἥτοι μυελώδη ἐσωτερικὴν. Ἡ τεφρόχρους μάζα, *γλοιοῖδης οὐσία τοῦ ἐγκεφάλου* (Substantia corticalis) συνίσταται ἀπὸ συσώρευσιν μικρῶν σφαιριδίων, τῶν ὁποίων μέρος τι ἔχει μικροὺς κόκκους. Ἡ λευκὴ μάζα (Substantia medullaris, *μυελώδης μάζα*) εἶναι συσώρευσις μικροσκοπικῶν σωλήνων, οἵτινες φαίνονται ὅτι ἐξέρχονται ἀπὸ τὴν τεφρόχρουν μάζαν τοῦ ἐγκεφάλου.

Ἡ οὐσία τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι μαλακὴ καὶ συνεχὴς, θλιβομένη ὑπὸ τῶν δακτύλων δέχεται τὰς ἐντυπώσεις καὶ εἶναι πολτώδης τὴν σύστασιν· ὁ ἐγκέφαλος ἐμπεριέχει πολλὸν ὕδωρ καὶ εἶναι ὅμοιος ὡς πρὸς τὴν σύνθεσιν τοῦ με γαλάκτωμα, Emulsio. Ἐάν ὁ πρόσφατος ἐγκέφαλος ἀναμιχθῇ με ὕδωρ, σχηματίζεται γαλακτώδης τι βευστόν, τὸ ὁποῖον διατηροῦν τὴν γαλακτώδη ὄψιν ἀποθέτει ἄνθος τι, καὶ τόσον διὰ τῆς ζέσεως ὅσον διὰ τῶν ὀξέων πήγνυται· κατὰ τοῦτο τὸ χαρακτηριστικὸν ὁμοιάζει μετὰ τῶν φυτικῶν γαλακτωμάτων. Κατὰ τὰς νεωτέρας ἀναλύσεις τοῦ Couërbe ἐμπεριέχει ὁ ἐγκέφαλος 5 εἶδη λίπους, τὰ ὁποῖα εἶναι τὰ ἑξῆς:

Χολοστεάρ, Cholestearin, ἐκ τοῦ ὁποίου συνίστανται τὰ περισσότερα τοῦ ἐγκεφάλου συγκρίματα, καὶ ἐπειδὴ κατὰ πρῶτον εὗρέθη εἰς τὴν χολὴν, ἐκεῖ θέλομεν τὸ περιγράψαι ἀκριβέστερον.

Ἐάν ὁ ἐγκέφαλος κατεργασθῇ πρότερον με αἰθέρα, μετὰ ταῦτα δὲ με ζέον οἰνόπνευμα, ἀποχωρίζεται ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς ἀποψύξεως λευκὴ κόνις, ἥτις ἐμπεριέχει πολὺ χολοστεάρ· ἀλλὰ καὶ τὸ δι' αἰθέρος διάλυμα ἐμπεριέχει σημαντικὸν ποσὸν αὐτοῦ. Ἐάν τὸ μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ

αιθέρος υπόλειμμα ζεσθῇ με οινόπνευμα, τὸ ὁποῖον διαλύει τὸ χολοστέαρ, ἐπιμένει τὸ καλούμενον *κερέβροτον*, *Cerebrot*, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδιάλυτον λίπος.

Τοῦτο τὸ λίπος μαζὺ με τὸ προηγούμενον εἶναι τὸ στερεὸν λίπος, τὸ ἀνακαλυφθὲν παρὰ τοῦ *Vauquelin*. Ὁ *Gmelin* εὗρηκεν, ὅτι τοῦτο τὸ λίπος συνίσταται ἀπὸ 2 λίπη καὶ ὠνόμασε τὸ στερεώτερον *κηρὸν* τοῦ ἐγκεφάλου, τὸ δὲ μαλακώτερον *ἐγκεφαλέλαιον*. Μετ' ἔπειτα ἐξετάσθη ἀκριβέστερον παρὰ τοῦ *Kühn*, ὅστις τὸ ὠνόμασε *μυελόκοριν* (μύελος καὶ κόνις). Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ *Couerbe* σύγκαιται ἐξ:

Ἄνθρακος	67,819
• Ὑδρογόνου	11,100
Νιτρογόνου	3,399
Θείου	2,138
Φωσφόρου	2,332
Ὄξυγόνου	12,213

Ἐγκεφαλέλαιον. *Cerebrol* ἢ *Eléencephol*. Τὸ λίπος τοῦτο ἐμπεριέχεται εἰς τὴν δι' οἰνόπνεύματος διάλυσιν, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεχωρίσθησαν τὸ χολοστέαρ καὶ τὸ ἐγκεφαλοτόν. ἔχει τὴν αὐτὴν σύνθεσιν ὡς τὸ ἀκόλουθον.

Κεφαλοτόν, *Cephalot*. Ἐμπεριέχεται μετὰ τὸ ἀκόλουθον εἰς τὸ υπόλειμμα, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν διὰ τῆς ἐξατμίσεως τοῦ αιθέρος, ἐξ οὗ ἀποχωρίσθη τὸ χολοστέαρ.

Τὸ δὲ πέμπτον εἶδος λέγεται *στεαρόκορον*, *Stearokonot*, ἐπεὶ παρυσιάζεται εἰς εἶδος κονοειδοῦς μάζης.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀνκλύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου εἶναι τὰ ἐξῆς: Λευκώματος 7,00. Στεατώδους ὕλης, ἐλαίνης, στέατος, 5,23. Φωσφόρου 1,50. Ὄσμοζωμίου 1,12. Ὄξεων ἀλάτων καὶ θείου 5,15. Ὑδατος 80,00.

Κατ' ἄλλην ἀνάλυσιν εὗρέθησαν τὰ ἐξῆς:

Λευκώματος 9,6. Ἄχρου λίπους 7,2. Ἐρυθροῦ λίπους 3,7. Ἐκχυλισματικῶν μορίων, γαλακτικῶν ἀλάτων, 2,0. Φωσφορικῆς τιτάνου μετὰ ἔχνη μαγνησίας καὶ ὀξειδίου σιδήρου 1,1. Ὑδατος 77,0.

Τὰ αὐτὰ συστατικὰ ἐξιχνιάσθησαν εἰς τὸν νοτιαῖον μυελὸν καὶ τὰ γέφυρα.

Ἐνίοτε εὗρίσκονται εἰς τὸ *κωράριον*, *Glandula pinealis*, παρὰ φύσιν

συμπήγματα, τὰ ὅποια μικρὰ ὄντα δὲν ἐπιφέρουσι βλάβην, δίδουσιν ὅμως ἀφορμὴν νευρικῶν γόσων. Εἰς τὰ συμπήγματα ταῦτα εὐρέθησαν :

Χοληστεάτος	58, 0.
Λευκώματος πεπηγμένου καὶ μεμβράνης	39, 5.
Φωσφορικῆς τιτάνου	2, 5.
	100.

Πῦον.

Ἐκαστος ἐρεθισμὸς εἰς τὸ κυψελῶδες ὅστούν, εἰς τὸ δέριμα ἢ καὶ εἰς ἐνδότερον μέρος τοῦ σώματος, διεγείρει εἰς τὰ μικρότερα ἀγγεῖα ταχυτέραν τινὰ κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος. Τὰ ἀγγεῖα ὑπεργεμίζονται μετὰ ῥευστῶν, δι' ὧν τὸ ἐρεθισθὲν μέρος ἐξοιδούται καὶ εἰς τὸ κέντρον του γεννᾶται ὀργανικὴ τις ἀποσύνθεσις. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην μεταβάλλεται ποσότης τις τῶν ῥευστῶν εἰς παχύρρευστον, λευκὸν ἢ κίτρινον ῥευστὸν, πῦον λεγόμενον· τὸ ῥευστὸν τοῦτο διαβιβρώσκει τὸ δέριμα καὶ ἐκρέει. Ἐνίοτε ἄρχεται τὸ πῦον νὰ σήπηται ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας καὶ μεταβολῆς τῶν χαρακτῆρων του, καὶ τότε καλεῖται κακοῦθες πῦον (ιχώρ), Icor.

Τὸ πῦον ἔχει εἰδικὴν βαρύτητα 1, 030, σύγκειται ἀπὸ πλῆθος σφαιριδίων κιτρίνων καὶ διαφόρου μεγέθους. Διὰ τῆς ἀποξηράνσεως ἀποβάλλει 86, 1 τοῖς % ὕδατος, ἐμπεριέχει λοιπὸν 13, 9 τοῖς % στερεῶν συστατικῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ψυχρὸν οἰνόπνευμα διαλύει 4, 3, συγκείμενα ἐκ λίπους, ἀλάτων διὰ γαλακτικοῦ ὀξέος καὶ ἐκχυλισματικῶν ὑλῶν. Τὸ ζέον οἰνόπνευμα διαλύει ἐκ τοῦ ὑπολείμματος 1, 6 ἰδιαίτερου τινὸς λίπους, τὰ δὲ εἰς αὐτὸ ἀδιάλυτα 7, 4 συνίστανται ἀπὸ πεπηγμένον λεύκωμα, ἀπὸ ἰδιαίτεραν ὕλην, καὶ ἀπὸ τὰ στερεὰ μόρια τῶν τοῦ πύου σφαιριδίων.

Τὸ ἀπεξηραμένον καὶ κεκαυμένον πῦον δίδει 0, 8 τέφρας· τὰ 0, 7 αὐτῆς σύγκεινται ἐξ εὐδιαλύτων ἀλάτων, τῶν κοινῶς ἐμπεριεχομένων εἰς ζωϊκὰ ῥευστά, τὸ δὲ ἀδιάλυτον 0, 1 εἶναι φωσφορικὴ τίτανος μὲ ὀλίγην ἀνθρακικὴν τίτανον καὶ ἴχνη χαλκίης. Ἀλλὰ ὁ Güterbork, ὅστις ἔκαμεν αὐτὰς τὰς ἐξετάσεις περὶ τοῦ πύου, δὲν ἐδυνήθη νὰ ἀνακαλύψῃ τὴν ἐλαχίστην ποσότητα ὀξειδωμένου σιδήρου· ἀπόδειξις, ὅτι τὰ σφαιρίδια τοῦ αἵματος δὲν λαμβάνουν μέρος εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ πύου.

Κατὰ τὰς ἐξετάσεις τοῦ Güterbork φαίνεται, ὅτι τὸ πῦον συνίσταται

ἀπὸ ὀρρόν, ὅστις ἐμπεριέχει δύο διὰ τῆς θερμότητος πηγνυόμενας ὕλας, καὶ ὅτι τὰ σφαιρίδια εἶναι πεπηγμένον λεύκωμα.

Ὁ τοῦ πύου ὀρρός πήγνυται τόσον διὰ τῆς ζέσεως, ὅσον διὰ τῆς μὲ οἰνόπνευμα μίξεως. Ἐκ τῆς δι' οἰνοπνεύματος πηγνυομένης μάζης διαλύει τὸ ὕδωρ ἰδιαιτέραν ὕλην, ὀνομασθεῖσαν παρὰ τοῦ Güterbork Pyin, *πυτίνη*, ἥτις ἔχει ὁμοιοτοτά τινα μὲ τὴν τοῦ τυροῦ ὕλην.

Οἱ ἱατροὶ ἐνασχολήθησαν πολὺ διὰ νὰ γνωρίσουν, ἂν τὸ εἰς τὰ σπητικὰ πάθη διὰ τοῦ βληχὸς ἀναχρεμπτόμενον ᾖ βαμμένον φλέγμα, ἢ ἀληθινὸν πῦον, ἢ καὶ φλέγμα μειμιγμένον μὲ πῦον.

Μερικοὶ λέγουσιν, ὅτι τὸ καυστικὸν κάλιον διαλύει μὲν τόσον τὸ πῦον ὅσον τὸ φλέγμα, ἀλλὰ τὸ πῦον καταβυθίζεται δι' ὕδατος, ὅχι δὲ καὶ τὸ φλέγμα. Τινὲς ἐξετάζουσι τὴν ἀναχρεμπτομένην ὕλην, τρίβοντες αὐτὴν μὲ ἴσον ποσὸν χλιαροῦ ὕδατος καὶ μετὰ ταῦτα προστίθεντες τὸ αὐτὸ ποσὸν κορεσθείσης ἀλousίας τῆς ποτάσεως· ἐὰν τὸ φλέγμα ἐμπεριέχῃ καὶ πῦον, ἀποχωρίζεται ἐξ αὐτοῦ εἰς διάστημα 2—3 ὥρων γλισχρὰ καὶ διαφανὴς πηκτή. Ἄλλοι ζέουσι τὸ φλέγμα μὲ διάλυσιν τοῦ ἀμμωνιακοῦ ἀλατος εἰς ὕδωρ· τὸ καθαρὸν φλέγμα διαλύεται κατὰ τὴν γνώμην αὐτῶν ἐντελῶς πρὸς καθαρὸν βλεννώδες ρευστὸν, τὸ δὲ ἔμπυον πήγνυται χωρὶς νὰ διαλυθῇ.

Ὁ Güterbork, ἐξετάσας καὶ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενον, ἤρεν, ὅτι τὸ καλῆτερον μέσον τοῦ διακρίνειν ἀμφοτέρας τὰς ὕλας ταύτας· εἶναι τὸ ὕδωρ· τὸ φλέγμα ἐπιπολάζει ἐπ' αὐτοῦ, τὸ δὲ πῦον καταπίπτει.

Καρκῖνος. *Cancer*.

Ὁ καρκῖνος εἶναι ἀποτέλεσμα νοσώδους καταστάσεως, ἀπὸ τὴν ὁποίαν τινὰ ὄργανα, ἐξόχως οἱ μαστοί, προσβάλλονται. Ὁ καρκῖνος γεννᾶται ἀπὸ ἰδίαν νοσερὰν ὀργάνωσιν ἀπὸ τὸν οὕτως λεγόμενον σκίρρον, *Scirrhus*, ὅστις μεταπίπτει εἰς φθέρουσαν ἐκφύλλωσιν, διακρινομένης δυσωδεστάτης καὶ σπηδωνώδους ὑγρότητος. Εἰς τὸ ἐκρέον συνήθως πολλὰ δυσώδες πῦον ἐμπεριέχονται ἀνθρακικὴ ἀμμωνία καὶ ὑδροθειωμένη ἀμμωνία.

Συμπήγματα.

Εἰς τὴν τράχειάν, εἰς τὴν ρίνα, εἰς τὸ περικάρδιον, εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς, εἰς τὸ ἥπαρ, εἰς τὴν μήτραν εὐρίσκονται ἐνίοτε συμπήγματα μεγαλύτερα ἢ μικρότερα, ἅτινα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συνίστανται ἐκ φωσ-

φορικῆς καὶ ἀνθρακικῆς τιτάνου, πεπηγμένου λευκώματος, βλέννης καὶ ὑδροχλωρικῆς σόδας.

Εἰς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας τῶν ἀπὸ ἀρθρίτιδα πασχόντων σχηματίζονται ἐνίοτε συγκρίματα, ἅτινα εὐρέθησαν συνιστάμενα ἐξ ὕδατος, ζωϊκῆς οὐσίας, οὐρικοῦ ὀξέος, νάτρου, τιτάνου, ὑδροχλωρικῆς σόδας.

Εἰς τὸν ἐγκέφαλον καὶ εἰς τὸ ἥπαρ, ἀπαντῶνται ἐνίοτε μεγαλύτεραι ἢ μικρότεραι μετὰ τινος ῥευστοῦ πεπληρωμένοι κύστεις, ὑδατίδες λεγόμεναι. Τὸ ἐν αὐταῖς ἐμπεριεχόμενον ῥευστὸν σύγκειται ἐκ λευκώματος, βλέννης, ἀνθρακικῆς σόδας, ὑδροχλωρικῆς σόδας, θεικῆς καὶ φωσφορικῆς τιτάνου.

Τὸ ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχεται εἰς τὸν *meliceron*, *Meliceris*, ἐμπεριέχει πεπηγμένον λεύκωμα, ἐλαϊώδες καὶ στεατῶδες νάτρον, χολοστέαρ, στεατίνην, τίτανον καὶ μαγνησίαν.

Παρὰ φύσιν ἀποκρίσεις λιπώδους ὕλης καλοῦνται *λιπώματα*· εἰς τὸ λίπος τοῦτο ἀνεκαλύφθησαν ἐνίοτε κρύσταλλοι χοληστέατος, καὶ ἐκτὸς τούτου τυρώδης ὕλη μὲ λίπος.

Φύματα τῶν πνευμόνων.

Τόσον εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς εἰς τὰ ζῶα, σχηματίζονται ἐνίοτε εἰς τοὺς πνευμένους μικρὰ, λευκὰ σφαιρίδια, ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἐπαυξάνοντα, στρογγυλὰ καὶ ἄλλοτε μὲν διαμύνουν σκληρὰ, ἄλλοτε δὲ κατ' ὀλίγον μαλακόνονται, ῥυτυοῦνται καὶ μεταβάλλονται εἰς ἐντελὲς πῦον. Ἡ ἐντὸς τῶν σφαιριδίων εὐρισκομένη μάζα ἐμπεριέχει εἰς τὸ πρῶτον στάδιον τῆς νόσου 15 πεπηγμένου λευκώματος καὶ 85 ὕδατος ὁμοῦ μὲ ἔχνη τῶν εἰς τὰ ζωϊκὰ ῥευστὰ ἐμπεριεχομένων ἀλάτων. Τὰ ἡμίρευστα συμμιγνύμενα μετὰ τοῦ ὕδατος παρέχουσι ῥευστὸν τι πηγνύμενον διὰ τῆς θερμάνσεως.

Ἑσχάραι ἐπὶ τῶν ἐλκῶν.

Ἐὰν ἀποτριφθῇ ἡ ἐπίδερμις καὶ σχηματισθῶσιν ἀνοικτὰ τραύματα ἐπὶ τοῦ δέρματος, ἐκχύνονται ῥευστὰ, ἅτινα ἀποξηραίνόμενα προφυλάττουσι τὸ κάτωθεν εὐρισκόμενον δέρμα ἀπὸ τῆν ἐπιρροὴν τοῦ ἀέρος. Τοιαῦται ἑσχάραι σύγκεινται ἐκ:

Πεπηγμένον λευκώματος	63
Ίευστου λευκώματος	15
Λίπους	2
Όσμοζωμίου	18
Τών συνήθων αλάτων	2

100.

Δυσώδες έλαιον του Viverra Putorius.

Τούτο τὸ ζῶον ἔχει μεταξὺ τοῦ ἀφεδρώνος καὶ τῆς οὐρᾶς κύστιν τινά, ἐμπεριέχουσαν τόσον πολὺ δυσώδες έλαιον, ὥστε δι' αὐτοῦ ἐκριπτομένου ἀπομακρύνονται τὰ διώκοντα αὐτὸ ἐχθρικά ζῶα. Τοῦτο τὸ έλαιον εἶναι ἐλαφρότερον τοῦ ὕδατος καὶ ἔχει ἀηδεστάτην ὡς σκοροδου ὁσμήν, εἶναι ὀλίγον μόνον διαχύσιμον εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον προσλαμβάνει τὴν ἀηδῆ αὐτοῦ ὁσμήν· ἐπὶ τοῦ χάρτου προξενεῖ σπιλώματα, καὶ ἐνῶ μέρος τοῦ ελαίου ἐξατμίζεται, βάφεται ὁ σπιλωθεὶς χάρτης ῥοδόχρους. Τοῦτο τὸ έλαιον σύγκειται ἐκ πτητικοῦ καὶ λιπαροῦ ελαίου, δυνάμενα νὰ ἀποχωρισθῶσι διὰ τῆς δι' ὕδατος ἀποσταξέως· ἡ ὁσμή του προέρχεται ἀπὸ τὸ πτητικὸν έλαιον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχεται ὑδρωθειωμένη ἀμμωνία, καὶ διὰ τοῦτο τὸ μετὰ τοῦ ελαίου κατεργαζόμενον ὕδωρ ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ καταβυθίζῃ τὰ διὰ μετάλλων ἄλατα. Τὸ λιπαρὸν έλαιον εἶναι ἄοσμον, ἐὰν ἀναφλεχθῇ, καίει ἐκπέμπον ὁσμήν ὁμοίαν τοῦ θειώδους ὀξέος· καὶ ὁ Lassaigne ἀνεκάλυψεν 8 τοῖς % θείου.

Όφθαλμομέλαν. Ophthalmomelanin.

Τὸ μέλαν χρῶμα εὐρίσκεται ἀναμειγμένον μετὰ βλέννης ἐπὶ τοῦ χοροειδοῦς ὑμένος τῶν ὀφθαλμῶν καὶ δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ εὐκόλως διὰ τῆς ἀποπλύσεως ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν βόων. Τὸ μέλαν χρῶμα τῶν ὀφθαλμῶν παρουσιάζεται εἰς εἶδος ὑπομελανῶν, εὐθρύπτων κορματίων, ὁσμων καὶ ἀτήκτων· εἰς τὸ ψυχρὸν καὶ θερμὸν ὕδωρ, εἰς τὸ οἰνόπνευμα, καὶ εἰς τὰ κεκραμένα ὀξέα εἶναι ἀδιάλυτον· παρὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου ἀποσυντίθεται, τὸ διάλυμα τοῦ καυστικοῦ καλίου κατεργαζόμενον μετὰ τῆς μελαίνης ὕλης, διαλύει μέρος αὐτῆς ὑπὸ τῆς ἐκλύσεως ἀμμωνίας καὶ ἐκ τοῦ ἐρυθροφαίου ὑγροῦ καταβυθίζονται διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος φαιοὶ θρόμβοι. Ἡ ῥηθεῖσα ὕλη εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸν αἰθέρα, εἰς τὰ λιπαρὰ καὶ πτητικὰ έλαια. Ἡ ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀέρος, θερμανθεῖσα ὕλη δεικνύει μᾶλλον τὰ χαρακτηριστικά

φυτικής ουσίας, αναφλέγεται και εκπέμπει όσμήν ως αί φυτική ουσία, και ή επιμένουσα τέφρα έμπεριέχει όλίγον όξειδιον του σιδήρου. Η μέλαινα ύλη των όφθαλμών εκλύει διά τής ξηράς αποστάξεως άνθρακικήν άμμονίαν.

Cerambyx Moschatus. Τουτό έντομον άποκρίνει εκ του άρδρωνος εύοσμόν τι ρευστόν έλαιώδους συστάσεως, αδιάλυτον εις τό ύδωρ, διαλύσιμον εις τό οινόπνευμα και τόν αιθέρα, εις τά όποια μεταδίδεται ή όσμή του ρευστού τούτου, ήτις όμοιάζει την των ρόδων. Εάν τό έλαιον τούτο θερμανθῇ μέχρι τής 60° R. φθείρεται ή εύάρεστος όσμή και άντικαθίσταται διά πολλά δυσάρεστου.

Χιτώνιον. Chitin.

Ούτως εκαλέσθη τό σκληρόν κάλυμμα των έντόμων και των κολεοπτέρων. Η ύλη αύτη θεωρείται ιδιαιτέρας φύσεως και άπολαμβάνεται, εάν τά πτερά των έντόμων εκχυλισθώσι διά καυστικής ποτάσης και τό επίλοιπον μέρος, χωρίς έντελῆ αποχώρισιν των έμπεριεχομένων μορίων, εκπλυθῇ δι' άρκοῦντος ύδατος. Τά καλύμματα των έντόμων έχουσι πολλάκις μεταλλικώς στίλβουσιν επιφάνειαν, ήτις προέρχεται από την των ήλιακων ακτίνων διάφορον θλάσιν και άντανάκλασιν. Διά τής επιρροῆς του φωτός άποκαθίσταται πολλάκις φαιά ή έρυθρά τό χρώμα.

Κερατοειδῆ όστᾶ του ψυητήρος. *Os balænae.*

Τά εις τόν ισοράγον του *Balæna mysticetus* και άλλων τινών ψυητήρων εύρισκόμενα κερατοειδῆ όστᾶ, τά όποια χρησιμεύουν προς έμπόδισιν τής διόδου των μικρών ζώων, συνίστανται εκ: λίπους διαλυσίμου διά του αιθέρος 3,700 ύδατώδους εκχυλίσματος 8, 7· ή δε μετά την καῦσιν επιμένουσα τέφρα έμπεριέχει: ύδροχλωρικής σόδας 1, 9, θειϊκής σόδας 1, 1, θειϊκής μαγνησίας 10, 2, φωσφορικής τιτάνου με έχνη χαλκού και όξειδιου του σιδήρου. Τά των χελώνων όστρακκ παρέχουν τέφραν έμπεριέχουσαν φωσφορικήν τίτανον, φωσφορικήν σόδαν, άνθρακικήν τίτανον και όξειδιον του σιδήρου· τής αύτῆς συνθέσεως είναι τά λέπη των όφρων και σαυρών.

Τὰ δὲ λεπίδια τῶν ἰχθύων ἔχουσι τὴν ἐξῆς σύνθεσιν.

Leopis ostea. Perca labrax.

Νιτρογονούχου ζωϊκῆς ὕλης . .	41, 10.	55, 00.
Φωσφορικῆς τιτάνου βασίκης . .	46, 20.	37, 80.
Ἀνθρακικῆς τιτάνου	10, 00.	3, 06.
Φωσφορικῆς μαγνησίας	2, 20.	0, 90.
Λίπους ῥευστοῦ	0, 40.	0, 40.
Ἀνθρακικοῦ νάτρου	0, 10.	0, 90.
Ίχνη σιδήρου, μαγγανησίου κτλ.		1, 94.

100. — 100.

Τὰ λέπη τινῶν εἰδῶν κυπρίνων εἶναι ἐξωτερικῶς σκεπασμένα ἀπὸ τινα ὡς τὸν ἄργυρον, στίλβουσιν στίβἀδα καὶ τὰ λέπη ταῦτα ἀποχωρίζονται, ἐὰν οἱ ἰχθεῖς ἀποπλυθῶσι μὲ ὕδωρ. Χρῆσιν τινα ἔχουσι τὰ λέπη τινὸς εἶδους κυπρίνου, καλουμένου *Cyprinus alburnus*. Οἱ μικροὶ οὗτοι ἰχθεῖς ἀνατάραττονται μὲ ὕδωρ, καὶ τὰ ἐκ τοῦ ὕδατος καταβυθιζόμενα λέπη καλῶς ἀποπλυθέντα ἐπιχύνονται μετὰ καυστικῆς ἀμμωνίας, δι' ἧς μέρος διαλύεται, μέρος δὲ μένει ἀδιάλυτον· τοῦτο τὸ διάλυμα καλεῖται *Essence d' Orient*, καὶ μεταχειρίζεται πρὸς κατασκευὴν τεχνητῶν μαργαρίτων. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἐγκλείεται εἰς τὸ κοῖλον τῶν ἐξ ὕλου κατασκευαζομένων μαργαρίτων σμικρὸν ποσὸν τοῦ ῥηθέντος ῥευστοῦ, ἀνακινεῖται διὰ νὰ σκεπασθῇ τὸ ἔνδον ἐντελῶς, τὸ δὲ ἐπίλοιπον ῥευστὸν ἐκβάλλεται· μετὰ ταῦτα ἡ ἀμμωνία ἐξατμίζεται καὶ τὸ ἔνδον τῆς ὕλου μένει κεκαλυμμένον μετὰ τῆς στιλβούσης ὕλης, καὶ ἀκολούθως πληροῦται τὸ κοῖλον μετὰ λευκοῦ κηροῦ.

Οἱ ἰχθεῖς δὲν ἔχουσι συνήθως λέπη εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς κοιλίας, ἀλλὰ εἶναι κεκαλυμμένοι ὑπὸ τινος μεταλλικῶς λαμπρίζοντος ὕμενος· ἡ λάμψις αὕτη προέρχεται ἀπὸ μικροσκοπικοὺς κρυστάλλους. Ἡ αὕτη κρυσταλλώσιμος ὕλη δίδει καὶ εἰς τὸν χωροειδῆ ὕμενα καὶ εἰς τὸ ἔμπροσθεν μέρος τῆς ἱρίδος τοῦ ὀφθαλμοῦ λαμπρότητα ὡς τὴν τοῦ ἀργύρου.

"Οστράκα τῶν Καρκίνων.

Τὸ μέλαν χροῶμα τῶν ὀστράκων τῶν καρκίνων ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ γίνεταί ἐρυθρὸν διὰ τῆς ζέσεως. Ἡ ὕλη αὕτη εἶναι λιπώδης, κυανοπρασίνη εἰς τὴν φυσικὴν τῆς κατάστασιν, ἐρυθροῦται δὲ ἂν θερμανθῇ μέχρις 70° R.

καὶ τότε ὁμοιάζει μὲ τὸ ῥάμφος τῶν χηνῶν καὶ περιστερῶν. Ἡ ὕλη αὕτη ἐμπεριέχεται τόσον εἰς τὸ ὄστρακον, καθὼς καὶ εἰς τὴν ὑποκάτω αὐτοῦ ἐπιδερμίδα, καὶ δύναται νὰ ἐξαχθῇ, ἐὰν τὰ καλῶς καθαρισθέντα ὄστρακα ἐκχυλισθῶσι δι' οἶνοπνεύματος, τὸ ὅποιον διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ λίπους προσλαμβάνει ἐρυθρὸν χρῶμα, καὶ ἐξατμιζομένου αὐτοῦ, ὑπολείπεται εἰς εἶδος ἐρυθρᾶς, στερεᾶς καὶ λιπώδους οὐσίας. Ἡ λιπώδης ὕλη εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, δικλῦσιμος εἰς τὸ οἶνοπνευμα, τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὰ λιπαρὰ καὶ πτητικὰ ἔλαια. Ἐὰν τὸ δι' οἶνοπνεύματος ἐρυθρὸν διάλυμα συμμιχθῇ μετὰθειοῦ ἢ νιτρικοῦ ὀξέος, μεταβάλλεται εἰς πράσινον, χωρὶς νὰ ἐπανέλθῃ τὸ ἐρυθροῦν χρῶμα δι' ἀλλοιωμάτων. Ἐὰν τὸ ῥηθὲν διάλυμα ἀναμιχθῇ μετὰ στυπτηρίαν, ἐξαλείφεται τὸ ἐρυθροῦν χρῶμα, προστεθείσης δὲ ἀμμωνίας, ἐπανέρχεται τὸ ἐρυθροῦν χρῶμα ἠνωμένον μετ' ἀργίλλου· ὡσαύτως ἀποχωρίζεται τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου δι' ὀξικοῦ μολύβδου εἰς εἶδος ἰώδους ἰζήματος. Τὰ ὄστρακα ταῦτα ἐρυθροῦνται ὡσαύτως διὰ ὀξέων, τινῶν ὀξίνων ἀλάτων, διὰ τῆς σήψεως, εἰς τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὀξυγόνον, ὅχι δὲ εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ τὸ ὕδρογόνον. Διὰ τῆς τοῦ χλωρίου ἐπιβροῆς λευκαίνονται.

Σύγκειται ἐκ χονδροειδοῦς ὑμένης 33, 3, ἀνθρακικῆς τιτάνου μὲ ἵχνη ὀξειδωμένου σιδήρου καὶ μαγνησίας 61, 0, φωσφορικῆς τιτάνου 5, 7. Τὰ λιθάρια τῶν ποταμίων καρκίνων, *Oculi Cancrorum*, σύγκεινται ἐξ: ἀνθρακικῆς τιτάνου 63, 16, φωσφορικῆς τιτάνου 11, 33, φωσφορικῆς μαγνησίας 1, 34, ἀνθρακικῆς σόδας 2, 41, εἰς τὸ ὕδωρ διαλυσίμων μορίων 11, 43, χόνδρου 4, 33.

“*Οστρεα, μαργαρίται καὶ πορφύρα.*”

Τὸ σαρκῶδες μέρος τοῦ ὀστρέου, *Ostrea edulis*, ἐμπεριέχει λεύκωμα, ἰνώδη ὕλην, βλένναν καὶ ἐκχυλισματικὴν ὕλην ὁμοιάζουσαν τὸ ὁμοζώμια. Ἐκ τῶν ἀπανθρακωμένων ὀστρέων ἐκχυλίζεται διὰ τοῦ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος φωσφορικὴ καὶ ἀνθρακικὴ τίτανος καὶ μετὰ τὴν ἐντελῆ ἀποτέφρωσιν ἐπιμένει μόνον φωσφορικὴ τίτανος.

Τὰ ὄστρακα τοῦ ζώου τούτου σύγκεινται ἐξ: Ἀδιαλύτου ζωϊκῆς οὐσίας 0, 5. Ἀνθρακικῆς τιτάνου 98, 6. Φωσφορικῆς τιτάνου 1, 2. Ἀργίλλου 0, 2.

Τὰ ὄστρακα τῶν χοχλιῶν, καθὼς καὶ οἱ μαργαρίται, σύγκεινται ἐξ ἀν-

θρακικῆς με ἔχνη φωσφορικῆς τιτάνου, ἠνωμένης με ὀλίγον ποσὸν δερματοειδοῦς ὑφάσματος.

Ἡ πορφύρα, *Murex brandaris*, ἐμπεριέχει ἰδιαιτέραν βαφικὴν ὕλην χρήσιμον τὸ πάλαι πρὸς χρωματισμὸν τῶν ὑφασμάτων καὶ παρέχουσαν ὥραιότητην καὶ πολυτιμότητην πορφυρὰν βαφὴν. Τοῦτο τὸ ρευστὸν, ἀποκρινόμενον ὑπὸ ἰδιαίτερου τινὸς ἀδένος, εἶναι ἄχρουν καὶ ἐκτιθέμενον εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ φωτὸς τῆς ἡμέρας λαμβάνει κατ' ἀρχὰς νεραντζοειδές, ἀκολούθως χλωρὸν, σμαράγδινον, κυανοῦν, ἐρυθρὸν, καὶ τέλος μετὰ 48 ὥρων ὥραιον πορφυροῦν χρῶμα.

Εἰς ταύτας τὰς ἀλλοιώσεις ὑπόκειται τὸ χρωματιζόμενον ὑφασμα, ἐνῶ ἀκόμη εἶναι ὑγρὸν· ἐὰν δὲ τὸ ὑφασμα τεθῇ ἐπὶ ἐμπορικοῦ χάρτου, δι' οὗ ἡ ὑγρασία ἀπορρόφᾶται, τότε αἱ τοῦ χρώματος ἀλλοιώσεις δὲν συμβαίνουσιν, ἐκτὸς ἐὰν ἡ ξηρανθεῖσα βλέννα βραχῇ ἐκ νέου με ὕδωρ. Παράδοξον εἶναι ὅτι αἱ ῥηθεῖσαι ἀλλοιώσεις ἐπίσης ἐμποδίζονται εἰς ἀπουσίαν τοῦ φωτὸς, καὶ εἰς τὴν ἀμμεσον ἐπιρροὴν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων.

Τὰ λοιπὰ ζωόφυτα, ὡς *Madreporae*, σύγκεινται ἐξ ἀνθρακικῆς τιτάνου καὶ δερματοειδοῦς ὑφάσματος. Ἄλλα, καθὼς *Millepora* καὶ *Isis Hippuris*, ὑπολείπουσιν ἐντεθέντα εἰς κεκραμένα ὀξέα, δι' οὗ διαλύεται ἡ ἀνθρακικὴ τίτανος, τὸ ζωϊκὸν ὑφασμα εἰς σχῆμα τοῦ ζώου· ἄλλα δὲ ὡς *Gorgonia Flabellum*, ἐμπεριέχουσι ζωϊκὴν κερατοειδῆ ὕλην μετὰ φωσφορικῆς τιτάνου, καὶ εἶναι περιβεβλημένα ἀπὸ ἀνθρακικὴν τίτανον. Τὰ ἐρυθρά κοράλλια, *Isis nobilis*, ἐμπεριέχουσιν ἀνθρακικὴν τίτανον καὶ μαγνησίαν καὶ εἶναι κεχρωματισμένα δι' ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.

Τρίχες.

Αἱ ἀνθρώπιναι τρίχες ἐξετάσθησαν εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους παρὰ τοῦ *Vauquelin*. Ἐὰν ζέωνται συνεχῶς μεθ' ὕδατος, ἐκχυλίζεται ἐξ αὐτῶν ὀλίγον ποσὸν ζωϊκῆς οὐσίας, καὶ εἰς τὸν τοῦ *Papin* λέβητα διαλύονται ὀλοτελῶς εἰς τὸ ὕδωρ, ὑπὸ τὴν ἐκλυσιν ὑδροθειωμένου ἀερίου· παρομοίως διαλύονται εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ, ἐπιμένοντος λιπώδους τινὸς ἐλαίου. Ὁ *Vauquelin*, κατεργάσας αὐτὰς με οἰνόπνευμα, ἐξεχύλισε μὲν ἐκ τῶν κοκκίνων τριχῶν ἐρυθρὸν ἔλαιον, ἐκ τῶν λευκῶν ἄχρουν καὶ στερεὸν ἔλαιον, ἐκ δὲ τῶν μελανίων μέλαν ἔλαιον ὁμοῦ με ἔνθειον σίδηρον. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἔκκρισις τοῦ κεχρωματισμένου τούτου ἐλαίου εἰς τὴν προβεβηκυῖαν ἡλικίαν παύει, ἀποκαθίσταται ἡ τριχὺ λευκὴ ἢ στακτερά· ὑπάρχουσι δὲ πα-

ρχαείγματα, ὅτι καὶ πολλῶν νέων αἱ τρίχες ἔγιναν λευκαί· τοῦτο προέρχεται ἀπὸ τὴν παῦσιν τῆς ἐκκρίσεως τοῦ ἐλαίου διὰ ἡθικῶν ἐπιρροῶν, ὡς λύπης κτλ. Ἡ τρίξ σύγκεται ἔκ τινος γενοτάτου σωλῆνος, ἐξωτερικῶς μετὰ μικρῶν λεπιδοειδῶν ἀπαφύσεων περιβεβλημένου· ἐντὸς αὐτοῦ ὑπάρχει ῥευστὸν, δι' οὗ τρέφεται ἡ τρίξ. Εἰς τινας νόσους, ὡς τὸν ἀχῶρα ἢ ψωροφύτην καὶ τὸν Πολωνικὸν βόστρυχα, *Tinea capitis* καὶ *Plica polonica*, ἐξοιδοῦται τὸ κοῖλον τόσον, ὥστε εἰς τὴν ἀποκοπὴν τῶν τριχῶν ἐκρέει τὸ ῥευστὸν, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ αἷμα ἐπαρτηρήθη. Τὸ θεῖον ἀπαντᾷται εἰς μεγαλύτερον ποσὸν εἰς τὰς λευκάς καὶ ἐρυθράς τρίχας, παρὰ εἰς τὰς μελαίνας καὶ βαθυχρωματισμένας. Ἡ τέφρα τῶν τριχῶν ἐμπεριέχει ἀλικὴν σόδαν, θειικὴν, φωσφορικὴν καὶ ἀνθρακικὴν τίτανον, ὀξειδίου σιδήρου καὶ ἔχνη ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου καὶ χαλκικῆς· εἰς τὴν τέφραν τῶν λευκῶν τριχῶν ἐμπεριέχεται καὶ φωσφορικὴ μαγνησία. Αἱ λευκαὶ καὶ ἐρυθραὶ τρίχες δύνανται νὰ βαφῶσι μέλαναι, ἐὰν ἀλειφθῶσι μετὰ φυράματος ἐξ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου καὶ τιτάνου· ὡσαύτως βάφονται καὶ αἱ λευκαὶ τρίχες τῶν ἵππων, διὰ τῆς ζέσεως μὲ μίγμα ἐξ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου καὶ τῆς τιτάνου ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀέρος. Καλῆτερα βάφονται, ἐὰν ἀλειφθοῦν μετὰ ἀλείμματος, συγκειμένου ἐκ νιτρικοῦ ἀργύρου, τιτάνου καὶ ἀλειφῆς τινος. Ἐκτὸς τοῦ μέλανος χρώματος ἀποκτοῦν καὶ πλείστορον βαθμὸν σκληρότητος καὶ ἐλαστικότητος, καὶ ἔνεκα τούτου γίνονται καταλληλότεραι πρὸς πλήρωσιν τῶν στρωμάτων καὶ τῶν ἐδρῶν. Αἱ τρίχες διαλύονται εἰς τὰ καυστικὰ ἀλκάλια, καὶ ἐπὶ τούτου ἐπιστηρίζεται ἡ ἀπόξυσις τῶν τριχῶν κατὰ τὴν συνήθειαν τῶν Τούρκων, οἵτινες ἐπιθέτουσιν ἐπὶ τὰς τρίχας μίγμα ἐκ 2 μερῶν ἐνθείου ἀρσενικοῦ (*Auripigmentum*) καὶ 9 μερῶν τιτάνου. Ὁ αὐτὸς σκοπὸς ἀποτελεῖται, ἐὰν τίτανος ἐνυδρὸς κορεσθεῖσα μετὰ ὑδροθεϊκοῦ ὀξέος ἀλειφθῇ ἐπὶ τῶν τριχῶν· δι' αὐτοῦ τοῦ μίγματος γίνεται τοιαύτη διάλυσις τῶν τριχῶν, ὥστε μετ' ὀλίγας στιγμὰς δύναται νὰ ἀποξυσθῇ διὰ ξυλίνου μαχαίριου.

Αἱ τρίχες, καθὼς καὶ τὸ μαλλίον, ἀφοῦ καθαρισθῶσιν ἀπὸ τὴν λιπώδη οὐσίαν, δύνανται νὰ χρωματισθῶσι κατ' ἀρέσκειαν. Αἱ τρίχες ἐπροσδιορίσθησαν διὰ νὰ διατηροῦν τοῦ σώματος τὴν θερμότητα, διότι εἶναι πολλὰ δυσάγωγοι διὰ τὴν θερμότητα.

Ὅστα. *Ossa*.

Τὰ ὅστα εἶναι τὰ σκληρότερα μέρη καὶ τὰ ὑποστηρίγματα τοῦ ζώου.

κοῦ σώματος, καὶ σχηματίζουσι διὰ τῆς συνενώσεώς των τὸ οὕτω λεγόμενον σκελετόν. Ἐὰν τὰ ὀστέα ᾖναι ἐλεύθερα ἀπὸ ἅπαντα τὰ ἑτερογενῆ μέρια καὶ ἀπὸ αἷμα, εἶναι λευκὰ ἢ ὀλίγον μόνον κιτρινίζοντα, καὶ καταξηρανθέντα ἀνθίστανται πολλὰ ἔτη εἰς τὴν σῆψιν. Σύγκεινται κατὰ μέγα μέρος ἐκ λιπώδους οὐσίας καὶ φωσφορικῆς τιτάνου. Ἐὰν καῶσι, φθείρεται ὁ ἐν αὐτοῖς ὑπάρχων χόνδρος, ἐπιμενούσης μόνον τῆς τέφρας τῶν ὀστέων εἰς εἶδος λευκῆς καὶ πορρώδους ὕλης· ἂν δὲ ἐξ ἐναντίας κατεργασθῶσι μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δι' ὕδατος κεκραμένου, διαλύεται ἡ φωσφορικὴ τίτχνος καὶ ἐπιμένει μόνον ὁ χόνδρος, ὅστις δύναται νὰ μεταβληθῇ διὰ συνεχοῦς ζέσεως μεθ' ὕδατος εἰς πήκτωμα.

Ἐὰν πυρωθῶσιν εἰς κερατίνην, ἐκλύεται ἀνθρακικὴ ἀμμωνία καὶ τινα ἐμπυρευματικὰ ἔλαια, καὶ ὁ ἐκ τοῦ χόνδρου σχηματιζόμενος ἀνθραξ ἀναμειγμένος μετὰ γαιωδῶν μορίων ἐπιμένει εἰς εἶδος μελαίνης μάζας, γνωστῆς ὑπὸ τὸ ὄνομα ὀστέα κεκαυμένα μέλανα. Διὰ τῆς ζέσεως τῶν ὀστέων μεθ' ὕδατος ἀποχωρίζεται ἐξ αὐτῶν τὸ μυελώδες λίπος, ὁ δὲ χόνδρος μόνον ἐν μέρει διαλύεται· τὸ ἀφέψημα μεταχειρίζεται πρὸς τροφήν, καὶ μάλιστα ἂν ζέεται εἰς τὸν τοῦ Papin λέβητα. Ἐὰν ἐμπεριέχη ἡ τροφή τῶν κτηνῶν ἐρυθρόδανον, λαμβάνουσι τὰ ὀστέα ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἐρυθρὸν χρῶμα. Ὁ Berzelius, ἐξετάσας τὰ ἐντελῶς ξηρανθέντα καὶ ἀπὸ πάσας τὰς ἑτερογενεῖς ὕλας καθαρισθέντα ὀστέα, ἔλαβε τὰ ἐξῆς ἀποτελέσματα.

	Ἀνθρώπου.	Βοός.
Χόνδρου εἰς ὕδωρ διαλυσίμου	31, 17—33, 30.	
Ἀγγεῖων	1, 13—	
Φωσφορικῆς τιτάνου μεθ' ὑπερτερούσης		
βάσεως καὶ με' ἔχνη ἀλικῆς τιτάνου	53, 04—57, 35.	
Ἀνθρακικῆς τιτάνου	11, 30— 3, 85.	
Φωσφορικῆς μαγνησίας	1, 16— 2, 05.	
Νάτρου με' ὀλίγην ἀλικὴν σόδαν	1, 20— 3, 45.	
Κατὰ τὸν K. Baron ἐμπεριέχουν τὰ λευκὰ κεκαυμένα ὀστέα τῶν λεόντων:		
Φωσφορικῆς τιτάνου	95, 0.	
Ἀνθρακικῆς τιτάνου	4, 5.	
Τὰ ὀστέα τοῦ κριοῦ:		
Φωσφορικῆς τιτάνου	80, 0.	
Ἀνθρακικῆς τιτάνου	19, 3.	

Τὴν αὐτὴν ὡς ἔγγιστα ἀναλογία ὡς πρὸς τὰ συστατικὰ μετὰ τῶν ὀσέων ἔχουσιν οἱ σκόλοπες τῶν ἰχθύων, καθὼς οἱ ἐλεφάντινοι ὀδόντες. Ὁ Gmelin ἐξέτασε τοὺς ὀδόντας τῶν βρεφῶν, τῶν ἐφήβων διαφόρων ζώων, καὶ εἰς ἅπαντας ἀνεκάλυψεν εἰς τὸ κέντρον των, μυελῶδες τι ῥευστὸν, καὶ ἐκτὸς τούτου φωσφορικὴν καὶ ἀνθρακικὴν τίτανον εἰς διαφόρους ἀναλογίας. Διὰ τοῦ θειώδους ὀξέος λευκαίνονται τὰ ὀστέα, ὅχι ὅμως διὰ τοῦ χλωρίου· εἰς τινὰς ἀπολελιθωμένους ἐλεφαντίνους ὀδόντας ἐξιχνεύθη καὶ φθορικὴ τίτανος.

Χρῆσις. Τὰ ὀστέα μεταχειρίζονται πρὸς κατασκευὴν τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος, καὶ τοῦτο πρὸς κατασκευὴν καὶ σύνθεσιν τῶν φωσφορικῶν ἀλάτων, πρὸς κατασκευὴν τοῦ πηκτώματος, τῶν μελανοκεκαυμένων ὀσέων, τοῦ ἀμμωνιακοῦ ἄλατος κ.τ.λ. Τὸ κέρας τῶν ἐλάφων ἔχει ὁμοιότητα μετὰ τῶν ὀστέων, μόνον ὁ χόνδρος ἐκείνου διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ εὐκολώτερα ἀπὸ τὸ τῶν ὀστέων· 16 οὔγγια ξυσμάτων κεράτων τῆς ἐλάφου περιέχουσι 4 $\frac{1}{2}$ οὔγγιας ξηροῦ πηκτώματος καὶ ἐκτὸς τούτου φωσφορικὴν καὶ ἀνθρακικὴν τίτανον.

Δέρμα. Σκῦτος καὶ περὶ βυρσοδεψίας.

Τὸ δέρμα σύγκειται ἐκ τριῶν μερῶν:

α'.) Ἐκ τοῦ κυρίως δέρματος, *Corium*.

β'.) Ἐκ τοῦ *Corpus papillare*, εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάρχουσι τὰ νεῦρα, ἅτινα εἶναι ἡ ἔδρα τῆς αἰσθήσεως τῆς ἐπαφῆς.

γ'.) Ἐκ τῆς ἐπιδερμίδος, *Epidermis*.

Τὸ διάφορον χρῶμα, τὸ ὁποῖον χαρακτηρίζει τὰς διαφόρους φυλλὰς, ἀποταμιεύεται εἰς τὸ *Corpus papillare* καὶ προέρχεται ἀπὸ ἰδιαιτέραν βαφικὴν ὕλην, ἥτις εἶναι μέλαινα εἰς τοὺς Μαύρους, εἰς τοὺς Ἀμερικανούς, εἰς τοὺς Ἀσιανούς φαῖα, εἰς δὲ τοὺς Εὐρωπαϊοὺς τόσον ἀνεπιστήτως χρωματισμένη, ὥστε δὲν διαφαίνεται διὰ τοῦ δέρματος, καὶ τούτου ἕνεκα καλοῦνται οὗτοι παραβαλλόμενοι μετὰ τοὺς ἄλλους, λευκοί. Ἡ λευκότης ἐξαρτᾶται πολὺ καὶ ἀπὸ τὴν προφύλαξιν ἐκ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἡλιακοῦ φωτός. Ὁ Foucroy ἐξέθεσε τὸ τῶν Ἀράβων μέλαν δέρμα εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ χλωρίου· δι' αὐτοῦ ἐλευκάνθη κατὰ τι, μετ' ὀλίγας δὲ ἡμέρας ἐλάμβανε τὸ πρότερόν του μέλαν χρῶμα. Τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα τῶν παρειῶν τοῦ Εὐρωπαίου δὲν προέρχεται ἀπὸ κἀνὲν ἰδιαιτέρον χρῶμα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐίρροσιν τοῦ αἵματος εἰς τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα τοῦ

προσώπου, καὶ ἐλλείποντος δὲ ἢ ἐλαττωμένον τοῦ αἵματος, τὸ πρόσωπον γίνεται λευκὸν καὶ χλωμόν. Τινὰ ζῶα ἔχουσι καὶ ἄλλα χρώματα, οὕτως εἶναι τινὰ μέρη τῶν πιθήκων κυανὰ, ὁ ῥόγχος τοῦ κυνὸς εἶναι μέλας, οἱ πόδες τῶν περιστερῶν ἐρυθρόφαιοι, αἱ χῆνες καὶ νῆτται ἔχουσιν ἐκτὸς τῶν κοκκίνων ῥάμφων καὶ κοκκίνους πόδας· αἱ βαφικαὶ αὐταὶ ὕλαι εἶναι λιπώδους φύσεως. Τὸ χρῶμα τῶν ἐκφυμάτων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν πτηνῶν προέρχεται ἀπὸ τὸ διαφανόμενον αἷμα. Ἐὰν τὸ δέρμα φθαρῇ δι' ἐλκῶν, δὲν ἀναγεννᾶται τὸ corpus papillare, ἀλλὰ τὸ φθαρὲν ἀντικαθίσταται διὰ κυψελώδους ἰστοῦ, τὸ μέρος τοῦτο μένει ἄχρουν καὶ σχηματίζει τὴν καλουμένην οὐλήν.

Τὸ δέρμα εἶναι ἀδιάλυτον μὲν εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ζεόμενον δὲ πολὺν καιρὸν μετὰ ὕδατος μεταβάλλεται εἰς πῆκτωμα· τὸ δέρμα τῶν ἰχθύων, καὶ τῶν μικρῶν καὶ τρυφερῶν ζῶων μεταβάλλεται ταχέως εἰς πῆκτωμα. Ἐὰν τὸ δέρμα τεθῇ εἰς διάλυμα ἀλικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου, ἐνῶ ἐνοῦται μετὰ τοῦ εἰρημένου ἄλματος, σκληρύνεται καὶ ἀνθίσταται εἰς τὴν σῆψιν, συγχρόνως δὲ σχηματίζεται ἀλικὸς ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος, ὅστις διαπερνᾷ τὸ δέρμα.

Τὸ σκύτος τὸ δέρμα τῶν ζῶων μεταχειρίζεται πρὸς κατασκευὴν τοῦ σκύτους, καὶ ἄλλων εἰδῶν διφθέρας. Ἐκ τῶν ἰσχυρῶν δερμάτων τῶν ζῶων κατασκευάζονται διὰ τῆς βυρσοδεψίας τὰ παττώματα, καὶ ἐκ τῶν λεπτοτέρων ὁ διὰ τὰ ὑποδήματα χιτῶν. Πρὸς ἀπόξυσιν τῶν τριχῶν τίθενται καὶ ἀφίνονται τὰ δέρματα εἰς δεξαμενὰς, ἀφοῦ ἐπιχυθῶσι μετὰ τιτανίου ὕδατος, ἕως οὗ δύνανται νὰ ἀποξυσθῶσιν αἱ τρίχες ἀπὸ τὸ δέρμα, καὶ μετὰ τὴν ἀπόξυσιν κατεργάζονται τὰ δέρματα εἰς ὕδωρ, ξυνιζόμενον διὰ θειικοῦ ἢ ὀξικοῦ ὀξέος, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται διὰ ζυμώσεως τῶν πιτύρων. Ἐὰν τὰ δέρματα κρεμασθῶσιν εἰς τὸ ὀξινὸν τοῦτο ρευστὸν, ἄρχονται νὰ οἰδαίνωνται, μετὰ ταῦτα εἰσβαπτίζονται εἰς διὰ πολλοῦ ὕδατος λεπτυνόμενον βυρσοδεψικὸν λέπος καὶ ὀλίγον κατ' ὀλίγον κατεργάζονται μετὰ ἀκρατωτέρου ἐγχύματος στιπτικῶν οὐσιῶν καὶ τέλος στιβάζονται εἰς ἀπὸ τὸ εἰρημένον λέπος πεπληρωμένους κάδους. Τὰ ἰσχυρότερα δέρματα δύνανται νὰ βυρσοδεψοῦνται τοιοῦτοτρόπως μετὰ παρέλευσιν ἐνὸς ἔτους. Εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην ἐνοῦται ἢ ἐν τοῖς φλοιοῖς τῶν δένδρων ἐμπεριεχομένη βυρσοδεψικὴ ὕλη μετὰ τοῦ δέρματος πρὸς σχηματισμὸν τοῦ σκύτους, καὶ οὕτως ἀντέχουσιν εἰς τὴν φθοροποιάν ἐνέργειαν τοῦ ὕδατος καὶ τῆς σήψεως.

Τὸ δέρμα ἔχει κιτρινόφαιον χρῶμα, καὶ ἀλειφόμενον μετὰ διαλύμα-

τος θειϊκοῦ σιδήρου, λαμβάνει ἕνεκα τῆς ἐν τῷ σκύτει ἐμπεριεχομένης
βυρσοδεφικῆς ὕλης μέλαν χρῶμα.

Τὰ ἀποξυσμένα δέρματα, διὰ νὰ λάβουν λευκὸν χρῶμα, εἰσβαπτίζον-
ται εἰς διάλυσιν ἀλικῆς σόδας καὶ στυπτηρίας· ἀμφοτέρω τὰ ἄλατα ἀπο-
συνθέτονται, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀμοιβαίας ἀποσυνθέσεως σχηματίζονται
ἀλικὴ ἀργιλλος καὶ θειϊκὴ σόδα· ἡ πρώτη διέρχεται διὰ τοῦ δέρματος
ἐνοῦται μετ' αὐτοῦ, καὶ οὕτω γεννᾶται τὸ λευκὸν σκῦτος. Ἔτερον εἶδος
σκύτους εὐκαμπτον ἀποτελεῖται, ἐὰν τὰ πρὸς σκυτοδεσίαν προετοιμα-
σθέντα δέρματα ἐντριφθῶσι μὲ λίπος· τὰ οὕτως ἀπολαμβανόμενα δέρματα
καὶ εἰς τοιαύτην κατὰστασιν χρησιμεύουσι πρὸς κατασκευὴν τῶν χειροκτίων.

Σιβέτ. *Zibethum*.

Ἡ εὐώδης αὕτη ὕλη ἐξάγεται ἀπὸ δύο εἶδη μαστοφόρων καὶ σαρκοφάγων
ζῶων ἰδίως δὲ ἀπὸ *Viverra Zibetha*, τὰ ἀμφοτέρω ζῶα ἀνήκουσιν εἰς τὴν
τάξιν τῶν γαλῶν, ἐξ ὧν τὸ ἐν ζῇ εἰς τὴν Ἀφρικὴν, τὸ δὲ ἕτερον εἰς τὴν
Ἀσίαν· τὰ ζῶα ταῦτα τρέφονται καὶ ἡμερόνονται ἕνεκα τῆς ῥηθείσης ὕλης
ἀπὸ τοὺς κατοίκους. Ἡ ὕλη αὕτη ἀποκρίνεται δι' ἀδένων, καὶ συνάζεται εἰς
κύστιν κειμένην μετὰξὺ τοῦ ἀφεδρώωνος καὶ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων. Ἀνὰ
πᾶσαν ἐβδομάδα γίνεται κένωσις τῆς κύσεως διὰ τινος μικροῦ κοχλιαρίου,
ἀφοῦ τὰ ζῶα ἰσχυρῶς δεθῶσι, διὰ νὰ μὴ δυνηθῶσι νὰ φύγωσι καὶ νὰ
βλάψωσι τοὺς ἀνθρώπους. Πρόσφατος οὔσα ἡ ὕλη αὕτη εἶναι λευκὴ τὸ
chrῶμα, ἀκολούθως δὲ κιτρινίζει καὶ προσλαμβάνει ἔτι εὐαρεστοτέραν
ὁσμὴν· ἡ ὁσμὴ τῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ πτητικόν τι ἔλαιον, δυνάμενον νὰ ἀπο-
χωρισθῇ διὰ τῆς μεθ' ὕδατος ἀποστάξεως. Τὰ λοιπὰ συστατικὰ εἶναι ἐ-
λευθέρω ἀμμωνία, ῥητίνη, λίπος, φαῖα ἐκχυλισματικὴ ὕλη διαλύσιμος
εἰς ὕδωρ καὶ οἰνόπνευμα· εἰς τὴν τέφραν εὐρίσκονται ἀνθρακικὸν καὶ θειϊ-
κὸν κάλιον, φωσφορικὴ τίτανος καὶ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.

Ἡ ὕλη αὕτη μεταχειρίζεται ὡς ἀντισπασμωδικόν, νευρικόν καὶ πολὺ
ἐρεθιστικόν μέσον, ἰδίως δὲ πρὸς εὐοσμίαν τῶν ἀλειμμάτων κτλ.

Ὕφρασμα τῆς ἀράχνης.

Αἱ ἀράχλαι ἐμπεριέχουσι ῥευστόν τι δυνάμενον νὰ ἐκθλιφθῇ ἀπὸ πολλὰς
μικρὰς ὁπὰς τοῦ σώματός των κατὰ τὴν θέλησίν των, καὶ τὸ ὅποῖον πυκ-
νούμενον πρὸς γλισχρώδη καὶ ἐλασικὴν κλωστήν, ἐπικολλᾶται ἐπὶ πάντων
τῶν σωμάτων, μεθ' ὧν ἐπισυνάπτεται μετὰ τοσαύτης δυνάμεως, ὥστε
διαρρήγνυται μᾶλλον παρὰ νὰ ἀπολυθῇ. Τὰ συστατικὰ τοῦ ῥευστοῦ

τούτου είναι υδροχλωρικά, θειικά, τιτανούχα άλατα και ρητίνη, τὰ ὅποια δύνανται νὰ ἐκχυλισθῶσιν ἐν μέρει δι' ὕδατος, ἐν μέρει δι' οἰνοπνεύματος· τὸ δι' οἰνοπνεύματος ἐκχυλιζόμενον ὕψωμα ἀποτεφρωθὲν, σύγκριται ἐξ ἀνθρακικῆς σόδας, υδροχλωρικῆς σόδας, θειικῆς τιτάνου, ἀνθρακικῆς τιτάνου, ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, χάλικος καὶ ἀργίλλου. Ἐὰν τὸ μεθ' ὕδατος ἀναμιχθὲν πλέγμα ἀνακινήθῃ μετὰ καυστικῆς ποτάσσης, ἐκλύεται δυνατὴ ὁσμή ὡς τῆς ἀμμωνίας.

Σπόγγοι.

Τὰ διάφορα εἶδη τῶν σπόγγων σύγκεινται ἐκ τινος κερρατοειδοῦς ὕλης, εἰς τὴν ὁποίαν ἐμπεριέχονται καὶ ἰωδοῦχα καὶ βρωμοῦχα ἄλατα, τὰ ὅποια ἐκχυλίζονται ἐκ τῆς τέφρας.

Τὰ εἰς τοὺς κεκαυμένους σπόγγους, *Spongia usta*, ἐμπεριεχόμενα εἶναι: Ὑδροχλωρικῆς σόδας 34, 38. Θειικῆς τιτάνου 1, 64. Ὑδριωδικῆς σόδας 2, 14. Βρωμοῦχου νάτρου 0, 76. Ἀνθρακικῆς τιτάνου 10, 32. Μαγνησίης 0, 47. Ὄξειδιον τοῦ σιδήρου 2, 87. Φωσφορικῆς τιτάνου 3, 5. Οἱ σπόγγοι ἐκζεσθέντες μεθ' ὕδατος δίδουσιν εἰς αὐτὸ μόνον 2, 45 διαλυσίμων μορίων. Ἐκ τούτου δὲ καταλαμβάνομεν, ὅτι ὅσον ἐντελεστέρα ἡ ἀνθράκωσις τῶν σπόγγων ἀποτελεσθῇ, τόσον ἐνεργητικώτερον εἶναι τὸ ὑπόλειμμα, ἐὰν ὑποθέσωμεν τὴν ἐνέργειαν τῶν σπόγγων ἐξαρτωμένην ἀπὸ τὸ ἰώδιον καὶ τὸ βρώμιον.

Καστόριον. *Castorium*.

Τὸ καστόριον εἶναι ὕλη ζωϊκὴ τοῦ κάστορος, *Castor Fiber* ζώου εἰς τὰ βόρεια τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας εὐρισκομένου καὶ εἰς τὰς ἰλῳδεῖς ὄχθας τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν διαιτωμένου. Ἡ ὕλη αὕτη ἀποκρίνεται εἰς φύσσας εὐρισκομένας μεταξὺ τοῦ δακτυλίου καὶ τῶν γεννητικῶν μορίων· εἰς τὰ ζῶντα ζῶα εἶναι ἡ ὕλη μαλακὴ, ἐὰν δὲ ξηρανθῇ, γίνεται πυκνὴ καὶ εὐθρυπτος, διαφράσσεται συνεχῶς μὲ ὕμενας, ἔχει ὁσμήν ἰσχυρὰν καὶ δυσώδη, γεῦσιν δὲ δριμεῖαν καὶ πικράν. Φέρεται ἀπὸ τὴν Ῥωσσίαν, Πολωνίαν καὶ τὴν Προυσσίαν ἐντὸς φυσσῶν σφαιροειδῶν, ὡοῦ μέγεθος ἔχουσῶν.

Διακρίνονται πολλὰ εἶδη καστορίου, τὸ Ῥωσσικόν, Καναδικόν, Ἀγγλικόν, τὸ Γερμανικόν καὶ Προυσσικόν· προτιμᾶται ὅμως τὸ Ῥωσσικόν καὶ Σιβηρικόν καστόριον, τὸ ὁποῖον ἀπαντᾶται εἰς φύσσας μεγαλητέρας ὡοῦ, κωνοειδεῖς, μεσοκοίλους καὶ ξανθομελάνους. Ἡ νεωτέρα ἀνάλυσις τοῦ

καστορίου ἔγινε παρὰ τοῦ Brandes, ὅστις ἀνεκάλυψεν εἰς τὸ καστόριον ἰδιαιτέραν ὕλην, τὴν ὁποίαν ἐκάλεσε καστορίνην.

Ἡ ὕλη αὕτη παρίσταται ὡς ἄχρουν λίπος, κρυσταλλώσιμον εἰς τετραγωνικάς ἀγγίδας, εἶναι πτητικὸν καὶ διαλύσιμον εἰς τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸ λείψυδρον οἰνόπνευμα· διαλύεται καὶ παρὰ τῶν κυστικῶν καλίων, χωρὶς ὅμως νὰ σχηματίσῃ σάπωνα, ἀλλὰ ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦτο ἀναμιχθῇ μεθ' ὕδατος, καταβυθίζεται ἐξ αὐτοῦ ἡ ῥηθεῖσα ὕλη. Τὸ καστόριον μεταχειρίζεται ὡς ἀντισπασμοδικὸν εἰς τὴν ἱατρικὴν.

Ἄμβαρ. Ambra grisea.

Εἶναι πιθανῶς νοσερὰ συγκρίματα τοῦ μακροκεφάλου φουσητήρος καὶ ἄλλων κητῶν καὶ εὐρισκόμενα εἰς τοὺς αἰγιαλοὺς τῆς Ἰνδικῆς, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς νοτίου Ἀμερικῆς. Παρίστανται δὲ ὡς βῶλοι διαφόρου μεγέθους, ὑπόλευκοι, εὐωδέστατοι, διὰ πρᾶου πυρὸς, ὡς ὁ κηρὸς, εὐκόλως τηκόμενοι· διὰ τῆς φλογὸς ἀνάπτουν, καὶ εἰς τὸν διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος αἰθέρα σχεδὸν ἐξ ὀλοκλήρου διακλύονται, εἰς δὲ τὸ οἰνόπνευμα μόνον ὀλίγον.

Ἐμπεριέχει ἰδιαιτέραν ὕλην καλουμένην ἀμβαρίνην, ἥτις δύναται νὰ κατασκευασθῇ, ἐὰν τὸ ἄμβαρ ζέται μετὰ δυνατοῦ οἰνοπνεύματος καὶ ἐὰν τὸ διῦλισθὲν ῥευστὸν ἀποψυχρανθῇ· εἰς τὴν περίστασιν ταύτην κρυσταλλοῦται ἡ ἀμβαρίνη εἰς εἶδος λευκῶν δερματοειδῶν λαμπρίζουσων ἀγκίδων. Οἱ κρύσταλλοι οὗτοι ζεόμενοι μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος μεταβάλλονται εἰς ἕτερόν τι ὄζον, ἀμβαρικὸν ὄζον καλούμενον, τὸ ὁποῖον παρουσιάζεται εἰς εἶδος μικρῶν κιτρίνων κρυστάλλων, οἵτινες εἶναι διαλύσιμοι εἰς τὸ ὕδωρ, τήκονται εἰς θερμοκρασίαν 100° R, καὶ ἐνόυνται μετὰ διαφόρων βάσεων πρὸς σχηματισμὸν αλάτων. Ἡ ἀμβαρικὴ πότασσα ἀναμιγνυομένη μετὰ διαφόρων διαλυμάτων τῶν μετάλλων προξενεῖ εἰς αὐτὰ κίτρινα καταβυθίσματα. Τὸ ἄμβαρ μεταχειρίζεται ἔνεκα τῆς εὐώδους ὁσμῆς του πρὸς κατασκευὴν διαφόρων εὐωδῶν συνθέσεων καὶ φυραμάτων, καὶ ἐνίοτε εἰς τὴν ἱατρικὴν διαλελυμένον εἰς τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὸν αἰθέρα.

Μέλαιρα βαφή τῶν ση. ὠρ.

Τὸ γένος τῶν σηπιδίων (Sepia) ἐμπεριέχει εἰς κύστιν τινα βλενωδὴς καὶ μέλαν ῥευστὸν, ἐκσπενδονιζόμενον ὑπὸ τούτων τῶν ζώων, ὅταν διώκωνται ἀπὸ ἄλλα, οὕτω δὲ θολόνουν τὸ ὕδωρ καὶ ἀποφύγουσι τὸν κίνδυνον. Ἡ

μέλαινα βαφικὴ ὕλη παραδεχθεῖσα ὡς ἰδιαιτέρας φύσεως ἐκκλέσθῃ Me-
lain καὶ δύναται νὰ χωρισθῇ ἐκ τῶν ἄλλων συστατικῶν, ἐὰν ἡ βαφὴ
βρασθῇ δι' ὕδατος, οἰνοπνεύματος καὶ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. Τὰ οὕτω
διαλυθέντα σύγκεινται ἐκ διαφόρων ἀλάτων, ὡς ἐξάγεται ἐκ τῆς ἀνα-
λύσεως.

Ἡ ξηρανθεῖσα μέλαινα βαφὴ σύγκειται ἐκ: Μελαίνης 78, 000. Ἀνθρα-
κικῆς τιτάνου 10, 40. Ἀνθρακικῆς μαγνησίας 7, 00. Ὑδροχλωρικῆς
καὶ θεικῆς σόδας 2, 16. Ζωϊκῆς βλεννης 0, 84. Ὑδατος 1, 60. Λέ-
γουσιν ὅτι τὰ κλητέρα εἶδη τῆς Κινικῆς μελάνης σύγκεινται ἐκ τῆς
ἀποξηρανθείσης μελάνης τῶν σηπιῶν. Τὸ κατὰ τὴν ῥάχην τῶν ζῶων
τούτων εὐρισκόμενον ὀστρακῶδες μέρος, λεγόμενον *Ossa sepiae*, σύγκει-
ται ἐξ ἀνθρακικῆς καὶ φωσφορικῆς τιτάνου με ἵχνη δερματοειδοῦς βλεν-
νώδους ὕλης. Μεταχειρίζεται δὲ αὐτὸ πρὸς σίλβωσιν τῶν ἐξ ἐλεφαντίνων
ὀστέων καὶ κέρατος κατασκευασιῶν, εἰς δὲ τὴν ἱατρικὴν ὡς ὀδον-
τότροιμα.

Μετάξη.

Μερικὰ ἔντομα περικλῶθονται πρὸ τῆς μεταμορφώσεώς των διὰ τινος
κλωστοειδοῦς φλέγματος. Μεταξὺ τούτων τῶν ἐντόμων διακρίνεται ὁ
μεταξο-σκώληξ, *Phalaena bombyx mori*, τοῦ ὁποίου τὸ περικλῶσμα συ-
νάγεται καὶ πωλεῖται ὑπὸ τὸ ὄνομα μετάξη. Ἡ ὕλη τῆς μετάξης ἐμ-
περιέχεται εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἐντόμου εἰς εἶδος γλίσχρου τινὸς ῥευστοῦ,
δυναμένου νὰ κλωσθῇ καὶ νὰ σκληρυνθῇ· ἐνῶ ὁ σκώληξ κλώθῃ τὸ ῥε-
υστὸν, πηγνυται μέρος πρὸς σχηματισμὸν κλωστής, μέρος δὲ περιβάλλον
αὐτὴν ξηραίνεται καὶ σχηματίζει τὸ βερνίκωμα, τὸ ὁποῖον δίδει εἰς τὴν
μετάξην τὸ κίτρινον χροῶμα.

Ἡ ἀκατέργαστος μετάξη σύγκειται κατὰ τὸ ἥμισυ τοῦ βάρους της ἐκ
τῆς μεταξώδους ὕλης (ινώδους ὕλης τῆς μετάξης), τὸ δὲ ἐπίλοιπον εἶναι
τὰ συστατικά τοῦ ῥευστοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον ἦτον διαλελυμένη ἡ μετάξη
προτοῦ σχηματίσῃ ὁ σκώληξ τὴν κλωστήν· τοῦτο τὸ ῥευστὸν ἐμπεριέχει
ἐκτὸς τοῦ ὕδατος, μετάξην, λευκωματοῶδη ὕλην, ἰδιαιτέραν ὕλην, ἥτις διὰ
τῆς μεθ' ὕδατος ζέσεως μεταβάλλεται εἰς κόμμι, λίπος καὶ κιτρίνην
βαφικὴν ὕλην εἰς τὴν ἐξῆς ἀναλογίαν:

κιτρίνη—λευκὴ μετάξη.
ινώδους ὕλης τῆς μετάξης 53, 37,—54, 04

Πηκτώδους ὕλης	20, 66—19, 08
Λευκώματος	24, 43—25, 47
Λίπους	1, 39— 1, 11
Λίπους ῥητινώδους	0, 10— 0, 30
Βασικῆς ὕλης	0, 05— 0, 00
Ἡ δὲ καθαρὰ μετὰξι: ἐμπεριέχει	
Ὑδρογόνου	6, 357.
Νιτρογόνου	19, 190.
Ὄξυγόνου	24, 962.
Ἄνθρακος	49, 494.

100.

Μεταξικὸν ὀξύ. Acide bombyque.

Οὕτω καλεῖται ὀξινόν τι ῥευστὸν ἀπολαμβανόμενον, ἐὰν ἀκατέργαστος μετὰξι, ἀναμιχθεῖσα μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος κεκραμένου, ὑποβληθῇ εἰς ἀπόσταξιν, μεχρισοῦ ἀποσταχθῶσι $\frac{2}{3}$ τοῦ ῥευστοῦ, εἰς τοῦτο δὲ τὸ ὀξινὸν ῥευστὸν νομίζουσιν ὅτι ἐμπεριέχεται τὸ μεταξικὸν ὀξύ.

Ἡ χρῆσις τῆς μετὰξης εἶναι πασίγνωστος, καὶ ἡ συνεκτικὴ τῆς δύναμις εἶναι σημαντικωτάτη.

Μόσχος. Moschus. Musc.

Εἰς φύσσας, κειμένας πλησίον τῶν γεννητικῶν μορίων τοῦ ἄρρενος τοῦ μόσχου, ζῶου εἰς τὰ ὄρη τῆς μεσαιᾶς Ἀσίας εὐρισκομένου, ἐμπεριέχεται ὕλη τις εὐώδης μόσχος καλουμένη.

Ὁ μόσχος ἐξετάσθη παρὰ διαφορῶν χημικῶν, οἵτινες ἀνεκάλυψαν, ὅτι ἡ πολυχρονίως διακείμενуса ὁσμὴ τοῦ μόσχου δὲν πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς πτητικὴν τινα οὐσίαν, ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ ἐνυπάρχαντος ὕδατος, καὶ ὅτι ὁ μόσχος δὲν ἐκπέμπει, οὐδεμίαν ὁσμὴν ἐὰν ᾖ λείψυδρος, πρὸς ἀπόδειξιν τούτου ξηραίνουν τὸν μόσχον ὑπὸ τὸ δοχεῖον τῆς πνευματικῆς ἀντλίας, πλησίον θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου, καὶ ἀφοῦ ἀπορρόφηθῇ ὅλον τὸ ἐνυπάρχον ὕδωρ παρὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, ἐξαλείφεται ἡ ὁσμὴ του, ἥτις μόνον δι' ἀναθρέξεως μεθ' ὕδατος δύναται νὰ ἐπανέλθῃ. Ἐὰν ξηραίνεται τριακοντάκις ὁ μόσχος, καὶ βρέχεται ἀλληλοδιαδόχως, φαίνεται πάντοτε εἰς μὲν τὴν ξηρὰν του κατὰστασιν ἄσμος, εἰς δὲ βεβρεγμένην προσλαμβάν-

νων τὴν ὁσμὴν τοῦ· ἐκ δὲ τῶν παρατηρήσεων τούτων ἐξάγεται ὅτι ἡ ὁσμὴ τοῦ μόσχου ἐπιστηρίζεται ἐπὶ τινος ὀλίγον κατ' ὀλίγον γεννωμένης ἀποσυνθέσεως αὐτοῦ καθὼς συμβαίνει καὶ εἰς ἄλλας πολλὰς εἰς σῆψιν ὑποκειμένης ζωϊκᾶς οὐσίας, ἐξ ὧν σχηματίζονται καὶ ἐξατμίζονται ὀλίγαι ποσότητες, ἰσχυρὰν ὁσμὴν ἐχόντων μορίων. Κατὰ τὰς ἐξετάσεις τοῦ K. Geiger καὶ Raiman σύγκειται ὁ μόσχος εἰς 100 μέρη ἐκ:

Στέατος μετ' ὀλίγου ἐλαίου	1, 1
Χοληστεάτος	4, 0
Ἰδιαίτερας πικρᾶς ῥητίνης	5, 0
Ὄσμοζωμίου, γαλακτικοῦ καλίου, νάτρου καὶ ἀμμωνίας	7, 5
Ὑλῃς ἡνωμένης ἐν μέρει μετ' ἀμμο- νίας, μετὰ μερικῶν θεϊκῶν, φωσφορικῶν καὶ ὑδροχλωρικῶν ἀλάτων	36, 5
Ἀμμώδους ἀδιαλύτου ὑπολείμματος	0, 4
Ὑδατος καὶ ἐξατμιζομένης ἀμμωνίας	43, 5

100.

Ὁ μόσχος ὑπόκειται συχνάκις εἰς νοθεύσεις. Τὸ καλλήτερον μέσον τοῦ νὰ γνωρίζωμεν τὴν ἀνόθευτον κατὰστασίν του, εἶναι νὰ διαλυθῇ εἰς $\frac{3}{4}$ ζέοντος ὕδατος, καὶ νὰ ἀποκατασταθῇ τὸ διάλυμα τοῦτο σχεδὸν πάντη ἄχρουν διὰ προσθήκης ὀξέων, ἰδίως δὲ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος· τὸ διάλυμα καταβυθίζεται διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου καὶ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων, ὅχι δὲ διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου. Ἡ τέφρα τοῦ καιομένου μόσχου πρέπει νὰ ᾖναι τεφρόχρους, ὅχι ἐρυθρὰ ἢ κιτρίνη, καὶ ὅχι περισσότερον τῶν 5 ἕως 6 τοῖς ἑκατόν.

Karbarίδες. Kantharides.

Αἱ κανθαρίδες εἶναι ἔντομα εἰς τὴν μεσαιάν καὶ τὴν νότιον Εὐρώπην εὕρισκόμενα· εἰς τὴν τάξιν τῶν ἐλυτροπτερίων ἀνήκοντα, ἔχουν πράσινον καὶ μεταλλικῶς λαμπρίζον κάλυμμα, ἐμπεριέχουσι δριμύτατον καὶ ὀξινὸν ἐκχύλισμα, πράσινον ἔλαιον, λεύκωμα καὶ μερικά ἅλατα. Ὁ Robiquet ἐξῆξεν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπεχώρισεν εἰς καθαρὰν κατὰστασιν ἰδιαίτε-
ραν καυστικὴν ὕλην, τὴν ὁποίαν ἐπωνόμασε *karbaridin*. Εἰς τὰς κανθα-
ρίδας ἐμπεριέχεται ἡ ῥηθεῖσα καυστικὴ ὕλη ἀναμειγμένη μετὰ κιτρίνου

λιπαροῦ ἐλαίου, μετὰ τινος κιτρίνης ὕλης, εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὸ οἶνό-
πνευμα διαλυσίμου, καθὼς καὶ μετὰ ὀξικοῦ καὶ οὐρικοῦ ὀξέος.

Πρὸς ἀποχώρισιν τῆς ἰδιαιτέρας ταύτης ὕλης, ἐκχυλίζονται τὰ εἰρη-
μένα ἔντομα δι' ὕδατος, τὸ ὕδατῶδες ἐκχύλισμα κατεργάζεται δι' οἶνο-
πνεύματος θερμοῦ, καὶ τὸ μετὰ τὴν ἀπόσταξιν τοῦ οἶνοπνεύματος ἀπο-
τελούμενον ἐκχύλισμα διαλύεται δι' αἰθέρος, τὸ δὲ διάλυμα τοῦτο ἐξα-
τμίζεται εἰς τὸν ἀέρα. Ἐκ τοῦ λειφθέντος ὑπολείμματος διαλύεται μετὰ
ταῦτα διὰ ψυχροῦ οἶνοπνεύματος κιτρίνη τις ὕλη, καὶ ἡ κανθαριδίνη
ἐπιμένει εἰς καθαρὰν κατὰστασιν.

Ἡ κανθαριδίνη κρυσταλλοῦται εἰς εἶδος μικρῶν λαμπρίζοντων φυλιδίων,
ἐντελῶς οὐδετέρων, καὶ τηκομένων διὰ μαλακοῦ πυρὸς πρὸς ἐλκιδῶδες
ρεύστων τὸ ὅποιον μεταβάλλεται διὰ τῆς ἀποψύξεως εἰς κρυσταλλώσιμον
διὰ μεγαλητέρας θερμοκρασίας ἐξαχνίζεται ἡ κανθαριδίνη καὶ ἐκπέμπει
μᾶζαν ἀτμὸν ἐπικίνδυνον διὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὴν ρίνα. Ἐὰν ὀλίγον
ποσὸν τῆς ὕλης ταύτης ἐπιτεθῇ ἐπὶ τῆς ἐπιδερμίδος, ἐνεργεῖ καυστικώ-
τατα, εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι ἀδιάλυτος, ἐὰν δὲ ἀναμιχθῇ μετὰ τῆς κιτρίνης
ὕλης, εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ ζέον οἶνόπνευμα, καὶ μετὰ τὴν ἀπόψυξιν
τοῦ ρεύστος ἀποτίθεται ἡ κανθαριδίνη, εἶναι ὁμοίως εὐδιάλυτος εἰς τὰ λι-
παρὰ ἔλαια καὶ εἰς τὸν αἰθέρα. Ἀφοῦ αἱ κανθαρίδες ἐκχυλισθῶσι δι' ὕδατος,
διαλύει τὸ ζέον οἶνόπνευμα ἐκ τῆς ξηρανθείσης κόπωσης τὸ πράσινον λιπαρὸν
ἔλαιον, τὸ δὲ ἐπιμένον δὲν ἔχει τὰ καυστικὰ χαρακτηριστικά.

Περὶ τῶν ἀντισηπτικῶν μέσων.

Τὸ κυριώτερον ἀντισηπτικὸν μέσον εἶναι ἡ ζωϊκὴ δύναμις· ἀφαιρε-
θείσης δὲ ταύτης, τὸ ὀργανικὸν σῶμα δὲν δύναται πλέον ν' ἀντέχῃ εἰς
τὴν σήψιν. ἔχομεν ὅμως μέσα τινά, δι' ὧν δυνάμεθα νὰ ἐμποδίσωμεν
τὴν σήψιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ἑξῆς.

α. Ὁ ἀποκλεισμός τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ὅστις ἐπιταχύνει τὴν
σήψιν ἕνεκα τοῦ ἐν αὐτῷ ὀξυγόνου. Ὁ ἀποκλεισμός τοῦ ἀέρος δύναται ν'
ἀποτελεσθῇ κατὰ διαφόρους τρόπους. Ἡ τοῦ Appert μέθοδος, περὶ τῆς
ὁποίας ἤδη ὠμιλήσαμεν, ἀπεδείχθη ὠφέλιμος καὶ διὰ τὰς ζωϊκὰς ὕλας.

Ὁ Gay-Lussac ἔδειξεν, ὅτι ἡ σήψις δύναται νὰ ἐμποδισθῇ πολὺν καιρὸν,
ἐὰν ζωϊκὰ ρευστά, λ. χ. ἡ τῆς κόλλας διάλυσις, θερμαίνεται καθ' ἡμέραν
ἢ καὶ ἀνὰ πᾶσαν δευτέραν ἡμέραν μέχρι τῆς 100° καθότι διὰ τῆς θερ-
μάνσεως τὸ ὀξυγόνον, τὸ ὅποιον ἐμπεριέχεται εἰς τὸν παρὰ τοῦ ζωϊκοῦ

ρεύστος ἀπορρόφηθέντα ἀέρα, ἐκλύεται. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον δύναται νὰ φυλαχθῇ τὸ γάλα πολὺν καιρὸν.

Ὁ Sweeny ἐθέρμανεν ὕδωρ μέχρις ἀναζέσεως διὰ νὰ ἐξάξῃ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα· εἰς τοῦτο τὸ ὕδωρ ἔβαλε ῥινήματα σιδήρου καὶ μετὰ τὴν φύξιν πρόσφατον κρέας, μετὰ ταῦτα ἔχυσεν ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἔλαιον. Μετὰ διάστημα 7 ἑβδομαδῶν ἐπαρτήρησεν, ὅτι τὸ κρέας ἦτον ἀκόμῃ ἐντελῶς πρόσφατον. Ἄλλοι εἰς ψυχρὸν ὕδωρ ἐνέχυσαν τετριμμένον θεῖον καὶ ἔλαιον, καὶ εἰς αὐτὸ ἐμβύθισαν κρέας, τὸ ὁποῖον ἔμεινε δύο ἑβδομάδας πρόσφατον.

Πρὸς διατήρησιν τῶν ζωϊκῶν καὶ φυτικῶν ὑλῶν ἀπὸ τὴν σήψιν στιβάζομεν αὐτάς με λειὸν ἄνθρακα ἢ τὰς ἐμβυθίζομεν εἰς ἔλαιον, εἰς λίπος, ἢ εἰς οἶνόπνευμα. Ὁ ἄνθραξ ὅμως ἔχει διπλὴν ἐνέργειαν· καθότι καὶ ἀποκλείει τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, καὶ ἀπορροφᾷ τὰ τῆς ἀρχομένης σήψεως ἀέρια.

β'. Τὰ ἅλατα. Συχνὰ στιβάζονται ζωϊκαὶ ὕλαι, λ. χ. κρέας, με κοινὸν ἅλας, ζάχαριν ἢ νίτρον, ἢ με μίγμα ἐξ αὐτῶν τῶν τριῶν, τὰ ὁποῖα διαπερνοῦν κατ' ὀλίγον τὸ ὑγρὸν κρέας καὶ τὸ φυλάττουσιν οὕτως ἀπὸ τὴν σήψιν. Τοῦτο ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴν ἀπορρόφησιν τοῦ εἰς τὰς ζωϊκὰς ὕλας ἐμπεριεχομένου ὕδατος ὑπὸ τῶν ἀλάτων. Οὕτως ἀποκαθίσταται ὀλίγον κατ' ὀλίγον τὸ σῶμα λεῖψυδρον, καὶ τὸ ἀλατῶδες διάλυμα, εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἐμβυθισμένον τὸ σῶμα, ἐμποδίζει τὴν εἴσοδον τοῦ ἀέρος. Τὰ μεταλλικὰ ἅλατα φυλάττουσι καλῆτερον ἀπὸ τὸ κοινὸν ἅλας, ἀλλὰ τὰ περισσότερα αὐτῶν, καὶ μάλιστα τὰ πλέον ἀντισηπτικά, ἐνοῦνται μετὰ τῆς ζωϊκῆς οὐσίας, ὥστε καθιστοῦν αὐτάς ἀχρήστους πρὸς τροφήν.

Μεταξὺ τῶν μεταλλικῶν ἀλάτων κατ' ἐξοχὴν ἀντισηπτικά θεωροῦνται ὁ διττοχλώριος ὑδράργυρος, ὁ νιτρικὸς ἄργυρος, καὶ ὁ θεικὸς ὀξειδωμένος σίδηρος. Αἱ οὐσίαι, αἵτινες εὐρίσκονται εἰς τὰς διαλύσεις των, ὅχι μόνον δὲν σήπονται, ἀλλὰ καὶ ἐκβαλλόμεναι μετὰ τινα καιρὸν ἐκ τῶν διαλύσεων δὲν μεταβάλλονται.

γ'. Τὸ οἶνόπνευμα. Μία τῶν συνηθεστέρων μεθόδων πρὸς διατήρησιν τῶν ζωϊκῶν ὑλῶν εἶναι τὸ νὰ ἐντίθενται εἰς ἐνυδρον οἶνόπνευμα. Τὸ οἶνόπνευμα συμμιγνύμενον μετὰ τὸ εἰς τὰς ζωϊκὰς ὕλας ἐμπεριεχόμενον ὕδωρ, ἐμποδίζει τὴν σήψιν. Τὸ λεῖψυδρον οἶνόπνευμα ἀπορροφᾷ τὸ εἰς τὰς οὐσίας ὕδωρ με μεγάλην ὁρμὴν καὶ ταχύτητα· διὰ τοῦτο αἱ οὐσίαι γίνονται δι' αὐτοῦ σκληραὶ καὶ συστέλλονται.

δ'. Τὸ ξυλόξος. Εἰς τὴν περιγραφὴν τοῦ ρεύστος τούτου ἀνεφέραμεν

περὶ τῆς ἀντισηπτικῆς δυνάμεώς του· τὴν αὐτὴν δυνάμιν ἔχει καὶ τὸ ἀπεσταγμένον ἄχρουν ὀξύ, τὸ ὁποῖον ὅμως ἐκπνέει ἀκόμη τὴν ὁσμὴν τοῦ πυρελαίου. Ἡ ἀντισηπτικὴ δυνάμις τοῦ ξυλόξους εἶναι πρῶτοντι θαυμάσιος. Ζωῖκαί ὕλαι ἐμβαπτιζόμεναι καὶρὸν τινα εἰς ξυλόξος ἢ ξυλικὸν ὀξύ, καθὼς καὶ πτώματα, εἰς τὰς φλέβας τῶν ὁποίων ἐγχύνεται αὐτὸ, ἀνθίστανται εἰς τὴν σήψιν, καὶ ἐὰν μετὰ ταῦτα ἐκτίθενται εἰς τὸν ἀέρα.

Ἄπαντα τὰ διὰ τοῦ ξυλικοῦ ὀξέος φυλαττόμενα ζωικά σώματα λαμβάνουσι χρῶμα βαθύτερον καὶ μετὰ τὴν ξήρανσιν σχεδὸν μέλαν. Καὶ αἱ ἄλλαι αἱ εἰς τὸ ξυλικὸν ὀξύ ἐμπεριεχόμεναι ὕλαι εἶναι πιθανὸν ὅτι ἔχουσιν ἀντισηπτικὴν δυνάμιν, ἀλλὰ κατ' ἐξοχὴν ἡ δυνάμις αὕτη ἀποδίδεται εἰς τὸ τρωσκρον, τοῦ ὁποῖου ἡ εἰς ὕδωρ διάλυσις, ὅσπιν ὀλίγην ποσότητα αὐτοῦ καὶ ἂν ἐμπεριέχῃ, ἐμποδίζει τὴν σήψιν ἐντελῶς. Πισίγνωστον εἶναι, ὅτι τὸ κρέας, ἐὰν ἐμβαπτισθῇ εἰς ἐμβρογχικὴ τῆς αἰθάλης καὶ ἐκτεθῇ εἰς καπνὸν, δὲν ὑπόκειται εἰς σήψιν· τοιοῦτον κρέας λέγεται *καπνιστόν*.

Ταρίχευσις τῶν νεκρῶν. Δὲν ἠξέυρομεν ἀκριβῶς, πῶς οἱ Αἰγύπτιοι διετήρησαν τόσον πολὺν καὶρὸν τοὺς νεκρούς των. Ὁ Ἡρόδοτος περιγράφει τὴν ταρίχευσιν τῶν νεκρῶν μὲ μεγάλην λεπτομέρειαν, καὶ οἱ τεταριχευμένοι νεκροί, τοὺς ὁποίους ἔχομεν ὑπ' ὄψιν, ἀποδεικνύουσιν, ὅτι αὐτὸς εἶχε πρῶτοντι γνῶσεις περὶ τῆς ἐγχειρίσεως ταύτης, ἀλλὰ τὴν σήμερον δὲν ἠξέυρομεν πλέον, τί ἐννοοῦν τὰ ὀνόματα τῶν πρὸς ταρίχευσιν μεταχειριζομένων οὐσιῶν. Τὸ νάτρον ἢ νίτρον, τὸ ὁποῖον ἀναφέρουν οἱ συγγραφεῖς ὅτι ἐμεταχειρίζοντο πρὸς ταρίχευσιν τῶν νεκρῶν, δὲν δύναται νὰ ᾔηται μήτε νιτρικὸν κάλιον, μήτε κοινὸν ἄλας, μήτε ἀνθρακικὸν νάτρον· καθότι αὐτὰ δὲν εὐρίσκονται εἰς σημαντικὸν ποσὸν εἰς τὰ τεταριχευμένα πτώματα καὶ μήτε ἔχουσι τὴν ἀπαιτουμένην ἀντισηπτικὴν δυνάμιν. Πιθανώτερον δὲ καὶ συμφωνώτερον φαίνεται νὰ ἐμβαπτιζῶντο τὰ πτώματα εἰς ξυλικὸν ὀξύ, τὸ ὁποῖον ὁ Πλίνιος καλεῖ *Cedrium*.

Ὁ Granville ἐπερίγραψε ταριχευμένον πτῶμα, εἰς τὸ ὁποῖον εὐρῆκε κηρὸν καὶ ῥητίνην· ἐκ τούτου ὑπέθεσεν ὅτι ἡ ταρίχευσις ἐγένετο διὰ τῆς τῶν νεκρῶν ἐμδυθείσεως εἰς τετηγμένον κηρὸν, καὶ ὅτι ἡ ὀνομασία τῶν αἰγυπτιακῶν τεταριχευμένων νεκρῶν *μούμια* προέρχεται ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴν λέξιν *μούμι*, τὸ ὁποῖον σημαίνει κηρὸν. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἡ παρ' αὐτοῦ ἐξετασθεῖσα *μούμια* ᾔητον τεταριχευμένη κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, δὲν δυνάμεθα νὰ παραδεχθῶμεν τὴν γνώμην ταύτην, καθότι εἰς τὰ περισσώτερα τῶν ἐξετασθέντων τεταριχευμένων πτωμάτων δὲν ἐπαρτηρήθη μήτε ἔχνος κηροῦ.

Τινὲς εἶναι τῆς γνώμης, ὅτι τὰ πτώματα ἀλατίζοντο πρότερον, καὶ

μετὰ ταῦτα ἀπεξηραίνοντο εἰς τὸν ἥλιον ἢ διὰ τοῦ πυρός. Πολλάκις εὑρέθησαν εἰς τὰς μούμιαις καὶ μικροὶ κρύσταλλοι ὑδροχλωρικοῦ καὶ θεϊκοῦ νάτρου ἐν μορφῇ ἐξανθημάτων. Ἀφοῦ τὰ ἐντόσθια ἐπροπαρασκευάζοντο, ἐπληροῦντο τὰ κοιλώματα μὲ εὐόσμους ῥητίνας, μὲ ἄργιλλον κτλ. Λέγουσι τινὲς, ὅτι εὑρίσκεται καὶ ἄσφαλτος μεταξὺ αὐτῶν παρομοίως αἰταινίαι, μὲ τὰς ὁποίας αἱ μούμιαι εἶναι περιτυλιγμέναι, ἐμβρέχοντο εἰς ὕλας διατηρούσας τὸν ἐγκεκλεισμένον νεκρὸν. Τὸ ὕδωρ διαλύει ἐξ αὐτῶν θεϊκόν, ὑδροχλωρικόν καὶ ἀνθρακικὸν νάτρον, καθὼς καὶ φυτικὴν ὕλην, τὴν ὁποίαν νομίζουσι τινες βυρσοδεψικὸν ὀξύ.

Πρὶν γνωρισθῶσι τὰ ἀξιόλογα ἀποτελέσματα τὰ διὰ τῆς ἐγχύσεως τοῦ ξυλικοῦ ὀξέος εἰς τὰς ἀρτηρίας, ἐπρότεινεν ὁ Berzelius τὸν ἀκόλουθον τρόπον πρὸς διατήρησιν τῶν νεκρῶν. Τὰ κοιλώματα τοῦ νεκροῦ ἀνοίγονται, καὶ εἰς διάφορα μέρη γίνονται τομαί· μετὰ ταῦτα βάλλεται ὁ νεκρὸς εἰς ξύλινον λουτήρα, καὶ στηρίζεται δι' ὑποστηριγμάτων, διὰ νὰ μὴ κεῖται εἰς τὸν πυθμένα· τέλος ἐπιχύνεται μὲ ἐνυδρὸν οἰνόπνευμα 0,830 εἰδικῆς βαρύτητος, εἰς τὸ ὁποῖον ἐδιαλύθη διττοχλωρίος ὑδραργύρος. Ἡ ποσότης τοῦ διττοχλωρίου ὑδραργύρου, ἥτις πρέπει νὰ ᾖ κατ' ἀρχὰς ὀλίγη, αὐξάνεται καθ' ἡμέραν κατὰ 1—2 λίτρας. Εἰς διάστημα 3—4 ἐβδομάδων, ἀφοῦ ὅλον τὸ ὕδωρ ἐξαχθῇ διὰ τῆς τοῦ διττοχλωρίου ὑδραργύρου διαλύσεως, ἐκ τοῦ πτώματος, ἐκβάλλεται τὸ πτώμα ἐκ τοῦ λουτήρος καὶ σὺρραπτομένων τῶν τομῶν δύναται νὰ ἐνδυθῇ· καθότι τώρα ξηραίνεται χωρὶς νὰ σήπεται, καὶ ἡ ἐπιδερμὶς διατηρεῖ πολὺν καιρὸν τὸ φυσικὸν χρῶμα. Τοῦτο δὲ ἔχει μεγάλην ἀξίαν εἰς τὰς περισσοτέρας περιστάσεις, καὶ δὲν ἀποτελεῖται διὰ τῆς χρήσεως τοῦ ξυλικοῦ ὀξέος.

Ἡ πλέον ἐντελής μέθοδος τῆς ταριχεύσεως εἶναι ἀναμφιβόλως νὰ ἐγχύνωμεν εἰς τὰς ἀρτηρίας τοῦ νεκροῦ ξυλικὸν ὀξύ καὶ νὰ διατηρῶμεν τὸ πτώμα ὁμοῦ μὲ τὰ ἐντόσθιά του εἰς λουτρὸν ἐμπεριέχον διάλυσιν τοῦ διττοχλωρίου ὑδραργύρου εἰς οἰνόπνευμα.

Ἡ διατήρησις νεκρῶν ζώων πρὸς ἀνατομικὰς ἐξετάσεις δύναται ν' ἀποτελεσθῇ κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. Τὸ νεκρὸν ζῶον βάλλεται εἰς λουτρὸν ἐκ 2 μερῶν στυπτηρίας, 2 μερῶν κοινοῦ ἁλτος, 1 μ. νίτρου καὶ τόσου ὕδατος, ὥς νὰ ἔχῃ τὸ ρευστὸν 1, 11 εἰδικὴν βαρύτητα. Ἐπίσης ἡ διάλυσις τῆς ὀξικῆς ἀργίλλου, ἢ τοῦ ἀρσενώδους ὀξέος, ἐγχυνομένη εἰς τὰς φλέβας τῶν νεκρῶν, ἐμποδίζει πολὺν καιρὸν τὴν σήψιν.

ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ.

A.

	Σελ.		Σελ.
'Αβροτανίνη.	416	'Αλιζάρι	483
'Αζαρίνη	443	'Αλιζαρίνη	483
Αιθάλη πευκίνη	467	'Αλλαντόνη	402
Αιθέρ διὰ βενζοϊκού ὀξέος	250	'Αλλόξανον	369
» θειϊκού ὀξέος	240	'Αλλόξαντον	368
» μυρμηκικοῦ ὀξέος	248	'Αλόη.	477
» ἐκ τοῦ ξυλοπνεύματος	283	'Αλοίνη	443
» διὰ ὀξαλικοῦ ὀξέος	249	'Αμβαρ	427
» ὀξικίου ὀξέος	247	'Αμβαρίνη	427
» τρυγικοῦ ὀξέος	250	'Αμμώλιον	298
» ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.	245	'Αμμωνία βενζοϊκή	30
» φωσφορικοῦ ὀξέος	243	» ἡλεκτρική	32
Αἰθύλιον	243	« νιτρική	44
Αἰθυλοξειδίου.	243	» ὀξαλική	26
» βενζοϊκόν	250	» ὀξική	259
» ἡλεκτρικόν	251	» οὐρική	367
» μυρμηκικόν	248	» πορφυρική	369
» νιτρικόν	244	» στεατική	435
» ὀξαλικόν	249	» τρυγική	47
» ὀξικόν	247	» μετὰ καλίου	48
» στεατικόν.	251	» ὑδροκυανική ἔνθειας	336
» τρυγικόν	250	» ἐνσίδηρος.	330
» ὑδροθεικόν	249	'Αμυγδαλίνη	454
» φωσφορικόν.	243	'Αμυλον	97
Αἷμα	338	'Αναπνοή	345
α ὀρακόντιον	164	'Ανθη βενζοϊκά	29
Αἱματίνη	486	'Ανθηρόκοκκος	493
Αἱματοσίνη	341	'Ανθαρίνη	414
Αἱμοκυανοῦν	341	'Ανθοκυανοῦν	408
Αἱμόφαιον	341	'Ανθόξανθον	408
'Ακονιτίνη	69	'Ανθος τοῦ γάλακτος	354
'Αλας πολύχρηστον τοῦ Seignette	47	'Ανίμιον	298
'Αλατα διὰ καφουρικοῦ, κηκικιδικοῦ,		'Αντισηπτικά μέσα	431
τρυγικοῦ ὀξέος κτλ. ὅρα κα-		'Αουρίνη	413
φουρικόν κηκικιδικόν,		'Απόθεμα.	440
τρυγικόν ὀξὺ κτλ.		'Απολιώσεις.	295
'Αλατα διὰ κινίνης, μορφίου, στρυ-		'Απόστασις πλινθοειδῆς	367
χίου κτλ. ὅρα κινίνη,		'Απυρίνη	80
μόρφιον, σρύχνιον κτλ.		'Αργίλλος ὀξική	259
		α τρυγική	48

	Σελ.		Γ.	Σελ.
Ἀργυρος κροτικός ὀξειδωμένος	338			273
» ὀξινός	268	Γαϊάνθρακες		273
» τρυγικός	48	Γάλα		350
Ἀρικίνη	68	» τῶν αἰγῶν		359
Ἀρνικίνη	443	» βοουτυρώδες		354
Ἀρτανιτίνη	444	» τῶν γυναικῶν		358
Ἀσπαργίνη	74	» τῆς ἔππου		358
Ἀσφαλτος	273	» τῆς ὄνου		358
» ῥητινώδης	275	» παρθένιον		477
Αὔξησις τῶν φυτῶν.	4	» τῶν προβάτων		359
		Γαλάκτωμα		422
B.		Γανώματα		470
Βάλαμα αὐτόρρυτα	475	Γεντιανή		444
» ῥευστά	475	Γερβίνη		72
» στερεὰ	175. 476	Γλοιαδίνη		404
Βάλαμον αὐτόρρυτον	468	Γλυκορρίζιον		96
» διὰ θείου	448	Γουαρίνη		79
» κοπαϊκόν	468	Γουεπαρίνη		444
» τολουταϊκόν	476		Δ.	
Βαρεῖα νιτρική	44	Δακτύλιον		84
» ὀξαλική	26	Δάκρυα		408
» ὀξική	260	Δατισκίνη		444
» τρυγική	48	Δατουρίνη		69
» ὑδροκυανική ἐνσίδηρος	331	Δαφνίνη	81.	445
Βαριολαρίνη	447	Δέρμα		423
Βάσεις ἀλατογόνοι φυτικά	54	Διάστασις		402
Βασσορίνη	85	Διοσμίνη		443
Βαφαὶ κύριαι	244	Δρακονίνη		465
» νόθαι	244	Δρύωχρον		496
Βαφή μέλαινα τῶν σηπιδίων.	428	Δύναμις ζωϊκή		4
Βαφική	480	» καταλυτική		2
Βενζόη	476		E.	
Βερβερίνη	444			
Βολίνη ἢ βιδόλιον	64. 77			
Βισμούδιον ὀξικόν ὀξειδωμένον.	260	Ἐγκέφαλος		444
» τρυγικόν	48	Ἐγκεφαλέλαιον		442
Βλάστησις	3	Ἐκπνοή τῶν φυτῶν		6
Βλέννα ζωϊκή	305	Ἐκλέψεις τῶν πτηνῶν		403
» φυτική	84	Ἐκπνοή τῶν φυτῶν		6
Βουτυρίνη	355	Ἐκχύλισμα τοῦ γάλακτος		350
Βούτυρον	354	» σαπονοειδὲς τοῦ οὐρούς		374
» κακάϊνον	429	Ἐκχύλισματα		409
» τῶν φυτῶν	448	Ἐλαία αἰθέρια		444
Βρασιλίνη	485	» ἀπεσταγμένα		444
Βρουκίνη	62	» γλίσχυρα		449
Βρουνάμυλον	402	» λιπαρά		448
Βρωμαθύλια	246	» μὴ ξηραίνόμενα		449
Βυρσοδεψία	423	ξηραίνόμενα	449.	425

	Σελ.		Σελ.
Ἐλαια πετητικὰ	444	Ἐρυθροπρωτίδη	303
» στερεὰ	418. 429	Ἐρυθρόφυλλον	409
Ἐλαϊδίνη	438	Ἐσενδεκίνη	79
Ἐλαϊνή	449	Ἐσχάραι τῶν ἐλκῶν	445
Ἐλαιοζαχάρεις	449	Εὐπατορίνη	80
Ἐλαιον (αἰθέριον) τοῦ ἀνίσου, τῶν καρυοφύλλων κτλ. ὄρα ἔλαια αἰθέρια.		Εὐπιον	287
» ἀμυγδάλινον	422	Εὐρώς	270
» ἐκ τῶν γαιανθράκων	294	Εὐφόρβιον	472
» τῆς δάφνης	430	Εὐωνυμίνη	445
» τοῦ δελφίνος	344		
» τῶν ἐλαιῶν	423	Z.	
» ἐμπυρευματικὸν	297	Ζάχαρις	87
» τῶν ἰχθύων	344	« τοῦ γάλακτος	356
» κακάινον	429	» κεκαυμένη	94
» τοῦ κανάβεως	426	» κοινή	87
» τῶν καρῶν	426	» ἐκ τῶν κοκκινισεύτλων	89
» τοῦ κηροῦ	432	» κρυσταλλωμένη	94
» κίκινον	428	» τοῦ μάννα	96
» κοινὸν	423	» μὴ κρυσταλλώσιμος	93
» τῆς κοφίας	431	» τοῦ μολύβδου	263
» κροτίωνον	427	» ἐκ τῶν μυκῶν	94
» τῶν λεπτοκαρῶν	425	» τῆς πηκτῆς	310
» μοσχοκαρῶν	429	» ἐκ τῶν σταφυλῶν	93
» τῶν μυρμῆκων	314	» σφενδάμνων	90
» ποδῶν τοῦ βοῦς	314	Ζαχαρόλευρον	88
» τοῦ ῥαφάνου	424	Ζύθος	230
» τρυγὸς θυσιῶδες	24	Ζύμωμα	104
» τῶν φηγῶν	424	Ζύμωσις	220
» φιλοσόφων	420	» εὐρωτιῶσα	269
» φοινίκειον	430	» οἶνοπνευματώδης	220
» τῶν χημικῶν τῆς Ὀλανδίας	346	» ὀξεῖα	220. 254
» ὠν	344	» σαπρὰ	220. 269
» τοῦ Cerambix moschatus	447		
» Vivera Putorius	446	H.	
Ἐλαιοπτήνη	446	Ἡλεκτρον	274
Ἐλαττηρίνη	444		
Ἐλενίνη	403	Θ.	
Ἐλημον	463		
Ἐλύτριον	81	Θαλλοκινίνη	67
Ἐμετίνη	63	Θειοκυάνιον	334
Ἐμπλαστρον διὰ λιθαργύρου	443	Θειοναφθαλίδιον	294
Ἐνθειοκυάνιον	334	Θειοναφθάλιον	294
Ἐνώσεις διπλαῖ, τριπλαῖ κτλ.	4	Θερμότης τῶν ζώων	347
Ἐξομοίωσις			
Ἐργοτίνη	443	I.	
Ἐρυθρίνη	492		
Ἐρυθρόδανον	482	Ἰδρῶς	407
Ἐρυθρόπικρον	492	Ἰεῖον	77

	Σελ.		Σελ.
Ἰλίκινη	413	Κεδριρέτη	286
Ἰμπερατορίνη	415	Κέλυφος	403
Ἰνδικὸν	201	Κερασσίνη	85
» διαλύσιμον	204	Κερέθροτον	412
» ὀξειδωμένον	203	Κετραρίνη	414
Ἰνες	406	Κεφαλοτόν	412
Ἰδς ἀπεσταγμένος	261	Κηρίνη	432
» τῶν ὄψεων	409	Κηρὸς	431
» χαλκοῦ ξυστός	262	» τοῦ ἐγκεφάλου	412
Ἰτεῖνη	67	» σφραγιστικός	464
Ἰχθυόκολλα	310	Κητίνη	316
Ἰχθὺρ	413	Κιγχωνίνη	65
Ἰωδαϊθύλιον	247	Κινίνη	66
Ἰωδάμυλον	99	Κιτρινοξύλον	196
		Κνήκωχρον	200
Κ.		Κοβάλτιον ὀξάλικόν	27
Καγκάμινον κυανοῦν	208	» ὀξικόν ὀξειδωμένον	260
Κάδομιον ὀξινόν	267	» ὑδροκυανικόν ἐνσίδηρον	332
Καθαρίνη	413	Κόκκοι ὠχροί	498
Καλαμοζάχαρις	87	Κόλλα	98
Κάλιον βενζοϊκόν	30	Κολοκυνθίνη	413
» ἐγκυάνιον ἐρυθρόν	330	Κολουμδίνη	414
» ἡλεκτρικόν	32	Κολοφώνιον	461
» νιτρικόν	43	Κολχικίνη	71
» ὀξάλικόν	25	Κόμμι	82
» ὀξικόν	257	» ἀμμωνιακόν	471
» οὐρικόν	366	» ἐλαστικόν	478
» προυσσικόν σιδηρίζον	328	» οἰδαινόμενον εἰς τὸ ὕδωρ	85
» στεατικόν	434	Κομμιρητῖναι	471
» τρυγικόν ὀξικόν	46	Κομμιρητίνη τοῦ ἱεροξύλου	473
» » οὐδέτερον	46	Κοπάλη	465
» ὑδροκυανικόν ἐνθειον	335	Κορνίνη	414
» ὑδροκυανικόν σιδηρίζον	328	Κρέας καπνιστόν	433
Κανθαρίδες	430	Κρόκειον	499
Κανθαριδίνη	431	Κροκοκίτρινον	499
Καπνομόριον	286	Κρόκος ψευδῆς	490
Καρθαμίνη	490	Κροτονίνη	79
Καρκίνος	414	Κυανέλαιον	291
Καρμήνιον	493	Κυάνιον βρωμοῦχον	325
Καρουφυλλίνη	452	» ἐγγλῶριον	325
Κασσίτερος ὀξικός ὀξειδωμένος	267	» ἐνθειον	336
» » ὑποξειδωμένος	267	» ἰωδοῦχον	325
» τρυγικός ὀξειδωμένος	48	Κυανοῦν τοῦ Βερολίνου	332
Καστορίνη	427	» καγκάμινον	208
Καστόριον	426	Κυανουρίνη	383
Κατάλυσις	2	Κυναπίνη	78
Καταβράκτης	409	Κυστίνη	379
Καφεΐνη	75	Κυψέλη	317
Καφουρά	146.	157 Κωδίνη	57
Καφουρά τεχνητή	454	Κωνίνη	72

Α.

Αακκίνη	
Αάκκον	
» δακρυῶδες	
» τοῦ καρμηνίου	
» σφαιροειδές	
» τῆς Φλωρεντίας	
Λειχηνάμυλον	
Λέκιθος	
Λεπίδια τῶν ἰχθύων	
Λευέλαιον	
Λευκίνη	
Λευκόχρυσος ὀξικός	
Λεύκωμα	
» τῶν ὠν	
Λίβανος	
Λιθάνθρακες	
Λιθάρια τῶν καρκίνων	
Λιθεΐα ὀξική	
Λίθοι τῆς οὐροδόχου κύστεως	
Λινέλαιον	
Λίπη	
Λίπος ἀνθρώπινον	
Λιπώματα	
Λιριοδενδρίνη	
Λυκισκίνη	
Λύμφη	
Λύχνος διάπυρος τοῦ Davy	

Μ.

Μαγγανήσιον ὀξικόν ὑποξειδωμένον	
» τρυγικόν ὀξειδωμένον	
Μαγνησία ὀξαλική	
» ὀξική	
» τρυγική	
Μαλακορητίνη	
Μαννίνη	
Μαρανθάμυλον	
Μαργαρίνη	
Μαργαρίται	
Μαστίχη	
Μαστιχίνη	
Μεθύλιον	
Μεθυλοξείδιον ὀξικόν	
Μελαίνη	
Μελαμπυρίνη	
Μέλαν τοῦ Frankfort	

Σελ.

164
163
195
194
186
194
102
403
318
291
305
269
305
403
473
473
419
259
377
425
313
315
415
415
413
348
239

116.

Μέλαν πεύκινον
Μελάνη τυπογραφική
Μελανοκινίνη
Μέλι
Μελλιθος
Μελιστύραξ
Μενιανθίνη
Μενισπερμίνη
Μεσίτης
Μετάξη
Μηκωνέλαιον
Μηκωνίνη
Μηκώνιον
Μηλίτης
Μόλυβδος ἀνθρακικός
» βενζοϊκός
» νιτρικός
» ὀξαλικός ὀξειδωμένος
» ὀξικός οὐδέτερος
» στεατικός
» τρυγικός ὀξειδωμένος
» τυρικός
» ὑδροκυανικός ὀξειδωμένος
» ἐνσίδηρος
» ὑποξικός
Μόρφιον
» μηχανικόν
» νιτρικόν
» ὀξικόν
» ὑδροχλωρικόν

Μόσχος

» τεχνητός

Μούμια

Μουνδαρίνη

Μουρεξάνιον

Μουρεξείδιον

Μυελόκονον

Μυελός νοτιαῖος

Μυκοζάχαρις

Μυρικίνη

Μυρτίδανον

Ν.

Ναρκώτιον
Νάτρον βενζοϊκόν
» ἡλεκτρικόν
» νιτρικόν
» ὀξαλικόν
» ὀξικόν

Σελ.

167
126
67
95
276
176
114
77
281. 284
428
127
115
397
229
265
30
14
26
263
135
18
353
331
264
55
57
56
57
56
429
275
433
114
370
370
412
411
94
132
113
58
30
32
13
26
258

	Σελ.		Σελ.
Νάτρον ούρικόν	366	Όξυ άνθρακονιτρικόν	207
» στεατικόν	435	» άποκρινικόν	272
» τρυγικόν όξινόν	47	» άσπαραγινικόν	74
» » ούδέτερον	47	» βενζοϊκόν	29
» υδροκυανικόν ένθειον	336	» βολητικόν	44
» » ένσίδηρον	330	» βορβορώδες	270
Ναφθάλιον	293	» βουτυρικόν	355
Νικέλιον όξάλικόν	27	» γαλακτικόν	355. 373
» όξικόν	264	» δαφνικόν	44
Νικοτίνη	70	» δελφινικόν	444
		» όρουδουρσοδεφικόν	35
Η.		» έλαιανθρακικόν	294
Ηανθίνη	183	» έλαϊδινικόν	428
Ηανθοξείδιον	380	» έλαιοκιμινικόν	429
Ηανθοπικρίνη	76	» έλαιώδες	436
Ηανθόφυλλον	409	» ένθεισιναπικόν	452
Ηύλον έρυθρόν τής Βρασιλίας	484	» τής εύθαλείας	43
» καμπεχινόν	486	» εύρωτικόν	270
» κίτρινον	496	» ζαχαρογαλακτικόν	357
» σαγάλινον	488	» ήλεκτρικόν	30
» ώχρόν	496	» θειϊκόν υδροκυανικόν θειούχον	336
Ευλόξος	279	» θειοελαϊώδες	438
Ευλόπνευμα	279. 281	» θειομελανικόν	242
		» θειουρικόν	369
Ο.		» θηρανθιμιδικόν	44
Όδόριον	298	» θριδακικόν	44
Οινόζυμωσις	220	» ιατροφικόν	427
Όινοι καπνιστοί	225	» ίνδικοθειϊκόν	205
Οινόμελι	230	» ίνδικονιτρικόν	206
Οινόπνευμα	232	» ίνικόν	304
Όϊνος	224	» ίπποδενζοϊκόν	29
Όλάνιον	298	» ίππουρικόν	45
Όλιβίτη	415	» καπνικόν	46
Όνίνη	307	» καρθαμινικόν	490
Όξέα βυρσοδεφικά	35	» κάρυοφυλλικόν	451
» όργανικά	41	» καφεϊκόν	75
Όξείδια ούδέτερα	82	» καφουρικόν	52. 459
Όξείδιον τοῦ μεθυλίου	283	» κηκιδικόν	40
» τυροῦ	353	» κητοθειϊκόν	316
Όξος	252	» κικινικόν	429
Όξύ αίγικόν	355	» κινικόν	32
» αίθιονικόν	243	» κινναμωμικόν	451
» άλλαντοϊκόν	402	» νιτρικόν	42
» άλλοξανικόν	369	» κολοφωνικόν	461
» άμβαρικόν	427	» κομμηνικόν	34
» άμνιωτικόν	402	» κοπαϊκόν	469
» άμυγδαλικόν	455	» κραμερικόν	45
» άνεμωνικόν	456	» κρηνικόν	272
		» κροτικόν	337
		» κροτώνιον	427

	Σελ.		Σελ.
Ὁξύ κυανικόν	325	Ὁξύ πυροκιτρικόν	43
» ἔνθειον	334	» πυρομηκωνικόν	34
» κυανικόν ὀξυγονωμένον	325	» πυρομηλικόν	46
» κυανοῦν	349	» πυρομυξικόν	52
» λειχηνικόν	47	» πυροσταφυλικόν	22. 23
» λευκινονιτρικόν	305	» πυροτρυγικόν	21
» λευκωματικόν	307	» ῥατανικόν	45
» λιθικόν	364	» ῥοδελικόν	291
» λυκικόν	44	» ῥοδόχρουν	367
» λυχνικόν	239	» τραγικόν	316. 355
» μαργαροθεικόν	436	» ῥοκελικόν	49
» μαργαρωδες	435	» σαπωνιακόν	417
» μεταξικόν	429	» ζαχαρικόν	51
» μηδικόν	42	» ζαχαρογαλακτικόν	51
» μηκωνικόν	33	» σπιραϊκόν	49
» Μηλικόν	27	» σταφυλικόν	22
» μιμοδурсοδεψικόν	43	» στεατικόν	433
» μισοξαλικόν	370	» στεατοκικινικόν	429
» μυκικόν	47	» τραγικόν	316. 355
» μυκομελικόν	369	» τρυγικόν	44
» μυξικόν	51	» τυρικόν	353
» μανιταρικόν	47	» ὑδρελαιῶδες	438
» μελιλιθικόν	276	» ὑδροκυανικόν	319
» μυρμηκικόν	318	» ὑδροκυανικόν σιδηρίζον	327
» ναρδικόν	48	» ὑδρομαργαρωδες	436
» νιτραιμοδαφές	207	» ὑδρομελονικόν	335
» νιτρομηκωνικόν	445	» ὑποθειογλοιαιδικόν	294
» ξανθοπρωτεϊνικόν	340	» ὑποθειοναφθαλικόν	293
» ξυλικόν	279	» ὑποθειοναφθικόν	293
» οἶνανθικόν	226	» ὑποξικόν	239
» ὀξαλικόν	23	» ὑποπρασινικόν	48
» ὀξαλουρικόν	368	» φαιελικόν	294
» ὀξικόν	255	» φελλικόν	53
» ὀρεικόν	464	» φθειραγχικόν	50. 436
» τῆς ὀρύζης	356	» φοινικικόν	430. 205
» οὐραμυλικόν	370	» γελιδονικόν	50
» οὐρικόν	364	» χλωροκυανικόν	325
» » ἐμπυρευματικόν	365	» χλωροξαλικόν	24
» οὐρολιθικόν	364	» χλωροξικόν	256
» παραδαινικόν	369	» χολοστεατικόν	317
» πευκικόν	464	Ὁξύζυμωσις	220
» πηκτῶδες	86	Ὁπιον	410
» πυρογαλακτικόν	356	Ὁποπράσινον	204
» πορφυρικόν	366. 370	Ὁργανα γεννητικὰ τῶν ἀμφιβίων	402
» πορφυροθεικόν	205	» τοῦ ἄρρενος τῶν μαστοφόρων	398
» πρασινικόν	48	» τοῦ θήλειος τῶν μαστοφόρων	400
» πρωτεϊνθεικόν	303	» τῶν ἐχθύων	402
» πυροκιττηδικόν	38	Ὁρελάνα	498
» πυροκιττικόν	33	Ὁρέλαιον	344
		Ὁρρός τοῦ γάλακτος	354

	Σελ.		Σελ.
Ὁσμοζώμιον	344	Πριμουλίνη	446
Ὁστᾶ	424	Προστώματα	210
» τοῦ φυσητῆρος	447	Πρωτείνη	302
Ὁστρακα τῶν καρκίνων	448	Πρωτίδη	303
» χελωνῶν	447	Πρωτόγαλα	358
Ὁστρεα	449	Πυΐνη	444
Οὐραμήλιον	369	Πυξίνη	80
Οὐράνιον ὄξικόν ὀξειδωμένον	260	Πῦον	443
Οὐρίνη	370	Πυρέλαιον	294
» νιτρική	372	Πυροξάνθιον	295
» ὀξαλική	372	Πυροξυ ζωϊκόν	300
Οὐροερυθροῦν	367		
Οὐρορητίνη	374	P.	
Οὐρος	363		
» αἵματηρόν	387	Ῥαΐνη	444
» γαλακτώδες	387	Ῥαμνίνη	444
» κυανοῦν	383	Ῥευστόν ἄλλαντοϊκόν	401
» μέλαν	383	» ἀμνιωτικόν	401
Ὁφθαλμομέλαν	446	» παγκρεατικόν	410
Ὁφιδίνη	444	» σπερματικόν	398
		» ὑδροπικόν	409
II.		Ῥητίνη	459
		» ἐκχυλισματικὴν ὕλην ἐμπεριέ-	
Παραμενισπερμίνη	77	» χουσαι	477
Περιττώματα	393	» μαλακαὶ	464
Πετρέλαιον	278	» σκληραὶ	464
Πευκεδανίνη	445	Ῥητίνη Δαμαρά	462
Πεψίνη	391	» ἰξώδης	466
Πέψις	390	» λευκὴ	464
Πηκτὴ	86	» pasto	468
Πήκτωμα	308	» ῥευστὴ	466
» τοῦ αἵματος	340	Ῥητινίτης	275
Πικρολειχηνίνη	445	Ῥητινογανώματα	470
Πιπερίνη	74	Ῥουσιokinίνη	67
Πίσσα Βουργουνδική	461	Ῥουτιλίνη	446
» τῶν γαιανθράκων	273		
» μέλαινα	467	Σ.	
» ῥευστὴ	467		
» » ἐκ τῶν γαιανθράκων	294	Σαθαδιλλίνη	63
Πιστόκαλλον	286	Σαγγιναρίνη	78
Πιστόπικρον	286	Σάγον ψευδές	98
Πλακοῦς	340	Σανδαράχη	463
Πλουμβαγίνη	76	Σανταλίνη	489
Πνεῦμα τοῦ κηροῦ	432	Σάπων ἀμυγδάλινος	444
Πολυγαλίνη	444	» ἰσπανικὸς	440
Πολύχρουον	445	» κρητικὸς	440
Πορτογαλίνη	444	» ὀξινὸς	421
Πορφύρα (Murex brandaris)	449	» πράσινος	441
Πότασσα ὄρα κάλιον		Σάπωνες	132. 438
Πορπουρίνη	483	» γαιώδεις	442

	Σελ.		Σελ.
Σάπωνες διαφανείς	440	Στεατίτης	275
» διά καλλίου	441	Στίμιμ τρυγικόν ὀξειδωμένον	19
» μαλακοί	441	Στρεψίχρουν	115
» μεταλλικοί	442	Στροντιανή νιτρική	44
» διά νάτρου	439	» ὀξαλική	26
» σκληροί	439	» ὀξική	260
Σαπωνίνη	417	» τρυγική	48
Σενεγίνη	417	Στρυχνίνη ἢ στρύχινον	59
Σενίνη	413	» θειική	61
Σεράπιον	93	» νιτρική	61
» μέλαν	88	» ὑδροχλωρική	59
Σήψις	269	Στύραξ	177
Σίδετ	425	Συγκρίματα τῆς οὐροδοῦχου κύσεως	377
Σίδηρος γαλακτικός	356	» ἐκ τῆς χολῆς	362
» νιτρικός ὑποξειδωμένος	44	Συμπήγματα	414
» μηλικός	28	Σφαῖραι σαπωνώδεις	141
» ὀξαλικός	26	Σφαιρίδια ἐνσίδηρα	49
» ὀξικός ὀξειδωμένος	267	Σωσίκερον	287
» » ὑποξειδωμένος	267		
« τρυγικός ὀξειδωμένος	49	T.	
» » ὑποξειδωμένος	49		
» ὑδροκυανικός	332	Ταχινίνη	417
Σιελίνη	406	Ταρίχευσις τῶν νεκρῶν	433
Σιελόλιθοι	406	Τεῖνη	76
Σιέλως	405	Τερεβινθίνη	166
Σίλφιον μηδικόν	471	» ἐψημένη	161
Σκαμμωνία	478	Τέφρα	4
Σκελετὸν τῶν φυτῶν	105	Τίτανος ὀξαλική	26
Σκυλλίνη	414	» ὀξική	260
Σκληρὸρρητιναί	461	» οὐρική	367
Σκορδίνη	414	» τρυγική	48
Σκουτελαρίνη	414	Τούρφα	272
Σκύτος	423	Τραγακανθίνη	85
Σμῆγμα τῆς ποστῆς	400	Τρίχες	420
Σμιλακίνη	417	Τροφή τῶν φυτῶν	4
Σμύρνα	473	Τρύξ	46
Σόδα ὄρα νάτρου		» ἐμβόραξ	46
Σολανίνη	417	» ἐμειτική	49
Σουριναμίνη	417	» ἐνσίδηρος	49
Σπαρτίνη	417	» ἐνστήμιμος	49
Σπέρμα κήτους	316		
Σπόγγοι	426	Y.	
Σταλάγματα	447		
Σταφυλοζάχαρις	93	Υδράργυρος βενζοϊκός	30
Στέαρ	313	» νιτρικός ὀξειδωμένος	44
» χοίρινον	345	» » ὑποξειδωμένος	44
Στεαρίνη	419	» κροτικός ὑποξειδωμένος	338
Στεαρόκονον	442	» κυανούχος	324
ΣτεαρOPTήνη	446	» ὀξικός ὀξειδωμένος	268
Στεατίνη	419	» » ὑποξειδωμένος	268

	Σελ.		Σελ.
Υδράργυρος τρυγικός	48	Χαλκός ὀξικός οὐδέτερος	261
» τυρικός	353	» τρυγικός ὀξειδωμένος	48
» ὑδροκυανικός	324	» τυρικός	353
Υδωρ πισσηρὸν	467	» ὑδροκυανικός ὀξειδωμένος ἐνσίδηρος	334
Υλαί ζωϊκαί	296		
Υλη ἀλόφιλος	378	Χεδροπίνη	405
» βαφικὴ τοῦ αἵματος	341	Χελιδόξανθον	50
» βόειος	395	Χιτώνιον	417
» θυρσοδεψικὴ	35	Χλωραιθύλιον	245
» γλυκεῖα τῶν ἐλαίων	433	Χλωροφορμάλιον	256
» δυσδιάλυτος τῆς χολῆς	361	Χλωρόφυλλον	107. 201
» ἐκχυλισματικὴ	409	Χολή	360
» ζωϊκὴ	311	Χολοκίτρινον	361
» ὀξειδωμένη	410	Χολοστέαρ	317. 414
» ἐλαιώδης	429	Χολόφασιον	361
» λευκὴ τοῦ ἰνδικοῦ	202	Χολόχλωρον	361
» ἱνικὴ φυτικὴ	405	Χρυσόξυλον	496
» ζωϊκὴ	303	Χρύσοπον	472
» κυανὴ τοῦ ἰνδικοῦ	203	Χρυσός ὀξικός	269
» μαργαρώδης	436	Χρώματα ἐρυθρά	182
» οὐρική	370	» κυανὰ	201
» πικρὰ τοῦ Welther	207	» ὀργανικά	480
» πολύχρωμος	200	» πράσινα	201
» πορφυρίζουσα τοῦ ἰνδικοῦ	205	» ὠχρὰ	495
» στεατίνη	419	Χρωματισμός	481
» σφαιροειδὴς τοῦ αἵματος	339	» διὰ τοῦ ἀνθηροκόκκου	212
» ταυρεῖα	361	» θραστικοῦ ξύλου	212
» τῆς τούρφας	273	» ἐρυθρὸς	211
» τυρώδης	352	» διὰ κνήκου	213
Υψασμα τῆς ἀράχνης	425	» κυανοῦς	216
		» μέλας	219
		» πράσινος	219
		» ὠχρὸς	213
			84
Φ.		Χυλός	410
Φηγίνη	443	Χυμός ἀρθριτικός	
Φθειράγγιον	63		
Φιλυρίνη	415		
Φλεριτίνη	412	Ψ.	
Φοινίκειον	205		
Φορμάλιον	285	Ψευδάργυρος νιτρικός	44
Φούσκιον	300	» ὀξικός	266
Φραξίνη	445	» τρυγικός ὀξειδωμένος	48
Φύματα πῶν πνευμόνων	445	Ψευδαλκανίνη	489
Φυτοκόλλα	404	Ψευδερυθρίνη	492
Φυτολεύκωμα	404	Ψιμύθιον	265
		Ω.	
X.			
Χαλκός νιτρικός	44	Ωζοκηρρίτης	276
» ὀξάλικός	27	Ωχρὸν τῆς κροκορρίτζης	499
» ὀξικός βασικός	162		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ.

Υ Π Ο

Ξ. ΑΛΑΝΔΕΡΕΡ.

Ὡς παράρτημα τῶν δύο τόμων τῆς γενικῆς χημείας, μεθ' ἑνὸς λιθογρα-

φημένου πίνακος.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ.

1842

NOTES

THE ANALYTICAL CHEMIST

THE

ANALYTICAL

THE ANALYTICAL CHEMIST

THE ANALYTICAL

THE ANALYTICAL

THE ANALYTICAL

THE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ἡ ἀναλυτικὴ Χημεία εἶναι ἀδιαίρετος κλάδος τῆς ἐφαρμοσμένης χημείας· σκοπὸς δὲ αὐτῆς εἶναι ἡ ἐξιχνεύσις τῆς συνθέσεως τῶν σωμάτων τόσοις ὡς πρὸς τὴν ποιότητα, καθὼς καὶ πρὸς τὴν ποσότητα τῶν στοιχείων, ἐκ τῶν ὁποίων συνίστανται. Ἔνεκα τούτου ἀπαιτεῖται πρὸ πάντων νὰ λάβωμεν ἀκριβῆ γνῶσιν ἐκείνων τῶν ὑλῶν, δι' ὧν ἀνακαλύπτονται τὰ διάφορα ὀξέα καὶ ἀλκάλια. Τὰ πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν ὀργανικῶν καὶ μὴ ὀργανικῶν οὐσιῶν χρήσιμα μέσα λέγονται δοκιμαστήρια ἢ ἀντιδραστήρια (Beagentia).

Περὶ ἀναγκαίων συσκευῶν πρὸς ἀνάλυσιν.

Διὰ τὰς πλείους ἐπὶ τῆς ποιότητος χημικὰς ἀναλύσεις ἀπαιτοῦνται μόνον ὀλίγα καὶ ἀπλὰ συσκευαί, αἵτινες εἶναι αἱ ἐξῆς.

Τὸ ἀναγκαιότερον πρὸς ἐξέτασιν τῶν ὑλῶν καθ' ὑγρὰν ὁδὸν εἶναι μικρὰ ὑέλινα ἀγγεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα διαλύονται τὰ εἰς τὴν ἐξέτασιν ὑποβαλλόμενα, καθότι οὕτω εἰς πολλὰς μερίδας διηρημένον τὸ διάλυμα ἐξετάζεται διὰ τῶν διαφόρων δοκιμαστηρίων. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ἐκλέγονται ἐνίοτε μικρὰ ποτήρια, τὰ ὁποῖα στέκονται μὲν κάλλιστα, δὲν δύνανται ὅμως νὰ θερμανθῶσι διὰ τοῦ λύχνου τοῦ οἰνοπνεύματος, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀναγκαιότατον. Καλῆτερα εἶναι νὰ μεταχειρισθῶσι διὰ τὰς ἐξετάσεις κύλινδροι κατασκευασμένοι ἐκ λευκῆς ὑέλου μὲ ἡμισφαιροειδῆ πυθμένα· εἰς τοιοῦτους κυλίνδρους δύνανται νὰ θερμανθῶσι καὶ ζεσθῶσι τόσοις τὰ διαλύματα, καθὼς καὶ τὰ παραγόμενα ἰζήματα, χωρὶς φόβον διαρρήξεως. Εἰς ἀναλύσεις ἐπὶ τῆς ποιότητος ἐξαρκοῦσιν εἰς τὰς πλείους περιστάσεις 20 τοιοῦτοι κύλινδροι, οἵτινες τίθενται εἰς ξυλὴν θήκην (σχ. 1)

Ἐπειδὴ τὰ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῶν δοκιμαστηρίων ἐπὶ τῶν ἀναλυομένων σωμάτων ἀποτελέσματα πολλάκις δὲν φαίνονται παρευθὺς, ἀλλὰ μετὰ τινα χρόνον, πρέπει νὰ ἀφίνωνται κάμποσον καιρὸν ἡσυχῶς διὰ νὰ σχηματισθῶσι τὰ καταβυθίσματα, καὶ διὰ νὰ μὴ γένῃ σύγχυσις, πρέπει νὰ ἐπικολᾷται ἐπὶ ἐκάστου κυλίνδρου τὸ ὄνομα τοῦ ἐν αὐτῷ τεθέντος δοκιμα-

στηρίου. Διὰ τὴν ἔκλυσιν τοῦ ὑδροθειωμένου αέριου ἀπαιτεῖται ἰδιαιτέρα συσκευή, διὰ νὰ διοχετεύεται τὸ ὑδροθειωμένον αέριον εἰς μέρη ξεχωριστά, καὶ ἐν ὑπαίθρῳ, ὥς νὰ μὴν ἐνοχληθῶσιν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ αέριον τοῦτο. Αἱ δὲ δοκιμασταὶ μὲ τὰ ἄλλα δοκιμαστήρια δύνανται νὰ ἐκτελεσθῶσιν εἰς δωμάτια. Ἐκτὸς τῶν ῥηθέντων κυλίνδρων, ἀπαιτοῦνται διάφορα χωνία διαφόρου μεγέθους, χάρτης πρὸς διύλισιν διὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν καταβυθισμάτων, ἀπαιτεῖται προσέτι μικρὸς λύχνος πρὸς θέρμανσιν τῶν ῥευστῶν, κλίβανος πρὸς τήξιν, ἐλάσματα καὶ σύρματα ἐκ λευκοχρύσου, διαφόρου μεγέθους χωνευτήρια ἐξ ἀργίλλου, μικρὸν χωνευτήριο ἐκ λευκοχρύσου, διάφορα πορφύρινα χωνευτήρια, ἐξατμιστήρια διαφόρου μεγέθους, ὄλμος ἐξ ἀχάτου λίθου, μερικοὶ ὑέλινι σωλῆνες πρὸς ἀνατάραξιν τῶν ῥευστῶν, κυρτοὶ σωλῆνες καὶ δίστομοι κύλινδροι πρὸς ἐκτύλινσιν διαφόρων αέριων, ἐξατμιστήρια μικρὰ ἐξ ὕλου, ἀποστακτικὰ σκεύη ἐξ ὕλου καὶ κατὰλληλα δοχεῖα, πρὸς τούτοις φελλὸς, ἐλαστικὸν κόμμι πρὸς συγκόλλησιν τῶν διαφόρων συσκευῶν κτλ.

Δοκιμαστήρια. Reagentia.

ὑπὸ τὸ ὄνομα δοκιμαστήριον ἐννοοῦμεν ἀπλοῦν, ἢ σύνθετον σῶμα, τὸ ὁποῖον ἐὰν συναφθῇ μετὰ ἄλλου τινὸς χημικῶς, μεταβάλλει αὐτὸ, καὶ οὕτως ἀναφαίνεται εἰς τὰς αἰσθήσεις, ἰδίως δὲ εἰς τὴν ὄρασιν ἢ ὑπαρξίς τοῦ ἐμπεριεχομένου σώματος· εἶναι δὲ φανερόν ὅτι τὸ ἀνακαλυφθὲν σῶμα δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ὡς δοκιμαστήριον πρὸς ἀνέυρεσιν τοῦ ἀνακαλύψαντος· οὕτω π. χ. τὸ θεϊκὸν ὄξύ εἶναι δοκιμαστήριον ἐπὶ τῆς βαρεῖας, καὶ ἡ βαρεῖα ἐπὶ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος. Μεταχειριζόμεθα δὲ τὰ δοκιμαστήρια καὶ πρὸς ἐξίχνευσιν τῆς παρουσίας ἢ ἀπουσίας τινῶν οὐσιῶν. Διὰ νὰ μὴ συμβῶσιν ἀπάται, ἀπαιτεῖται μεγίστη χημικὴ καθαριότης τῶν δοκιμαστηρίων.

Συνήθως τὰ δοκιμαστήρια φανερόνουσι τὴν ζητουμένην ὕλην διὰ μεταβολῆς τοῦ χρώματος, διὰ θολώσεως τῶν διαλυμάτων, καθὼς καὶ διὰ τοῦ σχηματισμοῦ τινὸς ἰζήματος· καθότι σχηματίζονται εἰς τὸ ὕδωρ δυσδιάλυτοι ἢ ἀδιάλυτοι ἐνώσεις, τὰς ὁποίας ἀποτελεῖ τὸ δοκιμαστήριον μετὰ τοῦ διαλυμένου σώματος.

Εἰς τινὰς περιστάσεις τὸ δοκιμαστήριον καὶ ὡς ἐνεργοῦν διαλυτικὸν μέσον ἐπὶ τῆς ἐξίχνευομένης οὐσίας, καὶ διὰ τοῦ ἀποτελουμένου διαλύματος, καθὼς καὶ διὰ τοῦ χρώματος, δύναται νὰ φανερώσῃ

τὴν φύσιν τῆς ὕλης· καθὼς π. χ. ἡ ἀμμωνία λαμβάνει κυανωπὸν χρῶμα διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ.

Τὰ δοκιμαστήρια ἔχουν διάφορον εὐαισθησίαν, δηλαδή διαφέρουσιν ὡς πρὸς τὴν ἐπιδεκτικότητα τοῦ νὰ ἀνακαλύπτωσι διὰ τινος μεταβολῆς τὰς εἰς ἴσὴν ποσότητες εὐρισκομένας διαφόρους ὕλας. Ἡ εὐαισθησία τοῦ δοκιμαστηρίου κρέμαται ἀπὸ τὸ ποσὸν τῆς ὕλης καὶ ἀπὸ τὸν βαθμὸν τῆς διὰ τοῦ ὕδατος λεπτύνσεως αὐτῆς· μεταξὺ πολλῶν δοκιμαστηρίων εὐαισθητότερον εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον φανερώνει τὴν διαλελυμένην ὕλην εἰς τὸν μεγαλύτερον βαθμὸν τῆς λεπτύνσεώς της. Ὅσον πάλιν τὸ διάλυμα τοῦ δοκιμαστηρίου εἶναι κεκραμένον, τόσον ὀλιγωτέρα εἶναι ἡ εὐαισθησία του, καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ μεταχειριζώμεθα τὰ δοκιμαστήρια εἰς τὴν μεγαλητέραν των πυκνότητα. Ἰπάρχει δὲ διαφορὰ καὶ ὡς πρὸς τὸν καιρὸν, καθ' ὃν θέλει φανῇ, μετὰ τὴν προσθήκην τοῦ δοκιμαστηρίου, ἡ ἀλλοίωσις, ἡ θόλωσις, ἡ τὸ καταβύθισμα· καὶ ὅσον μεγαλητέρα εἶναι ἡ λέπτυνσις τῶν δοκιμαστηρίων καὶ τῶν ἐξεταζομένων ὑλῶν, τόσον βραδύτερα παρουσιάζονται τὰ προρρήθέντα φαινόμενα· ὥστε δὲν πρέπει νὰ υποθέσωμεν παντελεῖ ἔλλειψιν τοῦ ζητουμένου σώματος, ἐὰν δὲν σχηματίζεται εὐθὺς ἡ θόλωσις ἢ τὸ καταβύθισμα, ἐξ ἐναντίας τὸ μετὰ τοῦ δοκιμαστηρίου ἀναμιγνυόμενον ρευστὸν πρέπει ν' ἀφίνεται καιρὸν τινα, καὶ εἰς περιστάσεις σημαντικῆς λεπτύνσεως δύναται νὰ ἀναγκαιῶσι καὶ ἡμέραι, ἕωσού φανῇ τὸ κατακρήνισμα· καθὼς συμβαίνει εἰς τὴν ἀποχώρησιν τῆς ποτάσεως ἐκ τῆς θεικῆς καὶ ἀλικῆς ποτάσεως διὰ τοῦ πυρρικοῦ ὀξέος καὶ εἰς 200 πλάσιαν λέπτυνσιν τοῦ διαλύματος.

Δοκιμαστήριά τινα δὲν δεικνύουσι κανὲν ἀποτέλεσμα ἀμέσως μετὰ τὴν σύμμειξιν τοῦ δοκιμαστηρίου, ἀλλὰ αἰφνηδίως ὅλον τὸ ποσὸν μεταβάλλεται· τοιαύτη εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ διὰ καγκραμίνου βάμματος πρὸς τὰ ἀσθενῆ ὀξέα ἐξόχως πρὸς τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ.

Τὰ δοκιμαστήρια μεταχειρίζονται συνήθως εἰς διαλελυμένην κατάστασιν, καὶ ὡς διαλυτικὸν μέσον χρησιμεύει τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ· ὡσαύτως τὸ πρὸς ἐξίχνευσιν σῶμα εὐρίσκεται εἰς τὸ ὕδωρ διαλελυμένον ἢ ἀφ' ἐαυτοῦ τοῦ ἢ διὰ τῆς βοηθείας τινὸς ὀξέος. Ἐὰν τὸ δοκιμαστήριον ᾗ διὰ λύσιμον, δύναται νὰ προστεθῇ εἰς τὸ ἐξετασθόμενον ρευστὸν εἰς στερεὰν κατάστασιν.

Ἡ δοκιμασία δύναται νὰ ἐκτελεσθῇ καὶ κατὰ πυροχημικὴν ὁδόν· αὕτη δὲ γίνεται, ἐὰν διαλυθῇ τὸ πρὸς ἐξέτασιν σῶμα ἢ ἀφ' ἐαυτοῦ, ἢ διὰ τῆς συμμιξέως του μετὰ διαφόρων τῇ τῆξιν ἐπιταχυνόντων μέσων, διὰ

τοῦ σαλπιγγίου ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων, οὕτω δὲ ἐξιχνεύεται τὸ σῶμα πολλάκις καὶ ταχέως καὶ μετὰ πάσης βεβαιότητος. Ἐὰν ἡ διάλυσις τῆς ἐξετασθησομένης ὕλης γίνεται δι' ὀξέος τινὸς καὶ ὄχι μόνον δι' ὕδατος, τότε ἀλλοιοῦται πολλάκις ἡ ἐνέργεια τοῦ δοκιμαστηρίου, καὶ εἰς τοιαύτας περιστάσεις πρέπει πρῶτον νὰ ἐξουδετερωθῇ τὸ ρευστὸν διὰ τινος βάσεως. Ἡ ἐνέργεια τῶν δοκιμαστηρίων τροποεῖται πολλάκις, ἐὰν τὸ διὰ τοῦ δοκιμαστηρίου καταβυθιζόμενον σῶμα εὗρεθῇ ἠνωμένον μετ' ἄλλων διαφόρων σωμάτων, καθότι μεταβάλλεται τὸ χρῶμα τῶν κατακρημνισμάτων.

Ὅξικον ὀξύ. *Acidum aceticum.*

Τὸ ὀξικὸν ὀξύ χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ἀεροειδοῦς ἀμμωνίας, πρὸς τοῦτο προσεγγίζομεν εἰς ὕλην, εἰς ἣν ὑποτίθεται ἡ ὑπαρξίς τῆς ἀμμωνίας, ὑελίνην ῥάβδον, ἢ ὑέλινον σωλῆνα βραχέντα μετὰ ὀξικοῦ ὀξέος. Ἐὰν ὑπάρχῃ ἀμμωνία, ἐκλύονται καὶ παρουσιάζονται ἐπὶ τῆς ὑελίνης ῥάβδου λευκοὶ ἀτμοί, συνιστάμενοι ἐξ ὀξικῆς ἀμμωνίας. Χρησιμεύει τὸ ὀξικὸν ὀξύ πρὸς ἐξουδετέρωσιν τινῶν βάσεων, δηλ. τινῶν ἀνθρακικῶν ἀλκαλίων καὶ γαιῶν εἰς τὰ ἱαματικά ὕδατα.

Τὸ ἀπεσταγμένον ὄξος μεταχειρίζεται πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ μολύβδου εἰς διάφορα ξηρεῖα, καθότι τὸ παρὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος εὐδιάλυτον ὀξειδίου τοῦ μολύβδου διαλύεται εὐκόλως καὶ παρὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀκολούθως δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου· τὸ τοιοῦτον δὲ ὄξος λαμβάνει γλυκεῖαν στυπτικὴν γεῦσιν, ἔνεκα τοῦ διαλυμένου μολύβδου· εἶναι πολὺ εὐαίσθητον ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ σιδήρου, δι' οὗ ἀποτελεῖται ἐρυθρόφαιον καταβύθισμα.

Ἀρσενικὸν ὀξύ ὑγρὸν. Acidum arsenicum liquidum.

Εἶναι πολὺ εὐαίσθητον ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἀργύρου, δι' οὗ ἀποτελεῖται ἐρυθρόφαιον καταβύθισμα.

Ὑδροθεικὸν ὀξύ. *Acidum hydrothionicum.*

Τὸ ὑδροθεικὸν ὀξύ εἰς ἀεροειδῆ καὶ ρευστὴν κατάστασιν εἶναι ἐν τῶν σημαντικωτέρων δοκιμαστηρίων πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν μετάλλων. Ὁ χρυσὸς καταβυθίζεται ἐκ τῆς μετὰ 100 μερῶν ὕδατος κεκραμένης διαλύσεως τοῦ διὰ φαιοῦ, ἢ μέλανος ἰζήματος· εἰς τὴν μετὰ 1000 μερ. λε-

πτυνομένην διάλυσιν δὲν ἀποτελεῖται εὐθὺς καταβύθισμα, τὸ δὲ διάλυμα χρωματίζεται φαιὸν καθὼς τὸ τοῦ χαλκοῦ.

Εἰς τοῦ λευκοχρύσου τὸ διάλυμα ἀποτελεῖται βαθύφαιος χρωματισμός, ὅχι ὅμως ἴζημα.

Ὁ ἄργυρος ἀποκρίνεται μετὰ φαιομέλανος χρώματος· ἐὰν δὲ τὸ διάλυμα ᾗναι κεκραμένον μετὰ 2,000 μερῶν ὕδατος, ἀποτελεῖται φαιὸς χρωματισμός, καὶ ἐὰν μετὰ 60,000 μερ. ὕδατος, δὲν ἀποτελεῖται πλέον καταβύθισμα.

Υδροάργυρος. Τὰ εἰς τὴν καταβύθισιν τοῦ ὑδραργύρου διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος φαινόμενα διαφέρουσι κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς ὀξειδώσεως τοῦ ὑδραργύρου καὶ κατὰ τὸ ποσόν, εἰς τὸ ὁποῖον προστίθεται τὸ ὑδροθειικόν ὀξύ. Τὸ διάλυμα τοῦ ὀξειδωμένου ἀλικοῦ ὑδραργύρου μεταβάλλεται διὰ μικροῦ ποσοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος εἰς ὑποξειδωμένον ἀλικὸν ὑδράργυρον, καταβυθίζομενον εἰς εἶδος λευκοῦ ἴζηματος, τὸ ὁποῖον γίνεται μέλαν, προστεθέντος πλειότερου ποσοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος. Ἐὰν διάλυμα τοῦ ὀξειδωμένου ἀλικοῦ ὑδραργύρου ἀναμιχθῇ μετὰ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, μεταβάλλεται εἰς λευκόν, κίτρινον, χρυσοειδές, καὶ τέλος μέλαν. Ἐὰν λεπτυνθῇ, μετὰ 15,000 μερ. ὕδατος, ἀποτελεῖται λευκὸς χρωματισμός, καὶ μετὰ 24 ὥρας καταβυθίζονται φαιαὶ κροκίδες.

Σχεδὸν τὴν ἰδίαν εὐαισθησίαν πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ὑδραργύρου ἔχει ὁ χαλκός· π. χ. μικρὸν στίλβον χαλκοῦν νόμισμα, τεθὲν εἰς διάλυσιν ὑδραργύρου καλύπτεται μετὰ τεφροχρόου ὑμένος, ὅστις στίλβονοῦται διὰ τῆς λειώσεως.

Ὁ μόλυβδος καταβυθίζεται ἐξ ὅλων τῶν διαλυμάτων του καὶ κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς λεπτύνσεως μετὰ μέλανος, φαιομέλανος, ἢ φαιοῦ χρώματος. Ἐκ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου φαίνεται τὸ ἴζημα πύραυτα μέλαν. Τὰ διαλύματα τοῦ μολύβδου κεκραμένα μετὰ 110,000 ὕδατος παρέχουσι φαιὰς κροκίδας. Ὁ νιτρικὸς μόλυβδος κεκραμένος μετὰ 10,000 μερῶν ὕδατος χρωματίζεται φαιός, ἀκολούθως ἀποτελεῖται καὶ τοιοῦτον ἴζημα.

Ὁ κασσίτερος καταβυθίζεται διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος μετὰ διαφόρων χρωμάτων κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς ὀξειδώσεως αὐτοῦ. Ἐὰν τὸ ὑδροθειικόν ὀξύ ὑγρὸν ἀναμιχθῇ μετὰ διαλύσεως τοῦ ὑδροχλωρικοῦ κασσιτέρου οὐδετέρου, ἀποτελεῖται μέλαν ἴζημα. Ἐὰν τὸ τοῦ κασσιτέρου διάλυμα ᾗναι κεκραμένον μετὰ 10,000 μερ. ὕδατος, λαμβάνει χρῶμα βαθύφαιον, μετὰ 100,000 μερ. ἀνοικτόφαιον, καὶ μετὰ 120,000, δύναται εἰσέτι νὰ ἀνακαλυφθῇ.

Ὁ χαλκὸς ἀποκρίνεται διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος μετὰ μέλανος, ἢ μελανοφαίου χρώματος κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς δι' ὕδατος λεπτύνσεως· ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦ θειικοῦ χαλκοῦ ᾖναι κεκραμένον μετὰ 40,000 μερκαταβυθίζεται ὁ χαλκὸς μετὰ φαιοῦ χρώματος· ὡσαύτως ἀποκρίνεται καὶ τὸ βισμούθιον.

Ἀρσενικόν. Τὸ ἀρσενῶδες ὀξύ καταβυθίζεται διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος μετὰ χρυσοειδοῦς χρώματος, καὶ κεκραμένον μετὰ πλειότερου ὕδατος γίνεται τὸ ἴζημα κίτρινον· τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα κατὰκάθεται μετὰ βραδύτητος· καὶ ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦ ἀρσενώδους ὀξέος ᾖναι κεκραμένον μετὰ 1,000 μερ. ὕδατος, δὲν ἀποχωρίζεται καταβύθισμα μετὰ περὶλευσιν 24 ὥρων. Ἐξ ἐναντίας ἀποχωρίζεται τὸ ἴζημα διὰ τῆς παγώσεως τοῦ ὕδατος, καθὼς καὶ διὰ τῆς προσθήκης τινὸς ὀξέος λ. χ. τοῦ ὑδροχλωρικοῦ, τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος, καθὼς καὶ διὰ τοῦ ἀρσενικοῦ ὀξέος. Εἰς διάλυσιν κεκραμένην μετὰ 60,000 μερ. ὕδατος, ἀποτελεῖται μόνον κίτρινος χρωματισμὸς διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος· ἐὰν δὲ τὸ ὑδροθειικὸν ὀξύ εἰς ἀρσενιδῇ κατάστασιν διοχετευθῇ διὰ διαλύματος τοῦ ἀρσενώδους ὀξέος, ἀποτελεῖται κίτρινος χρωματισμὸς, καὶ ἂν αὐτὸ ᾖναι κεκραμένον μετὰ 200,000 μερ. ὕδατος.

Ἐπὶ τῶν ἀρσενωδῶν ἀλάτων δὲν ἐνεργεῖ τὸ ὑδροθειικόν ὀξύ, καὶ ἐνεκα τούτου πρέπει πρότερον νὰ ἀναμιχθῶσι τὰ ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἀρσενικοῦ ἐξετασθησόμενα ρευστὰ μετὰ τινος ὀξέος, ὡς μετὰ ὀξικοῦ ἢ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Τὸ ἀρσενικόν ὀξύ παρέχει τὰ ἴδια φαινόμενα μὲ τὸ ἀρσενῶδες, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι πρέπει νὰ διοχετεύεται τοῦτο περισσότερον καιρὸν παρομοίως δὲν ἐνεργεῖ τὸ ὑδροθειικόν ὀξύ ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ ἀρσενικοῦ ὀξέος σχηματιζομένων ἀλάτων.

Στίμιον. Διάλυμα τῆς ἐμετικῆς τρυγὸς χρωματίζεται διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος χρυσοειδές, χωρὶς ποσῶς νὰ κατακρημνίζεται ἴζημα, μήτε διὰ τῆς ζέσεως, μήτε διὰ τῆς πήξεως τοῦ ὑγροῦ. Τὸ δὲ ἴζημα ἀποτελεῖται διὰ τῆς προσθήκης τῶν ὀξέων, ὡς τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος.

Τὸ κάδμιον καταβυθίζεται ἐκ τῶν διαλυμάτων του μετὰ κιτρίνου χρώματος, δι' ὑπερτερούσης ποσότητος ὑδροθειικοῦ ὀξέος μετὰ χρυσίζοντος, ὡς τὸ τοῦ ἐνθείου ἀρσενικοῦ.

Τὸ μολυβδαίνιον ἀποκρίνεται μετὰ βαθυφαίου, τὸ δὲ τελλούριον μετὰ μέλανος χρώματος.

Ἡ καταβύθις τοῦ σιδήρου παρὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος ἐξαρτᾶ

ται ἀπὸ τὸ ὀξύ τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἡνωμένον μετὰ τοῦ σιδήρου, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν βαθμὸν τῆς ὀξειδώσεως. Ὁ σίδηρος καταβυθίζεται ἐκ τῶν διὰ τοῦ ὀξικού, τρυγικοῦ καὶ ὀξάλικοῦ ὀξέος ὡς καὶ ἐκ τῆς θειϊκῆς ἐνώσεως, ἐὰν πρότερον κορεσθῇ τὸ θειϊκὸν ὀξύ διὰ τῆς ἀμμωνίας. Ἡ ὑπαρξίς ὑπερτερούντων ὀξέων ἐμποδίζει τὴν καταβύθισιν τοῦ σιδήρου· ἔνεκα τούτου τὸ μετὰ τρυγικοῦ ὀξέος ἀναμεμιγμένον ὑδροθειϊκὸν ὀξύ ἀνευρίσκει μόνον τὰ εἰς τὰ ρευστὰ ἐμπεριεχόμενα ἐπιβλαβῆ μέταλλα, ὡς τὸν μόλυβδον, τὸν χαλκὸν, ὅχι δὲ καὶ τὸν ἀβλαβῆ σίδηρον.

Διὰ λευκοῦ ἰζήματος κατακρημνίζεται ὁ ψευδάργυρος ἐκ τῶν διαλύσεων τοῦ διὰ τοῦ ὑδροθειϊκοῦ ὀξέος, δὲν κατακρημνίζονται δὲ τὸ μαγγανήσιον, τὸ οὐράριον, τὸ χρώμιον, τὸ τιτάνιον, δημήτριον, καὶ τὸ ταρτάλιον. Τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν καθὼς τὸ ἐκτεθὲν ὕδωρ ἔχει τὸ ὑδροθειωμένον ἀέριον, τὸ ὁποῖον πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν μετάλλων διοχετεύεται διὰ τῶν διαλυμάτων.

Ὑδροθειϊκὸν ὀξύ ὑγρὸν μετὰ τρυγικοῦ ὀξέος. *Acidum hydrothionicum liq. c. acido tartarico. Liquor probatorius Hahnemanni.*

Τοῦτο τὸ δοκιμαστήριον κατασκευάζεται, ἐὰν 2 δράμια ἐνθίου τιτάνου καὶ 2 τρυγικοῦ ὀξέος διαλυθῶσιν εἰς 16 οὔγγιας ἀπεσταγμένου ὕδατος. Μετὰ παρέλευσιν τινῶν ἡμερῶν διυλίζεται τὸ ρευστὸν καὶ φυλάττεται εἰς καλῶς κλεισμένην φιάλην ἐμπεριέχουσαν 4 δράμια ἐτέρου τρυγικοῦ ὀξέος.

Τοῦτο τὸ δοκιμαστήριον μεταχειρίζεται ἰδίως πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ μολύβδου, τοῦ ἀρσενικοῦ, τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ στίμμεως, καὶ προτιμᾶται ἀπὸ τὸ ὑδροθειωμένον ὕδωρ, ἐπειδὴ τὸ ἐλευθέρον τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος ὑδροθειϊκοῦ ὀξύ ἐμποδίζει τὴν καταβύθισιν τοῦ ἴσως ἐμπεριεχομένου ἀβλαβοῦς σιδήρου. Τὸ ἀρσενικὸν ὀξύ, τὸ ὁποῖον δὲν φανεροῦται πλέον διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος, ἀνακαλύπτεται ἐὰν ἐμπεριέχεται μόνον $\frac{1}{10000}$ καὶ $\frac{1}{20000}$ καὶ ἀποκρίνεται μετὰ παρέλευσιν ἐνὸς τετάρτου εἰς εἶδος κίτρινου ἰζήματος.

Μηκωρικὸν ὀξύ. *Acidum meconicum.*

Μεταχειρίζεται πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων, ἅτινα χρωματίζονται διὰ τοῦ μηχανικοῦ ὀξέος αἰμοδαφῆ.

Υδροχλωρικὸν ὀξύ. Acidum muriaticum.

Τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ εἶναι τὸ πλέον εὐαίσθητον δοκιμαστήριον πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ἀργύρου, καθότι ὁ ἄργυρος καὶ εἰς μεγάλην λεπτύνσιν τῶν διαλυμάτων, εἰς τὰ ὅποια ὑπάρχει ὡς ὀξειδίου, ἀποχωρίζεται διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἐν μορφῇ κροκιδοειδοῦς λευκῆς ὑποστάθμης, ἥτις μελανοῦται διὰ τοῦ φωτὸς καὶ διαλύεται εἰς τὴν ὑγρὰν ἀμμωνίαν· εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἐνοῦται τὸ ὀξυγόνον τοῦ ὀξειδίου τοῦ ἀργύρου μετὰ τοῦ ὑδρογόνου τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος πρὸς ὕδωρ, τὸ δὲ χλώριον μετὰ τοῦ μεταλλικοῦ ἀργύρου, πρὸς ἐγχλώριον ἄργυρον.

Τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ ἀποκρίνει καὶ τὸν ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον ἐκ τῶν ἀλάτων του, ὡς ὑδροχλωρικὸν ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον, καὶ εἰς σημαντικὸν βαθμὸν λεπτύνσεως, εἰς εἶδος λευκῆς θολώσεως. Πρὸς τούτοις μεταχειρίζεται τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, καθὼς καὶ τὸ ὀξικὸν ὀξύ διὰ τὴν ἐξίχνευσιν τῆς ἀμμωνίας, εἰς ἣν περίστασιν ἡ ὑδροχλωρικὴ ἀμμωνία ἀναφάνεται εἰς εἶδος λευκῶν ἀτμῶν. Μεταχειριζόμεθα τέλος τὸ ὀξύ τοῦτο καὶ διὰ νὰ διαλύσωμεν τινὰ σώματα.

Acidum muriaticum oxygenatum seu Chlorium. Χλώριον

Τὸ χλώριον χρησιμεύει πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ διττοῦδρογονανθρακούχου αερίου, καθότι σχηματίζει μετ' αὐτοῦ ἐλαϊώδη ἔνωσιν, ἐὰν ἀποκλεισθῇ ἡ τοῦ φωτὸς ἐπιρροή. Ἐνεργεῖ καὶ ἐπὶ τοῦ ὀξειδίου τοῦ ἀνθρακος, μετὰ τοῦ ὁποίου ἐνοῦται πρὸς σχηματισμὸν τοῦ διὰ τοῦ φωτὸς γεννωμένου αερίου. Εἰς διαλελυμένην κατάστασιν μεταχειρίζεται πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ ποσοῦ τοῦ διαλελυμένου ἰνδικοῦ Indigo.

Υδροκυανικὸν ὀξύ ὑγρόν. Acidum hydrocyanicum liquidum.

Ἀποτελεῖ εἰς διάλυμα τοῦ χαλκοῦ, ἀναμιχθέντος μετὰ βάμματος τοῦ ἱεροξύλου, κυανοῦν κατακρήμνισμα.

Νιτρικὸν ὀξύ. Acidum nitricum.

Τοῦτο τὸ ὀξύ, τὸ ὅποion εἶναι πολὺ χρήσιμον εἰς τὴν χημίαν καὶ φαρμακοποιάν, μεταχειρίζεται ὡς δοκιμαστήριον, ἐξόχως ὡς διαλυτικὸν μέσον πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς φύσεως τινῶν κατακρήμνισμάτων, καὶ πρὸς ἀποχώρησιν τῶν εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ διαλυσίμων ἀπὸ τῶν εἰς αὐτὸ ἀδιάλυτων σωμάτων· οὕτω τὰ καταβυθίσματα, τὰ ὅποια ἀποτελοῦνται διὰ

τῆς βαρείας, τῆς τιτάνου, τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, καὶ διὰ τῶν φυτικῶν ὀξέων, ὡς διὰ τοῦ ἠλεκτρικοῦ καὶ ἀρσενικοῦ ὀξέος, εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ, καὶ λεπτυνόμενον διὰ πολλοῦ ὕδατος· ἐξεναντίας τὰ διὰ τῆς βαρείας κατακρήμνισμα, τὸ προαγόμενον διὰ τοῦθεικοῦ ὀξέος, εἶναι πάντῃ ἀδιάλυτον εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ, καὶ ὁθειῖκός μολύβδος διαλύεται μόνον διὰ μεγάλου ποσοῦ νιτρικοῦ ὀξέος λεπτυνόμενου. Ἐκτὸς τούτου μεταχειρίζεται πρὸς ἐξουδετέρωσιν τῶν ρευστῶν.

Ἐρθειοκυανικὸν ὀξύ ὑγρόν. Acidum sulphocyanicum liquidum.

Εἶναι πολλὰ εὐαίσθητον δοκιμαστήριον ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων, ἅτινα χρωματίζονται αἰμοθαφῇ· τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν δεικνύουν καὶ τὰ διὰ ἐνθειοκυανικοῦ ὀξέος ἄλατα.

Θειικὸν ὀξύ. Acidum sulphuricum.

Τὸθειῖκόν ὀξύ εἶναι τὸ καταλληλότερον δοκιμαστήριον πρὸς ἀνέυρεσιν τῆς βαρείας, καθότι δι' αὐτοῦ ἀποτελεῖται ἡθειῖκή βαρεῖα, ἥτις παρίσταται ὡς κατακρήμνισμα πάντῃ ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ. Δι' αὐτοῦ ἀνακαλύπτεται καὶ παραμικρὰ ποσότης αὐτῆς διὰ τινος θόλωσης λευκῆς. Εἰς διάλυσιν ἐξ 100,000 μερῶν ὕδατος καὶ ἐνὸς χλωρικῆς βαρείας ἀποτελεῖται ἀμέσως σημαντικὴ θόλωσις· ἀποτελεῖται δὲ θύλωσις καὶ εἰς διάλυσιν 200,000 μεριδίων ὕδατος καὶ 1 χλωρικῆς βαρείας.

Τὸθειῖκόν ὀξύ εἶναι ὡσαύτως κατὰλληλον δοκιμαστήριον πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ ὀξειδωμένου μολύβδου, σχηματίζον μετ' αὐτοῦ ἀδιάλυτονθειῖκόν μολύβδον. Ἐκ τοῦ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος διαλύματος τοῦ μολύβδου κατακρήμνίζεται ὁ μολύβδος διὰ τοῦθεικοῦ ὀξέος, καὶ ἂν ᾦναι κεκραμένος μετὰ 20,000 μερ. ὕδατος, ἐκ δὲ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος, ἐὰν ᾦναι διαλελυμένος μετὰ 5,000 μερῶν.

Τὸθειῖκόν ὀξύ διὰ τῆς συμβοηθείας τῆςθειῖκῆς ποτάσσης, χρησιμεύει παρομοίως πρὸς ἀποχώρησιν τῆς ἀργίλλου ἐκ τῆς διαλύσεώς της, προάγει στυπτηρίαν, τῆς ὁποίας τὸ διάλυμα, ἐὰν ἀφθεῖ ἡσύχως καιρὸν τινα, κρυσταλλοῦται. Τὸθειῖκόν ὀξύ ἀποχωρίζει ἅπαντα τὰ λοιπὰ ὀξέα ἐκ τῶν ἐνώσεων των, τὰ ὅποια ἀκολούθως δύνανται νὰ γνωρισθῶσι διὰ τῶν χαρακτηριστικῶν, καθὼς τὸ ἀνθρακικόν, ὀξικόν, νιτρικόν, ὑδροχλωρικόν, καὶ βορικόν ὀξύ.

Θειῶδες ὀξύ. *Acidum sulphurosūm.*

Δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς ἀνακάλυσιν τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, σχηματίζον μετ' αὐτοῦ ὕδωρ, τὸ δὲ θεῖον ἀποχωρίζεται.

Τρυγικὸν ὀξύ. *Acidum tartaricum.*

Ἐξίχνευει τὸ καυστικὸν κάλιον, καθὼς καὶ τὰ διὰ καλίου ἅλατα, ἐπειδὴ τὰ διαλύματα αὐτοῦ ὑπερκορεσμένα ἀπὸ τὸ τρυγικὸν ὀξύ σχηματίζουν μετὰ τινὰ καιρὸν κρυστάλλους τρυγικοῦ καλίου ὑποξίνου· διὰ τοῦ δοκιμαστηρίου τούτου δύναται νὰ ἐξίχνευέται, ἂν ἡ βάσις τῶν διαφόρων ἀλάτων ᾖ καὶ τὸ κάλιον, ἢ τὸ νάτρον, καὶ συγχρόνως δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ τὸ κάλιον ἀπὸ τὸ νάτρον διὰ τοῦ εἰρημένου ὀξέος.

Αἰθήρ διὰ θεϊκοῦ ὀξέος. *Aether sulphuricus.*

Ὁ αἰθήρ μεταχειρίζεται εἰς ἀνάλυσιν τῶν φυτῶν, πρὸς διάλυσιν διαφόρων ὑλῶν ἀδιαλύτων ἢ δυσδιαλύτων εἰς τὰ ἄλλα ῥευστά· λ. χ. πρὸς διάλυσιν τῶν αἰθερίων ἐλαίων, τοῦ φωσφόρου, τινῶν ὀξειδωμένων ἀλάτων, τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου, τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου, τοῦ χρυσοῦ, τοῦ χαλκοῦ· ἰδίως δὲ εἶναι χρήσιμος πρὸς εξέταση τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου, ἂν δηλ. ᾖ ἐλεύθερος ἀπὸ τὸν ἀλικὸν ὀξειδωμένον ὑδραργυρον, ὅστις ὡς διαλύσιμος εἰς τὸν αἰθέρα, δύναται νὰ ἀνακαλυφθῇ μετ' ἐρυθροῦ χρώματος διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος, καὶ μετὰ μέλανος διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου.

Οἰνόπνευμα λεῖψυδρον. *Alcohol absolutum.*

Χρησιμεύει πρὸς ἀποχώρησιν τινῶν οὐσιῶν ἀπ' ἀλλήλων, οὕτω λ. χ. τὰ θεϊκὰ τὰ φωσφορικὰ ἅλατα εἶναι ἀδιάλυτα εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Ἡ νιτρικὴ καὶ ἀλικὴ πότασσα, σόδα, βαρεῖα, ἡ φθωρικὴ, τρυγικὴ καὶ ὀξαλικὴ βαρεῖα, πότασσα, σόδα, στροντιανή, τίτανος καὶ μαγνησία, καθὼς καὶ ἅπασαι αἱ ἐνώσεις τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν βάσεων δὲν διαλύονται εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Τὸ οἰνόπνευμα χρησιμεύει καὶ πρὸς δοκιμασίαν τῆς καθαρότητος πολλῶν εἰς αὐτὸ διαλυσίμων ἀλάτων καὶ ὀξέων, λ. χ. πρὸς δοκιμασίαν τῆς ὀξαλικῆς ποτάσσης, τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος κτλ. καθότι τὰ συμμεμιγμένα θεϊκὰ καὶ φωσφορικὰ ἅλατα ἐπιμένουσιν

αδιάλυτα· προσέτι χρησιμεύει διὰ νὰ δοκιμάζωμεν ἄλατα εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτα ἐπὶ τῆς παρουσίας τινὸς εἰς αὐτὸ εὐδιάλυτου ἄλατος· τὸν λύχνον ὑδροχλωρικὸν ὑποξειδωμένον ὑδραργύρον, ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἀλικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου. Τὸ οἰνόπνευμα χρησιμεύει πρὸς ἀνάλυσιν τῶν ἀλάτων, τὰ ὅποια ἐπιμένουσι μετὰ τὴν ἐξάτμισιν τῶν ἱαματικῶν ὑδάτων, καὶ πρὸς ἀποχώρησιν τῶν εἰς αὐτὸ διαλυσίμων ἀλάτων, καθὼς τῆς ὑδροχλωρικῆς τιτάνου, τῆς ἀλικῆς μαγνησίας καὶ ἀργίλλου ἀπὸ τὰ λοιπὰ τὸ κοινὸν ἄλας εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ οἰνόπνευμα. Τὰ εἰς τὸ οἰνόπνευμα ἀδιάλυτα ἄλατα καθυθίζονται ἐκ τῶν ὑδατωδῶν διαλύσεων των διὰ τοῦ οἰνοπνεύματος, καθότι ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῶν τὸ διαλυτικὸν μέρος τὸ ὕδωρ. Τὸ οἰνόπνευμα διαλύει τὸ βορικὸν ὀξύ, καὶ τὸ διάλυμα καίει μετὰ πρασίνης φλογός.

Πρὸς ἀνακάλυψιν βορικοῦ τινος ἄλατος, ἐπιχύνεται τὸ πρὸς ἐξέτασιν ἄλας μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος καὶ οἰνοπνεύματος. Ἐὰν τὸ μίγμα τοῦτο ἀναφλεγόμενον καίῃ μὲ πρασίνην φλόγην, καταλαμβάνομεν ὅτι περιέχει βορικὸν ὀξύ· τὸ δὲ οἰνοπνεύματος διάλυμα τῆς στροντιανῆς καὶ τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρείας δίδει, ἐὰν ἀναφλεχθῇ, ἐρυθρὰν φλόγα. Τὸ οἰνόπνευμα διαλύει προσέτι πολλὰς φυτικὰς οὐσίας καὶ τινὰς ζωϊκὰς, καθὼς τὸν κηρὸν καὶ πολλὰς ἄλλας λιπώδεις ὕλας, ῥητίνας, βάλσαμα κτλ. ἐξ ἐναντίας τὸ κόμμι, τὸ σιτάμυλον, τὸ λεύκωμα, τὸ πήκτωμα, ἢ τοῦ γάλακτος ζάχαρις εἶναι εἰς αὐτὸ ἀδιάλυτα. Χρησιμεύει προσέτι καὶ πρὸς ἐξέτασιν τῆς καθαριότητος τοῦ κιρκίνου ἐλαίου, τὸ ὅποιον εἶναι ἐντελῶς διαλύσιμον εἰς τὸ οἰνόπνευμα· ὁμοίως ἀνακαλύπτομεν, ἂν τὰ πτητικὰ ἔλαια ᾖναι καθαρὰ ἀπὸ τὰ ἔμμωνα, καθότι ταῦτα εἶναι εὐδιάλυτα εἰς τὸ οἰνόπνευμα· ὡσχύτως ἂν ἡ θεϊκὴ κιννίνη ᾖναι καθαρὰ ἀπὸ ζάχαριν. Ἄπαντα τὰ διὰ τῶν φυτικῶν ἀλκαλίων ἄλατα εἶναι διαλύσιμα.

Στυπτηρία. *Alumen.*

Καταθυθίζει τὰς διαλελυμένας ἐκχυλισματικὰς ὕλας εἰς εἶδος θρόμβων.

Θεϊκὴ ἀργίλλος ὑγρὰ. *Aluminium sulphuricum.*

Χρησιμεύει πρὸς ἐξίχνευσιν τῶν διὰ καλίου καὶ δι' ἄμμωνίας ἀλάτων, τῶν ὁποίων τὰ διαλύματα ἀναμιγνύομενα μετὰ τῆς διαλύσεως τῆς θεϊκῆς ἀργίλλου, σχηματίζουνσι καταβύθισμα κρυσταλλώδες.

Αμμωνία καυστική υγρά. Ammonium causticum liquidum.

Ἡ καυστική ἀμμωνία υγρὰ χρησιμεύει πρὸς ἀποχώρησιν τινῶν εἰς αὐτὴν ἀδιαλύτων γαιῶν καὶ ὀξειδίων τῶν μετάλλων ἀπὸ ἄλλα εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα τῆς ἀμμωνίας διαλυσίμων. Τοιουτοτρόπως ἀποχωρίζονται παρὰ τῆς ἀμμωνίας τὸ ὀξείδιον τοῦ σιδήρου καὶ ἡ ἄργιλλος ἀπὸ τὴν βαρεῖαν, στροντιανήν, τίτανον· προσέτι αἱ γαῖαι αὗται ἀποχωρίζονται ἀπὸ τὸ ὀξείδιον τοῦ ψευδαργύρου, καὶ τοῦ χαλκοῦ, καθότι τὰ δύο τελευταῖα εἶναι διαλύσιμα εἰς τὴν καυστικὴν ἀμμωνίαν. Ἰδίως μεταχειρίζεται ἡ καυστικὴ ἀμμωνία πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ διὰ τοῦ πρασινωποῦ ἰζήματος· τοῦτο δὲ διὰ περισσοτέρως ἀμμωνίας διαλύεται πάλιν, λαμβάνον ὠραῖον κυανοῦν χρῶμα.

Ἡ καυστικὴ ἀμμωνία καταβυθίζει τὸν ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον ἐκ τῶν διαλύσεών του, καὶ ὁ ὑπαξειδωμένος νιτρικὸς ὑδράργυρος εἶναι ἀξιόλογον δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ μικροτάτου ποσοῦ ἀμμωνίας. Χρησιμεύει τέλος εἰς τὸ νὰ διακρίνωμεν τὸν ἀλικὸν ἄργυρον ἀπὸ τὸν ἀλικὸν μόλυβδον καὶ ἀλικὸν ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον, καθότι οὗτοι δὲν διαλύονται εἰς τὴν υγρὰν ἀμμωνίαν, ἐνῶ ὁ ἀλικὸς ἄργυρος εἶναι διαλύσιμος· προσέτι εἰς τὸ νὰ διακρίνωμεν τὸ ἔνθειν ἀρσενικὸν ἀπὸ τὸ ἔνθειν κάδμιον· τὸ μὲν πρῶτον εἶναι διαλύσιμον, τὸ δὲ τελευταῖον ἀδιάλυτον εἰς τὴν ἀμμωνίαν.

Ἀλικὴ ἀμμωνία υγρὰ. Ammonium muriaticum liquidum.

Τὸ διάλυμα τῆς ἀλικῆς ἀμμωνίας χρησιμεύει πρὸς ἀποχώρησιν τῆς ἄργιλλου ἐκ τῆς διὰ τοῦ καυστικοῦ καλίου διαλύσεως, ἥτις, ἐνῶ σχηματίζεται ἀλικὴ πότασσα, καταβυθίζεται εἰς εἶδος κροκίδων. Ἡ ἀλικὴ ἀμμωνία χρησιμεύει καὶ πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς παρουσίας τοῦ καυστικοῦ καλίου, διὰ τοῦ ὁποίου ἐκλύεται ἡ ἀμμωνία εἰς ἀεροειδῆ κατὰστασιν.

Αμμωνία φωσφορικὴ υγρὰ μεθ' ὑπερτεροῦσης βάσεως.

Ammonium phosphoricum basicum liquidum.

Χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν καὶ ἀποχώρησιν τῆς μαγνησίας· ἐὰν προσθέσωμεν εἰς διάλυσιν τῆς μαγνησίας φωσφορικὸν ὕξυ καὶ ἀμμωνίαν εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα, σχηματίζεται, διὰ τῆς συμβοθείας ἀμφοτέρων τῶν ρευστῶν, δυσδιάλυτον καὶ διπλοῦν ἄλας, συνιστάμενον ἐξ ἀμμωνίας, μαγνησίας, καὶ φωσφορικοῦ ὀξέος· τὸ ἄλας

τοῦτο καταβυθίζεται εἰς εἶδος κρυσταλλώδους κόνεως, καὶ εἶναι πάντα ἀδιάλυτον εἰς ῥευστὰ ἐμπεριέχοντα φωσφορικὴν ἀμμωνίαν καὶ φωσφορικὴν σόδαν· ἐὰν δὲ ὑπάρχῃ εἰς τὰ ῥευστὰ ἱκανὸν ποσὸν ταύτης, δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ὁλοτελῶς ἡ μαγνησία ἐκ τοῦ διαλύματος τῆς ὑδροχλωρικῆς καὶθεικῆς μαγνησίας. Ἐὰν διάλυμα τῆς μαγνησίας ᾖ κακαραμένον μετὰ 50,000 μερῶν ὕδατος, δύναται νὰ καταβυθισθῇ ἡ ἐμπεριεχομένη μαγνησία διὰ τοῦ ῥηθέντος δοκιμαστηρίου. Πρὸς ἀποχώρησιν τῆς μαγνησίας ἐκ τῶν ἄλλων γαιῶν, ἢ τῆς ἀργίλλου, τιτάνου ἀναμειγνύεται τὸ ἐξατταθιστόμενον ῥευστὸν πρῶτον μὲ ὑδροχλωρικὴν ἀμμωνίαν, καὶ ἀκολούθως προστίθεται καυστικὴ ἀμμωνία, διὰ τῆς ὁποίας ἀποχωρίζεται ἡ ἐμπεριεχομένη ἀργίλλος. Τοῦτου γενομένου, προστίθεται ὀξάλικὴ ἀμμωνία, καὶ οὕτως ἀποχωρίζεται ἡ τίτανος (ὀξάλικὴ τίτανος)· διῴλισθέντος δὲ καὶ ἀποχωρισθέντος τοῦ κατακρημνίσματος, ἀναμειγνύομεν φωσφορικὴν σόδαν ἢ ἀμμωνίαν μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως, δι' ὧν τὸ ῥευστὸν βολοῦται παρὰ χρῆμα, ἐὰν ἐμπεριέχῃ μαγνησίαν.

Ἵνθρακικὴ ἀμμωνία ὑγρὰ. Ammonium subcarbonicum liquidum.

Ἡ ἄνθρακικὴ ἀμμωνία χρησιμεύει πρὸς κόρον τῶν ὀξέων· δι' αὐτῆς καταβυθίζονται αἱ πλείότεραι ἄνθρακικαὶ γαῖαι, τὸ δὲ κάλιον καὶ νάτρον, ἐὰν ὑπάρχωσι, μένουσιν εἰς τὴν διάλυσιν· παρομοίως διαλύονται τινὰ ὀξειδία τῶν μετάλλων εἰς τὴν ἄνθρακικὴν ἀμμωνίαν, καθὼς τὸ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ.

Ἡλεκτρικὴ ἀμμωνία ὑγρὰ. Ammonium succinatum liquidum.

Ἡ ἡλεκτρικὴ ἀμμωνία χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ σιδήρου, καθότι εἰς τὰ οὐδέτερα διαλύματα τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου γεννᾷ ὑποστάθμην ἐρυθρόφαιον.

Ἵδροθειωμένη ἀμμωνία ῥευστή. Ammonium sulphuratum liquidum.

Πρὸς κατασκευὴν ταύτης διοχετεύεται τὸ ἐκλυόμενον ὑδροθεικὸν ὀξύδι ἀμμωνίας καθαρᾶς ῥευστῆς, ἕως οὗ ἀπορροφᾶται, μετὰ ταῦτα ἐγκλείεται καλῶς τὸ ῥευστὸν εἰς ἀγγεῖα.

Τοῦτο τὸ δοκιμαστήριον ἐνεργεῖ ἐπὶ τῶν διαλυμάτων τῶν μετάλλων, καθὼς τὸ ὑδροθειωμένον ἀέριον, καὶ μάλιστα διὰ τούτου καταβυθίζονται μέταλλα μὴ κατακρημνιζόμενα παρὰ τοῦ ὑδροθειωμένου αἰρίου, καὶ ἔνεκα τούτου θεωρεῖται ὡς πλέον κατάλληλον δοκιμαστήριον ἐπὶ τῶν μετάλλων.

Σιτάμυλον. *Amylum*.

Εἶναι εὐαίσθητον ἀντιδραστήριον ἐπὶ τοῦ ἰώδους, μεθ' οὗ σχηματίζει κυανὴν ἑνώσιν.

Υἰδωρ τιτάνιον. *Aqua calcariae*.

Τὸ τιτάνιον ὑδωρ, διὰ νὰ ᾖναι χρήσιμον ὡς δοκιμαστήριον, πρέπει νὰ ἐμπεριέχῃ ὅσον τὸ δυνατόν πολλὴν τίτανον, καὶ ἔνεκα τούτου πρέπει νὰ μεταχειρίζεται ἀρτικατασκευασθέν. Χρησιμεύει.

α'. Πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς ἀεροσιδῇ ἢ διαλελυμένην κατάστασιν. Ἀέρια ἐμπεριέχοντα μόνον $\frac{1}{100}$ τοῦ ὄγκου τῶν ἀνθρακικοῦ ὀξέος θολοῦνσι τὸ μετ' αὐτῶν ἀνακινούμενον τιτάνιον ὑδωρ. Ἐὰν δὲ τὸ Ἴζημα ἀκριβῶς συναχθῇ καὶ ξηρανθῇ, δύναται νὰ προσδιορισθῇ τὸ ποσὸν τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος· καθότι εἰς κόκκος τοῦ ξηροῦ κατακρημνίσματος ἰσοδυναμεῖ μετὰ τὰ $\frac{3}{4}$ κυβικοῦ δακτύλου ἀνθρακικοῦ αἰρίου εἰς θερμοκρασίαν 0 R.

Ἐὰν μὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τιτάνιον ὑδωρ συμμιχθῇ μεθ' ὕδατος ἐμπεριέχοντος μόνον $\frac{1}{100}$ τοῦ ὄγκου τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος, ἀποτελεῖται μετ' ὀλίγον κροκοσιδὲς κατακρημνισμα προσκολλώμενον εἰς τὰ πλάγια τοῦ ἀγγείου.

β'. Πρὸς ἀνακάλυψιν καὶ ἀποχώρησιν τινῶν ὀξέων ἐκ τῶν ὑδατωδῶν διαλύσεων τῶν, καθότι ἡ τίτανος σχηματίζει κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀδιαλύτους ἐνώσεις.

Τὰ διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος κατακρημνιζόμενα ὀξέα εἶναι τὰ ἐξῆς·

Τὸ ὀξαλικόν ὀξύ. Εἰς τὴν διάλυσιν τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος ἀποτελεῖται κατακρημνισμα ἀρκετὰ δυνατόν, καὶ ἐὰν ᾖναι κεκραμένον μετὰ 5,000 μερῶν ὕδατος· τὸ Ἴζημα τοῦτο εἶναι κονιῶδες καὶ ὀλίγον μόνον διαλυσίμον εἰς ὑπερτεροῦν ὀξύ. Ἐὰν τὸ ὀξαλικόν ὀξύ λεπτυνθῇ μετὰ 10,000 μερῶν ὕδατος, ἀποτελεῖται Ἴζημα μετὰ τινα λεπτά· ἐὰν δὲ μετὰ 15,000 μετὰ ἡμίσειαν ὥραν· κεκραμένον μετὰ 20,000 μερῶν ὕδατος, μετὰ παρέ-

λευσιν τινῶν ὥρων, καὶ κεκραμένον μετὰ 90,000 μερῶν ὕδατος, ἀποτελεῖται καταβύθισμα μετὰ περίπου 12 ὥρας· ἔχνη θολώσεως ἀποτελοῦνται, ἐὰν λεπτυνθῇ μετὰ 100,000 μερῶν ὕδατος.

Ἀρσενικὸν ὀξύ. Τὸ κατακρήνισμα τοῦτο εἶναι μᾶλλον κροκοειδές καὶ εἰς ἑκατονταπλασίαν λέπτυνσιν τυρῶδες, καὶ διαλύσιμον εἰς ὑπερτεροῦν ὀξύ. Σημειωτέον δὲ ὅτι τὸ ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἀρσενικοῦ ἐξεταζόμενον ῥευστὸν πρέπει νὰ συμμιχθῇ καὶ ἐγγυθῇ εἰς τὸ τιτάνιον ὕδωρ καὶ ὅχι αὐτὸ εἰς ἐκεῖνο. Τὸ μετὰ 16 μερῶν ὕδατος κεκραμένον ἀρσενικὸν ὀξύ φαίνεται μὲν ἀμέσως διὰ τινος θολώσεως, ἀλλὰ μετὰ παρέλευσιν 24 ὥρων ἀποτίθεται σημαντικὸν κατακρήνισμα.

Φωσφορικὸν ὀξύ. Τὸ διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος εἰς τὰ διαλύματα τῶν φωσφορικῶν ἀλάτων κατακρήνισμα εἶναι κροκοειδές καὶ διαλύσιμον εἰς ὑπερτεροῦν ὀξύ· κεκραμένα δὲ μετὰ 600 μερῶν ὕδατος παρέχουσι κατακρήνισμα εἰς $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας.

Ἀρσενῶδες ὀξύ. Κεκραμένον μετὰ 1,000 μερῶν ὕδατος ἐξιχνεύεται καὶ $\frac{1}{10}$ λευκοῦ ἀρσενικοῦ διὰ τινος θολώσεως καὶ λευκοῦ κατακρήνισματος· ἐὰν δὲ ᾖναι κεκραμένον μετὰ 2,000 μερῶν ὥστε νὰ ἐμπεριέχεται μόνον $\frac{1}{24}$ τοῦ κόκκου, ἀρσενικοῦ ἀποτελεῖται θόλωσις μετὰ τινὰς ὥρας. Τὸ ἀποτελούμενον κατακρήνισμα εἶναι διαλύσιμον εἰς ὑπερτεροῦν ἀρσενῶδες ὀξύ, ῥιπτόμενον ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων ἐκλύει τὴν ὁσμὴν τοῦ σκροόδου· ἐὰν συμμιχθῇ μετ' ἀνθράκων καὶ πυρωθῇ εἰς ὕελινον σίφωνα, ἀποκαθίσταται τὸ ἀρσενικόν.

Τρυγικὸν ὀξύ. Τὸ εἰς τὸ διάλυμα τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος ἀποτελούμενον ἔζημα εἶναι κονιώδες καὶ διαλύσιμον εἰς ὑπερτεροῦν ὀξύ· κεκραμένου ὄντος μετὰ 1,000 μερῶν ὕδατος, ἀποτελεῖται θόλωσις μετὰ $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας, ἐὰν δὲ μετὰ 15,000, φαίνεται ἤδη σημαντικὴ θόλωσις.

Κιτρικὸν ὀξύ. Ἐὰν διαλυθῇ εἰς 500 μέρη ὕδατος, ἀποτελεῖται θόλωσις μετὰ $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας.

Θεικὸν ὀξύ. Καὶ εἰς τὸ ἄκρατον θεικόν ὀξύ δὲν ἀποτελεῖται ἀμέσως οὐδεμία ἀλλοίωσις διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος, μετὰ $\frac{1}{4}$ δὲ τῆς ὥρας ἀρχονται νὰ σχηματίζωνται ἀγκίδες ἐκ θεικῆς τιτάνου, προσκολλώμεναι ἐπὶ τῶν πλευρῶν τοῦ ἀγγείου.

Τὸ τιτάνιον ὕδωρ χρησιμεύει συχνάκις εἰς τὰς ἀναλύσεις τῶν φυτικῶν οὐσιῶν, καθὼς εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ἐκθλιβομένων χυλῶν τῶν φυτῶν, καρπῶν, πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος, τοῦ τρυγικοῦ καὶ

κιτρικού από τὸ μηλικόν ὄζυ, καὶ πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν εἰρημένων ὀξέων.

Τὸ τιτάνιον ὕδωρ δύναται νὰ μεταχειρισθῇ καὶ πρὸς ἀνακάλυψιν καὶ ἀποχώρησιν τῆς μαγνησίας, καὶ τῶν ἐνώσεών της μετὰ τῶν ὀξέων, ἐὰν δὲν ἐμπεριέχεται ἄλλη γῆ, καθὼς ἡ ἄργιλλος.

Μετὰ 1,000 μερῶν ὕδατος κεκραμένα διαλύματα ἀλικῆς μαγνησίας θολοῦνται εὐθὺς διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος, ἐὰν δὲ μετὰ 1,600 μερῶν κεκραμένα ἀποτελεῖται μετὰ τινος ὥρας ἐλαφρὸν καταβύθισμα, καὶ ἐὰν μετὰ 2,000 μερῶν μόλις φανεροῦται.

Τέλος χρησιμεύει τὸ τιτάνιον ὕδωρ πρὸς ἀνακάλυψιν καὶ ἀποχώρησιν τινῶν μετάλλων ἐκ τῶν διαλύσεων των, τὰ ὅποια καταβυθίζονται διαφόρως κεχρωματισμένα, π. χ. ἐξίχνευε τὸ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ διὰ πρᾶσινωποῦ χρώματισμοῦ κτλ.

Ἐὰν θέσωμεν εἰς οἰνόπνευμα ἔχον διαλελυμένα ἔχνη χαλκοῦ, ἕνεκα τοῦ συνήθως εἰς αὐτὸ ἐμπεριεχομένου ὀξικοῦ ὀξέος, τμῆμα κεκαυμένης τιτάνου, σκεπάζετε αὕτη μετὰ πρᾶσινωποῦ ὑμένος, καὶ ἂν ἐμπεριέχεται μόνον $\frac{1}{5000}$ χαλκοῦ. Ἐὰν ἀναμιχθῇ τὸ τιτάνιον ὕδωρ μετὰ διαλύσεως τοῦ ὀξειδωμένου ἀλικοῦ ὑδραργύρου, χρωματίζεται τὸ ρευστὸν κατ' ἀρχὰς γαλακτώδες, ἀκολούθως κίτρινον, νεραντζοειδές, ὑποκίτρινον καὶ, προστεθέντος πλείονος τιτανίου ὕδατος, ὠχρόν. Τὸ μετὰ 400 μερῶν ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου γίνεται διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος λευκόν, γαλακτώδες, καὶ, προστεθείσης πλείονος τιτάνου, καταβυθίζεται μετὰ τινος ὥρας ἀνοικτοκίτρινον κατακρήμνισμα· ἂν δὲ εἶναι κεκραμένον μετὰ 1,000 μερῶν, γίνεται τὸ διάλυμα μόνον γαλακτώδες, χωρὶς νὰ ἀποτελεσθῇ πλέον καταβύθισμα.

Ὁ νιτρικὸς ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος, διαλελυμένος καὶ κεκραμένος μετὰ 6,000 μερ. ὕδατος κατακρήμνίζεται μὲ μέλαν χρῶμα· ἐὰν συμμιχθῇ μετὰ 8,000 ἕως 16,000 μερ. ὕδατος, ἀποτελεῖται μόνον μελάνωσις, κατακρήμνισμα δὲ δὲν ἀποτελεῖται πλέον.

Νιτρικὸς ἄργυρος ὑγρὸς. Argentum nitricum liquidum.

Ὁ νιτρικὸς ἄργυρος εἶναι τὸ καταλληλότερον ἐπὶ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δοκιμαστήριον καὶ ὁ μεγαλύτερος ὅρος τῆς αἰσθαντικότητος εἶναι μεταξύ 1,000,000 καὶ 1,100,000. Διάλυσις τοῦ κοινοῦ ἄλατος εἰς 1,000,000 μερ. ὕδατος καταβυθίζεται παρὰ διαλύσεως τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου· τὸ ἀποτελούμενον λευκὸν καὶ κροκοειδές ἔζημα ἐκ τοῦ

φωτός κατ' ἀρχάς πορφυρόχρουν καὶ ἐπὶ τέλους μέλαν γινόμενον εἶναι διαλύσιμον εἰς τὴν ὑγρὰν καυστικὴν ἀμμωνίαν.

Ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ ἀρσενικοῦ, κορεσθέντος πρότερον μετ' ἀμμωνίας, καταβυθίζει ὑποστάθμην κιτρίνην, ἥτις γίνεται καστανόχρους ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φωτός· τοιοῦτοτρόπως ἀνακαλύπτεται ἤδη $\frac{400000}{400000}$ λευκοῦ ἀρσενικοῦ.

** Ἀργυρος θεϊκὸς ὑγρὸς. Argentum sulphuricum liq.*

Ὁ θεϊκὸς ἄργυρος κατασκευάζεται, ἐάν νιτρικὸς ἄργυρος διαλυθῇ εἰς τὸ ἀρκοῦν ἀπεσταγμένου ὕδατος, καὶ τὸ διάλυμα διῦλισθὲν καταβυθισθῇ διὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου· καὶ τὸ τοιοῦτον ἴζημα, ἀφοῦ ἀποπλυθῇ, διαλύεται εἰς τὴν ἀρκοῦσαν ποσότητα ἀπεσταγμένου ὕδατος. Τὸ ληφθὲν διάλυμα ἐγκλείεται ἀκριβῶς εἰς ἀγγεῖον καὶ τίθεται εἰς σύσκιον τόπον.

Λευκὸν ἀρσενικὸν ὑγρὸν. Arsenicum album liquidum.

Acidum arsenicosum.

Τὸ λευκὸν ἀρσενικόν, διὰ νὰ χρησιμεύσῃ ὡς δοκιμαστήριον, διαλύεται εἰς 100 μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος. Δι' αὐτοῦ ἀνακαλύπτεται τὸ ὑδροθεϊκὸν ὀξύ εἰς εἶδος κιτρίνου ἰζήματος, τὸ ὁποῖον ἀναδιαλύεται διὰ ὑδροθεϊκῆς ἀμμωνίας· ἐάν δὲ ἡ ἀμμωνία κορεσθῇ μὲ ἄλικόν ἢ θεϊκὸν ὀξύ, καθιζάνει ἐκ νέου τὸ ῥηθὲν ἴζημα. Ἐάν τὸ διάλυμα τοῦ λευκοῦ ἀρσενικοῦ συμμιχθῇ μὲ τιτάνιον ὕδωρ, ὥστε νὰ ὑπερτερῇ τοῦτο ὀλίγον, σχηματίζεται ὑποστάθμη λευκὴ συνισταμένη ἐξ ἀρσενώδους τιτάνου.

Τὸ διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου δὲν σχηματίζει ὑποστάθμην εἰς τὸ διάλυμα τοῦ ἀρσενικοῦ, εἰμὴ ἐάν τὸ διάλυμα τοῦ ἀρσενικοῦ κορεσθῇ ἀπὸ καυστικὴν ἀμμωνίαν ὑγρὰν· τότε δὲ καθιζάνει ἴζημα κίτρινον ἐξ ἀρσενώδους ἀργύρου, εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ καὶ εἰς τὴν καυστικὴν ἀμμωνίαν διαλυτόν· τὸ διάλυμα τοῦ ἀρσενικοῦ ἀνακαλύπτει τὸν χαλκὸν διὰ ὠχροπρασίνου ἰζήματος.

Ἄπαντα αἱ διὰ τοῦ ἀρσενικοῦ σχηματιζόμεναι ὑποστάθμαι, ἐπ' ἀνθρώπων τιθέμεναι, ἐκπέμπουσιν ἀτμοὺς ἔχοντας σκοροδῶδη ὀσμήν· ἐάν δὲ ἐνωθῶσι μὲ κόνιν ἀνθρώπων καὶ ἐγκλεισθεῖσαι εἰς ὑέλινον σωλῆνα πυρωθῶσιν, ἐξαχνίζουσι μεταλλικὸν ἀρσενικόν εἰς εἶδος τεφρολεύκων λεπιδίων ἐναποτιθεμένων εἰς τὰς πλευράς τοῦ σωλῆνος· πυρούμεναι δὲ ὁμοῦ μὲ πεπυ-

ρωμένων ἀνθράκων περιβάλλουν τὰς πλευράς τοῦ σωλῆνος μὲ λεπίδια τεφρόλευκα μεταλλικὴν στιλπνότητα ἔχοντα.

Ὑδροχλωρικὸς χρυσὸς ὑγρὸς. *Aurum muriaticum liq.*

Ὁ ὑδροχλωρικὸς χρυσὸς κατασκευάζεται, ἐὰν φύλλα χρυσοῦ διαλυθῶσιν εἰς νιτροδαλικὸν ὀξύ, καὶ τὸ διάλυμα ἐξατμισθῇ μέχρι ξηροῦ. Ἐν μέρος τοῦ ξηροῦ ὑπολείμματος διαλύεται εἰς 19 ἀπεσταγμένου ὕδατος, καὶ φυλάττεται εἰς σκοτεινὸν μέρος.

Τὸ διάλυμα τοῦ χρυσοῦ ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ φωτός, καὶ ἐκ τοῦ παρὰ τοῦ φωτός προσβαλλομένου ἀποχωρίζεται ὁ χρυσὸς εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν. Ὁ χρυσὸς ἀποχωρίζεται ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου καὶ διὰ τοῦ φωσφόρου, διὰ τῶν περισσοτέρων μετάλλων, καθὼς καὶ διὰ τῶν διὰ τοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου σχηματιζομένων ἀλάτων.

Τὸ διάλυμα τοῦ χρυσοῦ ἀνευρίσκει τὸν διαλελυμένον ὑποξειδωμένον κασσίτερον διὰ πορφυροῦ κροκοειδοῦς ἰζήματος, τὸν δὲ ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον διὰ φαιῶς ὑποστάθμης.

Ὁξικὴ, ὑδροχλωρικὴ καὶ νιτρικὴ βαρεῖα ὑγρὰ. *Baryta acetica, muriatica et nitrica liquida.*

Πρὸς κατασκευὴν τῆς νιτρικῆς βαρεῖας ἀποσυντίθεται διάλυμα ὑδροχλωρικῆς βαρεῖας διὰ διαλύσεως ὑπανθρακικῆς ἀμμωνίας. Τὸ ἀποτελούμενον κατακρήμνισμα ἀποχωρίζεται διὰ διύλισεως, καὶ ἀφοῦ ἀποπλυθῇ καὶ ξηρανθῇ, διαλύεται εἰς τὸ ἀρκοῦν νιτρικοῦ ὀξέος κεκραμένου. Τὸ ρευστὸν τοῦτο ἐξατμίζεται μέχρι κρυσταλλώσεως, καὶ οἱ ἀποτελούμενοι κρύσταλλοι διαλύονται εἰς τὸ ἀρκοῦν ὕδωρ καὶ φυλάττονται εἰς καλῶς κλεισμένον ἀγγεῖον.

Ἡ ὑδροχλωρικὴ βαρεῖα εἶναι τὸ πλέον εὐαίσθητον δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ θειϊκοῦ ὀξέος, καθότι ρευστὸν ἐμπεριέχον ἓν μέρος θειϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου καὶ 1,000,000 ὕδατος θολόνεται διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρεῖας· δὲν εἶναι ὅμως τόσον κατάλληλος πρὸς ἀνεύρεσιν τῶν θειϊκῶν ἀλάτων· θειϊκὴ σόδα κεκραμένη μὲ 400,000 μέρ. ὕδατος μόλις πλέον ἀνακαλύπτεται.

Ἡ ὑδροχλωρικὴ βαρεῖα δύναται νὰ μεταχειρισθῇ καὶ πρὸς ἀνακάλυ-

φιν καὶ διαχώρησιν τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος, ἐὰν δὲ τοῦτο ἐξουδετερωθῇ διὰ τινος βάσεως, καταβυθίζεται ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρείας λευκὴ ὑποστάθμη, ἥτις σύγκειται ἀπὸ φωσφορικὴν βαρεῖαν, εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ ὑδροχλωρικὸν καὶ νιτρικὸν ὀξὺ, καὶ ἐμπεριέχει εἰς 100 μερ. 68,2 βαρείας.

Δύναται προσέτι διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρείας νὰ προσδιορισθῇ ἀκριβῶς καὶ τὸ ποσὸν τοῦ ἐμπεριεχομένουθειικοῦ ὀξέος· ἐὰν δὲ τὸ πρὸς ἐξέτασιν ρευστὸν ἐμπεριέχῃ, ἐκτὸς τῶνθειϊκῶν ἀλάτων, καὶ ἀνθρακικὰ ἄλατα, καταβυθίζεται ἐκτὸς τῆςθειϊκῆς καὶ ἀνθρακικῆς βαρεῖας, ἥτις δύναται νὰ διαλυθῇ καὶ ἀποχωρισθῇ διὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. Εἰς τοιαύτην περίστασιν εἶναι καταλληλότερον νὰ ἐκλύθῃ πρῶτον τὸ ἀνθρακικὸν ὀξὺ δι' ὀλίγου ποσοῦ νιτρικοῦ ἢ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Ἡ νιτρικὴ βαρεῖα ἔχει τὰς αὐτὰς μὲ τὴν ὑδροχλωρικὴν βαρεῖαν ιδιότητας, ἀλλὰ προτιμάται εἰς περιστάσεις, καθ' ἃς τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξὺ ἐπιφέρει δυσκολίας. Ἡ νιτρικὴ βαρεῖα εἶναι προτιμητέα καὶ ἀπὸ τὸν νιτρικὸν μόλυβδον, ὅστις παρομοίως ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦθειικοῦ ὀξέος· καθότι ἡθειικὴ βαρεῖα εἶναι πάντῃ ἀδιάλυτος εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξὺ, ἐνῶ ὁθειϊκὸς μόλυβδος κατὰ μέγα μέρος διαλύεται εἰς αὐτό.

Ἡ ὀξικὴ βαρεῖα μεταχειρίζεται ἐνίοτε, ὅταν θέλωμεν νὰ προσδιορίσωμεν, ἂν τὸ μετὰ τοῦθειικοῦ ὀξέος ἠνωμένον ἀλκάλιον ᾖναι πότασσα ἢ σόδα. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν οὐδετεροῦται πρῶτον τὸ ἀλκάλιον δι' ὀξικοῦ ὀξέος, καὶ, ἀφοῦ καταβυθισθῶσι τὰθειϊκὰ ἄλατα διὰ τῆς ὀξικῆς βαρείας, ἐξατμίζεται τὸ ρευστὸν μέχρι ξηροῦ. Ἐὰν τὸ ξηρὸν τοῦτο ὑπόλειμμα διυγραινεται εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν, καταλχμβάνομεν ὅτι εἶναι πότασσα, ἐὰν δὲ διαχέεται εἰς αὐτὴν, δῆλον ὅτι εἶναι σόδα.

Θειικὸν κάδμιον ὑγρόν. Cadmium sulphuricum liquidum.

Δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἀνχνύλῳφιν τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος, δι' οὗ ἀποτελεῖται κίτρινον κατακρήμνισμα.

Ὀξικὴ τίταρος ὑγρὰ. Calcaria acetica liquida.

Δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ ὀξελικοῦ καὶ τρυγικοῦ ὀξέος καὶ τῶν δι' αὐτῶν ἀλάτων.

Ἄνθραξ. Carbo.

Ὁ ἀνθραξ δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς δοκιμαστήριον ἐπὶ τῶν χλωρικῶν

καὶ νιτρικῶν ἀλάτων, ἅτινα ἐκπυρσοκοροτοῦσιν, ἐὰν συναφθῶσι μετ' αὐτοῦ καὶ πυρωθῶσιν. Ὁ ἄνθραξ εἶναι χρήσιμος πρὸς ἀποκατάστασιν πολλῶν ὀξειδίων, τῶν ὁποίων ἡ φύσις μετὰ ταῦτα δύναται νὰ ἐξηχνευθῇ ἀκριβέστερα.

Δοκιμαστικὸς χάρτης κυανοῦς. Charta exploratoria coerulea.

Τὸ βάμμα τοῦ καγκαμίνου καθὼς καὶ ὁ χάρτης, ὅστις εἰσβαπτίζεται εἰς αὐτὸ τὸ βάμμα, εἶναι ἀξιόλογα δοκιμαστήρια ἐπὶ τῶν ὀξέων· τὸ βάμμα ὅμως εἶναι καταλληλότερον, ἐπεὶ διελύεταί εἰς αὐτά. Τὸ τοῦ καγκαμίνου βάμμα κατασκευάζεται ἐξ ἐνὸς μέρους καγκαμίνου καὶ 25 μερῶν ὕδατος. Τὸ διῦλισθὲν βάμμα λεπτύνεται ἀκολούθως μετὰ 500 μερῶν ὕδατος, ὥστε ἐν μέρος τῆς βαφικῆς ὕλης ἐμπεριέχεται εἰς 12,500 μέρ. ὕδατος.

Ἐν μέρος τῆς εἰρημένης βαφῆς κεκραμένον μετὰ 25,000 μερ. ὕδατος ἐρυθροῦται δι' ἐνὸς μέρους θειικοῦ ὀξέος, καὶ ἐναλλάξ φανεροῦται παρ' αὐτῆς $\frac{1}{100000}$ θειικοῦ ὀξέος εἰς τὴν διάλυσίν του.

Μετὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος φαίνεται ἐπιτηδεῖα πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ὕδροχλωρικοῦ, νιτρικοῦ, τρυγικοῦ, καὶ ὀξαλικοῦ ὀξέος.

Παρομοίως τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ μεταβάλλει τὴν βαφὴν τοῦ καγκαμίνου εἰς ἐρυθράν, ἡ δὲ ἀποτελεσθεῖσα ἐρυθρότης ἀφανίζεται, ἐὰν ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος, ἡ διὰ τῆς ἀναζέσεως.

Τὸ ὕδροθεικικὸν ὀξύ ὑγρὸν ἀναμιγνύμενον μετὰ τοῦ βάμματος τοῦ καγκαμίνου τὸ μεταβάλλει εἰς ἐρυθρόν, ὅχι ὅμως καθὼς τὰ λοιπὰ ὀξέα, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὸ πορφυροῦν κλίνειν, εἰς δὲ μεγαλύτερον ποσὸν ἐξαλείφεται καὶ τὸ κυανοῦν χρῶμα ὅλως διόλου.

Τὸ χλωρίον φθείρει τὸ χρῶμα, χωρὶς νὰ προηγηθῇ ἐρύθρωσις, καὶ τὸ καθαρὸν ὕδροκυανικὸν ὀξύ κοκκινίζει τὸ βάμμα τοῦ καγκαμίνου. Ὡσαύτως τὰ πλειότερα διαλύματα τῶν διὰ τῶν μετάλλων ἀλάτων ἐρυθροῦσιν τὴν εἰρημένην βαφὴν.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ χάρτου δὲν χρησιμεύει χάρτης λευκαίνόμενος διὰ τοῦ χλωρίου, καθότι λαμβάνει ἐρυθρὰς κηλίδας. Τὸ πρὸς βαφὴν χρῆσιμον βάμμα πρέπει νὰ ᾖ ἀρκετὰ καθαρόν. Εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ὑλῶν ἐπὶ τῆς παρουσίας τῶν ὀξέων πρέπει νὰ μείνῃ ὁ χάρτης διὰ τινα καιρὸν εἰς συνάφειαν μετ' αὐτῶν, ἂν καὶ δὲν ἐρυθροῦται ἀμέσως. Ἐπεὶ δὲ τὸ βάμμα τοῦ καγκαμίνου ὑπάρκει εἰς ταχεῖαν ἀλλοίωσιν καὶ φθοράν,

μεταχειρίζονται συχνότερα τὸν χάρτην. Διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἀποτελεῖται ἐρυθρῶσις τοῦ χάρτου, ὅστις ὅμως μετ' ὀλίγον λαμβάνει τὸ πρότερόν του κυανοῦν χρῶμα· παρομοίως ἐρυθροῦται διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος ἐπαναλαμβάνων τὸ χρῶμα του μετὰ τινὰς ἡμέρας.

Δοκιμαστικὸς χάρτης ἐρυθρωθεὶς. *Charta exploratoria rubefacta.*

Ὁ κυανοῦς δοκιμαστικὸς χάρτης εἰσθαπτίζεται εἰς ὄξος ἀπεσταγμένον ἢ εἰς ὑδροχλωρικὸν ὄξυ διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον, ἀκολούθως ξηραίνεται καὶ φυλάττεται.

Τὸ ἀνοικτοκυανοῦν καὶ διὰ τῶν ὀξέων τούτων ἐρυθρωθὲν βάμμα τοῦ καγκαμίνου εἶναι πολλὰ εὐαίσθητον διὰ τὰ ἀλκάλια· καθότι διάλυμα τῆς τιτάνου μετὰ 48,000 μερ. ὕδατος κεκραμένον ἐπαναφέρει τὸ κυανοῦν χρῶμα.

Ἡ ἀλλοίωσις τοῦ χρώματος ἀποτελεῖται καὶ διὰ τῶν ἀνθρακικῶν γαιῶν, καθὼς καὶ διὰ μεταλλικῶν ἀλάτων μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως, λ. χ. διὰ νιτρικοῦ ὑδραργύρου, νιτρικοῦ μολύβδου μεθ' ὑπερτερούσης βάσεως κτλ.

Ἐκτὸς τῶν δύο τούτων εἰδῶν τοῦ χάρτου μεταχειρίζονται προσέτι τὸ τῆς ρίζης ῥᾶς βάμμα, καθὼς καὶ τὸν χάρτην. Τὸ βάμμα κατασκευάζεται ἐξ ἑνὸς μέρους λειοτριβημένης ῥᾶς μετὰ 30 μερῶν ὕδατος, ἀκολούθως λεπτύνεται μεθ' ὕδατος, ἕως οὗ φανῇ τὸ χρῶμα ἀνοικτοκίτρινον. Τὸ κίτρινον χρῶμα διὰ τῶν καθαρῶν καὶ ἐλευθέρων ἀλκαλίων μεταβάλλεται εἰς φαιόν. Τὸ βάμμα τοῦτο εἶναι δοκιμαστήριον πολλὰ εὐαίσθητον, καὶ δι' αὐτοῦ ἀνευρίσκονται καὶ τὰ ἀσθενέστερα φυτικὰ ἀλκάλια, τὰ ὅποια δὲν ἐνεργοῦσι πλέον ἐπὶ τοῦ σεραπίου τῶν ἰσν, τῆς βαφῆς τῆς ἀγχοῦσης καὶ μάλιστα τῆς κροκορρίζης. Τιτάνιον ὕδωρ κεκραμένον μετὰ τῶν ὕδωρ, ὥστε νὰ ἐμπεριέχεται μόνον $\frac{1}{100000}$ τιτάνου, μεταβάλλει τὸ κίτρινον βάμμα εἰς φαιόν, καὶ ἡ παρουσία τοῦ καυστικοῦ ἀλκαλίου φανεροῦται εἰς διάλυσιν κεκραμμένην μετὰ 150,000 μερῶν· τὸ δὲ ἀνθρακικὸν κάλιον εἰς μετὰ 100,000 λεπτυνομένην διάλυσιν.

Τὸ ἀνθρακικὸν κάλιον καὶ νάτρον, εἰς τινὰ ἱαματικὰ ὕδατα ἐμπεριεχόμενα, δὲν μεταβάλλουσι τὴν εἰρημένην βαφὴν.

Βάμμα καὶ χάρτης τῆς κροκορρίζης.

Tinctura et charta exploratoria Curcumae.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ βάμματος τούτου ἐπιχύνεται ἓν μέρος λείας κροκορρίζης μὲ ἕξ μέρη κεκραμένου οἶνοπνεύματος, καὶ ἔπειτα διυλίζεται τὸ βάμμα· πρὸς κατασκευὴν δὲ τοῦ χάρτου ἀλείφονται διὰ τοῦ προϋφθέντος βάμματος τμήματα λευκοῦ χάρτου, τὰ ὅποια ξηρανθέντα φυλάττονται εἰς σύσκιον τόπον. Τὸ χρῶμα τοῦ χάρτου μεταβάλλεται διὰ τῶν ἀλκαλίων εἰς φαιόν, καὶ ἰσοδυναμεῖ σχεδὸν ὡς πρὸς τὴν εὐαισθησίαν μὲ τὸν τῆς ρίζης ῥᾶς. Διάλυμά τι ἐμπεριέχον $\frac{1}{50000}$ ἀμμωνίας καθαρᾶς μεταβάλλει τὸν χάρτην εἰς φαιόν. Τὰ ἀνθρακικὰ ἄλατα καὶ ἡ ἀνθρακικὴ σόδα, καθὼς εὐρίσκονται ἐμπεριεχόμενα εἰς τὰ ἱαματικά ὕδατα, δὲν ἐνεργοῦσι ἐπὶ τοῦ τῆς κροκορρίζης βάμματος, μεταβάλλουσι δὲ τὸ χρῶμα εἰς φαιόν, ἐὰν ζέωνται μετ' αὐτοῦ. Καὶ ἄκρατα ὀξέα, καθὼς τὸ θεϊκόν, τὸ νιτρικόν, καὶ τὸ ἀερῶδες ὑδροχλωρικόν ὀξύ, μεταβάλλουσι τὸν χάρτην εἰς φαιόν.

Βάμμα καὶ χάρτης τοῦ ἐρυθροῦ ξύλου.

Tinctura et charta exploratoria Fernambuci.

Κατασκευάζεται διὰ τῆς ἐκχυλίσεως τῶν ξυσμάτων τοῦ ἐρυθροῦ ξύλου τῆς Βρασιλίας μετὰ 16 πλάσιον βραστοῦ ὕδατος, ἀκολούθως λεπτύνεται τὸ βάμμα μεχριστοῦ φανῆ ἐρυθροκίτρινον, τὸ ὅποιον μεταβάλλεται διὰ τῶν ἀλκαλίων εἰς πορφυροῦν ἢ ἰώδες κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς πυκνώσεως τοῦ βάμματος.

Τὸ διὰ τῶν ἰῶν σεράπιον χρωματίζεται διὰ τῶν ἀλκαλίων πράσινον, διὰ δὲ τῶν ὀξέων ἰώδες.

Γαλβανικὴ στήλη. *Colonna Galbanica.*

Διὰ τῆς γαλβανικῆς στήλης δυνάμεθαι νὰ ἀποσυνθέσωμεν ἅπαντα τὰ ὑδρομιγῆ ὀξέα, καθὼς καὶ τὰ ἀλκάλια. Χρησιμεύει πρὸς ἀποσύνθεσιν πολλῶν ἀλάτων, καὶ πρὸς ἀποκατάστασιν τινῶν μεταλλοξειδίων καθ' ὑγρὰν ὁδόν· καὶ τὸ μικρότατον ποσὸν διαλελυμένου τινὸς μετάλλου προσκολλᾶται εἰς τὸν ἀρνητικὸν πόλον.

Χαλκὸς ἐληλαμένος. *Cuprum lamellatum.*

Ἐλασμα χαλκοῦ θερμανθὲν μεταχειρίζεται πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ ἄρσε-

νικοῦ· ἀνγκυλῶνται δὲ καὶ τὸν ὑδράργυρον, ὅστις ἐκ τοῦ διαλύματός του καταβυθίζεται εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν· πρὸς τούτοις καταβυθίζει τὸν ἀργυρον ἐκ τοῦ διαλύματός του εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν.

Θειϊκὸς χαλκὸς ὑγρὸς. *Cuprum sulphuricum liquidum.*

Κατασκευάζεται διὰ τῆς διαλύσεως 1 μέρ. θειϊκοῦ χαλκοῦ, εἰς 9 ἀπεσταγμένου ὕδατος.

Τὸ θειϊκὸν ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ εἶναι πολλὰ εὐαίσθητον δοκιμαστήριον διὰ τὸ διάλυμα τοῦ ἐνσιδήρου ὑδροκυανικοῦ καλίου· καθότι δι' αὐτοῦ προάγεται ἱζίμα κροκοειδὲς ἐρυθρόφαιον. Ἐκτὸς τούτου χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν καὶ προσδιορισμὸν τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου εἰς τὰ ἱαματικά ὕδατα, μόλα ταῦτα προτιμᾶται τὸ διάλυμα τοῦ ὀξικοῦ χαλκοῦ. Ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦ ὀξικοῦ χαλκοῦ προστεθῇ εἰς τὸ πρὸς ἐξέτασιν ὕδωρ, γεννᾶται κατακρήμνισμα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἔνθεις χαλκός· ἀφοῦ δὲ ἀποπλυθῇ καὶ ξηρανθῇ, μᾶς φανερόναι τὸ ποσὸν τοῦ θείου, ἐπομένως δὲ καὶ τὸ ποσὸν τοῦ ἐν τῷ ὕδατι ὑδροθειωμένου ἀερίου· 100 κυβικοὶ δάκτυλοι ὑδροθειωμένου ἀερίου ἀναλογουσι μὲ 4,3 ἰ θείου. Ὁ ληθθεὶς ἔνθεις χαλκὸς συνίσταται ἐξ 66, 3 χαλκοῦ καὶ 33, 7 θείου· ἢ 100 μέρη χαλκοῦ προσλαμβάνουσι 15, 66 θείου πρὸς μεταβολὴν εἰς ἔνθειον χαλκόν· οὕτω λοιπὸν δύναται νὰ λογισθῇ τὸ εἰς τὸ ὕδωρ ἐμπεριεχόμενον ὑδροθειωμένον ἀέριον. Τοῦτο τὸ ἄλας τοῦ χαλκοῦ καταβυθίζει ἐντελῶς τὸ θεῖον, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ διὰ τοῦ εἰς τὸ ρευστὸν ἴσως ἐμπεριεχομένου θειϊκοῦ καὶ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, τὰ ὁποῖα μεταβάλλουσι τὰς διαλύσεις τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου καὶ τοῦ ἀργύρου.

Δύναται προσέτι νὰ μεταχειρισθῇ ὡς δοκιμαστήριον καὶ ἐπὶ τοῦ ἀρσενώδους καὶ ἀρσενικοῦ ὀξέος· ἀρ' ἑαυτοῦ του δὲν προξενεῖ εἰς αὐτὰ ἀμμὶν ἀλλοιώσιν, ἀμα ὅμως προστεθῇ ἀμμωνία, ἀποτελεῖται πρασίνη ἢ κιτρινωπὴ θόλωσις, καὶ, κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς ἐπιπυκνώσεως τοῦ ρευστοῦ, καταβύθισμα. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀμμωνία εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα διαλύει τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα, κἄλλιον νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ἀρσενικοῦ ὁ θειϊκὸς χαλκὸς ἐναμμωνίως, ὅστις καταβυθίζει αὐτὸ εἰς εἶδος ὡχροπρασίου ἱζήματος, τὸ ὁποῖον ἐπὶ διαπύριον ἀνθράκων ῥιπτόμενον ἐκλύει τὴν τοῦ σκοροδίου ὁσμὴν.

Ζύμη. *Fermentum.*

Δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἐξίχνευσιν τῆς ζαχάρεως. *Ζαχαροδχον*

ρευστόν αναμιγνύμενον μετὰ ζύμης υπόκειται εἰς οἰνώδη ζυμωσιν, καὶ ἐὰν τὸ ὑπὸ τὴν ζύμωσιν ἐκλυόμενον ἀνθρακικὸν ὀξύ συναχθῇ ὑπὸ τὸν ὑδράργυρον, δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν καὶ τὸ ποσὸν τῆς ἐνυπαρχούσης ζαχάρως, γνωρίζοντες ὅτι 44 μέρη ἀνθρακικοῦ ὀξέος ἀναλογοῦσι μὲ 90 μέρη διαλελυμένης ζαχάρως.

Σίδηρος. Ferrum politum.

Ὁ μεταλλικὸς σίδηρος ἀνακαλύπτει τὸν διαλελυμένον χαλκὸν, καὶ ἀποκατασταίνει αὐτὸν εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν. Ἐὰν ὁ διαλελυμένος χαλκὸς ὑπάρχῃ εἰς τοιαύτην σμικρὰν ποσότητα, ὥστε τὰ μὲν ἀνακαλύπτεται πλέον δι' ἄλλων δοκιμαστηρίων δηλαδή, μέχρι $\frac{1}{50000}$, περιβάλλεται ὁ ἐντεθεὶς σίδηρος μετὰ μεταλλικοῦ ὑμένους, ὅστις φαίνεται προφανῶς μετὰ τὴν ξήρανσιν.

Υδροχλωρικὸς ὀξειδωμένος καὶ ὑποξειδωμένος σίδηρος ὑγρὸς,

Θεικὸς σίδηρος ὑγρὸς. Ferrum muriaticum oxydatum et oxydulatum liquidum. Ferrum sulphuricum liquidum.

Τὰ διαλύματα τοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου, τὸ θεικὸν δηλ. νιτρικόν, καθὼς καὶ τὸ ὑδροχλωρικόν, εἶναι εὐαίσθητα δοκιμαστήρια διὰ τὸ κηκιδικόν ὀξύ, τὸ ὁποῖον ἀνακαλύπτεται διὰ τῆς προαγωγῆς βαθυκυανοῦ χρώματος καὶ ἰζήματος. Ἐν μέρος π. χ. κρυσταλλωμένου κηκιδικοῦ ὀξέος διαλελυμένον εἰς 200,000 μέρη ὕδατος φανεροῦται διὰ κυανωποῦ χρωματισμοῦ· μεγαλύτερον δὲ ποσὸν τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου προάγει πρᾶσινον ἢ πρασινωπὸν χρῶμα. Μὲ τὸν αὐτὸν τρόπον φανεροῦται ἡ σιδηροπρασινίζουσα βυρσοδεψικὴ ὕλη τῆς ἐπταφύλλου ῥίζης, καὶ τῆς γέου ῥίζης διὰ ἐρυθρωποῦ σχεδὸν ἰώδους χρωματισμοῦ, ἡ δὲ βυρσοδεψικὴ ὕλη τοῦ φλοιοῦ τῆς κίνας, τῆς ῥᾶς, ῥατανίας, τοῦ λυκίου, τοῦ κίνου, ἀνακαλύπτεται διὰ πρασίνου χρωματισμοῦ, ὅστις ταχέως εἰς πρασινωπὸν καὶ φαῖον μεταβάλλεται.

Σημαντικωτάτη εἶναι ἡ ἐνέργεια τῶν διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων ἐπὶ τοῦ μηχανικοῦ ὀξέος· καθότι δι' αὐτοῦ ἀποτελεῖται ἐρυθρὸς χρωματισμὸς, καὶ ἔνεκα τούτου τὰ μεταχειρίζονται πρὸς ἐξίχνυσιν τοῦ ὀπίου. Τὰ διαλύματα τοῦ σιδήρου φανερόνουν τὴν τῆς καφέας ἰδιαιτέραν ὕλην (καφεΐνην), εἰς τὸ τῆς καφέας ἔγχυμα, διὰ ὠραίου πρασίνου

χρώματος καὶ τοῦτου κατακρημνίσματος· τὸ ὑδροκυανικὸν ἐνθειον ὀξὺ ἐλεύθερον, καθὼς καὶ μετὰ βάσεων ἡνωμένον, ἀποτελεῖ ἐρυθρὸν ἢ πορφυροῦν χρωματισμόν.

Τὰ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἅλατα καὶ ὁ ἀλικὸς ὑποξειδωμένος σίδηρος ἀπορρόφῳσι τὸ ὀξείδιον τοῦ νιτριγόνου καὶ μεταβάλλονται εἰς βαθύφαια ἢ μέλανα διαλύματα.

Τὰ διὰ τοῦ ὑποξειδίου ἅλατα δὲν ἐνεργοῦσιν ἐπὶ τοῦ κηκιδικοῦ ὀξέος, ἐὰν ἀποκλεισθῇ ἡ τῆς ἀτμοσφαίρας ἐπιρροή· μετὰ τοῦ κυανικοῦ καλίου σιδηρίζοντος, ἀποκλεισθείσης τῆς ἀτμοσφαίρας, προάγουσι λευκὸν καταβύθισμα· ὅθεν ὁ θειϊκὸς ὑποξειδωμένος σίδηρος δὲν ἐξίχνευε τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξὺ, ἂν δὲν ἀναμιχθῇ πρότερον μετὰ διαλύματος τοῦ θειϊκοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου, ἢ ἂν δὲν μεταβληθῇ μέρος αὐτοῦ διὰ τῆς ἀπορρόφησης ὀξυγόνου εἰς ὀξείδιον. Ἐὰν δὲ προστεθῇ ἀνθρακικὴ ἀμμωνία ἢ πτάσασα, φανεροῦται ἐλάχιστον ποσὸν σιδήρου διὰ σχηματισμοῦ κυανωποῦ χρώματος, τὸ ὅποιον ἀφανίζεται, ἐὰν προστεθῇ ὑδροχλωρικὸν ὀξὺ· καθότι δι' αὐτοῦ διαλύεται τὸ συγχρόνως καταβυθιζόμενον κίτρινον ὀξείδιον τοῦ σιδήρου. Ὑδροκυανικὸν ὀξὺ διὰ 100,000 μερῶν ὕδατος κεκραμένον ἀνακαλύπτεται διὰ ὁρατοῦ κυανοῦ χρώματος.

Ὁ ὑποξειδωμένος θειϊκὸς σίδηρος χρησιμεύει καὶ πρὸς ἐξίχνευσιν καὶ καταβύθισιν τοῦ χρυσοῦ ἐκ τῶν διαλυμάτων του· διὰ τοῦ ἰδίου μέσου δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τὸν χρυστὸν χημικῶς καθρὺν. Διάλυμα τοῦ χρυσοῦ κεκραμένον μετὰ 50 μερ. ὕδατος, λαμβάνει διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ θειϊκοῦ σιδήρου ὑπομέλαν χρῶμα, καὶ καταβυθίζεται εἰς εἶδος λεπτοτάτης κόνεως.

Ζωϊκὸν πήκτωμα. Gelatina animalis.

Χρησιμεύει ὡς ἀντιδραστήριον ἐπὶ τῆς βυρσοδεψικῆς ὕλης, μεθ' ἧς σχηματίζεται δερματικὴ τις εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὰ ὀξέα πάντῃ ἀδιάλυτος ὕλη.

Μεταλλικὸς ὑδράργυρος. Hydrargyrum metallicum.

Ὁ μεταλλικὸς ὑδράργυρος μεταχειρίζεται πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ ἀργύρου ἐκ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ἢ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἐγγλωρίου ἀργύρου, καθὼς ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου. Ἐπίσης πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ θείου ἐκ τῶν διαλυμάτων τῶν ἐνθειῶν ἀλκαλίων, οὗτος ἐντεθεὶς εἰς διάλυσιν τῶν

ἐνθείων ἀλκχλίων μεταβάλλεται εἰς ἐνθειον ὑδράργυρον, καὶ τὰ φαιὰ διαλύματα ἀποκατασταίνονται ἄχροα. Χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος εἰς τὰ ἱαματικά ὕδατα, ὅπου ὁ ὑδράργυρος λαμβάνει κίτρινον ἢ φαιὸν χρῶμα.

Ὑδράργυρος ὑδροχλωρικός ρευστός. *Hydrargyrum*

muriatricum oxydatum liquidum.

Τοῦτο τὸ διάλυμα εἶναι τὸ ἀσφαλέστερον δοκιμαστήριον πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ζωϊκοῦ λευκώματος, καὶ διάλυμα ἐμπεριέχον $\frac{1}{1000}$ ζέοντος γαλακτώματος, ἀποθέτει μετὰ τινα χρόνον θρόμβους, ἐνῷ μῆτε ἡ βλέννα μῆτε τὸ πῆκτωμα δὲν καταβυθίζονται.

Νιτρικός ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος ὑγρός. *Hydrargyrum*

nitricum oxydulatum.

Εἶναι ἐν τῶν σημαντικωτέρων δοκιμαστηρίων ἐπὶ τῆς ἀμμωνίας, ἐπειδὴ ἐὰν οἱ ἐκ τινος ὕλης ἐκλύμενοι ἄτμοι ἐμπεριέχουσιν ἱγνη ἀμμωνίας, καὶ διοχετευθῶσι διὰ διαλύσεως τοῦ νιτρικοῦ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου, σχηματίζεται τεφρόχρουν ἢ μέλαν κατακρήμνισμα.

Τὸ δοκιμαστήριον τοῦτο ἐυστήθη ἐξόχως πρὸς προσδιορισμὸν τοῦ νιτρογόνου εἰς ζωϊκὰς ἢ φυτικὰς οὐσίας, ἐκ τῶν ὁποίων ἐκλύεται ἡ ἀμμωνία· οὕτω δὲ καὶ $\frac{1}{100000}$ νιτρογόνου δύναται νὰ ἀνακαλυφθῇ.

Ὁ νιτρικός ὑδράργυρος εἶναι εὐαίσθητον δοκιμαστήριον καὶ ἐπὶ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, καὶ εἰς διάλυσιν τοῦ κοινοῦ ἁλατος εἰς 100,000 μέρη ὕδατος προξενεῖ δυνατωτέραν θόλωσιν παρὰ τὸν νιτρικὸν ἄργυρον· εἰς δὲ πλειοτέραν λέπτυνσιν προτιμᾶται πάλιν ὁ νιτρικός ἄργυρος, καθότι εἰς δι' 1,000,000 ὕδατος κεκραμένην διάλυσιν τοῦ κοινοῦ ἁλατος δὲν προάγεται οὐδεμία ἀλλοίωσις διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὑδραργύρου, ἐνῷ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ἄργύρου γίνεται σημαντικὴ θόλωσις. Ἐὰν δὲ ἦναι πυκνότερα ἢ διάλυσις ἀποτελεῖται λευκὸν καταβύθισμα, τὸ ὁποῖον ἐὰν ἐπιχυθῇ μετὰ βραστοῦ ὕδατος, χρωματίζεται κίτρινον. Ὁ νιτρικός ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος εἶναι ὡσαύτως πολλὰ εὐαίσθητον δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ, ἔχων μεγαλητέραν εὐαίσθησιν παρὰ ὁ ἀλικὸς ὑποξειδωμένος κασσίτερος. Τὸ διάλυμα τοῦ χρυσοῦ ἀποσυντίθεται δι' ἀφθόνου βαθυφαίου ἢ μελανο-ερυθοῦ κατακρημνίσματος. Εἰς πολλὰ λεπτυνομένην διάλυ-

σιν καθαυθίζεται τὸ κατακρημνισμα μετὰ μεγάλης ταχύτητος· ἐὰν δὲ ὁ χρυσὸς ᾖναι διαλελυμένος εἰς 60,000 μέρη ὕδατος σχηματίζεται ἐρυθρόφαις ἢ μᾶλλον ἐρυθρὸς χρωματισμός.

Υδρογόρον. Hydrogenium.

Εἷς τινὰς περιστάσεις χρησιμεύει πρὸς ἀποκατάστασιν τινῶν ὀξείδων τῶν μετάλλων.

Ἰνδικὸν διαλελυμένον. Indigo solutum.

Χρησιμεύει πρὸς ἐξέτασιν τοῦ κόρου τοῦ ἐγχλωρίου ὕδατος.

Ἰώδιον. Iodium.

Εἶναι ἀξιόλογον δοκιμαστήριον ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ σιταμύλου, ἀποτελοῦν μετ' αὐτοῦ βαθυκυανὴν ἔνωσιν, ἥτις δύναται νὰ μεταχειρισθῇ διὰ νὰ διακρίνωμεν τὸ ἀρσενικὸν ἀπὸ τὸν ὑδράργυρον. Τὸ ἀρσενῶδες ὀξύ, καθὼς καὶ ὁ ὑδροχλωρικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος, φθείρουσι τὸ κυανοῦν χρῶμα τῆς ῥηθείσης ἐνώσεως· ἐὰν δὲ ἡ ῥηθεῖσα φθορὰ τοῦ κυανοῦ χρώματος προαχθῇ, διὰ τοῦ ἀρσενικοῦ τότε τὸ κυανοῦν χρῶμα ἐπανερχεται διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου, τὸ ὁποῖον δὲν γίνεται ἐὰν ἐμπεριείχeto ὑδράργυρος.

Ὀξικὸν κάλιον ὑγρόν. Kali aceticum liquidum.

Χρησιμεύει πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου καὶ τῶν ἀλάτων αὐτοῦ, καθότι ταῦτα ἀναμιγνύμενα μετὰ τοῦ ὀξικοῦ καλίου λαμβάνουσιν αἰμοβαφεῖς χρῶμα. Τὸ ὑποξείδιον τοῦ ὑδραργύρου κατακρημνίζεται ἐκ τοῦ διαλύματός του εἰς εἶδος λευκῆς κόνεως, ἢ εἰς εἶδος λαμπρίζοντων φυλλιδίων. Τὸ διάλυμα τοῦ ὀξικοῦ καλίου δεικνύει καὶ τὸ τρυγικὸν ὀξύ. Μεταχειρίζεται καὶ πρὸς ἐξέτασιν τῆς καλῆς ποιότητος τοῦ αἰθέρος διὰ θεϊκοῦ ὀξέος καὶ οἰνοπνεύματος (Liquor mineralis Hoffmanni). Ἐὰν τὸ ἐξ ἴσης ποσότητος ὀξικοῦ καλίου καὶ ὕδατος ἀπρετελούμενον διάλυμα ἀναμειχθῇ μὲ ἴσον ὄγκον αἰθέρος διὰ θεϊκοῦ ὀξέος καὶ οἰνοπνεύματος, πρέπει νὰ ἀποχωρισθῇ τὸ τεταρτημόριον αἰθέρος διὰ θεϊκοῦ ὀξέος.

Ἀρσενικὸν κάλιον ὑγρόν. Kali arsenicum liquidum.

Ἐνεργεῖ ὡς καὶ τὸ ἀρσενῶδες ὀξύ, καὶ χρησιμεύει κατ' ἐξοχὴν πρὸς

αποχώρησιν τοῦ σιδήρου ἀπὸ τὸ μαγγανήσιον. Σχηματίζει μετὰ τῶν διαλυμάτων τῶν δι' ὀξειδωμένου σιδήρου ἀλάτων λευκὸν ἀδιάλυτον ἴζημα, ἡ δὲ τοῦ ἀρσενικοῦ ὀξέος μετὰ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ μαγγανησίου ἔνωσις μένει διαλελυμένη.

Berzoiḱon kálior ὑγρόν. Kali benzoicum liquidum.

Ἀποτελεῖ μετὰ τῶν οὐδετέρων διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων ἐρυθρωπὸν ἴζημα.

Ἀνθρακικὸν kálior ὀξινόν. Kali carbonicum acidulum.

Χρησιμεύει πρὸς ἀποχώρησιν τῆς τιτάνου ἀπὸ τὴν μαγνησίαν, καθότι δι' αὐτοῦ καταβυθίζεται ἡ τίτανος, ἐνῶ ἡ μαγνησία μεταβαλλομένη εἰς ἀνθρακικὴν μένει διαλελυμένη. Πρὸς τούτοις πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου ἀπὸ τὸ ὀξείδιον τοῦ σιδήρου, τὸ ὁποῖον καταβυθίζεται, τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου μένει διαλελυμένου.

Καυστικὸν kálior ὑγρόν. Kali causticum liquidum.

Τὸ καυστικὸν κάλιον χρησιμεύει πρὸς διάλυσιν τοῦ θείου, καὶ τοῦ χροσίχορτος ἐρσιμμιλου θείου, καὶ πρὸς ἀποχώρησιν τῆς καταβυθισθείσης ἀργίλλου ἀπὸ τὸ ὀξείδιον τοῦ σιδήρου καὶ τὴν μαγνησίαν· καθότι ἡ ἀργίλλος εἶναι διαλύσιμος εἰς τὸ θερμὸν καυστικὸν κάλιον, ἐνῶ ἀμφότερα τὰ ἄλλα μένουσιν ἀδιάλυτα.

Χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς χαλικῆς, διότι 1 μέρος αὐτῆς συντακὲν μετὰ 3 μερ. ποτάσσης σχηματίζει τὴν εὐδιάλυτον ὕεσαν. Ἀνακαλύπτει καὶ τὰ ἀμμωνιακὰ ἅλατα διὰ τῆς ἀμμωνιώδους ὁσμῆς· τέλος χρησιμεύει τὸ καυστικὸν κάλιον πρὸς καταβύθισιν τῶν πλειοτέρων μεταλλοξειδίων ἐκ τῶν διαλύσεων των.

Χρωμικὸν kálior ὑγρόν. Kali chromicum liquidum.

Ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, τὸ ὁποῖον καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύματός του μετὰ κιτρίνου χρώματος. Τὸ διάλυμα τοῦ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου καὶ τοῦ ἀργύρου καταβυθίζονται ὡσαύτως, τὸ μὲν πρῶτον μετὰ ἀνοικτο-ερυθροῦ χρώματος, τὸ δὲ μετὰ πορφυροῦ.

Ὑδροκυανικὸν ἐρσιδήρεον κάλιον ὑγρὸν. *Kali hydrocyanicum ferruginosum liquidum.*

Τὸ δοκιμαστήριον τοῦτο κατασκευάζεται διὰ τῆς διαλύσεως ἑνὸς μέρους αὐτοῦ εἰς 9 ὕδατος. Διὰ διαφόρων δὲ χρωμάτων, καὶ διαφόρων χρωματισμένων κατακρημνισμάτων ἀνακαλύπτει τὰ διάφορα ὀξείδια τῶν μετάλλων.

Ἵπερτεροῦν ποσὸν τῶν ὀξέων ὅχι μόνον δὲν ἐμποδίζει τὸν σχηματισμὸν τῶν, ἀλλὰ καὶ φαίνεται συντείνειν πρὸς ἀποχώρησίν των. Τὰ κατακρημνίσματα διαφέρουν ὡς πρὸς τὸ χρῶμα κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς ὀξειδώσεως· μεταβάλλονται δὲ τὰ χρώματα ἀπροσδοκῆτως, ἐὰν πλείοτερα ὀξείδια μετάλλων συγκαταβυθίζονται.

Τὰ διὰ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου ἄλλατα κατακρημνίζονται δι' αὐτοῦ μὲ ὑπόλευκον ὑποστάθμην, τὰ δὲ ὀξείδια μὲ κυανήν. Τὸ ἐκ τῆς διαλύσεως τοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου ποριζόμενον λευκὸν καταβύθισμα μεταβάλλεται τέχιστα διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ὀξυγόνου τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος εἰς κυανοῦν. Διάλυσις τοῦ ὑδροχλωρικοῦ σιδήρου κεκραμένη μετὰ 1,000,000 μερῶν ὕδατος καταβυθίζεται μετὰ τινά καιρὸν διὰ κυανωποῦ χρωματισμοῦ. Εἰς τινὰς περιστάσεις δὲν ἀνακαλύπτεται ὁ σίδηρος διὰ τοῦ δοκιμαστηρίου τούτου, καὶ μάλιστα ἐὰν ὑπάρχῃ ἡνωμένος μετὰ τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος· ὡσαύτως δὲν ἀνακαλύπτεται ὁ σίδηρος, ὅταν ᾖ ἡνωμένος μὲ φωσφορικὸν ὀξύ ἢ μὲ φωσφορικὰ ἄλλατα, ἐνῶ τὸ τῶν κηκίδων βάμμα προάγει σημαντικὸν ἰώδες καταβύθισμα. Ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦ κυανικοῦ σιδηρίζοντος καλίου προστεθῇ εἰς διάλυσιν μὴ ἐμπεριέχουσαν μήτε ἔχνη σιδήρου, μήτε ἐλεύθερόν τι ὀξύ, σχηματίζεται ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος μετὰ τινά καιρὸν πρατινωπὸν χρῶμα, τὸ ὅποιον ἀκολούθως μεταβάλλεται εἰς κυανοῦν· τοῦτο δὲ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ ἰδίου δοκιμαστηρίου, ἐξ οὗ ἀποκρίνεται ὑδροκυανικὸς σίδηρος. Παρομοίως δὲν καταβυθίζεται διὰ τοῦ δοκιμαστηρίου τούτου ὁ σίδηρος ἐκ τῶν διὰ τῶν ἀλκαλίων διαλύσεών του. Ἐπαράτηρηται ὅθεν ὅτι ἡ αἰσθαντικότης τοῦ εἰρημένου δοκιμαστηρίου ἐπὶ τοῦ σιδήρου, καθὼς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀξειδίων τῶν μετάλλων, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὑπερτεροῦσαν ποσότητα τοῦ ὀξέος. Οὕτω λ. χ. εἰς διάλυσιν τρυγικῆς ποτίσσης διὰ τοῦ τῶν κηκίδων βάμματος ἀνεκαλύφθη σίδηρος δι' ἀφθόνως σχηματιζόμενου ἰωειδοῦς κατακρημνίσματος, ἐνῶ τὸ ὑδροκυανικὸν κάλιον σιδηρίζον δὲν ἐφάνερωσε τὸ παραμικρὸν ἔχνος σιδήρου· μετ' ἀκριβειτέραν ἐξέτασιν

ἀνεκαλύρθη, ὅτι εἰς τὸ διάλυμα ὑπερτερεῖ τὸ ἀλκάλιον. Ἀκολούθως ἐπροστέθη ὀλίγον ποσὸν νιτρικοῦ ὀξέως, καὶ ἀμέσως ἐφανερώθη διὰ κυανοῦ κατακρημνίσματος ἡ ὑπαρξίς τοῦ σιδήρου.

Ἐκ τοῦ ποσοῦ τοῦ ληφθέντος ὑδροκυανικοῦ σιδήρου δύναται διὰ τοῦ διου δοκιμαστήριου· νὰ προσδιορισθῇ καὶ τὸ ποσὸν τοῦ ἐμπεριεχομένου σιδήρου, εἰς περιστάσεις, καθ' ἃς δὲν εὐρίσκεται ἄλλο μέταλλον, λ. χ. εἰς τὰ ἱαμακτικὰ ὕδατα· μόνη δυσκολία εἰς αὐτὴν τὴν ἐργασίαν εἶναι ἡ τελεία ἀποξήρανσις τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδήρου.

Ἐκατὸν μέρη ὑδροκυανικοῦ σιδήρου ζηρηνθέντα ὑπὸ τὴν πνευματικὴν ἀντλίαν εἰς θερμοκρασίαν 135° C. ἐμπεριέχουσι 40,24 μεταλλικοῦ σιδήρου, ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως τὸ $\frac{1}{3}$ ἀνήκει εἰς τὸ προστεθὲν δοκιμαστήριον, καὶ τὰ ἕτερα $\frac{2}{3}$ εἰς τὸ ἐξετασθὲν ρευστὸν. Ἐάν λ. χ. ληφθῶσιν ἀπὸ τὸ ἐξετασθὲν ρευστὸν 100 ὑδροκυανικοῦ σιδήρου, δύνανται νὰ λογισθῶσιν ἀνήκοντα εἰς τὸ ρευστὸν 26,83 μεταλλικοῦ σιδήρου.

Τὸ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ καὶ μετὰ 10,000 μερ. ὕδατος κεκραμένον, καθὼς ἐμπεριέχεται εἰς τὰ διαλύματα τοῦ χαλκοῦ, καταβυθίζεται παρὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ σιδηρίζοντος καλίου διὰ ἐρυθροφαίου χρώματος. Ἐάν δὲ τὸ διάλυμα τοῦ θεϊκοῦ χαλκοῦ ἀναμιχθῇ μετὰ 50,000 μερ. ὕδατος, χρωματίζεται πάραυτα τὸ ρευστὸν ἐρυθρόφαιον, καὶ μετὰ πρὸς ἐλευσιν 24 ὥρων ἀποκρίνεται καὶ τὸ κατακρημνισμα.

Τὰ διὰ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ χαλκοῦ ἄλατα, ἂν καὶ σπανίως ἀπαντῶμενα, καταβυθίζονται μετὰ λευκοῦ χρώματος, ταχέως εἰς ρόδινον μεταβαλλομένου.

Τὸ διάλυμα τοῦ ἀργύρου καταβυθίζεται μετὰ λευκοῦ, τὸ τοῦ μολύβδου, ὑδραργύρου, ψευδαργύρου, κασσιτέρου καὶ καδμίου μετὰ λευκοῦ, τὸ δὲ μαγγανήτιον διὰ υπερύθρου χρώματος.

Υδροιωδικὸν κάλιον ὑγρόν. *Kali hydriodicum liquidum.*

Τοῦτο τὸ δοκιμαστήριον ἀποτελεῖται ἐάν ἐν μέρος ὑδροιωδικοῦ καλίου διαλυθῇ εἰς τέσσαρα μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος.

Χρησιμευεῖ δὲ εἰς ἀνακάλυψιν τινῶν μετάλλων διὰ διαφόρως χρωματισμένων καταβυθισμάτων· ἀνιχνεύει τὸν ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον διὰ ὠχροπρασίνου ἰζήματος, προάγεται δὲ θόλωσις, ἂν τὸ διάλυμα ἀναμιχθῇ μετὰ 10,000 μερ. ὕδατος· ὁμοίως τὸν ὀξειδωμένον ὑδράργυρον διὰ πορφυροῦ χρώματος. Διαλύματα ἐμπεριέχοντα ὑποξειδωμένον καὶ ὀξει-

δωμένον ὑδράργυρον καταβυθίζονται πρῶτον μετὰ πρασινωποῦ, ἔπειτα μετὰ κιτρίνου καὶ τέλος πορφυροῦ χρώματος.

Τὰ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου ἅλατα καταβυθίζονται διὰ χρυσίζοντος χρώματος, καὶ διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ μολύβδου λεπτυνόμενον μετὰ 120,000 μερῶν ὕδατος θολοῦται.

Τὰ διὰ τοῦ ἀργύρου ἅλατα κεκραμένα μὲ 10,000 μέρη ὕδατος καταβυθίζονται μετὰ λευκοῦ χρώματος, καὶ τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα εἶναι διαλύσιμον εἰς τὴν ἀμμωνίαν. Τὰ τοῦ βισμούθιου ἅλατα ἀποσυνθέτονται σχηματίζοντα κασταόχρου κατακρήμνισμα, διαλύσιμον εἰς τὸ καυστικὸν κάλιον.

Μαγγανησιακὸν κάλιον ὑγρόν. Kali manganicum liquidum.

Χρησιμεύει ὡς δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ ἀρσενώδους ὀξέος, καθότι καὶ ὀλίγον ποσὸν τούτου δύναται νὰ μεταβάλλῃ τὸ ἰσῶδες διάλυμα τῆς μαγγανισιακῆς ποτάσεως εἰς κίτρινον.

Χλωρικὸν κάλιον. Kali muriaticum oxygenatum s. chloricum.

Χρησιμεύει πρὸς ἀνίχνευσιν τῶν καυσίμων ὑλῶν, καὶ πρὸς ἀποσύθεσιν τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν κατὰ ξηρὰν ὁδόν.

Νιτρικὸν κάλιον. Kali nitricum.

Ἐκπυρσοκροτεῖ μετὰ τῶν καυσίμων ὑλῶν, καὶ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐκπυρσοκροτήσεως δύναται νὰ ἐξιχνευθῇ ἡ φύσις τῶν καυσίμων ὑλῶν, ἂν δηλ. ᾖναι ἀνθραξ, θεῖον, ἢ μεταλλοξειδίον· πρὸς τούτοις χρησιμεύει, καθὼς τὰ διὰ τοῦ καλίου ἅλατα πρὸς ἐξιχνευσιν τοῦ τρυγικοῦ ὀξέος.

Ὁξαλικὸν κάλιον ὑγρόν. Kali oxalicum liquidum.

Ὁξαλικοῦ καλίου μέρος ἓν, τεθὲν εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον, διαλύεται εἰς 12 μέρη ὕδατος ἀπεσταγμένου βραστοῦ καὶ ἔπειτα κορέννεται τὸ διάλυμα ἀπὸ ἀνθρακικὸν κάλιον μέχρι ἐξουδετερώσεως· μετὰ ταῦτα ἐξατμίζεται τὸ ρευστὸν σχηματίζον κρυστάλλους, οἵτινες διαλυόμενοι εἰς ἀρκούν ἀπεσταγμένου ὕδατος φυλάττονται.

Τὸ ὀξαλικὸν κάλιον χρησιμεύει πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς τιτάνου καὶ εἰς

ἐλαχίστην ποσότητα, καὶ πρὸς ἀποχώρησίν τῃς ἀπὸ τὴν μαγνησίαν. Ἡ διάλυσις τῆς ὑδροχλωρικῆς τιτάνου εἰς 100,000 μέρη ὕδατος σχηματίζει διὰ τοῦ ὀξαλικοῦ καλίου θόλωσιν, ἂν καὶ μετὰ παρέλευσιν τινῶν ὥρῶν· τὸ ἀποτελούμενον κατακρήμνισμα εἶναι κονιῶδες.

Διάλυμα τῆς θειϊκῆς τιτάνου κεκραμένον μετὰ 100,000 μερῶν ὕδατος θολοῦται διὰ τοῦ ὀξαλικοῦ καλίου μετὰ τινα χρόνον, καὶ τὸ ἀποτελούμενον κατακρήμνισμα διαλύεται εὐκόλως εἰς τὰ ὀξέα.

Ἐπειδὴ τὸ ὀξαλικὸν κάλιον δὲν ἀποτελεῖ κατακρήμνισμα εἰς πεπυκνωμένα διαλύματα τῆς ὑδροχλωρικῆς, θειϊκῆς καὶ νιτρικῆς μαγνησίας, προτιμᾶται τῶν λοιπῶν δοκιμαστηρίων πρὸς ἀποχώρησιν τῆς τιτάνου ἀπὸ τὴν μαγνησίαν, μόνον ὅτι ἡ εὐαισθησία τοῦ ὀξαλικοῦ ὀξέος ἐλαττοῦται, ἂν εἰς τὰ διαλύματα ἐμπεριέχεται καὶ μαγνησία.

Τὸ ὀξαλικὸν κάλιον χρησιμεύει διὰ τὴν ἀνακάλυψιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, καὶ διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ μολύβδου μετὰ 100,000 μερῶν ὕδατος κεκραμένον παρέχει λευκὴν θόλωσιν μετὰ $\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας· ἕνεκα τούτου ὑπερέχει καὶ τὰ θειϊκὰ ἅλατα, καὶ εἰς τινὰς περιπτώσεις δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ μολύβδου. Ἐκτὸς τούτου καταβυθίζονται τὸ ὀξείδιον τοῦ ἀργύρου καὶ ὑδραργύρου μετὰ λευκοῦ χρώματος, τὸ ὀξείδιον τοῦ κοβαλτίου μετὰ ῥοδίνου, τὸ ὀξείδιον τοῦ χαλκοῦ μετὰ κυανοῦ, ἡ δὲ βαρεῖα καὶ στροντιανὴ μετὰ λευκοῦ.

Ἀντὶ τοῦ ὀξαλικοῦ καλίου δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ἡ ὀξαλικὴ ἀμμωνία· ἡ χρῆσις ταύτης ὅμως εἶναι ἀσφαλής, ἐπειδὴ ἔχει τὸ ἰδίωμα νὰ σχηματίζῃ διπλᾶ ἅλατα.

Ἰ' πανθρακικὸν κάλιον ὑγρὸν ἐκ τρυγός. *Kali subcarbonicum liquidum e tartaro.*

Πρὸς κατασκευὴν τούτου διαλύεται ἐν μέρος ὑπανθρακικοῦ καλίου ἐκ τρυγός εἰς 4 μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος.

Τὸ ὑπανθρακικὸν κάλιον καταβυθίζει τὰς γαίας ἐκ τῶν διαλύσεων, αἵτινες παρέχουσι μετὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος ἀδιάλυτα ἢ δυσδιάλυτα ἅλατα, καὶ ἰδίως τὴν τίτανον, στροντιανήν, καὶ μαγνησίαν. Διὰ τοῦτο καταβυθίζονται προσέτι τὰ ὀξειδωμένα μέταλλα ἐκ τῶν διαλύσεων τῶν μετὰ ἰδιαιτέρων χρωμάτων, διὰ τῶν ὁποίων δύνανται νὰ διαχωρισθῶσιν.

Τινὰ ἐξ αὐτῶν τῶν καταβυθισμάτων διακλύονται ἐντελῶς εἰς ὑπερτεροῦν

ποσόν, και οὕτω διακρίνονται ἀπὸ τὰ ἄλλατα· ἐπεὶ δὲ ὁμοῦς ἅπαντα τὰ μεταλλοξείδια και εἰς μικράν ποσότητα εἶναι διαλύσιμα εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα ἀνθρακικοῦ καλίου, δυσκόλως δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ τοῦτο πρὸς ἐντελῇ ἀποχώρησιν τῶν μετάλλων. Ἄπασαι αἱ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτοι ἢ δυσδιάλυτοι ἐνώσεις τῶν βάσεων και ὀξέων, ἀποσυντίθενται διὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ καλίου, καθότι τὰ ὀξέα σχηματίζουν μετὰ τοῦ καλίου εὐδιάλυτους ἐνώσεις, ἐνῶ αἱ βάσεις ἐνοῦνται μετὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος τοῦ καλίου πρὸς ἀδιάλυτα ἄλλατα· τοιαῦται εἶναι αἱ ἐνώσεις τῆς τιτάνου, σροντιανῆς και ἀργίλλου μετὰ τοῦ θειικοῦ, φθορικοῦ, φωσφορικοῦ, βρικοῦ, και μηλικῦ ὀξέος. Ἐπίσης χρησιμεύει πρὸς ἀποσύνθεσιν πολλῶν ἀδιαλύτων ἐνώσεων τῶν μεταλλοξειδίων μετὰ τῶν ὀξέων, ὡς μετὰ τοῦ θειικοῦ, ὕδροχλωρικοῦ, φωσφορικοῦ, χρωμικοῦ και μολυβδαινικοῦ ὀξέος. Τοιαῦται ἀποσυνθέσεις γίνονται διὰ τῆς πυρώσεως τοῦ ἀνθρακικοῦ καλίου μετὰ τῶν λειοτριβημένων ὀρυκτῶν.

Θεικὸν κάλιον ὑγρὸν. Kali sulphuricum liquidum.

Τὸ διάλυμα τῆς θειικῆς ποτάσσης ἐξιχνεύει τὰ διὰ βαρείας, τὰ διὰ τοῦ μολύβδου και τιτάνου ἄλλατα· πρὸς τούτοις ἀνακαλύπτει και τὸ τρυγικὸν ὀξύ σχηματίζον τὴν τρύγα. Τὸ διάλυμα τῆς θειικῆς ποτάσσης ἀναμιγνύμενον μετὰ θειικῆς ἀργίλλου ἀποτελεῖ στυπτηρίαν.

Τρυγικὸν κάλιον ὑγρὸν. Kali Tartaricum liquidum.

Δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ἐπὶ τῆς παρουσίας τῶν πλειοτέρων ὀξέων, μετὰ τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ τὴν τρύγα.

Ποτάσιον. Kalium s. Potassium.

Εἶναι πολὺ εὐαίσθητον ἐπὶ τοῦ ὀξυγόνου, εἴτε ἐλευθέρου, εἴτε μετ' ἄλλων σωμάτων ἡνωμένου. Τὸ ποτάσιον χρησιμεύει πρὸς ἀποσύνθεσιν σχεδὸν πάντων τῶν ὀξειδίων εἰς συνήθη, καθὼς και εἰς ἀνωτέραν θερμοκρασίαν.

Θειικὴ μαγνησία ὑγρὰ. Magnesia sulphurica liquida

Ἐν μέρος θειικῆς μαγνησίας καθαρᾶς διαλύεται εἰς τέσσαρα μέρη ἁπλοῦς ὕδατος. Χρησιμεύει πρὸς ἐξιχνεύσιν τῆς καθαριότητος τοῦ διτταν

Θρακικοῦ νάτρου καὶ καλίου, τῶν ὁποίων τὰ διαλύματα δὲν θολοῦνται διὰ τῆς θεικῆς μαγνησίας, ἐὰν ἐμπεριέχωσι τὸ ἀρκοῦν ποσὸν ἀνθρακικοῦ ὀξέος.

Ὁξειδίον τοῦ μαγγανησίου. Manganesium oxydatum.

Δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ ἰωδίου καὶ τοῦ βρωμίου· ἐὰν τὸ ὀξειδίον τοῦτο ἀναμιχθῇ μετὰ τινος ἰωδούχου ἢ βρωμιούχου ἁλματος, καὶ ἐπὶ τοῦ μίγματος ἐπιχυθῇ θεικὸν ὀξύ ἀκρατον, ἐκλύονται ἰώδεις ἀτμοί· φανερόντι προσέτι καὶ τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, ἐκ τοῦ ὁποίου συναπτομένου μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου ἐκλύονται ἀτμοί τοῦ χλωρίου.

Ὑδροχλωρικὸν νάτρον ὑγρόν. Natrum muriaticum liquidum.

Πρὸς κατασκευὴν τοῦ δοκιμαστήριου τούτου διαλύεται ἐν μέρος ἀλικοῦ νάτρου ἀγοραίου εἰς 3 μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος, καὶ ἐξατμίζεται τὸ διάλυμα, μέχριςὸς σχηματισθῶσι καθαροὶ κρύσταλλοι· τῶν κρυστάλλων τούτων ἐν μέρος διαλύεται εἰς 4 μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος.

Τὸ δοκιμαστήριον τοῦτο χρησιμεύει πρὸς ἀποχώρησιν καὶ ἀποσύνθεσιν τοῦ ἀργύρου ἐκ τῶν διαλύσεών του. Διάλυσις τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου κεκραμένη μετὰ 100,000 μερῶν ὕδατος θιλοῦται δι' αὐτοῦ· ἡ θόλωσις γίνεται πλέον ἐπισιθητῇ, ἐὰν τὸ βρευστὸν ἐκτεθῇ εἰς τὴν τοῦ φωτός ἐπιρροήν, δι' ἧς λαμβάνει ἐρυθροῦν χρῶμα. Ἐὰν λεπτυνθῇ δι' ὀλιγωτέρου ποσοῦ ὕδατος, ἀποτελεῖται καταθύθισμα κροκοειδές, τόσον ἀφθονώτερον, ὅσον πλέον πυκνὸν εἶναι τὸ διάλυμα. Μόλον τοῦτο τὸ καθαρόν ὑδροχλωρικὸν ὀξύ ἔχει πλειοτέραν ἐπ' αὐτοῦ εὐαισθησίαν.

Ὑποβορικὸν νάτρον. Natrum subboracicum.

Τὸ ὑποβορικὸν νάτρον τακὲν πρὸς ὕελον διὰ τοῦ σαλπιγγίου βάφεται μὲ διάφορα χρώματα, ὅταν ᾖναι μεμιγμένον μὲ μεταλλικὰ ἅλατα ἢ ὀξειδία. Οὕτως ἀνακαλύπτεται τὸ ὀξειδωμένον μαγγανῆσιον διὰ κυανοῦ χρώματος· ὁ ὀξειδωμένος σιδηρὸς εἰς σμικροτάτην μὲν ποσότητα δι' ὠχροῦ, εἰς μεγαλητέραν δὲ διὰ ὑπομέλανος· ὁ χαλκὸς διὰ πρασίνου· τὸ κοβάλτιον διὰ βαθυκυανοῦ χρωματισμοῦ· τὸ βορικὸν νάτρον συντακὲν μετὰ τοῦ ὀξειδωμένου ἀργύρου καὶ ψευδαργύρου ἀποτελεῖ μάζαν διαφανῇ, ἔνῳ προῦται· γίνεται δὲ αὕτη γαλακτόχρους, ἀφοῦ ἀποψυχανθῇ.

Ὁξυγόρον. *Oxygenium*.

Χρησιμεύει πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ ὑδρογόνου, καθότι ἐν συναφθῇ τὰ ὀξυγόνον καὶ ὑδρογόνον, καὶ ἀναφλεχθῶσιν εἰς τὸ εὐδιόμετρον τοῦ Βόλτα, σχηματίζεται ὕδωρ. Τὸ ὀξυγόνον χρησιμεύει καὶ πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ νιτρογόνου, μεθ' οὗ σχηματίζει ἐρυθροὺς ἀτμούς· διάφορα ὑποξείδια τῶν μετάλλων, ὡς τὸ δι ὀξέων διαλελυμένον ὑποξείδιον τοῦ σιδήρου, τοῦ κασσιτέρου κτλ. ὀξειδοῦνται ἐντελῶς διὰ τοῦ ὀξυγόνου. ὀξειδοῦνται προσέτι πολλὰ ἔνθεια μέταλλα καὶ εἰς συνήθη θερμοκρασίαν.

Φώσφορος. *Phosphorus*.

Δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ὀξυγόνου. ἔχει προσέτι τὴν ιδιότητα νὰ ἀποκαθιστᾷ διάφορα ὀξείδια ἐκ τῶν διαλύσεών των εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν, ὡς τὸ τοῦ χαλκοῦ, ὑδραργύρου, ἀργύρου καὶ χρυσοῦ.

Λευκοχρυσος ὑδροχλωρικὸς ὑγρὸς. *Platinum muriaticum liquidum*.

Τὸ διάλυμα τοῦ ὑδροχλωρικοῦ λευκοχρύσου μεταχειρίζεται πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ καλίου. Ἐν ἀναμιχθῇ μετὰ διαλυμάτων τοῦ καλίου, ἀποτελεῖται δυσδιάλυτον ἄλας, ἀποτιθέμενον εἰς εἶδος κρυσταλλωσίων, καὶ ἐρυθροφαίων σφαιριδίων. Δι' αὐτοῦ ἀνακαλύπτονται καὶ τὰ διὰ τῆς ἀμμωνίας ἄλατα, τὰ ὅποια παρέχουσι κίτρινον ἔζημα.

Ὁξικὸς μόλυβδος ρευστός. *Plumbum aceticum liquidum*.

Ἐν μέρος ὀξικοῦ μολύβδου κεκαθαρμένου διαλύεται εἰς ἑννέα μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος.

Ὁ ὀξικὸς μόλυβδος εἶναι ἀξιόλογον δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος· καθότι καὶ εἰς διάλυσιν τῆς φωσφορικῆς σόδας μετὰ 1,000 μερῶν ὕδατος ἀποτελεῖται λευκὸν κατακρήμνισμα· ὁ φωσφορικὸς μόλυβδος εἶναι κόνις ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύσιμος εἰς πολὺ νιτρικὸν ὀξύ. Διὰ τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου καταβυθίζεται τὸ τρυγικόν, ὀξαλικόν, νιτρικόν, μηλικόν, ἡλεκτρικόν ὀξύ, καθὼς καὶ ἅπασαι αἱ ἐνώσεις τῶν εἰρημένων ὀξέων, καὶ τὰ ἀποτελούμενα κατακρημνίσματα εἶναι διαλύσιμα εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ. Συνήθως μεταχειρίζονται τὸν ὀξικὸν μόλυβδον ρευστὸν πρὸς ἀποχώρησιν

τῶν φυτικῶν ὀξέων ἀπὸ τὰς μετὰ τῶν βάσεων ἐνώσεις των· τὸ καταβυθιζόμενον φυτικὸν ὀξύ ἀποχωρίζεται ἐκ τῆς μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου ἐνώσεώς του, ἢ διὰ τοῦ θειικοῦ, ἢ διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος ρευστοῦ. Τὸ διάλυμα τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ἐπιτυχῶς πρὸς προσδιορισμὸν τοῦ εἰς τὰ ἱαμακτικὰ ὕδατα ἐμπεριεχομένου ὑδροθειωμένου ἀερίου· πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν διοχετεύεται τὸ ἐξ αὐτῶν ἐκλυόμενον ὑδροθειωμένον ἀέριον διὰ διαλύματος ὀξικοῦ μολύβδου, δι' ὀλίγου ὀξικοῦ ὀξέος ὀξυνιζομένου· ἐκ τοῦ ληφθέντος καταβυθίσματος τοῦ ἐνθείου μολύβδου δυνάμεθα νὰ ὑπολογιζώμεθα τὸ ποσὸν τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου· 100 μέρη ἐνθείου μολύβδου ἐμπεριέχουσι 86,55 μολύβδου καὶ 13,45 θείου· καὶ 4,33 θείου ἀναλογοῦν μὲ 100 κυβικοὺς δακτύλους ὑδροθειωμένου ἀερίου· τὸ προστεθὲν ὀξικὸν ὀξύ ἐμποδίζει τὴν καταβύθισιν τοῦ ἀνθρακικοῦ μολύβδου, ἂν ἤθελεν ἐκλυθῇ καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ. Διὰ νὰ ἐξετάσωμεν, ἂν ἱαμακτικὸν ὕδωρ ἐμπεριέχῃ ὑδροθειωμένον ἀέριον, δυνάμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν τὸν διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ ὀξικοῦ μολύβδου ἡλειμμένον καὶ ξηρανθέντα χάρτην, ὅστις μελανίζεται διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου.

Οἰρόπνευμα διὰ σάπωνος. Spiritus Saponis.

Χρησιμεύει ὡς ἀντιδραστήριον ἐπὶ τῶν πλειοτέρων ὀξέων· καθότι δι' αὐτῶν ἀποσυντίθεται ὁ σάπων, ἀποχωριζομένου τοῦ στεατικοῦ καὶ ἐλαιώδους ὀξέος· ἀποδεικνύει καὶ τὴν παρουσίαν πάντων τῶν γαιωδῶν καὶ μεταλλικῶν ἀλάτων, δι' ὧν σχηματίζονται ἀδιάλυτοι ἐνώσεις.

Κασσίτερος. Stannum metallicum.

Χρησιμεύει πρὸς ἀποχώρησιν τινῶν μετάλλων ἐκ τῶν διαλυμάτων του, ἐπίσης πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ μηχανικίου. Ἐὰν ῥάβδος μεταλλικοῦ κασσιτέρου ἐντεθῇ εἰς διάλυσιν ὑδροχλωρικοῦ μηχανικίου, περιβάλλεται μετὰ στιβάδος ἀμεθύστου χροῦμα ἐχούσης. Τοῦτο τὸ φαινόμενον, τὸ πολὺ χαρακτηριστικὸν πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ τιτανικοῦ ὀξέος παρουσιάζεται, ἔὰν ἡ φιάλη καλῶς ἐπιπωματισθῇ.

Ὑδροχλωρικὸς ὑποξειδωμένος κασσίτερος ὑγρὸς.

Stannum muriaticum oxydulatum liquidum.

Ἐν μέρος ῥιניσμάτων καθαροῦ κασσιτέρου διαλύεται εἰς 3 μέρη ἀκρά-

του άλικοῦ ὀξέος, τὸ διάλυμα τοῦτο συμμίγνυται ἔπειτα μὲ ἐννέα⁷ μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος. Ἡ χρῆσις τοῦ δοκιμαστηρίου τούτου ἐπιστηρίζεται ἐπὶ τῆς ἀπορρόφησεως τοῦ ὀξυγόνου· δι' αὐτοῦ ἀποκαθίστανται τὰ πλείο-
τερα μεταλλοξείδια, τὰ ὁποῖα ἀποκαθιστάμενα, καταβυθίζονται μετὰ
διαφορετικοῦ χρώματος. Τὸ διάλυμα τοῦ κασσιτέρου εἶναι εὐαίσθητον
δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ, τὸν ὅποιον καταβυθίζει μὲ πορφυροῦν
χρῶμα, ἂν καὶ δὲν ἀποτίθεται ἀμέσως τὸ καταβύθισμα· δι' αὐτοῦ φανε-
ροῦται ὁ λευκόχρυσος διὰ τῆς μεταβολῆς τοῦ κιτρίνου χρώματος τῆς
διαλύσεώς του εἰς ἐρυθροῦν, καὶ ὁ χρωματισμὸς οὗτος φαίνεται καὶ εἰς
διάλυσιν τοῦ λευκοχρύσου κεκραμένην μὲ 10,000 μέρη ὕδατος.

Τὸ διάλυμα τοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου κατακρημνίζεται ἀπὸ ὀλίγον
ποσὸν τοῦ εἰρημένου δοκιμαστηρίου μετὰ λευκοῦ χρώματος, (τὸ καταβύ-
θισμα εἶναι ἀλικὸς ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος), διὰ μεγαλύτερου δὲ ποσοῦ
ἀποκρίνεται στακτερόν καταβύθισμα (μεταλλικὸς ὑδράργυρος)· τὸ διάλυ-
μα τοῦ κασσιτέρου εἶναι ἐν τῶν εὐαίσθητοτέρων δοκιμαστηρίων ἐπὶ τοῦ
άλικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου.

Εἰς διάλυσιν τοῦ νιτρικοῦ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου ἀποτελεῖται τε-
φρόχρουν κατακρήμνισμα δηλ. μεταλλικὸς ὑδράργυρος, εἰς δὲ διάλυσιν
νιτρικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου, καταβύθισμα λευκόν.

Εἰς ἀναλυτικὰς ἐργασίας φυτικῶν οὐσιῶν μεταχειρίζομεθα τὸ διάλυ-
μα τοῦ άλικοῦ κασσιτέρου πρὸς ἀποχώρησιν διαφόρων φυτικῶν συστατι-
κῶν ὡς τῆς βυρσοδεψικῆς, καὶ χρωματιστικῆς ὕλης ἐκ τῶν φλοιῶν τῆς
κίνας, τῶν λεπύρων τῶν καρύων, αἵτινες χαρακτηρίζονται διὰ ἰδιαιτέρου
χρώματος.

Στρυχνίνη. *Strychninum.*

Δύναται νὰ μεταχειρισθῇ πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος. Ἐὰν νι-
τρικόν τι ἄλλας ἀναμιχθῇ μετὰ στρυχνίνης καὶ ἐπιχυθῇ θεικόν ὀξύ, ἀπο-
τελεῖται ἐρυθροῦν χρῶμα.

Τὸ ἔνστικμιος ὑγρὰ. *Tartarus stibiatus liquidus.*

Πρὸς προαγωγὴν ταύτης διαλύεται ἐν μέρος ἐνστικμίου τρυγὸς εἰς
ἐννέα μέρη ἀπεσταγμένου ὕδατος.

Δι' αὐτῆς ἀνακαλύπτεται τὸ ὑδροθεικόν ὀξύ, καὶ τὰ ὑδροθεικὰ

ἄλλατα διὰ χρυσίζοντος ἰζήματος· δυνάμεθα προσέτι νὰ τὸ μεταχειρισθώμεν καὶ εἰς τὸ νὰ διακρίνωμεν ἐκ τῆς γενομένης μηλίνης ἢ κροκιδοειδοῦς ὑποστάθμης τὴν σκυτοδεψικὴν οὐσίαν καὶ τινὰς ἐκχυλισματικὰς πικρὰς οὐσίας, αἵτινες ἔχουσι σχέσιν πρὸς αὐτήν.

Κηκίδων βάμμα. Tinctura Gallarum.

Τὸ βάμμα τοῦτο ἀποτελεῖται διὰ τῆς κατεργάσεως 1 μέρ. λείων κηκίδων καὶ 6 κεκραμένου οἴνοπνεύματος.

Τὸ δοκιμαστήριον τοῦτο ἀνακαλύπτει τὰ μέταλλα μὲ διαφύρως κειρωματισμένα ἰζήματα, καὶ ἰδίως τὸν σίδηρον καὶ τὸ τιτάνιον· εἶναι τὸ πλέον εὐαίσθητον δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ σιδήρου, καὶ ὑπερέχει καὶ αὐτὸ τὸ ὕδροκυανικὸν κάλιον σιδηρίζον. Τὰ διαλύματα τῶν διὰ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου ἀλάτων χρωματίζονται κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς λεπτύνσεως ἐρυθρᾷ, καὶ ἐπομένως ἀποτελεῖται καταβύθισμα βαθυπορφυροῦν· εἰς κόκκος ἀνθρακικοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου διαλυθεὶς εἰς 400,000 μέρη ὕδατος δι' ἀνθρακικοῦ ὀξέος, φανεροῦται διὰ τῆς προσθήκης τοῦ διὰ κηκίδων βάμματος μετὰ πορφυροῦ χρώματος· ἱαματικὸν ὕδωρ, τὸ ὁποῖον νεαρῶς ἐξαντληθὲν δὲν λαμβάνει διὰ τοῦ βάμματος τούτου πορφυροῦν χρῶμα, δὲν δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ εἰς μίαν λίτραν μῆτε $\frac{1}{50}$ τοῦ κόκκου ἀνθρακικοῦ σιδήρου. Διάλυμα τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει $\frac{1}{2160000}$ θειικοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου χρωματίζεται ἀσθενῶς ἰσθδῆς· πρόσφατον διάλυμα ὑποξειδωμένου θειικοῦ σιδήρου διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένου δὲν μεταβάλλεται ἀμέσως, ἀλλὰ κατ' ὀλίγον χρωματίζεται ἰωειδές.

Εἰς διάλυσιν 1 μέρ. ὕδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου σιδήρου μετὰ 200,000 ὕδατος κεκραμένην ἀκόμη ἐξιχνεύεται διὰ τοῦ εἰρημένου δοκιμαστήριου ἢ ὑπαρξίς τοῦ σιδήρου. Τὸ βάμμα τῶν κηκίδων ἐξιχνεύει τὸν σίδηρον εἰς περιστάσεις, καθ' ἃς δὲν ἀνακαλύπτεται πλέον παρὰ τοῦ ὕδροκυανικοῦ καλίου σιδηρίζοντος· οὕτω λ. χ. εἰς τὴν διάλυσιν τοῦ οὐδετέρου τρυγικοῦ σιδήρου, ὅπου ἐνεργεῖ τὸ ὕδροκυανικὸν κάλιον μόνον, ὑπάρχοντος ἐλευθέρου ὀξέος. Τὰ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου διαλύματα χρωματίζονται μετὰ κυανοῦ, καὶ εἰς πλειοτέραν ἐπιπύκνωσιν μετὰ ὑπομέλανος χρώματος, καὶ εἰς τὴν τελευταίαν περίστασιν ἀποτελεῖται ἄφθονον βαθυκυανοῦν, σχεδὸν μέλαν καταβύθισμα· ὑπερτεροῦν ποσὸν τοῦ διαλύματος τῶν τοῦ ὀξειδίου

ἀλάτων ἐμποδίζει τὴν γένεσιν τοῦ κατακρημνίσματος καὶ τὸ κυανοῦν χρῶμα μεταβάλλεται εἰς κυανοπράσινον καὶ μῆλινον.

Τὸ βάμμα τῶν κηκίδων ἐξίχνευε καὶ τὰ ἄλατα τοῦ μνηκανίου, καὶ εἰς πολὺ ὕδωρ κεκραμένα, μὲ χρυσιζόν χρῶμα· ἐὰν δὲ ὑπάρχῃ συγχρόνως σίδηρος, ἀποτελεῖται κατακρημνισμα βαθύτερον τὸ χρῶμα καὶ σχεδὸν αἰμοδαφές.

Εἰς τὸ διάλυμα τοῦ χρυσοῦ γεννᾶται διὰ τοῦ βάμματος τούτου εἰς τὴν πρώτην στιγμὴν τῆς ἀναμίξεώς του φαιὸν χρῶμα, αὐξάνον κατ' ὀλίγον καὶ μεταβαλλόμενον εἰς ὠραῖον πορφυροῦν, μετ' ὀλίγον ἀποκρίνεται ἐκ τοῦ ρευστοῦ βαθύφαιος, σχεδὸν μέλιναι κόνις, δηλ. μεταλλικός χρυσὸς καὶ τὸ βάμμα λαμβάνει ἀκολούθως τεφρόχρουν χρῶμα. Εἰς μεγαλύτεραν λέπτυνσιν τοῦ διαλύματος λαμβάνει μόνον ἰσθες χρῶμα καὶ διάλυμα κεκραμένον μετὰ 2,000 μερ. ὕδατος χρωματίζεται ὑπομέλαν.

Τὸ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου διάλυμα καταβυθίζεται μετὰ φαιοκιτρίνου χρώματος καὶ διὰ τῆς θερμότητος ἀποκρίνεται ὁ μεταλλικός ἀργυρος εἰς εἶδος στακτεράς κόνεως, ἥτις προσκολλᾶται εἰς τὰς πλευράς τῶν σωλῆνων· ὁ μόλυθος ἀποκρίνεται ἐκ τῆς διὰ τοῦ νιτρικοῦ ἢ ὀξικοῦ ὀξέος διαλύσεώς του μετὰ κιτρινωποῦ χρώματος.

Ὁ ὑδράργυρος εἰς ὀξειδωμένην ἢ ὑποξειδωμένην κατάστασιν καταβυθίζεται ἐκ τῆς νιτρικῆς καὶ ὀξικῆς διαλύσεώς του μετὰ βαθυκιτρίνου χρώματος.

Ὁ κασσίτερος κατακρημνίζεται ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ ἀλικοῦ ὑποξειδωμένου κασσιτέρου μὲ κίτρινον χρῶμα, καὶ ἂν ὑπερτερῇ τὸ ὀξύ.

Ὁ χαλκὸς καταβυθίζεται φαιὸς, καὶ διάλυσις τοῦ χαλκοῦ κεκραμένη μετὰ 2,000 μερῶν ὕδατος μόλις φανεροῦται.

Τὸ στίμμιον καταβυθίζεται ἐκ τῆς διαλύσεως τῆς ἐνστιμμίου τρυγὸς μὲ ὠχρὸν χρῶμα.

Τὸ βισμούθιον καταβυθίζεται μετὰ χρυσιζόντος χρώματος, τὸ νικέλιον μετ' ὠχρολεύκου, τὸ οὐράνιον μετ' ἐρυθροφαίου, τὸ χρώμιον μετὰ φαιοῦ, τὸ μολυβδαίνιον μετὰ βιθυφαίου, τὸ δημήτριον μετὰ λευκοῦ καὶ τὸ ἀρσενικὸν ὀξύ μετὰ κιτρίνου· ὁ λευκόχρυσος, καθὼς καὶ ὁ χρυσὸς, δὲν ἀποκαθίζονται, ἀλλὰ καταβυθίζονται εἰς εἶδος ἀνοικτοκιτρίνων κροκίδων. Διὰ τοῦ βάμματος τῶν κηκίδων δὲν καταβυθίζονται τὰ ὀξείδια τοῦ ψευδαργύρου, τοῦ μαγγανησίου καὶ τοῦ ἀρσενικοῦ.

Εἰς ἀναλυτικὰς ἐργασίας φυτικῶν ὑλῶν χρησιμεύει τὸ τῶν κηκίδων βάμμα πρὸς ἀνακάλυσιν φυτικῶν ἀλκαλίων καταβυθίζομένων παρ' αὐτοῦ.

Εἰς τὸ ζωϊκὸν ρευστὸν φανερόναι διὰ κοκοειδοῦς καὶ ταχέως συσχομένου καταβυθίσματος τὴν ὑπαρξίν τοῦ πηκτώματος. Ἐν ἀπὸ τὸ πῆκτωμα τοῦτο ἐκθλιφθῇ τὸ ὕδωρ, παρέχει ὕλην δερματικὴν, ἐλαστικὴν καὶ ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ· τέλος ἀνακαλύπτει τὸ βάμμα τοῦτο καὶ εἰς τὰ τῶν φυτικῶν οὐσιῶν ἐκχυλίσματα τὴν παρουσίαν τοῦ φυτικοῦ πηκτώματος.

Ἰωδίου βάμμα. *Tinctura Iodii.*

Τὸ διαλελυμένον ἄμυλον γίνεται κυανοῦν διὰ τοῦ βάμματος τούτου· ἔαν δὲ τὸ δι' οἶνοπνεύματος βάμμα τοῦ ἰωδίου ἀναμιχθῇ μετὰ ξηροῦ ἀμύλου, δὲν ἀποτελεῖται τὸ εἰρημένον χρῶμα, ἀναφαίνεται ὅμως παραχρῆμα διὰ τῆς προσθήκης τοῦ ὕδατος. Διὰ τοῦ δοκιμαστήριου τούτου φανεροῦται εἰς λευκὰ ξηρεῖα καὶ ἄλλας τοιαύτας κατασκευασίας ἡ παρουσία τοῦ ἀμύλου, ἐκ τῶν ὁποίων ἀκολούθως δι' ἀποπλύσεως δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ.

Τὸ ὑδριωδικὸν ὀξύ εἶναι δοκιμαστήριον ἐπὶ τοῦ λευκοχρύσου καὶ παλλαδίου, τὰ ὁποῖα κατακρημνίζονται ἐκ τῶν διαλυμάτων των μετὰ βαθυφαίου χρώματος.

Ψευδάργυρος μεταλλικός. *Zincum metallicum.*

Ὁ ψευδάργυρος εἰς σχῆμα ράβδου ἢ πλατύσματος καταβυθίζει ἐκ τῶν διαλυμάτων τῶν μετάλλων πρὸ πάντων τὸν μόλυβδον, τὸν κασσίτερον, τὸ στίμμι καὶ τὸν χαλκόν.

Ὁδηγαί ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ σαλπιγγίου δοκιμασιῶν.

Εἰς τὰς περὶ τῆς ποιότητος ἀναλυτικὰς ἐξετάσεις, τὸ σαλπίγγιον εἶναι ἐν τῶν ἀπολύτως ἀναγκαίων ὀργάνων, ἐπεὶ δι' αὐτοῦ δύναται νὰ ἐξιχνευθῶσι πολλαὶ ὕλαι πρὸ πάντων δὲ τινὰ ὀξείδια τῶν μετάλλων μετὰ πλειοτέρας εὐκολίας καὶ βεβαιότητος, παρὰ δι' ἄλλης ὁποιασδήποτε ἐξετάσεως.

Ἐξετάζοντες ἂν τὸ σῶμα ἐμπεριέχῃ πτητικὰς καὶ ὀργανικὰς ὕλας, θερμαίνομεν αὐτὸ διὰ φλογὸς τοῦ οἶνοπνεύματος εἰς τινὰ μικρὸν σωλῆνα, ἢ εἰς ὑέλινον σίφωνα ἐκ τοῦ ἐνὸς ἄκρου κλεισμένον· μετὰ ταῦτα αὐξάνο-

μεν τὴν δύναμιν τῆς φλογὸς διὰ τοῦ σαλπιγγίου. Αἱ διὰ τῆς εἰρημένης πράξεως ἐξατμιζόμεναι ὕλαι εἶναι αἱ ἐξῆς.

α. Ὑδωρ. Τοῦτο δύναται νὰ ἐμπεριέχεται ὡς συστατικόν, ἢ ὡς κρυσταλλώσιμον ὕδωρ· ἐκ τοῦ ποσοῦ τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον ἀποτίθεται εἰς τὰ ψυχρότερα τοῦ σωλήνος μέρη, δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν, ἂν τὸ ὕδωρ ᾖ συστατικόν τοῦ σώματος, ἢ ἂν ἐμπεριέχεται εἰς αὐτὸ ὡς κρυσταλλώσιμον· ἐξετάζεται δὲ τὸ ὕδωρ τοῦτο καὶ διὰ τοῦ χάρτου τοῦ καγκαμίνου καὶ τοῦ τῆς κροκορρίζης, μήπως ἐμπεριέχῃ ἀλάλιον ἢ ὀξύ· καὶ ἐὰν μὲν ᾔθελε μεταβληθῇ μόνος ὁ τῆς κροκορρίζης χάρτης, δῆλον ὅτι ἐμπεριέχεται ἀμμωνία, ἥτις ἐναργέστατα ἐξιχνεύεται, ἐὰν τὸ ὕδωρ συναφθὲν μετὰ τοῦ ἀλικοῦ ὀξέος σχηματίσῃ λευκοὺς ἀτμούς.

β'. Πτητικὰ ὀξέα ἀεροειδοῦς καὶ ῥευστῆς καταστάσεως. Τὰ ἅλατα, τῶν ὁποίων τὰ ὀξέα εἶναι πτητικὰ, χάνουσι διὰ τῆς πυρώσεως μέρος τῶν ὀξέων των, τὸ ὁποῖον κοκκινίζει τὸν ἐπὶ τοῦ στομίου τοῦ σίφωνος τεθνήντα καὶ βραχύντα κυανοῦν χάρτην τοῦ καγκαμίνου. Μεταξὺ τῶν οὐδατέρων ἀλάτων ὀλίγα μόνον ἀποσυνθέτονται τοιοῦτοτρόπως διὰ τῆς θερμάνσεως, καὶ τοῦτο παρατηρεῖται μόνον ἐπὶ τῶν νιτρικῶν ἀλάτων, τὰ ὁποῖα θερμαινόμενα γεμίζουν τὸν ὑέλινον σωλῆνα μετὰ κιτρίνου τινὸς ἀερίου.

Κατὰ ἀσφαλέστερον τρόπον ἐξιχνεύεται ἡ ὑπαρξίς τῶν νιτρικῶν ἀλάτων, ἐὰν ἀναμιχθῶσι μετὰ θεικῆς ποτάσεως μεθ' ὑπερτεροῦντος ὀξέος καὶ θερμανθῶσιν.

Ὡσαύτως ἀποσυντίθενται διὰ τῆς θερμάνσεως τὰ ὀξέα τῶν ὑποθεικῶν, καὶ ὑποθεικῶν ἀλάτων, καὶ δύνανται νὰ γνωρισθῶσι διὰ τῆς κατὰ τοῦ θειώδους ὀξέος ὁσμῆς· εἰς τινὰς περιστάσεις δύνανται νὰ ἐξατμιθῇ διὰ τῆς θερμάνσεως καὶ τὸ φθορικὸν ὀξύ ἐκ τῶν φθορούχων ἐνώσεων, ἐὰν ἡ ἐνωσις αὕτη ἐμπεριέχῃ καὶ ὀλίγον ποσὸν ὕδατος.

γ'. Θεῖον καὶ τινα ἔνθεια μέταλλα. Ἐκ τῶν ἐξεταζομένων ὑλῶν δύναται νὰ ξαχνισθῇ θεῖον, ἐὰν τὸ μίγμα ἐμπεριέχῃ ἔνθεια μέταλλα· καθότι διὰ τῆς θερμάνσεως παραλείπουσι μέρος τοῦ θείου των. Ἐξαχνίζεται δὲ τὸ θεῖον εἰς εἶδος σταγόνων, αἵτινες ἔχουσιν ἐρυθρόφαιον χρῶμα, λαμβάνουσι δὲ ἰδιαίτερον κίτρινον χρῶμα μετὰ τὴν ἀπόψυξιν. Ὀλίγα μόνον ἔνθεια μέταλλα ἐξατμίζονται ἐντελῶς καὶ χωρὶς νὰ ἀποσυντίθενται· ταῦτα δὲ εἶναι ὁ ἐνθεις ὑδράργυρος, ὅστις λειοτριβηθεὶς λαμβάνει ἐρυθρὸν χρῶμα, καθὼς καὶ ἡ ἐνωσις τοῦ θείου μετὰ τοῦ ἀρσενικοῦ.

δ'. Σελήνιον καὶ μερικὰ ἐρσελήνια μέταλλα. Τὸ σελήνιον δύναται

νά εξαχνισθῇ, καθὼς καὶ τὸ θεῖον, εἴτε ἐμπεριέχεται εἰς τὸ μίγμα ὡς σελήνιον, εἴτε ὡς ἐνσελήνιον μέταλλον. Τὸ εξαχνιζόμενον σελήνιον ἀποτίθεται εἰς εἶδος μαλακῆς ἄχνης, ἥτις λειοτριβομένη παρέχει βιβυ-ερυθρὸν χρώμα· μετὰ τὸν τῶν ἐνσεληνίων μετάλλων δύναται νά εξαχνισθῇ καὶ ἐξατμισθῇ ἐντελῶς ὁ ἐνσεληνίος ὑδράργυρος, καθὼς καὶ τὸ ἐνσελήνιον ἀρσενικόν.

έ. Πηκτικὰ μέταλλα. Εἰς τὴν τάξιν ταύτην ἀνήκουσι κατ' ἐξοχὴν τὸ ἀρσενῶδες ὄξύ, ὁ ὑδράργυρος, τὸ κάδμιον, τὸ τελλούριον, ἅτινα ἔχουσι μεταλλικὴν λαμπρότητα, καὶ μέλαν ἢ τεφρόχρουν χρώμα. Τὸ ἀρσενῶδες ὄξύ εξαχνίζεται, ἐὰν τὸ πρὸς ἐξέτασιν σῶμα ἐμπεριέχῃ ἀρσενικόν, ἢ ἀρσενούχα μέταλλα, τὰ ὅποια θερμαινόμενα ἀποβάλλουν μέρος τοῦ ἐμπεριεχομένου ἀρσενικοῦ· τοιαῦται εἶναι αἱ ἐνώσεις τοῦ ἀρσενικοῦ μετὰ τοῦ νικελίου, τοῦ κοβάλτου, τοῦ σιδήρου, τοῦ στιμμίου κτλ. Ἐκλύουσι προσέτι διὰ τῆς θερμάνσεως μεταλλικὸν ἀρσενικόν ἢ ἀρσενῶδες ὄξύ, τὸ ὁποῖον καὶ ἀκολούθως δύναται νά ἐξηχνευθῇ διὰ τῶν γνωστῶν δοκιμαστηρίων.

Ὁ ὑδράργυρος εξαχνίζεται ἐκ τῶν πλειοτέρων του ἐνώσεων, καὶ δύναται νά γνωρισθῇ εὐκολώτερα ἀπὸ τὰ λοιπὰ μέταλλα· ἐὰν τὸ ποτὸν ᾔναι ὀλίγον, σχηματίζεται μόνον ἄχνη, ἥτις θλιφθεῖσα δι' ὑελίνης ῥάβδου παρέχει μεταλλικὰ σφαιρίδια ὑδραργύρου.

Τὸ κάδμιον παρομοίως δύναται νά εξαχνισθῇ ἐκ τινων αὐτοῦ ἐνώσεων, καὶ δύναται νά γνωρισθῇ διὰ τῶν χαρακτηριστικῶν του, καὶ ἰδίως καθότι θερμαινόμενον μεταβάλλεται εἰς φαῖον ὀξειδίου.

Τὸ τελλούριον δυσκόλως μόνον διὰ τῆς πυρώσεως εξατμίζεται, καὶ ἐναποτίθεται εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ σωλῆνος, καθὼς ὁ ὑδράργυρος, εἰς εἶδος μικρῶν, σκληρῶν καὶ μεταλλικῶν σταγόνων.

ς'. Ἑτέρα πηκτικὰ ὀξέα καὶ ὀξείδια. Εἰς τὴν τάξιν ταύτην ἀνήκουσι τὸ ὀξείδιον τοῦ στιμμίου, τὸ ὁποῖον τηκνόμενον μεταβάλλεται εἰς κίτρινον ῥευστόν, πρὶν εξαχνισθῇ εἰς εἶδος λαμπρίζουσιν ἀγγίδων.

Τὸ ὀξείδιον τοῦ τελλουρίου ἔχει ὅμοια χαρακτηριστικὰ, μόνον τοῦτο δυσκολώτερον εξαχνίζεται καὶ δὲν σχηματίζει κρυσταλλώσιμον ἄχνην.

Τὸ ἀρσενῶδες ὄξύ εὐκάλως εξαχνίζεται· τὸ ἀρσενικόν ὄξύ μεταβάλλεται διὰ ἰσχυροῦ πυρὸς εἰς ἀρσενῶδες ὄξύ καὶ εἰς ὀξυγόνον, καὶ παρέχει τὴν ἰδίαν ἄχνην, τὴν ὁποίαν καὶ τὸ ἀρσενῶδες ὄξύ.

Τὸ ὄξύ τοῦ ὀσμίου εξαχνίζεται διὰ τῆς θερμάνσεως εἰς εἶδος λευκῶν σταγόνων καὶ ἐκλύει δυνατὴν κεντητικὴν ὀσμήν.

ζ'. Πτητικὰ ἄλατα καὶ πτητικαὶ ἀλατώδεις ἐνώσεις. Τὰ πλείοτα ἄλατα τῆς ἀμμωνίας εἴτε ἐντελῶς ἐξατμιζόμενα, ἢ ἐν μέρει μόνον, ἂν ἐμπεριέχωσιν ἔμμονόν τι ὀξύ, ἀνήκουσιν εἰς τὴν τάξιν τῶν πτητικῶν ἀλάτων· τὰ ἄλατα τὰ ἐμπεριέχοντα ἀμμωνίαν, δύνανται νὰ διακριθῶσιν ἀπὸ τὰ λοιπὰ, ἐν τῷ ἐξατμιζόμενῳ ἅλας ἀναμιχθὲν μετὰ σόδας καὶ ὕδατος θερμανθῇ ἐπὶ τινος ἐλάσματος ἐκ λευκοχρύσου, καθότι οὕτως ἐκλύεται δυνατὴ ὁσμὴ κατὰ τῆς ἀμμωνίας.

Εἰς τὴν τάξιν τῶν πτητικῶν ἀλατοειδῶν ἐνώσεων ἀνήκουσι πρὸ πάντων ὁ ἀλικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος, ὅστις ἐξαχνίζεται καὶ τήκεται δι' ἐλαφρᾶς θερμότητος.

Ὁ ἀλικὸς ὑποξειδωμένος ὑδράργυρος, ὅστις ἐξαχνίζεται, πρὶν τακτῇ· ἢ ἄχνη αὕτη θερμὴ οὕσα ἔχει χρῶμα κίτρινον, μετὰ δὲ τὴν ἀπόψυξιν λαμβάνει λευκὸν χρῶμα· ἀμφοτέρω ταῦτα τὰ ἄλατα δίδουσι, καθὼς ἅπασαι αἱ τοῦ ὑδραργύρου ἐνώσεις, ἀφοῦ πρῶτον ἀναμιχθῶσι μετὰ σόδας καὶ θερμανθῶσιν εἰς μικρὸν ὑέλινον ἀγγεῖον, ἄχνην συνιστάμεν ἔκ σφαιριδίων ὑδραργύρου· τὰ αὐτὰ χαρακτηριστικὰ ἔχουσιν αἱ ἐνώσεις τοῦ ὑδραργύρου μετὰ τοῦ βρωμίου καὶ τοῦ ἰώδους, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ὁ ὑδριωδικὸς ὀξειδωμένος ὑδράργυρος, θερμαινόμενος ἐκλύει ἄχνην κιτρίνην ἐρυθρουμένην διὰ τῆς λειοτριβήσεως.

Καὶ ἂν δὲν ἀνακαλυφθῶσιν εἰς τὰς ἐξετασθησόμενας ὕλας πτητικὰ σώματα, εἶναι ἀνάγκη νὰ θερμανθῶσιν εἰς μικρὰν ὑελίνην φιάλην δι' ἀσθενοῦς πυρὸς καὶ μάλιστα, ἐὰν αἱ ὕλαι δὲν κροτοῦσιν.

Εἰς περιστάσεις τινὰς αἱ ἐξεταζόμεναι ὕλαι, ἀφοῦ πυρωθῶσιν, ὑποβάλλονται εἰς ἐξέτασιν διὰ τινων δοκιμαστηρίων. Ἐν π. χ. ὑποπτεύεται εἰς ὕλην τινὰ ὑπαρξίς τοῦ ὑδραργύρου, ἀναμιγνύεται αὕτη μὲ ὑπερτεροῦσαν ποσότητα σόδας, καὶ θερμαίνεται διὰ τῆς τοῦ οἰνοπνεύματος φλογός, αὐξανομένης τῆς θερμότητος διὰ τοῦ σαλπιγγίου· διὰ τῶν πράξεων τούτων ἀνακαλύπτεται ὁ ὑδράργυρος εἰς εἶδος ἄχνης τινός, ἐνὸς δὲν γνωρίζεται, ἂν ἡ ἄχνη αὕτη προέρχεται ἀπὸ μεταλικὸν ὑδράργυρον, καὶ τότε εἶναι ἀνάγκη νὰ συναχθῇ διὰ τινος ὑελίνης ἢ ξυλίνης ράβδου, καὶ οὕτω ἀναφαίνονται σφαιρίδια τοῦ ὑδραργύρου. Ἐκτὸς τῆς σόδας μεταχειρίζονται εἰς τοιαύτας δοκιμασίας τὴν θειϊκὴν πότασσαν δι' ὑπερτεροῦντος ἀξέως, ἥτις χρησιμεύει εἰς τὸ νὰ ἀνακαλύβῃ τὸ εἰς τὰ ἄλατα ἐμπεριεχόμενον ὀξύ, τὸ ὁποῖον μετὰ ταῦτα ἐκλύεται ἐκ τῶν ἐνώσεών του διὰ τῆς τήξεως. Κατ' ἐξοχὴν μεταχειρίζομεθα τὴν θειϊκὴν πότασσαν διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν παρουσίαν τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος εἰς τὰ νιτρικὰ ἄλατα· καθότι

ἐὰν τὰ ἅλατα ταῦτα ἀναμιχθῶσι μετὰ τῆς θεϊκῆς ποτάσεως καὶ θερμανθῶσιν εἰς κατὰλληλον φιάλην διὰ τῆς φλογὸς τοῦ οἶνοπνεύματος, ἐκλύουσιν ἄρθρον ἐρυθροκίτρινον ἀτμὸν, ὡς τὸν τοῦ νιτρώδους ὀξέος· διὰ τῆς θεϊκῆς ποτάσεως ἐκλύεται καὶ τὸ φθορικὸν ὄξυς ἐκ τῶν φθορικῶν ἐνώσεων, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ γνωρισθῇ, καθότι κατασταίνει τὸν ὑέλινον σωλῆνα ἀδιαφανῇ.

Ἐκ τῶν ἰωδούχων ἐνώσεων τῶν ἀναμιγνυομένων μετὰ τῆς θεϊκῆς ποτάσεως ἐκτυλίσσεται διὰ τῆς θερμάνσεως ἰώδης ἀτμὸς, ὅστις ἐπιτυκνύμενος εἰς τὸ ψυχρότερον μέρος παρουσιάζει κρυστάλλους τοῦ ἰώδους.

Τὰ τοῦ βρωμίου ἅλατα εἰς τὰς αὐτὰς πράξεις ὑποβαλλόμενα ἐκτυλίσσουσιν ἀτμὸν, ὡς τὸν τοῦ βρωμίου, τὸ ὁποῖον συνήθως ἐμπεριέχεται εἰς αὐτὰ εἰς τόσῃ ὀλίγῃ ποσότητι, ὥστε δυσκόλως δύναται νὰ γνωρισθῇ.

Διὰ νὰ ἐξιχνεύσωμεν εἰς τὰ θεϊκὰ ἅλατα, τῶν ὁποίων ἡ βάσις εἶναι ὀξείδιον τινὸς μετάλλου, τὴν παρουσίαν τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, θερμαίνομεν τὸ λείψυδρον μίγμα μετ' ἀνθρακος διὰ τοῦ σαλπιγγίου, δι' οὗ ἐκλύεται δυνατὴ ὁσμὴ κατὰ τοῦ θειώδους ὀξέος.

Ἀφοῦ ἡ πρὸς ἐξέτασιν ὕλη καθυποβλήθῃ εἰς τὰς προρῶθεις δοκιμαίας, θερμαίνεται εἰς ὑέλινον σωλῆνα διὰ μόνης τῆς φλογὸς τοῦ οἶνοπνεύματος αἰζανομένης τῆς θερμότητος διὰ τοῦ σαλπιγγίου· ὁ σκοπὸς τῆς πράξεως ταύτης ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ ἀνακαλύψωμεν, ἐὰν διὰ τῆς θερμάνσεως ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τῆς ἀτμοσφαίρας σχηματίζονται πτητικὰ σώματα ἢ ὄχι· τὰ πτητικὰ σώματα, τὰ ὁποῖα σχηματίζονται διὰ τῆς πυρώσεως εἶναι ἢ ἀεροειδῆ, καὶ τότε γνωρίζονται διὰ τῆς ὁσφρήσεως, ἢ στερεὰ, καὶ τότε ἀποτίθενται εἰς εἶδος ἄχνης εἰς τὰ ψυχρότερα τοῦ ἀγγείου μέρη καὶ ἀπομακρύνονται τόσον περισσότερον ἀπὸ τὴν ἐξεταζομένην ὕλην, ὅσον πτητικώτερα εἶναι.

Τὸ θειῶδες ὄξυς, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται διὰ τοῦ φρυγμοῦ τῶν ἐνθείων μετάλλων, καὶ εἰς ἐλαχίστην ποσότητα δύναται νὰ γνωρισθῇ διὰ τῆς ὁσμῆς του, ἐὰν πυρωθῇ εἰς ὑέλινον σωλῆνα καὶ συνεχῶς ὁσφραίνεται. Ἀνακαλύπτεται δὲ, καὶ ἐὰν χάρτης βαμμένος διὰ τοῦ ἀφεψήματος τοῦ ξύλου τῆς βρασιλίας, τεθείς εἰς τὸ ἀνώτατον τοῦ σωλῆνος μέρος, λευκανθῇ διὰ τοῦ ἐκλυομένου ὀξέος· τινὰ τῶν ἐνθείων μετάλλων ὄχι μόνον ἐκλύουσι θειῶδες ὄξυς, ἀλλὰ καὶ ἐξαχνίζουσι θεῖον· τινὰ πάλιν σχηματίζουσιν ἄλλους ἀτμοὺς, περὶ τῶν ὁποίων θέλομεν διαλάβει.

Ὁ ἔνθειος ψευδάργυρος καὶ τὸ ἔνθειον μολυβδαίνιον ἐκλύουσι δυσκολώτερα τῶν ἄλλων ἐνθείων μετάλλων θειῶδες ὀξύ.

Τὸ σελήνιον ἐξαχνίζεται συνήθως ἀπὸ τὰ ἐνσελήνια μέταλλα εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν.

Μερικὰ ἀρσενικοῦχα μέταλλα ἐκδίδουσιν, ἐὰν φρυχθῶσιν, ὁσμὴν ὡς τὴν τοῦ ἀρσενικοῦ· τοῦτο ὅμως τὸ φαινόμενον συμβαίνει μόνον εἰς περιπτώσεις, καθ' ἃς τὸ ἀρσενικὸν ἐξαχνίζεται εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν. Ἐὰν ἐξαχνισθῇ διὰ τοῦ φρυγμοῦ μόνον ἀρσενῶδες ὀξύ, τότε δὲν ἐκλύεται ἡ τοιαύτη ὁσμὴ.

Διὰ τοῦ φρυγμοῦ εἰς τὸν σωλῆνα ἀποτιθέμεναι ὕλαι.

Ἐὰν ἡ ἄχνη ἔχη λευκὸν χρῶμα, τότε συνίσταται συνήθως ἐξ ὀξειδίων, ἅτινα ἐνυπάρχουσιν εἰς τὴν ἐξεταζομένην ὕλην, καὶ τὰ ὅποια ἐσχηματίσθησαν διὰ τῆς ὀξειδώσεως τῶν μετάλλων. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσι:

α'. Τὸ ἀρσενῶδες ὀξύ, τὸ ὅποιον σχηματίζεται διὰ τοῦ φρυγμοῦ τῶν ἀρσενικοῦχων μετάλλων, ἀποτίθεται δὲ εἰς εἶδος λευκῆς ἄχνης κρυσταλλώδους, ἐὰν θεωρηθῇ διὰ τοῦ μικροσκοπίου. Ἐκ τινων ἀρσενικοῦχων μετάλλων σχηματίζεται τὸ ἀρσενῶδες ὀξύ εὐκολώτερα, ἐξ ἄλλων δυσκολώτερα, καὶ ἐνίοτε ἀπαιτεῖται συνεχῆς πύρωσις διὰ τοῦ σαλπιγγίου· ἐξ ὀλίγων ἀρσενικοῦχων μετάλλων σχηματίζεται διὰ τοῦ φρυγμοῦ ἐκτὸς τοῦ ἀρσενώδους ὀξέος, καὶ μεταλλικὸν ἀρσενικόν· ἐπίσης ἐξ ὕλων, αἵτινες ἐμπεριέχουσιν ἔνθειον ἀρσενικόν, ἐξαχνίζεται διὰ τοῦ φρυγμοῦ εἰς ἀνοικτὸν σωλῆνα, ἐκτὸς τοῦ ἀρσενώδους ὀξέος, συνήθως μὲν ἐρυθρόν, ἐνίοτε δὲ καὶ κίτρινον ἔνθειον ἀρσενικόν. Πρὸς τούτοις δύναται νὰ ἐκλυθῇ ἀρσενῶδες ὀξύ ἐξ ὕλων, εἰς ἃς ὑπάρχει ὑπερτεροῦσα ποσότης ἀρσενώδους ὀξέος.

β'. Τὸ ὀξείδιον τοῦ στιμμίου σχηματίζεται διὰ τοῦ φρυγμοῦ στιμμίου, ἐξ ἐνστιμμίων μετάλλων, ἐνθείου στιμμίου, καθὼς καὶ ἐκ διαφορῶν ὀρυκτῶν, ἐν οἷς ὑπάρχει τὸ εἰρημένον ὀξείδιον.

Ἡ σχηματιζομένη ἄχνη εἶναι λευκὴ τὸ χρῶμα, καὶ ἀσθενῶς θερμανθεῖσα μετατοπίζεται, χαρακτηριστικὸν ἀνῆκον εἰς μόνον τὸ ὀξείδιον τοῦ στιμμίου. Εἰς πολλὰς περιπτώσεις ὁ ἐκ τῶν στιμμιοῦχων ὕλων διὰ τοῦ φρυγμοῦ ἐκλύμενος καπνὸς ἐμπεριέχει, ὅχι μόνον ὀξείδιον τοῦ στιμμίου, ἀλλὰ συγχρόνως στιμμιωδες ὀξύ, τὸ ὅποιον ἂν καὶ δὲν ἦναι πτητικὸν ἐμφανίζεται ὅμως εἰς εἶδος ἄχνης, ἄνωθεν τῆς ἐξατμιζομένης ὕλης. Ἄχνη,

ἥτις ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ ὀξειδίου τοῦ στιμμίου καὶ στιμμικὸν ὀξύ, δύναται νὰ ἐξατμισθῇ μόνον ἐν μέρει, ἐὰν θερμανθῇ.

γ'. Ὁξειδίον τοῦ τελλουρίου. Τὸ εἰρημένον ὀξειδίον φαίνεται εἰς εἶδος ἄχνης διὰ τοῦ φρυγμοῦ τοῦ τελλουρίου καὶ τῶν ὀρυκτῶν τῶν ἐμπεριεχόντων τὸ τελλούριον, καθὼς καὶ διὰ τῆς θερμάνσεως τοῦ ὀξειδίου τοῦ τελλουρίου καὶ τινων αὐτοῦ ἐνώσεων· τὸ ἐξατμιζόμενον τελλουροξειδίον σχηματίζει λευκὸν καπνὸν, ὀλιγώτερον ὅμως πτητικὸν ἀπὸ τὸν τοῦ ὀξειδίου τοῦ στιμμίου καὶ διακρινόμενον, καθότι δὲν μετατοπίζεται θερμαινόμενος, ἀλλὰ τήκεται πρὸς μικρὰς σταγόνας.

Ἐὰν τὰ τοῦ τελλουρίου ὀρυκτὰ ἐμπεριέχωσι μόλυβδον, σχηματίζεται μὲν ἄχνη τοῦ τελλουροξειδίου, ἀλλ' ἐκτὸς τούτου καὶ ἑτέρα ἄχνη, συνισταμένη ἐξ ὀξειδίου τοῦ τελλουρίου καὶ μολύβδου, μὴ τηκομένη πρὸς σταγόνας· τὰ αὐτὰ χαρακτηριστικὰ ἔχει καὶ ὁ ἐγγλῶριος μόλυβδος, καθότι ἐξατμίζεται καὶ αὐτὸς ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀέρος καὶ τήκεται πρὸς σταγόνας.

δ'. Ὁξειδίον τοῦ βισμούθιου. Σχηματίζεται διὰ τῆς ὀξειδώσεως τοῦ ἐνθείου βισμούθιου καὶ τῶν τοῦ βισμούθιου ὀρυκτῶν, ἀλλ' ὄχι καὶ διὰ τῆς ὀξειδώσεως τοῦ βισμούθιου. Ἡ ἀποτελούμενη ἄχνη θερμαινόμενη τήκεται πρὸς φαιὰς ἢ κιτρίνους σταγόνας, καὶ διὰ τοῦ χρώματος τούτου γνωρίζεται ἀπὸ τὴν ἄχνην τοῦ ὀξειδίου τοῦ τελλουρίου. Παρομοίως αἱ ὕλαι, αἵτινες ἐμπεριέχουσι βισμούθιον, ἐὰν πυρωθῶσι, περιβάλλονται ἀπὸ ὀξειδίου τοῦ βισμούθιου, τὸ ὁποῖον ἔχει χρῶμα βαθυκίτρινον, καὶ κατὰ τοῦτο δύναται νὰ διακριθῇ ἀπὸ τὰ πλείοντα μέταλλα· τινὰ μέταλλα ὡς τὸ ἀρσενικόν, τὸ τελλούριον, στίμμιον καὶ τὸ βισμούθιον δίδουσιν, ἐὰν μιγνύματα αὐτῶν θερμανθῶσιν εἰς τὸν ἀνοικτὸν σωλῆνα, ἄχνην λευκὴν. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσιν ὁ ἐνθεις καὶ ἐνσελήνιος μόλυβδος, οἵτινες δίδουσιν ἄχνην λευκὴν, συνισταμένην ἐκ θειικοῦ καὶ σεληνιακοῦ μολυβδοξειδίου, καὶ μεταβαλλομένην εἰς στακτεράν διὰ τῆς θερμάνσεως.

Ὁ ἐνθεις κασσίτερος ἐκδίδει πυκνὸν καὶ λευκὸν καπνὸν, συνιστάμενον ἐξ ὑποξειδίου τοῦ κασσιτέρου, ὅστις δὲν δύναται νὰ ἐξατμισθῇ διὰ τῆς θερμάνσεως.

Τὸ μολυβδαινικὸν ὀξύ θερμαινόμενον ἐξαχνίζεται ἐν μέρει εἰς εἶδος κοινώδους ἄχνης, ἐν μέρει εἰς εἶδος λαμπρίζοντων καὶ ἀσθενῶς κιτρινίζόντων κρυστάλλων· ἡ δὲ ἐνθεις μολυβδαίνα ὡσαύτως θερμαινόμενη δὲν δίδει ἄχνην, ἀλλὰ μόνον θειώδες ὀξύ.

Αἱ πλείοντα ἐνώσεις τοῦ ὑδραργύρου ἐκλύουσιν ἐὰν θερμανθῶσιν εἰς

άνοικτὸν σωλῆνα ἄχνην ἐξ ὑδραργύρου· ὁ ἐνθεὶς ὑδραργυρὸς ἐξατμίζεται χωρὶς σχεδὸν νὰ ἀποσυντεθῇ, καὶ ἐκδίδει μέρος μεταλλικοῦ ὑδραργύρου, ὅστις ὡς πτητικώτερος ἀποτίθεται εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ σωλῆνος· αἱ ἐνώσεις τοῦ χλωρίου μετὰ τοῦ ὑδραργύρου ἐξαχνίζονται χωρὶς νὰ ἀποσυντεθῶσιν.

γ'. Ἀφοῦ ἡ ἐξετασθησομένη ὕλη ἐδοκιμάσθη εἰς τὸν ὑέλινον σωλῆνα, θερμαίνεται μέρος αὐτῆς διὰ τῆς φλογὸς τοῦ σαλπιγγίου· ὁ σκοπὸς τῆς πράξεως ταύτης εἶναι νὰ ἐξετάσωμεν, ἂν δύναται νὰ ταχῇ, καθὼς καὶ τὰς ἀλλοιώσεις τῶν χρωμάτων, τὰς ὁποίας λαμβάνουσι μερικαὶ ὕλαι, ἢ τὰς ὁποίας μεταδίδουσιν εἰς τὴν φλόγα τοῦ σαλπιγγίου, καὶ τέλος νὰ ἰδῶμεν τὰς μεταβολάς, τὰς ὁποίας λαμβάνουν αἱ ὕλαι τόσον διὰ τῆς ὀξειδούσης φλογὸς καθὼς καὶ τῆς ἀποκαθιστώσης· κατὰ τοὺς διαφόρους σκοποὺς θερμαίνεται ἡ ἐξετασθησομένη ὕλη ἢ ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων, ἢ ἐπὶ τινὸς πλατύσματος ἐκ λευκοχρύσου.

Διὰ νὰ ἐξετάσωμεν τὴν χώνευσιν τῶν ὑλῶν διὰ τῆς φλογὸς τοῦ σαλπιγγίου, ἐπιθέτομεν ἐπ' ἀνθρακος, δηλαδὴ ἐκθέτομεν εἰς τὴν μεγαλητέραν θερμότητα, τὰς συνισταμένας ὕλας ἐκ μετάλλων ἢ μεταλλοξειδίων, αἱ ὁποῖαι εὐκόλως ἀποκατασταίνονται, καὶ αἱ ὁποῖαι ἐμπεριέχουσιν ὕλας κίτρινες διαλύουσιν ἢ φθείρουσιν τὸν λευκόχρυσον.

Ἐὰν δὲ σύγκηται ἡ ἐξετασθησομένη ὕλη ἐξ ὑλῶν, αἵτινες δὲν δύνανται νὰ διαλύωσιν εἰς τὴν θερμότητα τὸν λευκόχρυσον, τότε μέρος τῆς εἰρημένης ὕλης διὰ πυράγκας κρατούμενον ἐκτίθεται εἰς τὴν μεγαλητέραν θερμότητα· ἡ πρᾶξις αὕτη ἐφαρμόζεται εἰς περιστάσεις, καθὼς ἡ ὕλη ἐμπεριέχει χάλικα, καὶ οὕτως δύνανται νὰ γνωρισθῶσιν ἀπ' ἀλλήλων διὰ τοῦ διαφορετικοῦ βαθμοῦ τῆς χωνεύσεως. Ἐὰν ἡ ὕλη σύγκηται ἐκ μικρῶν κομματίων, τότε ἐπιτίθεται κομμάτιον ἐπ' ἀνθρακος καὶ ἐπ' αὐτοῦ ὀδηγεῖται ἡ φλόξ διὰ τοῦ σαλπιγγίου. Κονιώδεις ὕλαι συγκολλοῦνται πρῶτον διὰ σιέλου πρὸς φύραμα, καὶ ἀκολούθως θερμαίνονται τεθεῖσαι ἐπ' ἀνθρακος διὰ τῆς φλογός. Πρέπει δὲ νὰ σημειώσωμεν ὅτι ἀπαιτεῖται προσοχὴ διὰ νὰ μὴ διωχθῇ διὰ τοῦ φυσήματος ἡ ἐξεταζομένη ὕλη.

Τὰ πλεῖστον μέταλλα τήκονται διὰ τῆς εἰρημένης φλογός καὶ ἐξαιρουμένων τῶν εὐγενῶν μετάλλων, ἅπαντα ὀξειδοῦνται. Μεταξὺ τῶν εὐγενῶν μετάλλων τήκονται πρὸ τῆς φλογός τοῦ σαλπιγγίου, ὁ χρυσοῦς καὶ ὁ ἄργυρος, χωρὶς νὰ μεταβάλλωνται. Ἀπληκτα φαίνονται ὁ λευκόχρυσος, τὸ ἰρίδιον, παλλάδιον, καὶ τὸ ῥόδιον, καθὼς καὶ τὸ ὄσμιον· τὸ δὲ τελευταῖον ὀξειδοῦται εἰς τὸ ἔξω μέρος τῆς φλογός, μεταβαλλόμενον πρὸς

ὀσμικὸν ὀξύ, καὶ ἐξατμιζόμενον. Μεταξὺ τῶν λοιπῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων τὰ ὀξειδία δύνανται νὰ μεταποιηθῶσιν εἰς μέταλλα κατ' ἐξοχὴν ὑπὸ τῆς συνδρομῆς τῆς σόδας, ἄτμητα εἶναι διὰ τοῦ πυρὸς τοῦ σαλπιγγίου ἢ μολύβδαινα, τὸ βολφράμιον, τὸ νικέλιον, τὸ κοβάλτιον, καὶ ὁ σίδηρος.

Τὰ ἐνθεια μέταλλα τήκονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τοῦ ἀνθρακος διὰ τοῦ πυρὸς τοῦ σαλπιγγίου, καὶ ἐὰν τὰ ὀξειδία τῶν μετάλλων ᾖναι ἄτμητα· πολλὰ δὲ ἐξ αὐτῶν ὀξειδοῦνται συγχρόνως, καὶ, ἐνῶ ἐκλύουσι διὰ τῆς θερμάνσεως ὀσμήν κατὰ τοῦ θειώδους ὀξέος, μεταβάλλονται εἰς ὀξειδία.

Τὰ πλείοτερα καθαρὰ μεταλλοξείδια εἶναι ἄτμητα, μερικὰ ἐξ αὐτῶν ὀξειδοῦνται εἰς μεγαλύτερον βαθμὸν διὰ τῆς ἔξω φλογός, λαμβάνουν δὲ κατώτερον βαθμὸν ὀξειδώσεως διὰ τῆς ἔσω φλογός. Τὰ ἄτμητα ὀξειδία εἶναι ἢ βαρεῖα, ἢ στροντιανή· Τούτων δὲ αἱ ἐνώσεις μετὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος, καθὼς καὶ αἱ ὑδρομιγεῖς γαῖαι εἶναι τήξεως ἐπιδεκτικαί, μεταβάλλονται δὲ εἰς καθαρὰς γαίας, ἐὰν θερμανθῶσιν ἐπ' ἀνθρακος, καὶ γίνονται εὐτήκτα φυράματα. Ἡ τίτανος ἐὰν ἰσχυρῶς θερμανθῇ, φωτοβολεῖ παρομοίως ἢ μαγνησιὰ, ἢ ἄργιλλος, ἢ θυρηλία, ἢ ἱτρία, καὶ τὸ ζιρκόνιον.

Ἀλλοιώσεις τῶν χρωμάτων, εἰς τὰς ὁποίας ὑπόκεινται

αἱ ὕλαι, ἐὰν θερμανθῶσιν.

Αἱ ἀλλοιώσεις αὗται προσέρχονται ἀπὸ τὴν ἀποσύνθεσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπόκεινται μεταβαλλόμεναι συγχρόνως εἰς σῶμά τι ἔχον διαφορετικὸν χρῶμα.

Μερικὰ σώματα λαμβάνουσιν, ἐὰν θερμανθῶσι, διαφορετικὸν χρῶμα χωρὶς νὰ μεταβάλλωνται κατὰ τὴν σύνθεσίν των, κατ' ὀλίγον δὲ χάνουσι τὸ διὰ τῆς θερμάνσεως ληφθὲν χρῶμα, καὶ μετὰ τὴν ἀπόψυξιν ἐπαναλαμβάνουν τὸ πρῶτόν των χρῶμα, καὶ τοῦτο εἶναι χαρακτηριστικὸν ἰδιάζον εἰς πολλὰς ὕλας. Εἰς τὴν κατηγορίαν τούτων ἀνήκουσι τὸ ὀξειδιον τοῦ ψευδαργύρου, καὶ τὸ τιτανικὸν ὀξύ, ἔχοντα λευκὸν χρῶμα εἰς συνήθη θερμότητα, κίτρινον εἰς τὴν ἐπαυξανομένην, φαινόμενον τὸ ὁποῖον δύναται μὲν νὰ θεωρηθῇ ἐπὶ πολλῶν ἄλλων λευκῶν ὑλῶν, ὅχι ὅμως εἰς τοιοῦτον ἐξοχὸν βαθμὸν.

Τὸ μίνιον καὶ τὸ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου ἔχουσιν εἰς συνήθη θερμότητα ἐρυθρὸν χρῶμα, εἰς ὑψηλότεραν δὲ μέλαν, χωρὶς ὅμως νὰ ἀποσυντεθῶσι· πολλοὶ ὕλιν ματαβάλλουσι τὸ χρῶμα διὰ τῆς θερμότητος εἰς βαθύτερον, καθὼς τὸ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου καὶ τοῦ βισμούθιου.

Ἡ παρουσία μερικῶν σωμάτων δύναται νὰ ἐξίχνευθῇ καὶ διὰ τοῦ χρωματισμοῦ τῆς φλογὸς τοῦ λύχνου τοῦ οἰνοπνεύματος. Οὕτω λ. χ. ἀναφέρομεν χρωματισμὸν τῆς φλογὸς διὰ τῶν ἀλκαλίων· διαφορετικὸς χρωματισμὸς παρατηρεῖται, ἐὰν ἡ φλόξ συναφθῇ μετὰ σωμάτων ἐμπεριεχόντων στροντιανήν καὶ τίτανόν, καθὼς καὶ με φωσφορικὰς ἐνώσεις βραχεΐσαι μετὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος καὶ βόρακος.

Αἱ ἀποσυνθέσεις, εἰς τὰς ὁποίας ὑπόκεινται μερικαὶ οὐσίαι διὰ τῆς ἔξω, καθὼς καὶ διὰ τῆς ἔσω φλογὸς, συνίστανται εἰς τὸ νὰ ὀξειδωθῶσι διὰ τὴν ἔξω φλογὸς καὶ νὰ ἀποκατασταθῶσι πάλιν διὰ τῆς ἔσω· αἱ μεταβολαί, αἵτινες ἀποτελοῦνται διὰ τῆς ἔξω φλογὸς, ὁμοιάζουσι συνήθως με ἐκείνας, εἰς τὰς ὁποίας ὑπόκεινται τὰ σώματα, ἐὰν θερμανθῶσιν εἰς τὸν ἀνοικτὸν ἀέρα. Μολοντοῦτο ὀξειδοῦνται συχνάκις σώματα εἰς τὴν ἔξω φλόγα ἐπ' ἀνθρακος, διὰ νὰ δυνηθῶσι νὰ διαλυθῶσι ἀκολουθῶς εὐκολώτερα διὰ τῶν δοκιμαστηρίων· οὕτω λ. χ. καθυποβάλλονται τὰ ἐνθεια καὶ τὰ ἀρσενούχα μέταλλα εἰς φρυγμὸν διὰ νὰ ἀποχωρισθῶσιν ἀπὸ τὰ σχηματιζόμενα ὀξειδία τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀρσενικόν, ὡς θειώδες καὶ ἀρσενώδες ὀξύ.

Ἡ ἀποκατάστασις, τὴν ὁποίαν αἱ ὕλιν πάσχουσιν εἰς τὴν ἔσω φλόγα, ἀποτελεῖται εὐκολώτερα καὶ καλῆτερα, ἐὰν ἡ ὕλη ἀναμιχθῇ μετὰ σόδας καὶ ἀκολουθῶς πυρωθῇ ἐπ' ἀνθρακος διὰ τῆς φλογὸς τοῦ σαλπιγγίου.

δ'. Ἀφοῦ ἡ πρὸς ἐξέτασιν ὕλη δοκιμάσθῃ εἰς τὸν ὑέλινον σωλῆνα, καὶ ἀφοῦ ἐξετασθῇ εἰς τὴν ἐπιρρόην τῆς θερμότητος, ἀκολουθῶς ἐξετάζεται διὰ τῶν δοκιμαστηρίων· ἡ ἐξέτασις αὕτη γίνεται εἰς τὰς πλειοτέρας περιπτώσεις ἐπ' ἀνθρακος, ἢ καὶ ἐπὶ σύρματος ἐκ λευκοχρύσου, εἰς πολλὰ ὀλίγας περιστάσεις μεταχειρίζεται τὸ πλάτυσμα τοῦ λευκοχρύσου.

Τὰ κυριώτερα δοκιμαστήρια διὰ τὴν ἐξέτασιν εἶναι ἡ σόδα λεῖψυδρος, ἡ ἐναμμώνιος φωσφορικὴ σόδα, καὶ ὁ βόραξ.

Ἐξέτασις τῶν ὕλων διὰ τῆς σόδας.

Συντηκόμεναι με σόδα ἐπ' ἀνθρακος σχηματίζουσι σφαιρίδιον, καὶ

τοῦτο εἶναι χαρακτηριστικὸν εἰς πολλὰς ὕλας· τινὲς ὕλαι τήκονται μετὰ τῆς σόδας εἰς τὴν ἔσω φλόγα, ὅμως μόνον ἐπὶ τοῦ σύρματος τοῦ λευκοχρύσου, καὶ τοῦτο συμβαίνει εἰς ἐκείνας τὰς ὕλας, αἵτινες δεικνύουσιν ὡς πρὸς τὴν σόδα νὰ χαρκτηριστικά. Πολλὰ ὀξειδία ἀποκαθίστανται εὐκόλως, ἐν ἀναμιχθῶσι μετὰ τῆς σόδας καὶ ἐκτεθῶσιν εἰς τὴν ἔσω φλόγα ἐπ' ἀνθρακος, καὶ τότε ἐκ τῶν ἐκτακέντων μετάλλων γνωρίζεται τὸ ἐξαγόμενον ὀξειδίον. Ἐπὶ πολλῶν ὑλῶν πάλιν δὲν ἔχει καμμίαν ἐνέργειαν ἡ σόδα, μήτε δύνανται νὰ ἀποκατασταθῶσι μετ' ἀνθρακος, μήτε συντήκονται ἐπὶ τοῦ λευκοχρύσου· εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσιν αἱ γαῖαι, καὶ ὀλίγα τινὰ ἐκ τῶν οὕτω καλουμένων ὀξειδίων τῶν μετάλλων.

α'. Ὑλαι, αἵτινες δύνανται νὰ συντακῶσι διὰ μέσου τῆς σόδας ἐπ' ἀνθρακος πρὸς σφαιρίδια εἶναι μόνον ὀλίγαι.

Ὁ χάλιξ συντήκεται μετὰ τῆς σόδας πρὸς διαχυγὲς καὶ ἄχρουν σφαιρίδιον, καὶ δι' αὐτοῦ ἐξιχνεύεται. Ἐκτὸς τούτου συντήκονται καὶ τινες ἐνώσεις μετὰ τῆς σόδας πρὸς σφαιρίδιον, σπανίως ὅμως διαφανές. Ὅσον πλεῖστον ποσὸν χάλικος καὶ ὀλιγώτεροι βάσεις ἐμπεριέχονται, καὶ ὀλιγώτερον ποσὸν σόδας προστεθῇ, τόσον εὐκολώτερον τήκονται. Προσέτι δύναται καὶ τὸ τιτανικὸν ὀξύ νὰ τακῇ μετὰ τῆς σόδας πρὸς ἀδιαφανῆ καὶ ὑπόλευκον ὕελον.

Αἱ λοιπαὶ ὕλαι διόλου δὲν διχλύνονται παρὰ τῆς σόδας, ἀλλ' ἐπιμένουσιν ἐπὶ τοῦ ἀνθρακος, ἐνῷ ἡ σόδα εἰσέρχεται εἰς τοὺς πόρους αὐτοῦ.

β'. Ὑλαι, αἵτινες ἀναμιγνύμεναι μετὰ τῆς σόδας καὶ τεθεῖσαι ἐπὶ τοῦ ἐκ λευκοχρύσου σύρματος δύνανται νὰ συντηχθῶσιν εἰς τὸ ἔσω τῆς φλογὸς μέρος, εἶναι: Ὁ χάλιξ, τὸ μολυβδοειδὲς βολφραμικόν, καὶ στιμμιώδες ὀξύ, τὸ ὀξειδίον τοῦ χρωμίου, τοῦ τελλυρίου, τὸ τιτανικὸν ὀξύ, καθὼς καὶ τὰ ὀξειδία τοῦ μαγγανησίου. Τὰ τελευταῖα ταῦτα διαλύονται εἰς ὀλίγον ποσὸν σόδας, ἥτις λαμβάνει διὰ τοῦ ἐλαχίστου ποσοῦ πράσινον χρῶμα, δι' οὗ τὸ μαγγανησίον εὐκόλως δύναται νὰ γνωρισθῇ· ὁ χρωματισμὸς δύναται νὰ θεωρηθῇ κάλιον ἐπὶ τοῦ σύρματος τοῦ λευκοχρύσου. Παρομοίως διαλύεται καὶ εἰς ὀλίγον ποσὸν τὸ ὀξειδίον τοῦ κοβαλτίου, τὸ ὀξειδίον τοῦ μολύβδου καὶ τοῦ χαλκοῦ.

γ'. Ὑλαι τινὲς ἀναμιγνύμεναι μετὰ σόδας καὶ πυρωθεῖσαι διὰ τῆς ἔσω τοῦ λύχνου φλογὸς ἀποκαθίστανται.

Μερικὰ τῶν ὀξειδίων ἀποκαθίστανται εἰς μέταλλον, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἐξατμισθῇ διὰ συνεχοῦς θερμάνσεως διὰ τῆς ἔσω φλογός. Ἐν

τὸ μέταλλον ἀποκατασταθῇ καὶ ἐξατμισθῇ, κατακαλύπτει ὡς ὀξειδίων τὸν ἄνθρακα ἢ εἰς τὸ ἴδιον μέρος ἐπὶ τοῦ ὁποίου θερμάνθη, ἢ καὶ εἰς ἀπόστημά τι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον μέγχι. Τινὰ δὲ ὀξείδια, τῶν ὁποίων τὰ μέταλλα δὲν εἶναι πτητικὰ, ἀποκαθίστανται, χωρὶς νὰ σχηματίζεται τοιοῦτον κάλυμμα. Τὸ ἀποκατασταθὲν μέταλλον δύναται ἀκολούθως ἐκ τοῦ λειοτριβηθέντος ἄνθρακος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐγίνεν ἡ ἀποκατάστασις, νὰ ἐκπλυθῇ καὶ γνωρισθῇ ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν του.

Εἰνότε δύναται, καθὼς ἀναφέραμεν καὶ ἄλλοτε, νὰ ἀποκατασταθῶσι μερικὰ ὀξείδια διὰ μόνης τῆς ἔσω φλογός, ἡ δὲ ἀποκατάστασις γίνεται εὐκολωτέρη διὰ τῆς προσθήκης τῆς σόδας.

Παρομοίως αἱ ἐνώσεις τῶν μετάλλων μετὰ τοῦ θείου, τοῦ σεληνίου, τοῦ χλωρίου, βρωμίου, καὶ ἰώδους ἀποκαθίστανται, ἀφοῦ ἀναμιχθῶσι μετὰ σόδας, εἰς μέταλλα, τὸ ὁποῖον δὲν ἐκτελεῖται ἄνευ τῆς σόδας διὰ τῆς φλογός τοῦ σαλπιγγίου πρὸς τούτοις εἶναι καλὸν νὰ καθυποβληθῶσι τὰ ἐνσέληνια, καὶ ἔνθεια μέταλλα εἰς φρυγμὸν πρὶν ἀποκατασταθῶσι διὰ τῆς σόδας, μάλιστα δὲ πρέπει νὰ υποβληθῶσιν εἰς τὴν πρᾶξιν ταύτην τὰ ἀρσενούχα μέταλλα.

δ'. Ὄξείδια ἢ ἐνώσεις αὐτῶν, αἵτινες δύνανται νὰ ἀποκατασταθῶσιν ἀναμιγνύμεναι μετὰ τῆς σόδας διὰ τῆς ἔσω φλογός τοῦ σαλπιγγίου, ἄλλα τῶν ὁποίων τὰ μέταλλα εἶναι πτητικὰ καὶ ἔνεκα τούτου καλύπτουσι τὸν ἄνθρακα.

Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσι τὸ ὀξειδίων τοῦ στιμμίου· τὸ ἀποκατασταθὲν μέταλλον εἶναι εὐθρυπτοί, καπνίζει διὰ συνεχοῦς θερμάνσεως, καὶ καλύπτει τὸν ἄνθρακα μετὰ λευκοῦ καλύμματος.

Τὸ ὀξειδίων τοῦ τελλουρίου παρέχει λευκὸν κάλυμμα καὶ μεταδίδει κυανοῦν χρῶμα εἰς τὴν φλόγα.

Τὸ ὀξειδίων τοῦ ψευδαργύρου δίδει λευκὸν κάλυμμα, χωρὶς νὰ φαίνεται μεταλλικὸς ψευδάργυρος· τὸ λευκὸν τοῦτο κάλυμμα θερμὸν ὄν, εἶναι κίτρινον, ἀφοῦ δὲ ψυχρανθῇ, λευκόν.

Τὸ ὀξειδίων τοῦ καθμίου καλύπτει τὸν ἄνθρακα μετὰ φαιοῦ καλύμματος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου δὲν φαίνεται σφαιρίδιον μετάλλου.

Τὸ ὀξειδίων τοῦ βισμούθιου δύναται νὰ ἀποκατασταθῇ εὐκίως εἰς μεταλλικὰ σφαιρίδια, τὰ ὁποῖα εἶναι εὐθρυπτα καὶ διαρρήγνυνται διὰ τῆς σφυρηλασίας, διὰ δὲ συνεχοῦς θερμάνσεως μεταβάλλονται πάλιν εἰς κίτρινωπὸν ὀξειδιον, δι' οὗ καλύπτεται ὁ ἄνθραξ.

Τὸ ὀξειδίων τοῦ μόλυβδου παρομοίως δύναται νὰ ἀποκατασταθῇ εἰς

μεταλλικά σφαιρίδια, τὰ ὅποια διὰ συνεχοῦς θερμάνσεως μεταβάλλονται εἰς κιτρινωπὸν ὀξειδίου ὅμοιον κατὰ τὸ χρῶμα μὲ τὸ ὀξειδίου τοῦ βισμούθιου. Τὰ ἀποκατασταθέντα μεταλλικά σφαιρίδια τοῦ μολύβδου διαφέρουσιν ἀπὸ τὰ τοῦ βισμούθιου, διότι δύνανται νὰ ἐκτανθῶσι διὰ τοῦ σφυρίου, ἐνῶ τὰ τοῦ βισμούθιου θραύονται.

ε. Ὁξειδία καὶ ἐνώσεις τινῶν ὀξειδίων, ἅτινα ἀναμιγνύμενα μετὰ τῆς σόδας, δύνανται νὰ ἀποκατασταθῶσι διὰ τῆς ἔσω φλογός, τῶν ὁποίων ὅμως τὰ μέταλλα ὡς μὴ πτητικὰ δὲν καλύπτουσι τὸν ἀνθρακὰ διὰ τινος καλύμματος. Εἰς τὴν τάξιν αὐτῶν ἀνήκουσι:

Τὸ μολυβδαϊνικὸν ὀξύ, τὸ βολφραμικὸν ὀξύ, τὰ ὀξειδία τοῦ σιδήρου, τοῦ κοβαλτίου, τοῦ νικελίου, τοῦ κασσιτέρου, τοῦ χαλκοῦ, καὶ ἐν γένει τὰ ὀξειδία τῶν εὐγενῶν μετάλλων, ἅτινα διὰ μόνης τῆς θερμάνσεως ἀποκαθίστανται.

Ἐὰν ὑπάρχωσι πλείωτερα ὀξειδία εἰς τὴν πρὸς ἐξέτασιν ὕλην, ἀποτελοῦνται πολλάκις κρᾶματά.

Διὰ τῆς σόδας καὶ ἐπ' ἀνθρακος δύναται χωρὶς ἀμφιβολίαν νὰ ἐξιχνευθῇ τὸ ἀρσενικὸν καὶ εἰς μικροτάτην ποσότητα, ἡ ἐξιχνευσις δὲ αὕτη γίνεται πρὸ πάντων διὰ τῆς ὀσφρήσεως.

Παρομοίως δύναται νὰ ἐξιχνευθῇ διὰ τῆς ὀσμῆς τὸ θειὸν εἰς τὰ ἐνθεῖα μέταλλα καὶ εἰς τὰ θεικὰ ἅλατα, καθὼς καὶ τὸ σελήνιον εἰς τὰ ἐνσεληνια μέταλλα· εἰς δὲ τὰ σεληνικὰ ἅλατα ὅχι μόνον διὰ τῆς σόδας, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς πυρώσεως μετὰ σόδας καὶ χάλικος.

θ. Ὑδαί, αἵτινες δὲν διαλύονται διὰ τῆς σόδας μήτε ἐπὶ τοῦ σύρματος τοῦ λεκὸχρύσου, μήτε ἐπ' ἀνθρακος.

Τοιαύτης φύσεως εἶναι τὰ ὀξειδία τοῦ οὐρανίου, τοῦ δημητρίου, τὸ τανταλικὸν ὀξύ, ἡ ἄργιλλος, μαγνησίς, τίτανος, στροντιανή, βαρεῖα, καθὼς καὶ τὰ ἀλκάλια, τὰ ὅποια θερμαινόμενα ἀπορρόφῶνται ἀπὸ τὸν ἀνθρακὰ.

Τὰ ἅλατα τῶν ἀλκαλίων δύνανται νὰ διακριθῶσιν ἀπὸ τὰ τῶν γαιῶν διὰ τῆς σόδας, ἐὰν τεθῶσιν ἐπ' ἀνθρακος· τὰ γαιώδη ἅλατα ἐπιμένουσιν ἐπὶ τοῦ ἀνθρακος, ἐνῶ τὰ τῶν ἀλκαλίων ἀπορρόφῶνται ἀπὸ τὸν ἀνθρακὰ.

Ἐξέτασις τῶν ὑλῶν διὰ τῆς φωσφορικῆς ἐναμμωνίου σόδας.

Ἡ ἐναμμώνιος φωσφορικὴ σόδα μεταβάλλεται διὰ τῆς τήξεως εἰς φωσφορικὴν σόδαν, μετὰ φωσφορικῷ ὀξέος ὑπερτεροῦντος, τὸ ὅποιον διὰ

ποῦ υπερτεροῦντός τοῦ ὀξέος διαλύει ἀπάσας τὰς ὕλας. Ὁ χάλις δὲν διαλύεται, εἰμὴ μόνον εἰς ὀλίγην ποσότητα παρὰ τῆς φωσφορικῆς σόδας καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ χαρακτηριστικοῦ δύναται νὰ γνωρισθῇ. Συνήθως αἱ ὕλαι ἐξετάζονται διὰ τῆς φωσφορικῆς σόδας ἐπ' ἀνθρακος, σπανιώτερα δὲ ἐπὶ τοῦ σύρματος τοῦ λευκοχρύσου διὰ τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς φλογός.

Εἰς πολλὰς περιστάσεις ἀποτελοῦνται δι' ἀμφοτέρων τῶν φλογῶν διάφορα φαινόμενα, καὶ μάλιστα τὰ ὀξειδία τῶν μετάλλων δύναται νὰ ὀξειδωθῶσιν εἰς μικρότερον ἢ μεγαλύτερον βαθμὸν.

Τὸ ἐξωτερικὸν μέρος τῆς φλογός ὀξειδώνει τὰς ὕλας καὶ μεταβάλλει τὰ ὀξειδία κατωτέρου βαθμοῦ ὀξειδώσεως εἰς μεγαλύτερον ἢ ἔσω φλόξ ἐξ ἐναντίας μεταβάλλει τὰ ὀξειδία ἀνωτέρου βαθμοῦ εἰς ὑπαξείδια, καὶ τέλος τὰ ἀποκαθιστᾷ. Ἐὰν αἱ ὕλαι ἐξετάζονται μετὰ τῆς φωσφορικῆς σόδας εἰς τὴν ἔσω φλόγα καὶ διακοπῇ ἢ τῆξις, πρέπει νὰ ἀποψυχρανθῇ ταχέως τὸ ἀποτελούμενον σφαιρίδιον διὰ ψυχροῦ αἵρος, ἄλλως δὲ δύναται νὰ συμβῇ πολλάκις ὀξειδώσις.

Τὰ πλείωτερα ὀξειδία παρέχουσι συντηκόμενα μετὰ φωσφορικῆς σόδας ἄχροα σφαιρίδια, τὰ ὁποῖα φαίνονται πολλάκις λευκά, ἐὰν διαλυθῇ μεγαλύτερον ποσόν.

Πολλὰ ὀξειδία τῶν μετάλλων παρουσιάζουσιν, ἐὰν συντακῶσι μετὰ φωσφορικῆς σόδας, χρωματισμένον σφαιρίδιον, καὶ πρὸς τὸν εἰρημέναν σκοπὸν ἢ φωσφορικὴ σόδα εἶναι ἀξιόλογον δοκιμαστήριον. Τὸ χρῶμα τούτων τῶν σφαιριδίων συχνάκις διαφέρει, ἢ δὲ διαφορὰ συνίσταται, ἐὰν ταχῇ εἰς τὴν ἔσω ἢ ἔξω φλόγα.

Ἐὰν ὑπάρχῃ μεγαλύτερον τοῦ δέοντος ποσὸν τῆς χρωματίζουσας ὕλης, τότε δεικνύει τὸ σφαιρίδιον πολλάκις τόσον βαθὺ χρῶμα, ὥστε δὲν δύναται νὰ γνωρισθῇ καλῶς· τότε δὲ θερμὸν καὶ ρευστὸν ἐκτείνεται ὀλίγον ἀφοῦ ψυχρανθῇ.

Τὸ χρῶμα τῶν σφαιριδίων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ποσὸν τῆς ἐν τῷ ἄλατι διαλελυμένης ὕλης, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν θερμὴν ἢ ψυχρὰν κατάστασιν αὐτοῦ,

Χρώματα τῶν διὰ φωσφορικῆς σόδας σφαιριδίων, ἀποτελούμενα

εἰς τὸ ἔξω τῆς φλογός μέρος.

Ἄχροα σφαιρίδια ἀποτελοῦνται διὰ τῆς βαρείας, στροντιανῆς, τιτά-

νου, βηρυλίας, ιτρίας, θωρίας, τὰ ὅποια ὅμως, ἐὰν διχλυθῇ μεγαλύτερον ποσὸν τῶν ῥηθεισῶν γαιῶν, γίνονται λευκὰ μετὰ τὴν ἀπόψυξιν.

Λευκὰ προσέτι φαίνονται καὶ τὰ σφαιρίδια τῆς ἀργίλλου καὶ τοῦ μολυβδαϊνικοῦ ὀξέος, τὰ ὅποια ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποτελοῦνται ἄχροα μόνον διὰ τῆς συντήξεως ἐπὶ τοῦ σύρματος τοῦ λευκοχρύσου· διὰ τοῦ βολφραμικοῦ καὶ στιμμιώδους ὀξέος σχηματίζονται σφαιρίδια ὑποκίτρινα· διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ τελλουρίου, διὰ τοῦ τανταλικοῦ, καὶ τιτανικοῦ ὀξέος, τοῦ ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου, τοῦ καδμίου, μολύβδου, ἀπολαμβάνονται σφαιρίδια λευκὰ· ἡ δὲ τῶν τριῶν τελευταίων λευκότης δύναται μᾶλλον νὰ ὀνομασθῇ γαλακτώδης.

Πράσινα σφαιρίδια δίδουσι τὸ ὀξείδιον τοῦ χρωμίου, τοῦ χαλκοῦ, καὶ τοῦ οὐρανίου· κίτρινα ἀποτελοῦνται διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ ἀργύρου, καὶ βισμούθιου, τὸ δὲ διὰ τοῦ τελευταίου γίνεται μετὰ τὴν ἀπόψυξιν σχεδὸν διαυγές. Ἐρυθρὰ γίνονται διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, νικελίου καὶ δημητρίου, λαμβάνοντα ἀνοικτότερον χρῶμα διὰ τῆς ἀποψύξεως. Κυανὰ γίνονται διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ κοβαλτίου, ἰωειδῇ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου.

Χρῶματα σφαιριδίων ἀποτελούμενα διὰ τῆς ἔσω φλογός.

Ἄχροα σφαιρίδια δίδονται διὰ τῆς βαρείας, στροντιανῆς, τιτάνου, μαγγνησίας, βηρυλίας, ιτρίας, ἀργίλλου, τανταλικῦ ὀξέος, ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου, ὀξειδίου τοῦ καδμίου, τοῦ κατσίτερου, ἐκτὸς τούτων καὶ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ δημητρίου καὶ μαγγανησίου.

Πράσινα ἀποτελοῦνται διὰ τοῦ μολυβδαϊνικοῦ ὀξέος, ὀξειδίου τοῦ χρωμίου, τοῦ οὐρανίου, καὶ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.

Ἐρυθρὰ χρωματίζονται διὰ τοῦ βολφραμικοῦ ὀξέος ἐνσιδήρου, τοῦ στιμμιώδους ἐνσιδήρου, τοῦ τιτανικοῦ ὀξέος, καὶ τοῦ ὀξειδίου τοῦ νικελίου.

Σφαιρίδια φαῖα ἢ ὑπόφαια δίδουσι τὰ ὀξείδια τοῦ χαλκοῦ.

Κυανὰ τὸ βολφραμικὸν ὄξύ, καὶ τὸ ὀξείδιον τοῦ κοβαλτίου.

Ἰωειδῇ τὸ τιτανικὸν ὄξύ.

Τεφρόχροα ἀποτελοῦνται διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ τελλουρίου, βισμούθιου, μολύβδου καὶ ἀργύρου, καὶ τὸ χρῶμα τοῦτο προέρχεται ἀπὸ ἀποκατασταθὲν μέταλλον.

Ἐξέτασις τῶν ὑλῶν διὰ τοῦ βορικοῦ νάτρου.

Σχεδὸν πᾶσαι αἱ ὑλαι, ἐὰν συντηχθῶσι μετὰ τοῦ βορικοῦ νάτρου, δια-

λύονται παρ' αὐτοῦ, διαφέρουσιν ὅμως ὡς πρὸς τὴν διαλυσιμότητά των· ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεται ἡ σύντηξις ἐπὶ τοῦ σύρματος τοῦ λευκο-
χρύσου, καὶ μάλιστα ἐὰν θέλωμεν νὰ διακρίνωμεν καλῶς τὸ ἀποτελού-
μενον χρώμα. Ἐπὶ ἀνθρακος δὲν δύνανται νὰ ἀποτελεσθῇ διὰ τοῦ βορικοῦ
νάτρου τόσον ταχέως τὸ σφαιρίδιον, καθὼς διὰ τοῦ φωσφορικοῦ νάτρου,
ἐπειδὴ ὁ βόραξ κατ' ἀρχὰς διαχέζεται ἐπὶ τοῦ ἀνθρακος καὶ μόνον διὰ
συνεχοῦς φύσηματος συντίθεται μετὰ τῆς πρὸς ἐξέτασιν ὕλης πρὸς
σφαιρίδιον.

Χρώματα τῶν διὰ τοῦ βόρακος σφαιριδίων προαγόμενα εἰς τὴν

ἔξω φλόγα τοῦ λύχνου.

Ἄχρως σφαιρίδια δίδουσιν ἡ βαρεῖα, στροντιανή, τίτανος, μαγνη-
σία, βηρυλλία, τὸ τανταλικὸν καὶ τιτανικὸν ὄξυ, τὸ ὀξειδίου τοῦ
ψευδαργύρου, τοῦ καδμίου, ἀργύρου· ἅπαντα ὅμως τὰ διὰ τοῦ βόρακος
σφαιρίδια γίνονται διαφανῆ, ἐὰν ἐμπεριέχωσι μέγαλον ποσὸν τῶν ῥηθέν-
των ὀξειδίων, ἢ ἐὰν τὸ φύσημα γίνεται διακεκομμένως.

Ἐκτὸς τούτου σχηματίζονται ἄχρως σφαιρίδια διὰ τῆς ἀργίλλου, χά-
λικος, ὀξειδίου τοῦ τελλουρίου, βισμούθιου, στιμμιώδους ὀξέος, τοῦ
βολφραμικοῦ καὶ μολυβδαϊνικοῦ ὀξέος, καὶ τοῦ ὀξειδίου τοῦ κασσιτέρου.

Πράσινα σφαιρίδια δίδουσι τὸ ὀξειδίου τοῦ χρωμίου καὶ τοῦ χαλκοῦ.
Κίτρινα προάγονται διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ οὐρανίου, καὶ μολύβδου, ἀλ-
λὰ τὸ τελευταῖον μεταβάλλεται εἰς ἄχρουν.

Ἐρυθρὰ ἀποτελοῦνται διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ δημητρίου, τοῦ σιδήρου,
καὶ νικελίου· κυανοῦν σφαιρίδιον δίδει τὸ ὀξειδίου τοῦ κοβαλτίου· ἰώδες τὸ
ὀξειδίου τοῦ μαγνηησίου.

Χρώματα τῶν σφαιριδίων ἀποτελούμενα διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς

ἔσω φλόγος.

Ἄχρως σφαιρίδια παρουσιάζονται διὰ τῆς βαρεῖας, στροντιανῆς, τιτάνου,
μαγνησίας, τανταλικοῦ ὀξέος, ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου, καὶ καδμίου,
πρὸς τούτοις διὰ τῆς ἀργίλλου, χάλικος, καὶ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ
κασσιτέρου.

Πράσινα γίνονται διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χρωμίου, οὐρανίου καὶ σιδήρου.

Κίτρινα διὰ τοῦ βολφραμικοῦ ὀξέος, φαῖα ἢ ἐρυθρόφαια διὰ τοῦ μα-
λυβδαϊνικοῦ ὀξέος καὶ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ.

Κυανά διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ κοβαλτίου· ἰώδη διὰ τοῦ τιτανικοῦ ὀξέος· τεφρόχροα διὰ τοῦ στιμμιώδους ὀξέος, διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ τελλουρίου, νικελίου, βισμούθιου καὶ ἀργύρου, ἔνεκα τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν εἰς μέταλλα.

Ἐκ τῆς ἐκθέσεως ταύτης παρατηροῦμεν, ὅτι τὰ αὐτὰ ὀξειδια σχηματίζουν σφαιρίδια διαφόρως χρωματισμένα διὰ τοῦ φωσφορικοῦ νάτρου, καὶ διαφόρως διὰ τοῦ βόρακος. Ἐκτὸς τῶν δύο εἰρημένων δοκιμαστηρίων μεταχειρίζονται ἄλλα τινά, ὅποια τὰ ἐξῆς:

Τὸ βορικὸν ὀξύ καὶ τὸ σιδηροῦν σύρμα πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος· τὸ διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ κοβαλτίου πρὸς διάκρισιν τῆς μαγνησίας ἀπὸ τὴν ἄργιλλον καὶ τὸ ὀξείδιον τοῦ ψευδαργύρου· τὸ ὀξείδιον τοῦ νικελίου διὰ τὴν ἀνακάλυψιν τῶν καλίων· τὸ ὀξείδιον τοῦ χαλκοῦ διὰ τὴν ἐξέλεγχιν τῶν βρωμιούχων, ἰωδούχων καὶ ἐγχλωρίων ἐνώσεων. Σπανίως δὲ μεταχειρίζεται καὶ ἡ λειοτριβημένη φθορική τίτανος διὰ νὰ διακρίνωμεν τὴν θειϊκὴν βραεῖαν, θειϊκὴν στροντιανήν, καὶ θειϊκὴν τίτανον ἀπὸ ἄλλας ὕλας. Ἡ φθορική τίτανος συντακεῖσα μετὰ τῶν ὑλῶν τούτων παρουσιάζει ἄχρουν σφαιρίδιον, τὸ ὅποῖον ἀποψυχραίνόμενον γίνεται γαλακτώδες τὸ χρῶμα, καὶ τάνάπαλιν δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ἡ θειϊκὴ τίτανος πρὸς ἐξίχνευσιν τῆς φθορικῆς τιτάνου.

Περὶ τῆς τῶν ἀερίων ἐξετάσεως.

Ἡ περὶ τῆς πριότητος ἐξέτασις μίγματος τινος ἀερίων συνίσταται εἰς τὸ νὰ ἀποχωρισθῶσιν ἐκ τοῦ μίγματος τινὰ ἢ πλειότερα τῶν ἐνυπαρχόντων ἀερίων πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν χρησιμεύουσι διάφορα δοκιμαστήρια, ἅτινα ἐνοῦνται μετὰ διαφόρων ἀερίων πρὸς στερεάς ἢ ρευστάς ἐνώσεις, μὴ ἐνούμενα μετὰ τῶν ἄλλων.

Αἱ δοκιμαίαι, αἵτινες συνήθως γίνονται διὰ τὴν περὶ τῆς ποιότητος ἐξέτασιν, ἐκτελοῦνται εἰς τὰς πλειοτέρας περιστάσεις εἰς ὑελίνους σίφωνας κλεισμένους εἰς τὸ ἐν ἄχρον κατὰ τὸ σχῆμα.

Ἡ διάμετρος τῶν σιφώνων δὲν πρέπει νὰ ᾖ μεγάλη, διὰ νὰ δύναται νὰ κλειῶνται διὰ τοῦ δακτύλου καὶ νὰ ἀνακινῶνται μετὰ τῶν διαφόρων ρευστῶν διαλυτικῶν μέσων. Τὸ ἐξετασθησόμενον μίγμα τῶν ἀερίων φυλάττεται εἰς μέγαν κύλινδρον ὑπὸ ὑδράργυρου, καὶ ἐξ αὐτοῦ πληροῦνται τὰ μικρότερα ἀγγεῖα διὰ τὰς διαφόρους δοκιμασίας· διὰ νὰ μὴ ὀνηθῇ δὲ νὰ εἰσχωρήσῃ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ εἰς τὸ μίγμα, πληροῦνται αἱ

δοκιμασικαὶ φιάλαι ἀπὸ ὑδράργυρου καὶ ἀναστρέφονται εἰς δεξια-
μενὴν πλήρη ὑδραργύρου πλησίον τῶν μεγάλων κυλίνδρων, ἐξ ὧν τὸ ἀέ-
ριον μεταβιβάζεται εἰς αὐτάς. Εἰς ἔλλειψιν τοῦ ἀναγκαίου ποσοῦ
ὑδραργύρου βιαζόμεθα πολλάκις νὰ μεταχειρισθῶμεν ἀντὶ τοῦ ὑδραρ-
γύρου ὕδωρ, ἢ διάλυμα τοῦ κοινῷ ἁλτος, καὶ τοῦτο δύναται νὰ γίνη,
ἐὰν τὰ ἀέρια δὲν ᾔναι διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ.

Τὰ ἀέρια, τὰ ὅποια εἰς δοκιμασίας τῆς ποιότητος δύνανται νὰ ἀπαντη-
θῶσι, εἶναι τὰ ἐφεξῆς. Ὄξυγόνον, ὑδρογόνον, διττο-υδρογονοανθρακοῦχον
ἀέριον, πρῶτον καὶ διττο-υδρογονοφωσφοροῦχον ἀέριον, ὑδρογοναρσενι-
κοῦχον ἀέριον, ὀξειδιον τοῦ ἄνθρακος, ὀξειδιον, τοῦ νιτρογόνου ὑποξειδιον,
τοῦ νιτρογόνου, νιτρογόνον, ὑδροχλωρικόν ἀέριον, ὑδροβρωμικόν ἀέριον,
ὕδριωδικόν ἀέριον, ὑδροκυανικόν ἀέριον, ὑδροφθορικόν χαλικοῦχον ἀέριον,
ὕδροφθορικόν βοριοῦχον ἀέριον, ἀμμωνία, ἀνθρακικόν ὀξύ, θειώδες ὀξύ,
χλώριον, κυάνιον ὑδροθειωμένον ἀέριον, ὑδροσεληνικόν ἀέριον, καὶ ὑδρο-
τελλουρικόν ἀέριον.

Δὲν εἶναι τόσον δύσκολον νὰ ἐξιχνεύσωμεν τὴν φύσιν τινὸς ἀερίου,
ὅταν δὲν ᾔναι μεμιγμένον μετ' ἄλλων ἀερίων. Πρῶτον ἐξετάζεται τὸ
τῶν ἀερίων μίγμα, ἐὰν κἀνὲν ἐξ αὐτῶν ᾔναι διαλύσιμον διὰ τῆς
καυστικῆς ποτάσεως, δι' ἧς ἀπορρόφῶνται μερικὰ ἀέρια, ἐνῶ ἄλλα
μένουν ἀδιάλυτα. Τὰ παρὰ τῆς καυστικῆς ποτάσεως μὴ ἀπορρόφώμενα
ἀέρια εἶναι τὸ ὀξυγόνον, ὑδρογόνον, ἀμφοτέρω τὰ εἶδη τοῦ ὑδρογονοανθρα-
κούχου ἀερίου, καὶ τὰ ὑδρογονοφωσφοροῦχα ἀέρια, τὸ ὑδρογονο-αρσε-
νικοῦχον ἀέριον, τὸ ὀξειδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ ὀξειδιον τοῦ νιτρογόνου,
τὸ ὑποξειδιον τοῦ νιτρογόνου καὶ τὸ νιτρογόνον.

Τὰ εἰρημένα ἀέρια διὰ σημαντικῶν τινῶν χαρακτηριστικῶν δια-
κρίνονται μεταξὺ τῶν. Τὸ ἐξεταζόμενον ἀέριον εἶναι ὀξυγόνον, ἐὰν
συναφθὲν μετὰ τινος καίοντος σώματος δὲν ἀναφλέγεται, ἀλλὰ συν-
τείνῃ εἰς τὴν καύσιν αὐτοῦ μετὰ μεγάλης ζωηρότητος· προσέτι ἐὰν
ἤδη ἡμικαὲς ξυλάριον ἐμβαπτισθὲν εἰς τὸ ἀέριον ἀναφλεχθῇ, καὶ ἐὰν
ἀναμιγνυόμενον μετὰ ἀχρόου ὀξειδίου τοῦ νιτρογόνου σχηματίξῃ ἐρυ-
θροικτρίνους ἀτμούς. Ἐὰν τὸ ἀέριον σύγκηται ἐξ ὑδρογόνου, ἀναφλε-
γόμενον καίεται μετὰ ἀσθενοῦς κυανωπῆς φλογός, καὶ δὲν ἔχει οὐ-
δεμίαν ἢ ἀσθενῆ μόνον ὁσμὴν· παρὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος ἀπορρό-
φᾶται ὀλίγον κατ' ὀλίγον καὶ ἰδίως διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἡλιακοῦ φωτός,
χωρὶς νὰ θολωθῇ· ἐὰν ἀναμιχθῇ μὲ ἴσον ὄγκον χλωρίου, καὶ ἀνακινή-
ται μετὰ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου, δὲν ἀπορροφᾶται, μήτε

προξενεί μέλανα χρωματισμόν. Εάν τὸ ἐξεταζόμενον ᾗναι διττο-υδρο-γοανθρακῶχον ἀέριον, θέλει καεῖ ἀναφλεγόμενον μετὰ λαμπριζούσης φλογός, καὶ ἀναμιγνύμενον μετὰ τοῦ χλωρίου σχηματίζει μικρὰς σταγόνας ἐλαίου, τὸ δὲ ὕδωρ λαμβάνει ὁσμὴν κατὰ τὸ νάρθα. Τὸ ἀέριον δὲν θολοῦται μήτε διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος, μήτε διὰ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου.

Τὸ ἐκ πρωτοῦδρογονανθρακῶχου ἀερίου συνιστάμενον μίγμα, ἀναφλεγόμενον καίει μετὰ ἀσθενοῦς κυανωπῆς φλογός, καὶ ἀναμιγνύμενον μετὰ τοῦ χλωρίου, ἀποσυντιθεται ὅχι εἰς τὸ σκότος, ἀλλὰ διὰ τῆς τοῦ φωτὸς ἐπιρροῆς ἀκολούθως ἀπορρόφᾶται παρὰ τοῦ εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα προστεθέντος τιτανίου ὕδατος, δὲν ἀπορρόφᾶται δὲ μήτε ὑπὸ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου, μήτε παρὰ τοῦ ποτασίου. Τὸ διττο-υδροφωσφορῶμενον ἀέριον καίει, ἐὰν ἀναφλεχθῇ, μετὰ λαμπριζούσης φλογός, καὶ ἐκπέμπει λευκὴν καπνὸν, ὅστις κοκκινίζει τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην· χαρακτηριστικὰ, δι' ὧν διακρίνεται ἀπὸ πολλὰ ἄλλα ἀέρια. Ἐκτὸς τούτου ἔχει ἰδιάζουσιν ὁσμὴν, καὶ ἀπορρόφᾶται διὰ ἀνακινήσεως παρὰ τοῦ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου ὑπὸ τὸν σχηματισμὸν μέλανος κατακρημνίσματος. Τὸ πρωτο-υδροφωσφορῶμενον ἀέριον ἀναφλέγεται ἀφ' ἑαυτοῦ του συναπτόμενον μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, καίει μετὰ φωτοβολούσης φλογός, ἥτις ἐκπέμπει λευκὸν καπνὸν, κοκκινίζοντα τὸν τοῦ καγκαμίνου χάρτην.

Τὸ ὑδρογονο-αρσενικοῦχον ἀέριον καίει ἀναφλεγόμενον εἰς ἀνεστραμμένον δοκιμαστικὸν σίφωνα, καὶ σχηματίζει μέλαν ἢ φαιὸν καταβύθισμα, τοῦ ὁποίου τὸ ἐλάχιστον ποσὸν δύναται νὰ γνωρισθῇ δι' ἀρσενικοῦ. Ἀπὸ τὰ ἄλλα ἀέρια διακρίνεται διὰ τῆς ἰδιαίτερας ἀηδοῦς του ὁσμῆς, καὶ διότι ἀπορρόφᾶται παρὰ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου ὑπὸ σχηματισμὸν μέλανος κατακρημνίσματος συνισταμένου ἐξ ἀργύρου.

Τὸ ὀξειδίου τοῦ ἄνθρακος ἀναφλεγόμενον καίει μετὰ κυανῆς φλογός, ἔχει ἰδιαίτεράν ὁσμὴν, καὶ δεικνύει εἰς τὸ διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου καὶ εἰς τὸ χλώριον τὰ αὐτὰ χαρακτηριστικὰ, καθὼς τὸ πρωτο-υδροανθρακῶχον ἀέριον.

Τὸ ὀξειδίου τοῦ νιτρογόνου εἶναι ἄχρουν, καὶ σχηματίζει, ἐνούμενον μετὰ τοῦ ὀξυγόνου τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἐρυθροκιτρίνους ἀτμούς, διὰ τῶν ὁποίων διαφέρει ἀπὸ τὰ ἄλλα ἀέρια· ἀπορρόφᾶται προσέτι παρὰ διαλύματος θειικοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, ἢ ἄλλου τινὸς ἁλτος τοῦ ὑπο-

ξειδίου τοῦ σιδήρου καὶ τὸ διάλυμα μελανοχρωματίζεται· τὸ τελευταῖον τοῦτο χαρακτηριστικὸν δὲν ἀνήκει εἰς ἄλλο ἀέριον.

Τὸ ὑποξειδίου τοῦ νιτρογόνου δὲν εἶναι καύσιμον, ἀναφλέγει ὅμως, καθὼς τὸ ὀξυγόνον, ἡμικαὲς ξυλάριον. Ἀπὸ τὸ ὀξυγόνον διαφέρει, καθότι ἀναμιγνύμενον μετὰ τοῦ νιτρογονοξειδίου δὲν ἐκλύει ἐρυθροκιτρίνους ἀτμούς· καὶ παρὰ τοῦ διχλύματος τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου δὲν ἀπορρόφᾶται.

Τὸ νιτρογόνον δὲν εἶναι ἀναφλέξως ἐπιδεκτικόν, μήτε δύναται νὰ συντείνη πρὸς καῦσιν τῶν σωμάτων· εἶναι ἄστυον καὶ δὲν μεταβάλλεται μήτε διὰ τοῦ χλωρίου, μήτε διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου, ἢ ἄλλων δοκιμαστηρίων, δι' ὧν διαφέρει ἀπὸ τὰ ἄλλα ἀέρια.

Τὰ ἀέρια, τὰ ὁποῖα ἀπορρόφῶνται διὰ διχλύματος τῆς ποτάσεως, εἶναι τὰ ἐξῆς:

Ὑδροχλωρικὸν ἀέριον,
Ὑδροβρωμικὸν ἀέριον,
Ἵδριωδικὸν ὀξύ,
Ἵδροφθοροχαλικοῦχον ὀξύ,
Ἵδροκυανικὸν ὀξύ,
Ἀμμωνία,

Ἐκτὸς τούτων ἀπορρόφῶνται,

Ἀνθρακικόν,
Θειώδες ὀξύ,

Χλώριον,

Κυάνιον,

Ἵδροθειωμένον ἀέριον,,

Ἵδροσελήνιον ἀέριον καὶ

Ἵδροτελλουριωμένον ἀέριον.

Τὰ ἀέρια ταῦτα διακρίνονται ἀπ' ἀλλήλων εὐκολώτερα ἀπὸ τὰ ἄλλα, περὶ τῶν ὁποίων ὠμιλήσαμεν. Τὰ πρῶτα ἕξ ἢ ἐπτὰ διαλύονται εἰς ὀλίγον ποσὸν ὕδατος κατὰ μεγάλην ποσότητα, καθὼς καὶ εἰς τὰ ἀλκάλια· καὶ ἐπειδὴ τὰ τελευταῖα ἐπτὰ εἶναι μὲν διαλύσιμα, ὅχι ὅμως τόσον καθὼς τὰ πρῶτα, δύνανται ἐκ τούτου νὰ διακριθῶσιν ἀπὸ ἐκεῖνα, εἰς ἣναι καθαρὰ, καὶ ἀπερρόφηθησαν ἀπὸ τὸ ὕδωρ. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐπτὰ ἀέρια δύνανται νὰ γνωρισθῶσι διὰ τῶν ἤδη γνωστῶν χαρακτηριστικῶν ἐπὶ τῶν δοκιμαστηρίων. Τὰ δὲ ἄλλα ἀέρια, τὰ ὀλίγον μόνον διαλύσιμα, δύνανται νὰ γνωρισθῶσιν ἀπ' ἀλλήλων, καθαρὰ ὄντα, διὰ τῶν ἐφεξῆς χαρακτηριστικῶν.

Τὸ ἀνθρακικόν, τὸ θειῶδες ὀξύ καὶ τὸ χλώριον, εἰς συνκρῆσιν μετα τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος, δὲν ἀναφλέγονται, ἐνῷ ἐξ ἐναντίας τὸ κυάνιον, τὸ ὑδροθειωμένον αἷριον, τὸ ὑδροσελήνιον καὶ τὸ ὑδροτελλούριον αἷριον, συναπτόμενα μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος, δύνανται νὰ ἀναφλεχθῶσι. Τὰ τέσσαρα τελευταῖα δύνανται νὰ γνωρισθῶσι καὶ διὰ τῆς ὁσμῆς, ἐξόχως δὲ τὸ κυάνιον καὶ τὸ ὑδροθειωμένον αἷριον, τῶν ὁποίων ἡ ὁσμὴ εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστική. Μεταξὺ τῶν τριῶν μὴ καύσεως ἐπιδεκτικῶν αἱρίων διαφέρουσι τὸ χλώριον, καὶ τὸ θειῶδες ὀξύ διὰ τῆς ἰδιαιτέρας δριμυείας ὁσμῆς ἀπὸ τὸ ἀνθρακικόν ὀξύ, τὸ ὁποῖον εἶναι ἄρισμον καὶ ἀπορρόφῃται ὑπὸ σχηματισμὸν λευκῆς ὑποστάμενης διὰ τῆς ἀνακινήσεως μετὰ τιτανίου ὕδατος· τὸ ἀποτελούμενον κατικρήνισμα ἀντὶ αὐτοῦ σχεδὸν δι' ὅλων τῶν ὁξέων.

Καθὼς τὰ αἷρια, καθαρὰ ὄντα, δύνανται νὰ γνωρισθῶσιν, οὕτω καὶ ἀναμειγμένα μετ' ἄλλων αἱρίων δὲν εἶναι δύσκολον νὰ γνωρισθῶσιν εἰς τὰς πλείους τοῦλάχιστον περιστάσεις.

Τὸ ὑπὸ ὑδράργυρον συναχθὲν μίγμα τῶν αἱρίων ἀνακινεῖται κατ' ἀρχὰς μετὰ πεπυκνωμένης διαλύσεως ποτάσεως, δι' ἧς ἀποχωρίζονται τὰ εἰς τὸ χάλιον εὐδιάλυτα ἀπὸ τὰ εἰς αὐτὸ ἀδιάλυτα.

Περὶ τῆς ἐξετάσεως τῶν παρὰ τοῦ διαλύματος τῆς ποτάσεως μὴ ἀπορροφωμένων αἱρίων.

Κατ' ἀρχὰς ἐξετάζεται, εἰς μέρος τοῦ μετὰ τὴν κίνησιν τῆς ποτάσεως ἐπιμένοντος αἱρίου δύναται νὰ ἀναφλεχθῇ ἢ ὅχι· εἰς τὴν πρώτην περίστασιν σύγκειται ἐκ καύσεως ἐπιδεκτικῶν καὶ παρὰ τοῦ διαλύματος τῆς ποτάσεως μὴ διαλυσίμων αἱρίων, ἥγουν ἐξ ὑδρογόνου, ὑδρογονο-ανθρακούχου, ὑδρογίνο-φωσφορούχου, ὑδρογονο-ἀρσενικούχου αἱρίου, ἐξ ὀξειδίου τοῦ ἀνθρακος, ἢ τοῦλάχιστον ἐν ἡ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐμπεριέχονται εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα· ἄλλως δὲ εἰς τὸ αἷριον συντείνη διὰ τὴν καῦσιν καίοντος σώματος ἐμβαπτισθέντος εἰς τὸ μίγμα, ἐμπεριέχει ἢ ὀξυγόνον, ἢ νιτρογονο-ὑποξείδιον.

Εἰς τὸ ἐξεταζόμενον αἷριον ἀναφλεγόμενον πυρσοκροτῇ μετὰ ἰσχυρᾶς ἢ ἀσθενοῦς βροντῆς, ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ ὀξυγόνου τινὰ τῶν ὑδρογονούχων αἱρίων· καὶ, ὑπάρχοντος τοῦ διττο-υδρογονανθρακούχου αἱρίου, θέλει εἶσθαι ἢ ἐκπυρσοκρότησις πολλὰ δυνατή. Εἰς τὸ μίγμα τῶν αἱρίων συναπτόμενον μετὰ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος δὲν ἀναφλεχθῇ, μήτε

συντείνη διὰ τὴν καῦσιν τινὸς καίοντος σώματος, τότε δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς συνιστάμενον ἐκ νιτρογόνου ἢ ἐκ νιτρογονοξειδίου.

Μέρος τοῦ παρὰ τοῦ διαλύματος μὴ ἀπορρόφωμένου μίγματος ἀνακινεῖται μετὰ διαλύσεως νιτρικοῦ ἀργύρου. Ἐὰν ἀπορρόφηθῇ ἐντελῶς ἢ κατὰ μέγα μέρος ὑπὸ τὸν σχηματισμὸν μέλανος κατὰκρημνίσματος, τότε δυνάμεθα νὰ ὑπολάβωμεν τὸ ἀπορρόφηθὲν ἀέριον συνιστάμενον ἢ ἐκ τῶν δύο εἰδῶν τοῦ ὑδρογονοφωσφορούχου, ἢ ἐκ τοῦ ὑδρογονο-αρσενικού-χου ἀερίου. Τὸ παρὰ τοῦ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου μὴ ἀπορρόφηθὲν μέρος συνίσταται εἰς τοιαύτην περίστασιν συνήθως ἐξ ὑδρογόνου.

Ἐὰν τὸ μίγμα συναπτόμενον μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἦναι ἀναφλέξεως ἐπιδεκτικόν, καὶ ἐὰν δὲν ἀπορρόφηθῇ διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου, προστίθεται χλωρίον ἀέριον, καὶ τότε, ὑπάρχοντος τοῦ διττοῦδρογονο-ανθρακούχου ἀερίου, σχηματίζονται σταγόνες ἐλαίου, καὶ ἐκλύεται ὁσμή ὡς τοῦ αἰθέρος, τὴν ὁποίαν λαμβάνει τὸ ὕδωρ. Ἐὰν τὸ ἀέριον τὸ ἀνάμειγνυόμενον μετὰ τοῦ χλωρίου καὶ ἐκτεθὲν εἰς τὴν τοῦ φωτὸς ἐπιρροὴν ἀπορρόφηθῇ ἀπὸ τὸ τιτάνιον ὕδωρ ὑπὸ φαινόμενον λευκῆς θολώσεως, δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ ἢ πρωτο-ὑδραρσενιωμένον ἀέριον- ἢ ὀξειδίου τοῦ ἀνθρακος.

Ἐὰν τὸ εἰς τὸν ἀέρα ἀναφλέξεως ἐπιδεκτικὸν ἀέριον ἀνάμειγνυόμενον μετὰ τοῦ χλωρίου ἀπορρόφηθῇ παρὰ τοῦ ὕδατος, χωρὶς νὰ σχηματίσῃ λευκὴν καταβύθισμα, τότε τὸ ἀέριον εἶναι ὑδρογόνον. Ἐὰν τὸ ἀέριον συναπτόμενον μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος δὲν ἀναφλεχθῇ, συναφθὲν δὲ μετὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξειδίου σχηματίζῃ ἐρυθροὺς ἀτμούς, οἵτινες ἀπορρόφῶνται παρὰ τοῦ ὕδατος, τότε θεωρεῖται τὸ ἀέριον ὡς ὀξυγόνον, καὶ ἐξ ἐναντίας ἐξίχνευεται ἡ παρουσία τοῦ ὀξειδίου τοῦ νιτρογόνου, ἐὰν τὸ ἀέριον διοχετεύμενον διὰ μίγματος τοῦ ὀξυγόνου σχηματίζωνται νεραντζοειδεῖς ἀτμοί. Ἐκτὸς τούτου τὸ νιτρογονοξειδίον δύναται νὰ γνωρισθῇ, ἐὰν ἀπορρόφηθὲν παρὰ διαλύματος ὑποξειδωμένου σιδήρου, μελάνωσιν τὸ διάλυμα.

Ἐὰν ἐπιμένῃ μέρος τοῦ ἐξατμισθέντος ἀερίου, ἀφοῦ τὸ μίγμα ἐσυνήφθῃ μετὰ διαλύματος τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου, μετὰ χλωρίου, μετὰ ὀξυγόνου, καὶ ὀξειδίου τοῦ νιτρογόνου, τὸ ἐπιμένον ἀέριον δύναται νὰ συνίσταται μόνον ἐκ νιτρογόνου ἢ ἐκ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ νιτρογόνου.

Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν τὰ καίοντα σώματα εἰσβαπτισθέντα σβέννυνται εἰς δὲ τὴν δευτέραν ὄχι. Ἐὰν δὲ τὰ δύο ἀέρια ἦναι ἀναμειγμένα, δύνανται νὰ χωρισθῶσι καὶ νὰ γνωρισθῶσιν, ἐὰν προσθέσωμεν οἶνοπνεύματος

τὸ τεταρτημόριον ὡς πρὸς τὸν ὄγκον τοῦ αἰρίου καὶ τὰ ἀνακινήτωμεν μετ' αὐτοῦ, δι' οὗ ἀπορρόφᾶται τὸ ὑποξειδίον τοῦ νιτρογόνου καὶ ἐπιμένει μόνον τὸ νιτρογόνον.

Ἐξέτασις τῶν παρὰ τοῦ διαλύματος τῆς ποτάσεως

ἀπορρόφωμένων αἰρίων.

Ἐάν τὸ μίγμα τῶν αἰρίων, πρὸ τοῦ νὰ συναφθῇ μετὰ τοῦ διαλύματος τῆς ποτάσεως, ἀνακινήθῃ μεθ' ὕδατος, διαλύονται μερικὰ αἲρια εἰς ἀρκετὸν ποσόν, ἐνῷ ἄλλα ἀπορρόφῶνται μόνον εἰς μικρὰν ποσότητα. Ἀφοῦ τὸ μίγμα τῶν αἰρίων συναφθῇ μετ' ὀλίγου ποσοῦ ὕδατος, ἀνακινεῖται μέρος τοῦ μὴ ἀπορρόρηθέντος αἰρίου μετὰ τιτανίου ὕδατος, παρὰ τοῦ ὁποίου ἀπορρόφᾶται τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ θολόνον τὸ τιτάνιον ὕδωρ, καὶ δι' αὐτοῦ τοῦ χημικηριστικοῦ εὐκόλως δύναιται νὰ γνωρισθῇ. Μέρος τοῦ αἰρίου ἀνακινεῖται μετὰ διαλύσεως ὀξικοῦ μολύβδου, καὶ ἐάν τὸ διάλυμα καταβυθισθῇ μετὰ τινος χρώματος καὶ τὸ αἶριον ἀπορρόφηθῇ ἢ ἐντελῶς, ἢ καὶ ἐν μέρει, τότε ἀποδεικνύεται ἡ περυσία τοῦ ὑδροθειωμένου αἰρίου, τοῦ ὁποίου καὶ τὸ μικρότατον ποτὸν δύναιται νὰ ἐξιχνευθῇ διὰ τῆς ὁσμῆς. Μεγαλητέρα ποσότης τοῦ εἰρημένου αἰρίου ἐξιχνεύεται, καθότι ἀναφλεγόμενον καίει μετὰ κυνῆς φλογός, ἀφοῦ συναφθῇ μετὰ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος· ἡ καῦσις τοῦ αἰρίου συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴν τοῦ θειώδους ὀξέος. Ὅμοια χαρακτηριστικὰ ἔχουσι καὶ τὸ ὑδροσεληνικὸν καὶ τὸ ὑδροτελλουρικὸν αἶριον, χωρὶς ὅμως νὰ αἰσθανθῶμεν τὴν ὁσμὴν τοῦ καίοντος θείου. Ἐάν τὸ αἶριον μεταβάλλῃ τὸ κυανοῦν χρῶμα τοῦ καγκκμίνου εἰς κίτρινον, καὶ ἐάν ἀπορρόφηθῇ ἐν μέρει, ἢ ἐντελῶς παρὰ τοῦ ὑδραργύρου, ἐμπεριέχει χλωρίον· ἐάν παρουσιάζῃ τὴν γνωστὴν ὁσμὴν τοῦ καίοντος θείου, κ' ἐάν ἀπορρόφᾶται παρὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου τοῦ ἐρυθροῦ ἢ τοῦ φαιοῦ, καθὼς καὶ παρὰ τοῦ βόρακος, τὸ αἶριον εἶναι θειῶδες ὀξύ.

Διὰ νὰ πληροφορηθῶμεν, ἂν τὸ αἶριον ἐμπεριέχῃ κυάνιον, προστίθεται, ἀφοῦ ἀπορρόφηθῇ παρὰ τοῦ διαλύματος τῆς ποτάσεως, διάλυμα τοῦ θειικοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, ἐμπεριέχον συγχρόνως μέρος ὀξειδίου τοῦ σιδήρου· προστίθεται δὲ καὶ ὀλίγον ποσὸν θειικοῦ ὀξέος κεκραμένου ἢ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ διὰ νὰ ζυγισθῇ τὸ ρευστόν· ἐάν σχηματισθῇ κυανοῦν κατακρήμνισμα, ἐμπεριεῖχε τὸ ἐξετασθὲν αἶριον κυάνιον.

Πρὶν γίνωσι τοιαῦται δοκιμαί, εἶναι καλὸν νὰ συναφθῇ τὸ ἀέριον μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου τοῦ ἐρυθροῦ, διὰ νὰ ἀπορρόφηθῶσι παρ' αὐτοῦ οἱ ἴσως ὑπάρχοντες ἀτμοὶ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος, τὸ δὲ κυάνιον δὲν ἀπορροφᾶται ὑπὸ τοῦ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου.

Τὰ δι' ὀλίγου ποσοῦ ὕδατος εἰς μεγάλην ποσότητα διαλύσιμα ἀέρια δύνανται νὰ γνωρισθῶσιν εὐκόλως, καὶ ἀναμειγμένα ὄντα μετὰ πολλῶν ἄλλων ἀερίων.

Ἐάν τὸ ἀέριον ἀπορροφώμενον παρὰ τοῦ ὕδατος ἀποθέτῃ χάλικα εἰς εἶδος πυκτοειδῶν κροκίδων, τότε ἐμπεριέχεται εἰς τὸ ἀέριον ὑδροθωρικὸν χαλικοῦχον ἀέριον· ἐάν τὸ διάλυμα ἀναμειγνύμενον μετ' οἶνοπνεύματος ἀναφλεχθῇ καὶ καίῃ μετὰ πρσιίνης φλογός, τότε ἐμπεριέχει ὑδροθωρικὸν βοριοῦχον ἀέριον.

Ἐάν τὸ διάλυμα τοῦ ἀερίου εἰς ὀλίγον ὕδωρ, ἢ εἰς ὀλίγην πότασσαν ῥευστὴν ἀναμιχθῇ μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος καὶ σιταμύλου χρωματίζῃ αὐτὸ κυανοῦν, ἀποδεικνύεται ἡ ὑπαρξίς τοῦ ὑδριωδικοῦ ἀερίου, τὸ ὁποῖον παρομοίως ἀποσυντίθεται διὰ τοῦ ὑδραργύρου, καὶ δὲν δύναται νὰ συναχθῇ ὑπὸ ὕδωρ ἕνεκα τῆς εὐδιαλυσίας του εἰς τὸ ὕδωρ.

Ἐάν τὸ ἀέριον ἢ τὸ διάλυμα τοῦ ἀερίου εἰς ὕδωρ συναφθῇ μετὰ χλωρίου ἢ μετὰ διαλύτῳ χλωρίου, καὶ ἀποτελεσθῇ φαιὸς χρωματισμὸς, καὶ ἐάν τὸ ῥευστὸν, ἀνακινούμενον μετὰ αἰθέρος διδῇ τὸ φαιὸν του χρώμα πρὸς τὸν αἰθέρα, τότε ἀποδεικνύεται ἡ παρουσία τοῦ ὑδροβρωμικοῦ ἀερίου. Ἐάν τὸ διάλυμα τοῦ ἀερίου συναπτόμενον μετὰ διαλύτῳ νιτρικοῦ ἀργύρου καταβυθιθῇ μετὰ λευκοῦ χρώματος, καὶ ἐάν τὸ κατακρήμνισμα τοῦτο ᾗναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ, διαλύσιμον ὅμως εἰς τὴν ἀμμωνίαν τὴν ὑγρὰν, τότε ἐμπεριέχεται τὸ ὑδροχλωρικὸν ἀέριον, ἀφοῦ ὅμως πρῶτον ἐπληροφορήθημεν περὶ τῆς ἀπουσίας τοῦ ὑδροβρωμικοῦ ἀερίου.

Ἐάν τὸ ἀέριον συναπτόμενον μετὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ῥευστοῦ ἢ ἀεροειδοῦς ἀποτελῇ λευκοὺς ἀτμούς, τότε ἐμπεριέχει ἀμμωνίαν, ἥτις ὅμως δὲν δύναται ποτὲ νὰ συνυπάρχῃ μετ' ὀξέων ἀερίων, ἐκτὸς δὲ τούτου δύναται νὰ γνωρισθῇ εὐκόλως διὰ τῆς ὁσμῆς τῆς.

Περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν ἱαματικῶν ὑδάτων.

Τὰ εἰς τὰ ἱαματικὰ ὕδατα μέχρι τοῦδε ἐξιχνευθέντα ἄλατα ἐμπεριέχουσι τὰς ἐξῆς βάσεις καὶ ὀξέα.

Βάσεις.

Κάλιον, νάτрон, λίθιον, αμμωνίαν, στροντιανήν, τίτχον, άργιλλον, μαγνησίαν, υποξειδιον του μαγγανησίου, υποξειδιον του σιδήρου, οξειδιον του ψευδαργύρου και του χαλκού.

Οξεία.

Θειϊκόν, θειῶδες, νιτρικόν, άνθρακικόν, βώρικόν, φωσφορικόν και χαλικόν οξύ· προς τούτοις χλώριον, φθόριον, βορώμιόν, ιώδες και θειον, ήνωμένα μετά των προειρημένων βάσεων.

Η δια την ποιότητα ανάλυσις των ιαματικών υδάτων είναι συνοδουμένη μετά τινων δυσκολιών, καθότι τινά συστατικά έμπεριέχονται εις τόσην μικράν ποσότητα, ώστε μόλις δύναται να εξιχνευθῇ ή παρουσία των. Αν και ή σμικρά ποσότης έμπεριεχομένου τινός συστατικού δεν έχη καμμίαν επίρροήν επί της ιαματικής δυνάμεως του υδάτος, άλλ' ή πρόσδος της επίστηλής απαντῇ την ακριβῆ εξέτασιν όλων των έμπεριεχομένων συστατικών μορίων. Προς εξέτασιν εξατμίζεται μέγα ποσόν του υδάτος μέχρι ξηρού, έως να επιμείνωσι τά ενυπάρχοντα μη πτητικά αλάτα εις ξηράν κατάστασιν. Μεταξύ της εξατμίσεως των ιαματικών υδάτων καταβυθίζονται πολλάκις άφ' έαυτων τινά συστατικά, τά όποια αποχωρίζονται δια διύλυσεως, και μετά ταύτα εξετάζονται. Μέρος του ρευστου διύλισθην εξετάζεται δια τώτων δοκιμαστηρίων, ότα συστατικά εν τῷ υδατι υποτίθενται και έν τῷ ποσόν του ρευστου ήναι ικανόν, δυνάμεθα δι' εκάστην δοκιμασίαν να μεταχειρισθώμεν νέον ποσόν αυτού. Εξ τινας περιστάσεις μεταχειρίζονται τῷ αὐτοφύεῳ ὕδαρ, χωρίς να τῷ εξατμίζουν προλαβόντως, όταν ή τῷ ποσόν του εξεταζομένου υδάτος ήναι ολίγον, ή τὰ στερεά συστατικά έμπεριέχωνται εις άφθονίαν.

Περί της εξιχνεύσεως των βάσεων.

α. Εις μέρος τι υδάτος δι' εξατμίσεως μη επιπεπυκνωμένου προστίθεται υδροθειωμένη αμμωνία, τῷ δὲ ρευστὸν αφήνεται ήσυχως δια να αποτεθῇ τῷ καταβύθισμα· έν ὅμως τῷ ὕδαρ έμπεριέχη υπερτεροῦν οξύ, εξουδετεροῦται ακριβῶς δι' αμμωνίας. Δια να έμποδισθῇ ή του ατμοσφαιρικοῦ αέρος επίρροή, εκτελεῖται ή καταβύθισις εις καλῶς επιπωμάτισμένην φιάλην. Δια των ειρημένων δοκιμαστηρίων καταβυθίζονται τῷ υποξειδιον του σιδήρου και του μαγγανησίου, τῷ οξειδιον του ψευδαργύρου και του χαλκού, και ένθεια μέταλλα. Ουσίαι τινές, καθῶς ή άργίλλος,

ἡ φωσφορική τίτκνος, δύνανται νά καταβυθισθῶσι διὰ τοῦ ἐκτεθέντός δοκιμακτηρίου, ἀλλὰ ἀκριβέστερα ἐξιχνεύονται δ' ἄλλων μέσων.

Ἐάν εἰς τὸ ἱαματικὸν ὕδωρ ἤθελον εὔρεθῇ, ἐκτὸς τῶν διαλυθέντων μεταλλοξειδίων, καὶ ἄλλα τινὰ μέταλλα, καταβυθίζονται παρομοίως ὡς ἐνθεια μέταλλα. Τὰ καταβυθιζόμενα ἐνθεια μέταλλα ἔχουσι μέλαν χροῶμα, καὶ ἂν μικρότατον ποσὸν ὑποξειδίου σιδήρου ἐμπεριέχεται εἰς τὸ διάλυμα. Τὸ καθαρὸν ρευστὸν μεταγγίζεται ἀπὸ τοῦ ἀποτελλομένου καταβύθισμα, καὶ, χωρὶς νά ἀποπλυθῇ, ἀποχωρίζεται διὰ διύλισεως. Τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα κατεργάζεται μετὰ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος καὶ ὀλίγου ποτοῦ νιτρικοῦ ὀξέος· ἐκ τοῦ διαλύματος τούτου καταβυθίζεται τὸ ὀξειδον τοῦ σιδήρου δι' ἀμμωνίας, καὶ ξηραθὲν καθυποβάλλεται εἰς διὰ τοῦ σαλπιγγίου ἐξέτασιν. Τὸ διύλισθὲν ὑγρὸν δύναται νά ἐμπεριέχῃ ὑποξειδιον τοῦ μαγγανίου, ὀξειδιον τοῦ ψευδαργύρου, καὶ εἰς τινὰς περιπτώσεις ὀξειδιον τοῦ χαλκοῦ· εἰς τοιαύτην περίπτωσιν ἐξαίρεται τὸ ρευστὸν μέχρι ξηροῦ, καὶ τὸ ξηρὸν ὑπόλειμμα ἐξετάζεται διὰ τοῦ σαλπιγγίου πρὸς ἀνίχνευσιν αὐτῶν.

Ἐάν τὸ ἐν τῷ ἱαματικῷ ὕδατι ἐμπεριεχόμενον ποσὸν ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου εἶναι πολλὰ ὀλίγον, δὲν σχηματίζεται εἰς τὸ ὕδωρ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας μέλαν καταβύθισμα, ἀλλὰ κατ' ἀρχὰς ἀποτελεῖται ὑποπράσινος χρωματισμὸς εἰς τὸ ρευστὸν, ἐξ οὗ μετὰ τινὰ καιρὸν, ἐάν ἡ ἐπιπωματισμένη φιάλη τεθῇ εἰς θερμὸν μέρος, κατακρημνίζονται ἔχνη μέλανος καταβύθισματος, τὸ ὅποιον διύλισθὲν δύναται νά ἐξετασθῇ ἐπὶ τῆς τοῦ σιδήρου πικρουσίας. Μικρότατον ποσὸν τοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου μὴ δυνάμενον νά καταβυθισθῇ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, δύναται νά ἀνκαλυφθῇ διὰ τινων στοιχείων τοῦ τῶν κηκίδων βάμματος· ἀλλ' ἐάν ἐμπεριέχῃ ἀνθρακικὸν σίδηρον πρέπει τὸ ὕδωρ νά ἦναι νεαρῶς ἐξηντηλημένον διὰ τοῦ τῶν κηκίδων βάμματος· δὲν ἀποτελεῖται πάραυτα, ἀλλὰ μετὰ τινὰ καιρὸν ἰώδης χρωματισμὸς. Ἐάν δὲ οὗτος δὲν αὐξάνῃ μετὰ τινὰ ὥραν, δύναται νά θεωρηθῇ τὸ τοῦ ἐμπεριεχομένου σιδήρου ποσὸν μικρότατον. Ταχέως παρουσιασθεὶς ὁ χρωματισμὸς ἀναγγέλλει τὴν ὑπαρξίν μετὰ μείζοντος ποτοῦ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου.

Ἐάν τὸ ὕδωρ πρὸ τῆς καταβύθισεως μετὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας ἐπιτυκνούται διὰ τῆς ἐξατμίσεως, μεταβάλλεται τὸ ὑποξειδιον τοῦ σιδήρου εἰς ὀξειδιον, καὶ ἐάν ἦτον ἡνωμένον μετὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καταβυθίζεται ὡς ὀξειδιον τοῦ σιδήρου ὑδρομιγές. Ἐάν ἐμπεριέχῃ τὸ ὕδωρ

θειϊκόν ἢ ὑδροχλωρικόν ὑποξειδίου σιδήρου, ἀποχωρίζεται διὰ τῆς ἐξατμίσεως μόνον ὀλίγον ποσὸν τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ὑδρομιγοῦς.

β'. Ἔτερον μέρος τοῦ ἱματικοῦ ὕδατος ἀναμιγνύεται μεθ' ὑπερτεροῦντος ποσοῦ ἀμμωνίας καθαρᾶς, καὶ τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα ἐγκλείεται εἰς φιάλην διὰ νὰ μὴν ἐπιρρέαζεται ἀπὸ τὴν ἀτμοσφαῖραν. Διὰ τῆς ἀμμωνίας ἀποχωρίζεται ἰδίως ἡ ἀργίλλος, δύναται δὲ νὰ ἀποχωρισθῇ καὶ ἡ ἀνθρακικὴ τίτανος, καὶ ἡ στροντιανή, ἡ ἀνθρακικὴ μαγνησία, ἐὰν τὰ τοιαῦτα ἐμπεριέχωνται ὡς ἀνθρακικὰ ἄλατα. Ἐπίσης δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ διὰ τῆς ἀμμωνίας καὶ φωσφορικὴ, καὶ φθορικὴ τίτανος. Ἐὰν δὲ τὸ ἱματικὸν ὕδωρ προλαβόντως ἐξατμισθῇ, εὐρίσκονται ταῦτα εἰς τὸ σχηματιζόμενον καταβύθισμα. Ἐὰν ἀκολούθως διὰ τῆς ἀμμωνίας προαχθῇ καταβύθισμα δύναται τοῦτο νὰ ἐμπεριέχῃ ἐκτὸς τῆς ἀργίλλου καὶ μαγνησίαν, ἥτις δὲν ἤθελε καταβυθισθῇ διὰ τῆς ἀμμωνίας, ἐὰν ἐπροστίθετο πρότερον ὑδροχλωρικὸν ὀξύ. Ἐκτὸς τῆς μαγνησίας δύναται νὰ εὑρεθῇ εἰς τὸ τῆς ἀργίλλου καταβύθισμα καὶ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου.

Τὸ ἀπὸ τὴν ἀργίλλον διῦλισθὲν ὑγρὸν ἀναμίγνυται ἀκολούθως μετὰ διαλύματος ὀξαλικῆς ποτάσεως, δι' ἧς ἀποτελεῖται καταβύθισμα, ἐὰν ἐμπεριέχεται εἰς τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ἐπιπυκνούμενον ρευστὸν τίτανος μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς ὀξαλικῆς τιτάνου ἐνοῦται τὸ ρευστὸν μετὰ διαλύσεως φωσφορικῆς σόδας, δι' ἧς, ὑπαρχούσης μαγνησίας, σχηματίζεται ἀμέσως ἢ μετὰ καιρὸν καταβύθισμα. Ἐὰν δὲ ὑπάρχῃ εἰς τὸ ὕδωρ μεγαλύτερον ποσὸν μαγνησίας, εἶναι καλὸν νὰ προστεθῇ πρὸ τῆς ἀμμωνίας ὀλίγον ὑδροχλωρικὸν ὀξύ.

γ'. Ἔτερον μέρος τοῦ ἱματικοῦ ὕδατος μεταχειρίζεται πρὸς ἐξέτασιν τῶν ἐν τῷ ὕδατι ἐμπεριεχομένων στερεῶν ἀλκαλίων, καὶ ἐλλειπούσης τῆς μαγνησίας, δὲν ἀπαντῶνται μεγάλαι δυσκολίαι πρὸς ἀνεύρεσιν αὐτῶν. Ἐὰν ὑπάρχῃ εἰς τὸ ὕδωρ μέγα ποσὸν ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, προστίθεται εἰς αὐτὸ διάλυσις τοῦ χλωρίου, καὶ τὸ ρευστὸν θερμαίνεται διὰ νὰ μεταβληθῇ τὸ ὑποξείδιον εἰς ὀξειδιον. Ἀκολούθως καταβυθίζεται διὰ διαλύσεως ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας ἡ ἀργίλλος, τὸ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, καὶ ἡ τίτανος, ἐὰν ἐμπεριέχεται. Τὸ διῦλισθὲν ρευστὸν ἐξατμίζεται ἀκολούθως μέχρι ξηροῦ καὶ τὸ ὑπόλειμμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχονται τὰ ἀλκάλια μετὰ τῶν ὀξέων, πυροῦται τὸ συνήθως ἐνυπάρχον ἀλκάλιον εἶναι ἡ σόδα, τὸ δὲ κάλιον καὶ λίθιον ἀπαντῶνται σπανιότερα. Πρὸς τὴν τῆς ἀμμωνίας ἀνακάλυψιν ἐξατμίζεται ἱκανὸν ποσὸν διὰ πρᾶκτάτου πυρὸς μέχρι ξηροῦ, καὶ τὸ ἐξατμισθὲν ρευστὸν ἀναμιγνύεται μετὰ ποτάσεως πρὸς ἐκτύλιξιν τῆς ἐμπεριεχομένης

ἀμμωνίας, ἥτις ἐκλύεται εἰς εἶδος λευκῶν ἀτμῶν, ἐὰν πλησιάζωμεν εἰς αὐτὸ τὸ ῥευστὸν υἑλινὸν ῥάβδον ἠλειμμένην με ὑδροχλωρικὸν ὀξύ· ἐπίσης δύναται νὰ ἀνακαλυφθῇ ἡ παρουσία τῆς ἐκλυομένης ἀμμωνίας διὰ τῆς ἰδιαιτέρας τῆς ὁσμῆς.

Ἐὰν δὲ ὑπάρχῃ πολλὰ ὀλίγον ποσὸν ἀμμωνιοῦχου τινὸς ἄλατος δύναται νὰ ἐξιχνευθῇ ἡ ἀμμωνία με περισσοτέραν ἀσφάλειαν κατὰ τὸν ἐρεξῆς τρόπον· εἰς ἱκανὸν ποσὸν ἱαματικοῦ ὕδατος δι' ἐξατμίσεως ἐπιπυκνούμενον προστίθεται δ ἄλυμα ἀνθρακικῆς ποτάσεως, ἡ ἀνθρακικῆς σόδας καὶ ἀκολούθως καθυποβάλλεται ὅλον τὸ φύρμα εἰς ἀπόσταξιν ἐντὸς υἑλινου ἀποστακτικοῦ σκεύους, ἐρημοτιμένου μετὰ δοχείου ἐμπεριέχοντος ὀλίγον ποσὸν ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος· τὸ ἀποτεινόμενον ἀποστάγμα ἐξατμίζεται ἀκολούθως διὰ πύρου πυρὸς μέχρι ξηροῦ, καὶ οὕτω λαμβάνεται ὑδροχλωρικὴ ἀμμωνία, ἥτις δύναται νὰ ἐξαχθῇ καὶ ἐξιχνευθῇ διὰ τῶν ἤδη γνωστῶν δοκιμαστηρίων.

Τὸ εἰς τὴν ἐξατμίσιν τοῦ ἱαματικοῦ ὕδατος ἀποτελούμενον ἀδιάλυτον καταβύθισμα σύγκειται, ἐὰν τὸ ὕδωρ ἐμπεριέχῃ πολλὰ ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἐξ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, ὀξειδίου τοῦ μαγγανητίου, ἀνθρακικῆς τιτάνου, στροντιανῆς, φωσφορικῆς τιτάνου, φθορικῆς τιτάνου. κ.λ.π. Ταῦτα δὲ ἦσαν διαλελυμένα εἰς τὸ ἐλεύθερον ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ διὰ τῶν ἀνθρακικῶν ἀλάτων· τὸ καταβύθισμα τοῦτο τεθεὶν εἰς ἐκ λευκοχρύσου ἀγγοῖον διαλύεται διὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, δι' οὗ ἐκλύεται τὸ ἐνυπάρχον ἀνθρακικὸν ὀξύ· τὸ ξινὸν διάλυμα τίθεται ἀκολούθως μετὰ τὴν ἐντελῆ ἐκλυσιν τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς φιάλην, ἥτις ἐπιπωματίζεται, ἀφοῦ προστεθῇ ἀμμωνία. Ἐὰν δι' αὐτῆς ἀποτελεσθῇ καταβύθισμα, δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ φωσφορικὴν καὶ φθορικὴν τίτανον.

Τὸ ἔζημα τοῦτο δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ καὶ ἔχῃ στροντιανῆς, ἥτις ἀνεκαλύφθη ὑπὸ τοῦ Berzelius εἰς τινὰ ἱαματικὰ ὕδατα. Δύναται δὲ νὰ εὑρεθῇ εἰς τὸ ἔζημα, ἐὰν αὐτὸ διαλυθῇ εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ καὶ ἐξατμισθῇ μέχρι ξηροῦ· ἐὰν δὲ κατεργασθῇ με οἰνόπνευμα καὶ μετὰ ταῦτα ἀναφλεχθῇ, καίει με ὠραίαν ἐρυθρὰν φλόγα, ἐξ ἧς ἡ τῆς στροντιανῆς παρουσία ἀποδείκνυται.

Περὶ τῆς ἐξιχνεύσεως τῶν ὀξέων.

α. Εἰς μέρος τοῦ ἱαματικοῦ ὕδατος ἀναμεμιγμένον με ὀλίγον ποσὸν ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος προστίθεται διάλυμα ἀλικῆς βαρείας, καὶ ἐμπεριεχο-

μένου θειϊκοῦ ὀξέος, ἀποτελεῖται καταβύθισμα ἀδιάλυτον εἰς τὰ δι' ὕδατος κεκραμένα ὀξέα.

β'. Εἰς ἕτερον μέρος ἱματικοῦ ὕδατος ἀναμιγνύεται ὀλίγον νιτρικὸν ὀξύ καὶ ἀκολουθῶς διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου πρὸς ἐξίχνευσιν τῶν ἀλικῶν ἐνώσεων. Ἐὰν ἐμπεριέχῃ τὸ ἱματικὸν ὕδωρ ὑδροθειωμένον ἀέριον ἢ ἕτερον εὐδιάλυτον ἔνθιον μέταλλον, προστίθεται διάλυμα θειϊκοῦ χαλκοῦ, δι' οὗ καταβυθίζεται τὸ θεῖον τοῦ ὑδροθειωμένου αερίου, καθὼς καὶ τὸ τῶν ἐνθίων μετάλλων ὡς ἔνθιος χαλκός, ὅστις ἀποχωρίζεται καὶ διυλίζεται μετὰ τινά καιρόν. Τὸ διυλισθὲν ῥευστὸν ἐνοῦται ἀκολουθῶς μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος καὶ μετέπειτα μετὰ διαλύματος νιτρικοῦ ὀξειδίου ἀργύρου, δι' οὗ καταβυθίζεται ὑδροχλωρικός ἄργυρος, ἐὰν εὑρεθῇ εἰς τὸ ῥευστὸν ἐγγλῶριος ἔνωσις.

Διὰ δὲ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου δύναται νὰ καταβυθισθῇ ἐπίσης τὸ ἰώδες καὶ τὸ βρώμιον, ἐὰν ἐμπεριέχωνται εἰς τὸ ἱματικὸν ὕδωρ, ἐνώσεις τοῦ ἰώδους, ἢ τοῦ βρωμίου. Ἐπειδὴ ὅμως αἱ δύο τελευταῖαι ἐνώσεις εὐρέθησαν μέχρι τοῦδε μόνον εἰς μικράν ποσότητα, δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τὸ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου ἀποτελούμενον ἔζημα προερχόμενον ἀπὸ ὑδροχλωρικός ἐνώσεις. Διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν δὲ περὶ τῆς παρουσίας τῶν ἰωδούχων καὶ βρωμούχων ἐνώσεων ἀπαιτοῦνται καὶ ἄλλαι δοκιμαί, περὶ ὧν ἀκολουθῶς.

γ'. Εἰς μέρος τοῦ προσφάτως ἐξηντλημένου καὶ μὴ ἐξατμισθέντος ὕδατος προστίθεται τιτάνιον ὕδωρ, δι' οὗ ἀποτελεῖται καταβύθισμα, παρόντος τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Ἡ παρουσία δὲ μεγάλου ποσοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος φαίνεται καὶ ἐκ τῆς ποιότητος τοῦ ἱματικοῦ ὕδατος, ἐκπέμπει δηλ. ἀφρόν χωρὶς νὰ γίνῃ ἐπαισθητὴ ἀηδὴς τις ὁσμὴ τοῦ ὑδροθειωμένου αερίου. Ἐὰν ὀλίγαι σταγόνες τιτανίου ὕδατος προστεθῶσιν εἰς ὕδωρ ἐμπεριέχον μέγα ποσὸν ἀνθρακικοῦ ὀξέος, ἀναδιλύεται τὸ κατ' ἀρχὰς γενόμενον λευκὸν καταβύθισμα διὰ τῆς ἀνακινήσεως, ἢ διὰ τῆς προσθήκης μεγαλητέρου ποσοῦ ἱματικοῦ ὕδατος, τὸ ὅποῖον δὲν συμβαίνει, ἐὰν ἐμπεριέχῃ τὸ ὕδωρ ἀνθρακικά ἅλατα, ἢ ἀνθρακικός γαίας. Ἐὰν ὑπάρχῃ μέγα ποσὸν μαγνησίας, καταβυθίζεται διὰ τοῦ τιτανίου ὕδατος καὶ μέρος τῆς μαγνησίας.

δ'. Ἑτερον μέρος τοῦ ἱματικοῦ ὕδατος ἐξατμίζεται διὰ πύρου πρὸς μέχρι ξηροῦ, χωρὶς νὰ θερμανθῇ πολὺ τὸ ἐξατμισθὲν φύραμα. Ἐὰν διὰ τῆς ἐξατμίσεως προαχθῇ ἀδιάλυτόν τι καταβύθισμα, προστίθεται ἀκολουθῶς ὕδωρ πρὸς διάλυσιν τῶν εἰς αὐτὸ διαλυσίμων ὑλῶν. Τὸ ῥευστὸν

διυλίζεται και εξατμίζεται εκ νέου δια πρᾶου πυρὸς μέχρι ξηροῦ, και τοῦτο τὸ φύραμα ἐξετάζεται πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν ἐμπεριεχομένων ὀξέων. Μέρος π. χ. ἐξετάζεται ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος· πρὸς τοῦτο ἀναμιγνύεται τὸ μέχρι ξηροῦ εξατμισθὲν ἱαματικὸν ὕδωρ μετὰ λειοτριβηθέντος ἀνθρακος και θερμαίνεται. Τὰ νιτρικὰ ἄλατα ἀπαντῶνται μόνον σπανίως εἰς τὰ ἱαματικὰ ὕδατα, ἐξόχως δὲ εἰς τὰ πηγαία μεγάλων πόλεων.

ε. Ἐτερον μέρος ἐξετάζεται ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ βορικοῦ ὀξέος δια τοῦ θειικοῦ ὀξέος και τοῦ οἰνοπνεύματος κατὰ τὸν ἤδη ἐκτεθέντα τρόπον. Τὰ βορικὰ ἄλατα εὑρέθησαν μέχρι τῆς σήμερον μόνον εἰς τὸ ὕδωρ τινῶν λιμνῶν τῆς Τοσκάνης και τοῦ Τιβετίου.

Πρὸς ἐξίχνευσιν τοῦ χαλικοῦ ὀξέος εξατμίζεται μέρος τοῦ ὕδατος, χωρὶς ν' ἀποχωρισθῇ τὸ διὰ τῆς εξατμίσεως σχηματισθὲν καταβύθισμα. Τὸ διὰ τῆς εξατμίσεως πεπυκνωμένον φύραμα δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, δι' οὗ διαλύονται ἅπαντα τὰ ἐμπεριεχόμενα ἐκτὸς τοῦ χαλικοῦ ὀξέος.

ς'. Ἡ ὑπαρξὶς τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος και τοῦ φθορίου ἐξίχνευεται μόνον εἰς τὸ ἀδιάλυτον καταβύθισμα, τὸ ἀποτελούμενον διὰ τῆς εξατμίσεως τοῦ ἱαματικοῦ ὕδατος· τὰ δύο ταῦτα ὀξέα ἐμπεριέχονται πάντοτε μόνον εἰς ἐλαχίστην ποσότητα εἰς εἶδος φθορικῆς και φωσφορικῆς τιτάνου, και εἰς ὕδατα ἀνθρακικὴν σόδαν ἢ ἀνθρακικὸν ὀξὺ ἐλεύθερον ἐμπεριέχοντα. Τὸ ἀδιάλυτον τοῦτο καταβύθισμα ἐπιχύνεται εἰς ἐκ λευκοχρύσου ἀγγεῖον μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, και ἀφοῦ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξὺ τῆς συγχρόνως καταβυθισθείσης ἀνθρακικῆς τιτάνου ἐντελῶς ἐκλυθῇ, ἐξουδετεροῦται τὸ διάλυμα διὰ καθαρᾶς ἀμμωνίας ἐντὸς ἀγγείου δυναμένου νὰ ἐπιπωματισθῇ. Τὸ οὕτως ἀποτελούμενον καταβύθισμα, ἀφοῦ μεταγγισθῇ τὸ ἐπιπολᾶζον ῥευστὸν, διυλίζεται και ἐπιχύνεται μετὰ ταῦτα διὰ θειικοῦ ὀξέος.

Ἐπὶ τοῦ στομίου τοῦ ἐκ λευκοχρύσου ἀγγείου ἐπιτίθεται ἀκολούθως ὕελος ἠλειμμένη μετὰ κηροῦ, ἐφ' ἧς ἐγχχαράττονται γράμματα· ἐὰν ἐκ τοῦ μίγματος ἐκλύεται φθορικὸν ὀξὺ, ἡ ὕελος φθείρεται και τὰ γράμματα ἀποκαθίστανται ἀδιαφανῇ. Τὸ εἰς τὸ ἀγγεῖον ἐπιμεῖναν φύραμα διαλύεται ἀκολούθως διὰ πολλοῦ θερμοῦ ὕδατος πρὸς διάλυσιν τοῦ ἐνυπάρχοντος γύψου· τὸ διάλυμα μεταγγίζεται εἰς φιάλην τινά, ἥτις δύναται νὰ ἐπιπωματισθῇ, και μετέπειτα προστίθεται ἀμμωνία, δι' ἧς κατὰ κρημνίζεται ἡ φωσφορικὴ τίτανος, καθὼς και ἡ φωσφορικὴ ἀργίλλος,

καὶ ὀξειδίων τοῦ σιδήρου. Τὸ ποσὸν τοῦ ἀποτελουμένου καταβυθίσματος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἶναι τόσον ὀλίγον, ὥστε μόλις διὰ τοῦ σαλπιγγίου ἀνακαλύπτεται εἰς αὐτὸ τὸ ποσὸν τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος.

Ζ'. Μέρος τοῦ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ληφθέντος ξηροῦ ὑπολείμματος μεταχειρίζεται πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ ἰώδους. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἰῶδες πάντοτε ὑπάρχει μόνον εἰς ἐλαχίστην ποσότητα, μεταχειρίζομεθα τὸν ἐφεξῆς τρόπον.

Τὸ διὰ τῆς ἐξατμίσεως ληφθὲν ξηρὸν ὑπόλειμμα ἐντίθεται εἰς ἀρκετὰ μεγάλην φιάλην, ἣτις δύναται νὰ ἐπιπωματισθῇ, ἀκολούθως χύνεται εἰς αὐτὴν θεϊκὸν ὀξύ ἄκρατον δι' ἴσου ποσοῦ ὕδατος κεκραμένον, χωρὶς ὅμως νὰ βραχῇ ὁ λαϊμός τῆς φιάλης. Ἡ φιάλη πρέπει νὰ ᾔηται ἀρκετὰ εὐρύχωρος, ὥστε ἡ διὰ τοῦ ἀναβρασμοῦ ἀνυψουμένη μάζα νὰ μὴν ὑπερβαίῃ τὸ ἥμισυ τῆς φιάλης. Μετὰ ταῦτα ἐφαρμόζεται μετὰ τοῦ πώματος καὶ τῆς ὑέλου ὑγρὸς χάρτης πεπαλισμένος μετὰ σιταμύλου, καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ἐλαχίστη ποσότης ἰώδους χρωματίζεται ὁ χάρτης μετὰ ἰώδους ἢ κυανοῦ χρώματος. Ἐὰν τὸ ξηρὸν φύραμα ἐξουδετερωθῇ διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος, καὶ κορεσθῇ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, δύναται νὰ ἐκλυθῇ ἐγγλῶριον ἰῶδες, τὸ ὁποῖον δὲν ἤθελε βάφει τὸν χάρτην κυανοῦν.

η'. Ἅτερον μέρος τοῦ ἱαματικοῦ ὕδατος μεταχειρίζεται διὰ τὴν ἐξιχνευσιν τοῦ βρωμίου, τὸ ὁποῖον εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ἐξιχνεύσθη εἰς μερικὰ ἱαματικὰ ὕδατα. Ὁ συνήθης τρόπος τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ βρωμίου εἶαι ὁ ἐξῆς. Τὸ ἱαματικὸν ὕδωρ ἐπιπυκνοῦται διὰ τῆς ἐξατμίσεως καὶ μετὰ ταῦτα εἰσβάλλεται εἰς φιάλην, ἣτις δύναται νὰ ἐπιπωματισθῇ· ἀκολούθως διοχετεύεται διὰ τοῦ ὕδατος χλῶριον ἀέριον, δι' οὗ λαμβάνει ἐρυθροκίτρινον χρῶμα, ἐὰν τὸ ποσὸν τοῦ βρωμίου δὲν ᾔηθελεν εἶσθαι πολλὰ ὀλίγον. Ἀκολούθως ἐπιχύνεται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ρευστοῦ στιβὰς αἰθέρος, καὶ ἀροῦ ἀνakinηθῇ ἡ φιάλη πρὸς ἀνάμιξιν τοῦ ρευστοῦ, ἀφίεται εἰς ἡσυχίαν πρὸς ἀποχώρησίν του. Ὁ διὰ τοῦ βρωμίου χρωματισμένος αἰθὴρ ἀποχωρίζεται ἀκολούθως ἀπὸ τὸ ἄχρουν ρευστὸν καὶ ἀνακινεῖται μετ' ὀλίγου ποσοῦ καυστικῆς ποτάσσης ὑγρᾶς, δι' ἧς χάνει τὴν ὁσμὴν καὶ τὸ κίτρινον χρῶμά του, ἐξ αὐτοῦ δὲ σχηματίζεται ἀνάλογον ποσὸν βρωμιούχου καλίου καὶ βρωμικῆς ποτάσσης, ἐξ ὧν δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ διὰ τῆς πυρώσεως τὸ βρώμιον.

θ'. Ἡ παρουσία τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος εἰς τὰ ἱαματικὰ ὕδατα, ἐὰν ὑπάρχῃ εἰς ἐλευθέρην κατάστασιν, δύναται νὰ γνωρισθῇ καὶ διὰ τῆς ὁσμῆς, ἐὰν δὲ ἡνωμένον μετὰ τινος βάσεως, γνωρίζεται ἐκ τῆς ἀποσυνθέσεως ἐπὶ

τοῦ ὑδροθειωμένου ὀξέος ὑγροῦ ἀποῦ προστεθῇ ὑδροφθωρικόν ἢθεικόν ὀξύ.

ι. Ἡ παρουσία τοῦ θείου εἰς τὰ ἱματικά ὑδάτα γνωρίζεται διὰ τῆς ὁσμῆς κατὰ τοῦ ὑδροθειωμένου αέριου· ἡ ὁσμὴ αὕτη εἶναι δυνατωτέρα, ἐὰν ὑπάρχῃ τὸ θεῖον διαλυμένον εἰς τὰ αὐτοφυῆ ὑδάτα ὡς ὑδροθειωμένον αέριον καὶ εἰς τὰς δύο περιστάσεις ἀποτελεῖται διὰ τῶν διαλυμάτων τῶν μετάλλων καταβύθισμα μέλαν, συνιστάμενον ἐξ ἐνθείου μετάλλου. Εἰς τοιαύτην δοκιμασίαν μεταχειρίζεται συνήθως τὸ διάλυμα μολυβδούχου τινὸς ἢ ἀργυρούχου ἁλατος· ἐπειδὴ τὰ ῥηθέντα διαλύματα δεικνύουσι πλειοτέραν εὐαισθησίαν εἰς τὸ ἐλάχιστον ποσὸν ὑδροθειωμένου αέριου ἀπὸ τὰ διαλύματα τῶν λοιπῶν μεταλλοξειδίων.

ια. Τὰ ἱματικά ὑδάτα ἐμπεριέχουσιν ἐκτὸς τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος, τοῦ ὑδροθειωμένου αέριου καὶ τοῦ θειώδους ὀξέος, πολλάκις καὶ ἄλλας ἀεροειδεῖς οὐσίας, ὡς ὀξυγόνον καὶ ὑδρογόνον, ἀλλὰ συνήθως εἰς ὀλιγωτέραν ποσότητα παρὰ τὸ κοινὸν ὕδωρ· τὸ ὀξυγόνον, καθὼς καὶ τὸ ὑδρογόνον, δύνανται νὰ ἐκλυθῶσιν ἐκ τῶν ἱματικῶν ὑδάτων διὰ συνεχοῦς ζέσεως.

Ἐκτὸς τῶν εἰρημένων συστατικῶν, ἐμπεριέχουσι τὰ ἱματικά ὑδάτα συχνάκις καὶ ὀργανικὰς οὐσίας διαλυμένας, αἵτινες δίδουν εἰς τὸ ἐξάτμιζόμενον ὕδωρ κίτρινον χρῶμα, εἰς δὲ τὰ ἐπιμένοντα ἅλατα ὑποκίτρινον.

Περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν χαλικοῦχων ἐνώσεων, αἵτινες ἀπαρτῶνται αὐτοσυστάτοι εἰς τὴν φύσιν.

Αἱ ἐνώσεις αὗται γνωρίζονται καὶ διακρίνονται ἀπὸ τὰς ἄλλας ἐνώσεις τὰς μὴ ἐμπεριεχούσας χάλικα, καθότι, ἐὰν ταχῶσι διὰ τοῦ σάλπιγγίου ἐπ' ἀνθρακος μὲ φωσφορικὸν νάτρον, μένει ἀδιάλυτος ἡ χαλικὴ, καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς τετηγμένης μάζης φαίνεται εἰς εἶδος σφαιριδίου. Συστατικά, τὰ ὅποια ἀπαντῶνται εἰς χαλικοῦχους ἐνώσεις εἶναι, ἐκτὸς τῆς χαλικῆς, ἀργίλλος, τίτανος, μαγνησία, ὑποξείδιον τοῦ σιδήρου, ἐνίοτε ἔχνη ὑποξειδίου τοῦ μαγνησίου, ἀλκάλιον τι καὶ ὕδωρ.

Πρὸς ἐξέτασιν χαλικοῦχου τινὸς ἐνώσεως καθ' ὑγρὰν ὁδὸν πρέπει μέρος τοῦ λειοτετριμμένου ὀρυκτοῦ νὰ κατεργασθῇ μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, καὶ ἕτερον μέρος αὐτοῦ νὰ ἐξετασθῇ, ἐὰν ἐμπεριέχῃ ὕδωρ· ἡ διὰ τῆς διαλύσεως ἀποχωριζομένη χαλικὴ ἀποχωρίζεται διὰ διύλισης, καὶ ἐκπύνεται. Διὰ νὰ ἀποκατασταθῇ δὲ καθαρὰ, διαλύεται ἐκ νέου εἰς διάλυσιν ἀνθρακικῆς ποτάσεως ἢ σόδας, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλύματος

ἀποχωρίζεται πάλιν διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. Ἐάν πληροφορηθῶμεν διὰ τῆς διὰ τοῦ σαλπιγγίου δοκιμασίας ὅτι ἡ ἐξεταζομένη ἔνωσις ἐμπεριέχει πολὺν σίδηρον, προσθέτομεν εἰς τὸ ὑδροχλωρικὸν διάλυμα μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς χαλκικῆς ὀλίγον νιτρικὸν ὀξύ, καὶ θερμαινόμενον αὐτοῦ, μεταβάλλεται τὸ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου εἰς ὀξειδίου· τὸ νιτρικὸν ὀξύ δὲν προστίθεται ὅμως, ἐὰν ἡ ἔνωσις δὲν ἐμπεριέχῃ σίδηρον. Ἀκολούθως προστίθεται ἀμμωνία, ὥστε νὰ ὑπερτερῇ αὕτη, καὶ τὸ λαμβανόμενον κατακρήνηνισμα ἀποχωρίζεται ὅσον ἔνεστι ταχύτερον. Τοῦτο τὸ κατακρήνηνισμα δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ ἀργίλλον, καὶ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου· ἐὰν ἐμπεριέχεται μόνον ἀργίλλος, εἶναι λευκόν· εἶναι δὲ κατὰ τὸ μᾶλλον, ἢ ἥττον φαιὸν, ἐὰν ἐμπεριέχῃ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου. Τὸ ἕζημα ἐστὶ ὑγρὸν ζέεται μετὰ διαλύματος καυστικῆς κηλίδας, καὶ ἀποχωρίζεται διὰ τῆς διυλίσεως ἀπὸ τοῦ ἀδιάλυτον ὀξειδίου τοῦ σιδήρου· εἰς τὸ διυλισθὲν ἀλκαλικὸν ρευστὸν προστίθεται διάλυμα τῆς ὑδροχλωρικῆς ἀμμωνίας, καὶ ἐὰν δι' αὐτῆς ἀποτελεσθῇ λευκὸν ἕζημα, εἴμεθα βέβαιοι περὶ τῆς παρουσίας τῆς ἀργίλλου· τοῦτο τὸ ἕζημα, ἐὰν μετὰ τινα καιρὸν προσλάβῃ ὑπόφαιον, ἢ φαιὸν χρῶμα, ἐμπεριέχει μικρὰν ποσότητα τοῦ μαγνησίου.

Εἰς τὸ ρευστὸν, ἀπὸ τοῦ ὁποῖον τὸ διὰ τῆς ἀμμωνίας προηγούμενον καταβύθισμα ἀπεχωρίσθη, προστίθεται διάλυσις τοῦ ὀξυχαλικοῦ ὀξέος καὶ τῆς ἀμμωνίας καὶ δι' αὐτῶν καταβυθίζεται ἡ τίτανος· ἡ καταβυθισθεῖσα ὀξυχαλικὴ τίτανος δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ μικρὸν ποσὸν ὑποξειδίου τοῦ μαγνησίου, καὶ τότε προσλαμβάνει ὡς αὐτὸς ὑπόφαιον χρῶμα. Ἀφοῦ ἡ ὀξυχαλικὴ τίτανος ἀποχωρίσθῃ διὰ διυλίσεως, προστίθεται ἐκ νέου ὀξυχαλικὴ ἀμμωνία, διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν, ἐὰν ὅλη ἡ ποσότης τῆς τιτάνου ἤδη ἐκταβυθίσθῃ. Μετὰ ταῦτα ἐξετάζεται τὸ διάλυμα, ἂν ἐμπεριέχῃ μαγνησίον, ἥτις ἀνακαλύπτεται, ἐὰν διὰ τῆς προσθήκης τῆς φωσφορικῆς σόδας καὶ ἀμμωνίας προχθῇ καταβύθισμα. Τὴν παρουσίαν τοῦ ὑποξειδίου τοῦ μαγνησίου, τοῦ ὁποῖου συνήθως μόνον μικρὰ ποσότητες εἰς τὰς χαλκούχους ἐνώσεις ὑπάρχουσιν, ἀνακαλύπτεται εὐκολώτερα διὰ τῆς ἐξέτασεως διὰ τοῦ φουστηρίου, παρὰ καθ' ὑγρὰν ὁδόν.

Ἐὰν ἡ χαλκούχος ἔνωσις δὲν διχάζεται διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, συντήκεται τὸ λειοτριβηθὲν ὀρυκτὸν μετὰ τριπλασίας ποσότητος ἀνθρακικῆς ποτάσσης ἢ σόδας· ἐὰν ἡ χαλκούχος ἔνωσις συμμιχθῇ μὲ μίγμα ἐκ 5 μερῶν ἀνθρακικῆς ποτάσσης, καὶ 4 ἀνθρακικῆς σόδας, καὶ ἂν τὸ φύμα τοῦτο θερμανθῇ εἰς μικρὰν ἐκ λευκοχρύσου χύτραν,

τότε ἀποτελεῖται ἡ τῆξις καὶ διὰ τῆς θερμότητος τοῦ λύχνου τοῦ οἶνο-
πνεύματος. Ἡ μέθοδος αὕτη δύναται νὰ μεταχειρισθῇ εἰς τὰς ἐπὶ τῆς
ποιότητος ἀνκλύσεις, ὅχι ὅμως καὶ εἰς τὰς ἐπὶ τῆς ποσότητος, καθότι
εἰς τὴν τῆξιν ταύτην συμβαίνει ἔκλυσις ἀνθρακικοῦ ὀξέος, δι' οὗ μέρος
τῆς μάζης διασκορπίζεται. Ἡ ἰσχυρῶς πυρουμενὴ μάζα κατεργάζεται μεθ'
ὑδατος, καὶ τὸ διάλυμα ἀνχιμύνεται μὲ ποσὸν τι ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. Τὸ
ὑδατῶδες ρευστὸν εἶναι πράσινον, καθὼς καὶ ἡ πεπυρωμένη μάζα, ἐὰν
ἐμπεριέχεται ἐλάχιστον ποσὸν ὑποξειδίου τοῦ μαγγανησίου· τὸ πράσινον
ρευστὸν λαμβάνει ἐρυθροῦν χρῶμα δι' ὀλίγου ποσοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος,
ἀποχωρίζεται δὲ διὰ μεγαλητέρου ποσοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, ἐὰν τὸ
ρευστὸν ἔτι θερμανθῇ. Τὸ ὀξινὸν ρευστὸν ἐξατμίζεται εἰς πορφυροῦν τι
ἀγγεῖον μέχρι ξηροῦ, καὶ κατεργασθέντος τοῦ ὑπολείμματος μεθ' ὑδατος,
ἐπιμένει ὁ χάλιξ εἰς ἀδιάλυτον κατάστασιν.

Βαρεῖα. Ἡ γῆ αὕτη εὐρέθη μέχρι τοῦδε εἰς τὸ Baryt Harmatom.
ἀπολαμβάνεται δὲ ἐκ τοῦ ἀπὸ τὸ χαλικὸν ὀξὺ ἀποχωρισθέντος ὑδροχλω-
ρικοῦ διαλύματος διὰ προσθήκης θειικοῦ ὀξέος ὡς θειικῆ βαρεῖα· ἐὰν
κατὰ τύχην εἰς τὸ ἐξεταζόμενον ὄρυκτον ἐμπεριέχεται καὶ πολλὴ τίτανος,
δύναται νὰ καταβυθισθῇ συγχρόνως καὶ θειικὴ τίτανος, ἥτις χωρίζεται
ἀπὸ τὴν συγχρόνως καταβυθισθεῖσαν θειικὴν βαρεῖαν διὰ τῆς δι' ὑδατος
ἐκπλύσεως. Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σημειώσωμεν ὅτι, ὑπαρχούσης στροντια-
νῆς γῆς, ἡ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, ἤθελον καταβυθισθῇ ἀμφοτέρω ταῦτα
ἐκ τῆς ὑδροχλωρικῆς διαλύσεως.

Βηρυλλία. Ἡ γῆ αὕτη ἀπαντᾷται εἰς τὰ ἐφεξῆς ὄρυκτὰ
Smaragd, Euklas, Cymophan. Εἰς τὰ πρῶτα τρία ἀπαντᾷται ὁμοῦ μὲ
τὴν ἄργιλλον, μετὰ τῆς ὁποίας δύναται νὰ συγχέηται. Πρὸς ἀνακάλυψιν
τῆς βηρυλλίας πράττομεν ὡς ἐφεξῆς. Ἀφοῦ ἀποχωρισθῇ ὁ χάλι-
ξ, προστίθεται εἰς τὴν διάλυσιν ἀμμωνία, διὰ τῆς ὁποίας ἡ βη-
ρυλλία, ἂν ὑπάρχῃ, θέλει καταβυθισθῇ. Τὸ λαμβανόμενον ἴζημα ἔτι
ὑγρὸν διαλύεται εἰς ὅσον ἔνεστι ὀλιγώτερον ὑδροχλωρικὸν ὀξὺ, καὶ εἰς τὸ
διάλυμα τοῦτο προστίθεται διάλυσις ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας εἰς ὑπερτε-
ροῦσαν ποσότητα· τὸ ἴζημα κατεργάζεται μετὰ τῆς ἀμμωνίας εἰς κλει-
σμένην φιάλην καιρὸν τινα, ἀφοῦ δὲ ἀποχωρισθῇ τὸ διάλυμα ἀπὸ τὰ
ἀδιάλυτα μέρη, εὐρίσκεται ἡ βηρυλλία εἰς τὸ διῶλιζόμενον ρευστὸν, καὶ
δύναται νὰ ληφθῇ ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς ἐξατμίσεως. Ἡ βηρυλλία ἔχει
μεγάλην ὁμοιότητα μὲ τὴν ἄργιλλον, καὶ ἐξέτασις περὶ τῆς καθαρότητος
τῆς πρώτης γίνεται διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ νιτρικοῦ κοβαλτίου διὰ τοῦ

σαλπιγγίου· ἡ ἀργίλλος δηλαδή ἀλειφθεῖσα μὲ νιτρικὸν κοβάλλιον καὶ πυρωθεῖσα λαμβάνει καθαρὸν κυανοῦν χρῶμα, ἐάν δὲ προσλαμβάνη πρασινωπὸν χρῶμα, εἶναι ὑποψία ὅτι ὑπάρχει καὶ βηρυλλία.

Θωρία. Ἡ γῆ αὕτη ἀνεκαλύφθη ἀπὸ τὸν Berzelius εἰς τὸν θωρίτην λίθον καὶ δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἐκ τῶν ἄλλων συστατικῶν κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Ἐάν εἰς τὸ διάλυμα διαφόρων βάσεων μεταλλικῶν ἢ μὴ μεταλλικῶν ἐντεθῶσι κρύσταλλοι θεϊκῆς ποτάσσης, μεχρισοῦ δὲν διαλύονται πλέον, θέλει κρυσταλλωθῇ τὸ διπλοῦν ἅλας συνιστάμενον ἐκ θεϊκῆς ποτάσσης, καὶ θεϊκῆς θωρίας. Ἐάν τοῦτο τὸ δυσδιαλυτώτατον ἅλας διαλυθῇ εἰς θερμὸν ὕδωρ, δύναται ν' ἀποχωρισθῇ ἡ θωρία διὰ προσθήκης καυστικῆς ποτάσσης.

Ἰτρία. Αὕτη εὐρίσκεται εἰς τὰ ἐφεξῆς ὄρυκτά, Orthit, Gadolinit καὶ Pyrorthit. Ἐάν εἰς τὸ διυλίζομενον ρευστὸν, ἐξ οὗ ἀπεχωρίσθῃ τὸ χαλικὸν ὀξύ, προστεθῇ ἀμμωνία, ἀποχωρίζεται ἡ ἰτρία· ἐπειδὴ δὲ εἶναι συνήθως ἀναμειγμένη μετὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ δημητρίου, ἀποπλύνεται τὸ ἀποτελούμενον ἕκρημα μὲ κεκορεσμένην διάλυσιν θεϊκῆς ποτάσσης, δι' ἧς διαλύεται ἡ ἰτρία καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ διυλισθέντος διαλύματος καταβυθίζεται διὰ τῆς ἀμμωνίας.

Ὑποξείδιον τοῦ δημητρίου. Ἀπαντᾷται ἰδίως εἰς τὰ ἐφεξῆς ὄρυκτά τὸ Gadolinit, Cerit, Orthit, καὶ Pyrorthit· καὶ ἐν γένει εἰς ἅπαντα τὰ ὄρυκτά, εἰς τὰ ὅποια εὐρίσκεται καὶ ἡ ἰτρία· ἡ ἀποχώρησις ἐκ τῆς ἰτρίας μὲ τὴν ὁποίαν ἔχει πολλὰς ὁμοιότητας, γίνεται διὰ τοῦ διαλύματος τῆς θεϊκῆς ποτάσσης, εἰς τὸ ὅποσον τὸ ὑποξείδιον τοῦ δημητρίου, εἶναι ἀδιάλυτον, διαλύσιμος δὲ ἡ ἰτρία.

Ζirkονία. Ἡ γῆ αὕτη θεωρεῖται ὡς κύριον συστατικὸν τοῦ Zirkon καὶ Eudialyt. Ἡ ζirkονία ἀποχωρίζεται ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ὄρυκτῶν κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον: Ἀφοῦ κατὰ τὸν συνήθη τρόπον ἀποχωρισθῇ τὸ χαλικὸν ὀξύ, καταβυθίζεται ἡ ζirkονία διὰ τῆς ἀμμωνίας· ἐπειδὴ ὅμως δι' αὐτῆς καταβυθίζεται συνήθως καὶ τὸ διαλυόμενον ὀξείδιον τοῦ σιδήρου, πυροῦται ἡ καταβυθισθεῖσα ζirkονία, καὶ οὕτως ἀποκαθίσταται ἡ ζirkονία ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, ὥστε διὰ τῆς κατεργάσεως δι' αὐτοῦ δύναται νὰ διαλυθῇ τὸ ὀξείδιον τοῦ σιδήρου, ἡ δὲ ζirkονία μένει ἀδιάλυτος.

Ὀξείδιον ψευδαργύρου. Τοῦτο τὸ ὀξείδιον εὐρίσκεται ἰδίως εἰς τὸ ὄρυκτὸν καθμία καλούμενον· διὰ νὰ ἀποχωρισθῇ τὸ ὀξείδιον τοῦ

ψευδαργύρου εκ τῶν τοιούτων χαλκικούχων ενώσεων, αποχωρίζεται εκ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ διαλύματος τὸ διαλυόμενον ὀξειδιον τοῦ μολύβδου καὶ κασσιτέρου διὰ τοῦ ὑδροθειικοῦ ὀξέος. Ἀκολούθως ὑπερκορέννεται τὸ διάλυμα μετ' ἀμμωνίας, καὶ μετὰ ταῦτα προστίθεται ὑδροθειικὴ ἀμμωνία, διὰ τῆς ὁποίας αποχωρίζεται ὁ ψευδαργυρος, ὡς ἔνθιος ψευδαργυρος· δύσκολον εἶναι νὰ γνωρισθῇ τὸ ὀξειδιον τοῦ ψευδαργύρου διὰ τοῦ φουστηρίου, ἐπεὶ δὴ δυσκόλως ἐξχνίζεται.

Ὁξειδιον τοῦ νικελίου. Τοῦτο τὸ ὀξειδιον εἶναι συστατικὸν τῶν ὀρυκτῶν Chrysopras, Olivin. Εἰς τὰ πλείοτερα νικελιοῦχα ὀρυκτὰ δύναται νὰ εὑρεθῇ τὸ ὀξειδιον τοῦ νικελίου διὰ τοῦ σαλπιγγίου, ἐπεὶ δὴ συντακὲν μὲ βορακὰ ἢ φωσφορικὴν σόδαν δίδει εἰς αὐτὰ ὑπέρυθρον χρῶμα· εἰς ἀναλύσεις ἐπὶ τῆς ποιότητος δύναται νὰ αποχωρισθῇ τὸ ὀξειδιον τοῦ νικελίου εκ τοῦ ἐνθείου νικελίου.

Ὁξειδιον τοῦ καδμίου. Ὁ καλλίτερος τρόπος τοῦ αποχωρίζειν τὸ ὀξειδιον τοῦ καδμίου ἀπὸ τὸ ὀξειδιον τοῦ ψευδαργύρου, μετὰ τοῦ ὁποίου συνήθως ἀπαντᾷται εἰς τὰ ὀλίγα ψευδαργυροῦχα ὀρυκτὰ, γίνεται κατὰ τὸν ἐφεξῆς τρόπον. Διὰ τοῦ ἀπὸ τὸ χαλκικὸν ὀξύ ἀποχωριζομένου ὑδροχλωρικοῦ ὀξίνου διαλύματος διοχετεύεται ὑδροθειωμένον ἀέριον, δι' οὗ καταβυθίζεται τὸ καδμιον, ὅχι δὲ καὶ ὁ ψευδαργυρος.

Ὁξειδιον τοῦ μολύβδου. Τοῦτο τὸ ὀξειδιον εὑρέθη εἰς μικρὰν ποσότητα εἰς διάφορα χαλκικοῦχα ὀρυκτὰ. Ἐν ἡ ἀποσύνθεσις τῆς χαλκικούχου ενώσεως γίνῃ διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, τότε εὑρίσκεται εἰς τὸ ἀδιάλυτον ὑπόλειμμα, καὶ τὸ ὀξειδιον τοῦ μολύβδου, ὡς ὑδροχλωρικός μολύβδος· ἐν δὲ ἤθελον εὑρεθῇ καὶ ἔχνη μολύβδου διαλυμένα, δύναται νὰ αποχωρισθῶσι διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας.

Ὁξειδιον τοῦ οὐρανίου. Ἀπαντᾷται εἰς μικρὰν ποσότητα εἰς ὀλίγα ὀρυκτὰ καὶ εἰς τὸν θωρίτην, καὶ θεωρεῖται κύριον συστατικὸν τοῦ ὀρυκτοῦ καλουμένου Pechblende. Πρὸς εὔρεσιν τοῦ οὐρανοξειδίου ἀποχωρίζεται εκ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ διαλύματος τὸ διαλυόμενον οὐράνιον διὰ τῆς καυστικῆς ἀμμωνίας· τὸ προηγούμενον ἴζημα διαλύεται εκ νέου εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, καὶ ἐξ αὐτοῦ καταβυθίζεται διὰ τῆς ποτάσεως. Ἐὰν τὸ ἴζημα τοῦτο κατεργασθῇ μὲ ὅσον ἐνεπτι ἄκρατον διάλυσιν ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας διαλύεται ὑπ' αὐτῆς τὸ ὀξειδιον τοῦ οὐρανίου, ὅχι δὲ καὶ τὰ λοιπὰ συστατικά.

Ὁξειδιον τοῦ χαλκοῦ. Εὑρίσκεται κατὰ διάφορον ποσότητα εἰς τὰ ἐφεξῆς ὀρυκτὰ Dioptas, Malachit, Idiocras, Allophan, Cerin, εἰς

τὰ ὁποῖα ἡ παρουσία τοῦ χαλκοῦ δύναται ν' ἀνακαλυφθῇ καὶ διὰ τοῦ φουσητηρίου· πρὸς τούτοις ἀνακλύπτεται τὸ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ εἰς τὸ ἀπὸ τοῦ χαλκικοῦ ὀξὺ ἀποχωρισθὲν ὑδροχλωρικὸν διάλυμα διὰ τῶν γνωστῶν ἀντιδραστηρίων.

Ὁξειδιον τοῦ κασσιτέρου. Ἰχνη αὐτοῦ εὐρέθησκον εἰς τὰ ἐξῆς ὀρυκτὰ Euklas, Thorit, Smaragd· πρὸς ἀνακάλυψιν αὐτοῦ διοχετεύεται διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ διαλύματος ὑδροθεικὸν ἀέριον, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ κασσίτερος ἀποχωρίζεται ὡς ἔνθεις κασσίτερος, ὅχι ὅμως παρευθὺς, ἀλλὰ μετὰ τινα χρόνον καὶ ταχύτερα διὰ τῆς θερμάνσεως τοῦ ρευστοῦ. Ἐὰν τὸ ἐξετασθὲν ὀρυκτὸν ἐμπεριεῖχε καὶ ἄλλα μέταλλα, εὐρίσκονται καὶ αὐτὰ ἐντὸς τοῦ ἰζήματος· καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποχωρίζεται ὁ ἔνθεις κασσίτερος διὰ τῆς κατεργάσεως μετὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, δι' ἧς διαλύεται ὁ ἔνθεις κασσίτερος, ὅχι δὲ τὰ ἄλλα ἔνθεια μέταλλα.

Ὁξειδιον τοῦ χρωμίου. Διαφόρων ὀρυκτῶν τὸ ὠραῖον πράσινον χρῶμα ἀποδίδεται εἰς τὸ ὀξειδίου τοῦ χρωμίου, καθὼς τὸ τοῦ σμάραγδου λίθου· ὅχι μόνον δὲ πράσινα, ἀλλὰ καὶ αἰμοδαφῇ τινα ὀρυκτὰ ὀφείλουν τὸ αἰμοδαφές των χρῶμα εἰς τὸ ὀξειδίου τοῦ χρωμίου, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸ ἰδίωμα θερμαινόμενα νὰ γίνωνται μέλανα καὶ ἀδιαρχνῇ, ὀλίγον δὲ κατ' ὀλίγον ἀποψυχαινόμενα λαμβάνουσι κίτρινον καὶ ὠραῖον πράσινον χρῶμα, καὶ μετὰ τὴν ἐντελὴ ἀπόψυξιν ἐπικυαυρίζονται τὸ ἰδίον των χρῶμα. Μικρὰ ποσότης τοῦ ὀξειδίου τοῦ χρωμίου εἰς διάφορα ὀρυκτὰ δύναται ν' ἀνακαλυφθῇ διὰ τοῦ φουσητηρίου· ἐὰν δὲ συντακῶσι μετὰ βόρρακος, ἢ φωσφορικῆς σόδας, λαβάνει τὸ ταχὺν φόνημα ἀποψυχαινόμενον πράσινον χρῶμα. Ἡ ἐξέτασις τῶν χρωμιούχων ἐνώσεων κατὰ ξηρὰν ὁδὸν γίνεται, ἐὰν συντακῶσι μὲ νιτρικόν, ἢ ἀνθρακικὸν κάλιον· δι' αὐτῶν μεταβάλλεται τὸ ὀξειδίου τοῦ χρωμίου εἰς χρωμικὸν κάλιον, ἐκ τοῦ ὁποίου τὸ χρωμικὸν ὀξὺ δύναται ν' ἀποχωρισθῇ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου, διὰ τῆς νιτρικῆς βαρέας, καὶ νιτρικοῦ μολύβδου· ἐκ δὲ τοῦ χρωμικοῦ ὀξέος ἀποκαθίσταται ὀξειδιον τοῦ χρωμίου, ἐὰν προστεθῇ ὑδροχλωρικὸν ὀξὺ ἢ οἰνόπνευμα.

Τιτανικὸν ὀξὺ. Τοῦτο τὸ ὀξὺ ἀπαντᾷται ἠνωμένον μετὰ χαλκοῦ ὀξέος εἰς τὸ Titanit, Ἰχνη αὐτοῦ μετὰ ὀξειδίου τοῦ κασσιτέρου ὑπάρχουν εἰς τὰ ἐφεξῆς ὀρυκτὰ, Cymophan, Cyanit, Achmit, Glimer. Ἐὰν αὐτὰ τὰ ὀρυκτὰ ἀναμιχθέντα μὲ ἀνθρακικὸν κάλιον πυρωθῶσι, καὶ τὸ πυρωθὲν μίγμα διαλυθῇ εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξὺ, διαλύεται τιτανι-

κόν οξύ, καὶ τιτανικόν ἀλκάλιον· τὸ τιτανικόν οξύ δίδει εἰς τὸν βόρακα καὶ εἰς τὸ φωσφορικόν νάτρον ἀσθενὲς κυανοῦν χρῶμα.

Tartaricόν οξύ. Εἰς μικράν ποσότητα εὑρέθη τοῦτο τὸ οξύ εἰς τινα ὀρυκτά, εἰς τὸν Smaragd, καὶ δύναται νὰ διαλυθῇ διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Boricόν οξύ. Εὑρέθη εἰς πολλὰ ὀρυκτά κατὰ διάφορον ποσότητα, ἀποτελεῖ τὸ κύριον μέρος εἰς τὸν δατόλιθον, καὶ βοτρίλιθον, καὶ εὐρίσκεται εἰς μικράν ποσότητα εἰς τὰ ἐξῆς ὀρυκτά Turmalin καὶ Axinit, Pinit, Granat, Colophonit, Topas. Ἡ παρουσία τοῦ βορικοῦ ὀξέος εἰς τὰς χαλικούχους ἐνώσεις ἀνακαλύπτεται, ἐὰν αὗται ἀποσυντεθεῖσαι διὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἐπιχυθῶσι μὲ οἰνόπνευμα, καὶ τοῦτο ἀναφλεχθῇ· τὸ πράσινον χρῶμα τῆς φλογὸς προδίδει τὴν παρουσίαν τοῦ βορικοῦ ὀξέος.

Φωσφορικόν οξύ. Καὶ τοῦτο τὸ οξύ εὐρίσκεται εἰς τινας χαλικούχους ἐνώσεις εἰς ἐλαχίστην ποσότητα· εἰς περισσοτέραν δὲ, εἰς τὰ Sordamelit καὶ Lepidolith. Τὰ λειοτριβθέντα ὀρυκτά ἀναμειγνύμενα μετὰ τριπλασίου ποσοῦ σόδας ἢ ἀνθρακικῆς ποτάσης τήκονται καὶ οὕτω προάγεται φωσφορικόν ἀλκάλιον, ἐξ οὗ τὸ φωσφορικόν οξύ δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς τιτάνου· ἡ φωσφορικὴ αὕτη τίτανος ἀποσυντεθεῖσα διὰ θεϊκοῦ ὀξέος παρέχει τὸ φωσφορικόν οξύ, τὸ ὁποῖον διὰ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου καταβυθίζόμενον ὡς κίτρινον ἷζημα δύναται νὰ γνωρισθῇ.

Ἀνθραξ. Ἡ μόνη εἰς τὴν φύσιν ἀπαντωμένη τοῦ χάλικος ἔνωσις ἐμπεριέχουσα ἄνθρακα εἰς ἀρκετὴν ποσότητα εἶναι ὁ Pyrothit· εἰς τοῦτο τὸ περίεργον ὀρυκτὸν δύναται νὰ φανῇ ἡ παρουσία τοῦ ἄνθρακος, ἐὰν διὰ τοῦ σαλπιγγίου ἐλαφρῶς θερμαινόμενον εἰς ἓν μέρος πυρωθῇ· τότε ἀνάπτει, ἐξακολουθεῖ νὰ καίῃ, χωρὶς νὰ σχηματίσῃ φλόγα καὶ αἰθάλην, καὶ τὸ ὀρυκτὸν λαμβάνει λευκὸν ἢ στακτόχρουν χρῶμα. Ἐὰν ἀναμειχθὲν μὲ νιτρικὸν κάλιον θερμανθῇ, προξενεῖ κρότον, ὅστις συμβαίνει μὲ πᾶσαν ἀνθρακούχον ἔνωσιν· μικρὰ ποσότης ἄνθρακος ἢ μάλλον ὑπαρξίς ὀργανικῶν οὐσιῶν, εὐρίσκονται εἰς πολλὰς χαλικούχους ἐνώσεις, καὶ αὗται κάμνουν ὥστε νὰ μελανοχρωματίζωνται, ἐὰν θερμανθῶσιν εἰς σωλῆνα διὰ τοῦ λύχνου τοῦ οἰνοπνεύματος· τὸ μέλαν δὲ χρῶμα ἐξαλείφεται, ἐὰν θερμανθῶσιν εἰς τὸν ἀέρα, ἐπεὶ δὲ ὁ ἀνθραξ καίει· τοιαῦτα φαινόμενα παρατηροῦμεν εἰς διάφορα μαγνησιούχα ὀρυκτά, ὡς εἰς τὸ Picrosmin, Pyrallolith, Serpentin, Agalmatolith, Pimelith, Chondodrit, Kapholith, εἰς τὸ σήπιον καὶ τὸν στατίτην λίθον. Εἰς με-

ρικὰ χαλικοῦχα ὀρυκτὰ ἐμπεριέχεται καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ, καὶ διὰ τοῦτο ἀνθρακίζωσιν, ἐὰν λειοτριβηθέντα ἐπιχυθῶσι μὲ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ· τοῦτο προέρχεται, ἐπεὶδὴ ἐμπεριέχουσιν ἀνθρακικὴν τίτανον, ἢ ἄλλας ἀνθρακικὰς ἐνώσεις.

Φθόριοι. Εἰς ἀρκετὴν ποσότητα εὑρίσκεται εἰς τὸ Topas, Chondodrit, καὶ εἰς τινὰ μέρη τοῦ Glimer, ἐξ ὧς εἰς ἐκεῖνα τὰ ὅποια ἐμπεριέχουν λίθιον, ἀπαντᾷται δὲ καὶ εἰς τὰ ἐφεξῆς ὀρυκτὰ, Amphibol, Karpolith, Apophyllit, Chabasit, Scapolith. Τὸ φθόριον ἀνακαλύπτεται ἢ διὰ τοῦ σαλπιγγίου, καθὼς εἶχμεν ἐκθέσει, ἢ ἐὰν τὰ λειοτριβηθέντα ὀρυκτὰ ἐντὸς ἀγγείου ἐκ λευκοχρότου σκεπασμένου μετὰ ὑελίνου ἐλάσματος, ἐπιχυθῶσι μετὰ θειικοῦ ὀξέος· ἐὰν ὑπάρχῃ φθορικὴ ἔνθεσις καταξιδρώσκεται ἡ ὕελος, ἢ ἀποκαθίσταται ἀδιαφανής.

Χλωριοι. Ἀνεκαλύφθη εἰς τινὰς χαλικοῦχους ἐνώσεις πάντοτε ὅμως εἰς μικρὰν ποσότητα, ἰδίως εὑρέθη εἰς τὸ Sodalith, Eudialith, Pyrosmalith· πρὸς ἀνακάλυψιν αὐτοῦ προστίθεται εἰς τὸ ἀπὸ τὸ χαλικὸν ὀξύ ἀποχωρισθὲν διάλυμα νιτρικὸς ἀργυρος, δι' οὗ ἀποτελεῖται λευκὸν ἱζημα, μελανούμενον διὰ τοῦ φωτός· τὴν ἀνακάλυψιν κατὰ ξηρὰν ὁδὸν ἐκθέσαμεν εἰς τὸ περὶ τοῦ σαλπιγγίου.

Θεῖοι. Ἀπαντᾷται εἰς τινὰς χαλικοῦχους ἐνώσεις ἢ ὡς ἑνθεῖαις ἔνθεσις, ἢ ὡς θειικὸν ἄλας, καθὼς καὶ εἰς τὰ Helvin, Hauyn καὶ No-sian. Ἡ παρουσία τοῦ προδίδεται διὰ τῆς ἰδιαζούσης τοῦ ὀσμῆς, καθὼς καὶ διὰ τῆς κυανίζουσας φλογός, ἐὰν τοιαῦται ἐνώσεις θερμανθῶσι διὰ τοῦ σαλπιγγίου, προσέτι ἐὰν λειοτριβηθεῖται ἐπιχυθῶσι μὲ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, δι' οὗ ἐκλύεται ἡ ὀσμὴ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου. Πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ θεῖου, δυνάμεθα προσέτι νὰ ζέωμεν τὸ λειοτριβηθὲν ὀρυκτὸν μὲ νιτρικὸν ὀξύ, δι' οὗ μεταβάλλεται εἰς θειικὸν ὀξύ, καὶ οὕτω διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρείας ἀνακαλύπτεται ἡ παρουσία τοῦ θεῖου. Πρὸς ἀνακάλυψιν θειικῶν ἐνώσεων μὴ ἀποτυνθιζόμενων διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καθὼς λ. χ. τῆς θειικῆς βαρείας, ἢ τῆς θειικῆς σροντιακῆς, πρέπει νὰ συντακῇ μὲ ἀνθρακικὴν πότασσαν, ἢ σόδαν· οὕτως ἀποτελεῖται εὐδιάλυτόν τι θειικὸν ἄλας, τὸ ὅποιον εὐκόλως ἀνακαλύπτεται διὰ τῶν ἀντιδραστηρίων. Τὰ θειικὰ ἄλατα δύνανται νὰ γνωρισθῶσι καὶ διὰ τοῦ σαλπιγγίου, ἐὰν αὐτὰ ἀναμειγμένα μὲ σόδαν καὶ ἀνθρακὰ ἰσχυρῶς πυρωθῶσιν· ἐὰν τὸ ἀποτελούμενον μίγμα τεθῇ ἐπὶ ἀργυροῦ νομίσματος καὶ βραχῇ μὲ ὕδωρ, χρωματίζεται ὁ ἀργυρος φαιὸς ἢ μέλας.

Γενικοί κανόνες εἰς τὰς περὶ ποιότητος χημικὰς ἀναλύσεις.

Ἐν γένει εἶναι δύσκολον νὰ προσδιορίζωμεν τὸ ποσὸν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ γίνη ἡ ἐξέτασις· ὅταν ὑπάρχῃ ἀρκετὸν ποσὸν τῆς ἐξεταζομένης ὕλης, ἡ ἀνάλυσις εὐκολύνεται ἀρκετὰ, ἐὰν πρὸς προσδιορισμὸν τῶν διαφόρων συστατικῶν μεταχειρισθῶμεν διαφόρους ποσότητας τῆς ἐξετασθησομένης ὕλης, πρέπει ὁμῶς νὰ φυλάττεται μέρος αὐτῆς.

Μέρος τῆς ὕλης ἐξοδεύεται μόνον διὰ νὰ πληροφορηθῶμεν, ἂν εἰς τὸ μίγμα ὑπάρχωσι ἀνόργανα ἢ ὀργανικὰ σώματα. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον τίθεται μικρὸν τι ποσὸν εἰς ὑέλινον σωλῆνα, ὀλίγας γραμμάς διάμετρον ἔχοντα, ἀνοικτὸν εἰς τὸ ἐν ἄκρον· ὁ σωλὴν θερμαίνεται διὰ τῆς φλογὸς τοῦ οἶνοπνεύματος. Διὰ τῆς θερμάνσεως μελανίζονται σχεδὸν ἅπαντα τὰ ὀργανικὰ σώματα, ἐὰν ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ δὲν ἔχῃ ἐλευθέραν εἴσοδον· πρὸς τούτοις σχηματίζονται διὰ τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τὰ συνθετὰ προϊόντα τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν, δηλαδὴ ἐμπυρευματικὸν ἔλαιον καὶ ἐμπυρευματικὸν ὕδωρ.

Διὰ τῆς δοκιμῆς ταύτης πληροφορούμεθα, ἂν ἐμπεριέχωνται εἰς τὴν ἐξεταζομένην ὕλην ὕδωρ ἢ ἕτερα πτητικὰ σώματα· τὸ ἐμπεριεχόμενον ὕδωρ συνάζεται διὰ τῆς τοῦ σωλῆνος θερμάνσεως εἰς τὰ ψυχρότερα μέρη, καὶ ἂν κρεμάσωμεν εἰς τὸν σωλῆνα χάρτην τοῦ καγκαμίνου εἰς τρόπον ὥστε νὰ βραχῇ ὑπὸ τοῦ ἐξατμισθέντος ὕδατος, βλέπομεν, ἂν τὸ ὕδωρ ἔχῃ ὀξέα ἢ ἀλκαλικά χαρακτηριστικά, καὶ εἰς τὴν τελευταίαν περίστασιν ὑποπτεύεται ἡ παρουσία τῆς ἀμμωνίας.

Πρὶν προβῶμεν εἰς τὴν κυρίως ἐξέτασιν δι' ὑγρᾶς ὁδοῦ, πρέπει νὰ πληροφορηθῶμεν, ἂν ἡ ἐξεταζομένη ὕλη διαλύεται ἐντελῶς ἢ ἐν μέρει εἰς τὸ ὕδωρ. Περὶ τῆς διαλυσιμότητος τῶν σωμάτων πληροφορούμεθα, ἐὰν μέρος τῆς ὕλης, λ. χ. 10 κόκκοι, ἀναταράσσωνται εἰς κατὰλληλον ἀγγεῖον μὲ ὕδωρ καὶ θερμαίνόμενοι διὰ τοῦ λύχνου τοῦ οἶνοπνεύματος ὀλιγοστεύουσιν ἢ διαλύονται. Ἐὰν ἡ ὕλη φαίνεται ἀδιάλυτος, διυλίζεται μέρος τοῦ ὕδατος καὶ σταγόνες τινὲς ἐξατμίζονται προσεκτικῶς ἐπὶ ἐλάσματος ἐκ λευκοχρύσου. Ἐὰν παρατηρηθῇ ἐπ' αὐτοῦ ὑπόλειμμα, θεωρεῖται ἡ ὕλη ἐν μέρει διαλύσιμος, ἐὰν δὲ τὸ ἔλασμα μὲν καθαρὸν, θεωρεῖται ἐντελῶς ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ.

Οἱ ἀρχαριοί, οἵτινες θέλουσι νὰ γυμνασθῶσιν εἰς τὰς περὶ τῆς ποιότητος ἀναλύσεις πρέπει νὰ ἐκλέξωσι διὰ τὰ δοκίμια ἐνώσεις ἀπλουστεράς συνθέσεως, ὡς ἐξ ἐνὸς ὀξέος καὶ μιᾶς μόνης βάσεως, τινὸς μεταλλοξει-

δίου. Εἰς τοιαύτας ἀναλύσεις διαλύεται 1 γράμμιον εἰς τὸ ἀρχαῖον ποσὸν ὕδατος, καὶ τὸ διάλυμα τοῦτο ἐξετάζεται ἀκολούθως διὰ τῶν διαφόρων ἀντιδραστηρίων κατὰ τὴν εἰς τὰς ἀκολουθοῦς ὁδηγίαις περιεχομένην μέθοδον.

Ὅδηγίαι πρὸς ἐξέτασιν ἐνώσεων εὐδιαλύτων εἰς τὸ ὕδωρ καὶ συνισταμένων ἐξ ἐνὸς ὀξέος καὶ μιᾶς βάσεως, τινὸς μεταλλοξειδίου ἢ μεταλλικοῦ σώματος, τῶν ὁποίων δὲ τὰ συστατικὰ εὐρίσκονται εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐξῆς βάσεων.

Βάσεις.

1. Κάλιον. 2. Νάτρον. 3. Ἀμμωνία. 4. Βαρεῖα. 5. Στροντιανή. 6. Τίτανος, 7. Μαγνησία. 8. Ἀργίλλος. 9. Ὑποξειδίων τοῦ μαγνηησίου. 10. Ὄξειδιον τοῦ ψευδαργύρου. 11. Ὄξειδιον τοῦ κοβάλτιου. 12. Ὄξειδιον τοῦ νικελίου. 13. Ὑποξειδίων τοῦ σιδήρου. 14. Ὄξειδιον τοῦ σιδήρου. 15. Ὄξειδιον τοῦ καδμίου. 16. Ὄξειδιον τοῦ μολύβδου. 17. Ὄξειδιον τοῦ βισμούθιου. 18. Ὄξειδιον τοῦ χαλκοῦ. 19. Ὄξειδιον τοῦ ἀργύρου. 20. Ὑποξειδίων τοῦ ὑδραργύρου. 21. Ὄξειδιον τοῦ ὑδραργύρου. 22. Ὄξειδιον τοῦ χρυσοῦ. 23. Ὑποξειδίων τοῦ κασσιτέρου. 24. Ὄξειδιον τοῦ κασσιτέρου. 25. Ὄξειδιον τοῦ στίμμεως.

Ὅξέα καὶ μὴ μεταλλικὰ σώματα.

1. Θεϊκόν	}	Ὄξύ
2. Νιτρικόν		
3. Φωσφορικόν		
4. Ἀρσενικόν		
5. Βορικόν		
6. Ἀνθρακικόν		
7. Χλώριον.	}	Ἐνωθέντα εἰς τὴν ἐξεταζομένην
8. Φθόριον.		ὑλὴν μετὰ τινος μετάλλου τῶν
9. Θεῖον.		εἰρημένων βάσεων.

Ἀνάλυσις πρὸς εὐρεσιν τῆς βάσεως ἢ τοῦ μετάλλου.

α. Εἰς ποσὸν τι τοῦ διαλύματος τῆς ὑλῆς εἰς ὕδωρ προστίθεται ὀξύ τι, λ. χ. ὀλίγαι σταγόνες ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, ἢ ἐὰν εὐρεθῶσιν εἰς τὸ διάλυμα ὀξειδιον τοῦ ἀργύρου, ὑποξειδίων τοῦ ὑδραργύρου, ἢ καὶ μέγα ποσὸν ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, τὰ ὅποια ἀνακαλύπτονται, ἐὰν, προστιθεμένου

υδροχλωρικοῦ ὀξέος γεννᾶται λευκὸν Ἱζημα, προστίθεται ἀντὶ τοῦ υδροχλωρικοῦ ὀξέος νιτρικόν. Εἰς τὸ οὕτως ὀξυνισθὲν διάλυμα χύνεται υδροθειωμένου ὕδατος τόσον, ὥστε νὰ ἐκπέμπηται εἰσέτι ἡ ὀσμὴ κατὰ τοῦ υδροθειωμένου αέριου. Ἐὰν δὲν ἀποτελεσθῇ Ἱζημα, ἡ ὕλη ἐμπεριέχει μίαν ἀπὸ τὰς βάσεις τὰς ἀπὸ 1 μέχρι 13 καίμενας· σχηματιζομένου δὲ τινος Ἱζήματος, ἐμπεριέχει μίαν ἐκ τῶν ἀπὸ 14 μέχρι 15. Ἐὰν τὸ Ἱζημα ᾖναι μέλαν, ἡ βάσις θεωρεῖται ὡς μία τῶν ἐκ 16 ἕως 22, εἶναι δηλαδὴ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, τοῦ βισμούθιου, τοῦ χαλκοῦ, τοῦ ἀργύρου, ὑποξειδίου τοῦ υδραργύρου, ὀξειδίου τοῦ υδραργύρου ἢ ὀξειδίου τοῦ χρυσοῦ. Πρὸς διάκρισιν δὲ αὐτῶν μεταχειρίζομεθα τὰ ἐξῆς μέτα.

Εἰς ποσὸν τι τοῦ διαλύματος χύνεται καυστικὴ ἀμμωνία, καὶ ἂν τὸ διάλυμα λαμβάνῃ βαθυκυανοῦν χρῶμα, χωρὶς νὰ ἀποτελεσθῇ καταβύθισμα, ἡ βάσις θεωρεῖται ὡς ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ.

Ἐὰν τὸ διάλυμα διὰ προσθήκης μεγάλου ποσοῦ ὕδατος ἀποκατασταθῇ γαλακτώδες, τότε ἡ βάσις εἶναι ὀξειδίου τοῦ βισμούθιου.

Ἐὰν διὰ τινων σταγόνων υδροχλωρικοῦ ὀξέος προαχθῇ εἰς τὸ διάλυμα λευκὸν Ἱζημα, μὴ ἀφχνιζόμενον διὰ πολλοῦ ὕδατος, ἡ βάσις ὑποτίθεται ὡς ὀξειδίου ἢ ὑποξειδίου τοῦ υδραργύρου. Αἱ βάσεις δὲ αὗται διακρίνονται πρὸς ἀλλήλας διὰ τῶν ἐξῆς δοκιμῶν.

Εἰς μέρος τῆς διαλύσεως στάζονται τινὲς σταγόνες καυστικῆς ἀμμωνίας. Ἐὰν σχηματισθῇ βαθυμέλαν ἢ τεφρόχρουν καταβύθισμα, μὴ ἀναδιαλύμενον διὰ πλείονος ποσοῦ προστιθεμένης ἀμμωνίας, ὑποτίθεται ἡ βάσις ὡς ὑποξειδίου τοῦ υδραργύρου. Ἐξ ἐνκντίας δεικνύεται ἡ παρουσία τοῦ ὀξειδίου τοῦ υδραργύρου, ἔν διὰ τῆς ἀμμωνίας προαχθῇ φαῖον Ἱζημα εὐδιάλυτον εἰς ὑπερτεροῦν ποσὸν ἀμμωνίας.

Εἰς ποσὸν τι τοῦ διαλύματος προστίθεται καυστικὸν κάλιον διαλυμένον. Ἐὰν δι' ὑπερτερούσης ποιότητος αὐτοῦ σχηματισθῇ κίτρινον Ἱζημα, ἡ βάσις εἶναι ὀξειδίου τοῦ υδραργύρου.

Εἰς μερίδιον τοῦ διαλύματος σταλάζεται διάλυμα θεικοῦ σιδήρου ὑποξειδωμένου· ἐὰν προαχθῇ φαῖον Ἱζημα, τὸ ὅποιον καταβυθιζόμενον γνωρίζεται ὡς μεταλλικὸς χρυσὸς, τότε ἡ βάσις εἶναι ὀξειδίου τοῦ χρυσοῦ.

Εἰς ἕτερον μέρος τοῦ ρευστοῦ σταλάζεται θεικὸν ὀξύ ἢ τὸ διάλυμα τινὸς ἄλλου διὰ θεικοῦ ὀξέος. Ἐὰν δι' αὐτοῦ γεννηθῇ λευκὸν καταβύθισμα, ἀποδεικνύεται ἡ παρουσία τοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου.

Εάν τὸ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος αποτελούμενον ἴζημα ᾖναι γα-
λακτώδες, τότε ἡ βάσις εἶναι ὀξειδίου τοῦ φευδαργύρου.

Εάν δὲ ᾖναι τὸ ἴζημα κίτρινον, ἡ βάσις εἶναι ἡ ὀξειδίου τοῦ κασ-
σιτέρου ἢ τοῦ καδμίου. Διὰ τὴν διακριθῶσιν αἱ βάσεις αὗται, γίνονται
αἱ ἀκόλουθοι δοκιμασίαι.

Εἰς μέρος τοῦ διαλύματος χύνεται ὑδροθειωμένη ἀμμωνία (σημειωτέον
δὲ ὅτι τὸ διάλυμα ὀξινὸν ὄν, πρέπει νὰ κορεσθῇ πρότερον δι' ἀμμωνίας).
Εάν προαχθῇ δι' αὐτῆς κίτρινον ἴζημα, ἀδιάλυτον εἰς ὑπερτεροῦν ποσὸν
ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, ἡ βάσις εἶναι ὀξειδίου τοῦ καδμίου· ἐάν δὲ τὸ
κατὰ τὸν ἐκτεθέντα τρόπον σχηματισθὲν ἴζημα ἀναδιαλυθῇ, προστιθεμένου
ὑπερτεροῦντος ποσοῦ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, ἡ βάσις εἶναι ὀξειδίου
τοῦ κασσιτέρου.

Εάν τὸ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος προαχθὲν ἴζημα ἔχῃ βαθύφαιον
χρῶμα, εἶναι ἡ βάσις ὑποξειδίου τοῦ κασσιτέρου· ἐάν δὲ ἔχῃ χρυσοῖον
χρῶμα, ἡ βάσις εἶναι ὀξειδίου τοῦ στίμμεως.

6'. Εάν εἰς τὸ ὀξυνισθὲν διάλυμα τῆς ἐξεταζομένης ὕλης δὲν σχηματισθῇ
καθόλου ἴζημα, τότε, καθὼς εἶπαμεν, δὲν ὑπάρχει βάσις μεταλλικὴ
25. Εἰς ταύτην τὴν περίστασιν προστίθεται ὑδροθειωμένη ἀμμωνία εἰς τὸ
διάλυμα, τὸ ὅποιον πρέπει νὰ κορεσθῇ πρότερον διὰ καυστικῆς ἀμμο-
νίας. Εάν ἀποχωρισθῇ ἴζημά τι, ὑποπτεύεται βάσις τις ἀπὸ τὰς ἐκ τῶν 8
μέχρι 13 κεκρίνας, δηλαδή ἀργιλίου, ὑποξειδίου τοῦ μαγγανησίου,
ὀξειδίου τοῦ φευδαργύρου, τοῦ κοβαλτίου, τοῦ νικελίου ἢ ὑποξειδίου
τοῦ σιδήρου.

Εάν τὸ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας αποτελούμενον ἴζημα ᾖναι μέ-
λαν, ἡ βάσις κεῖται μετὰξὺ τῶν ἀπὸ 11 ἕως 13 ἐμπεριεχομένων· πρὸς
διάκρισιν τῶν τριῶν τούτων βάσεων, τοῦ ὀξειδίου τοῦ κοβαλτίου, τοῦ
ὀξειδίου τοῦ νικελίου, καὶ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, πράττομεν
ὡς ἑξῆς.

Εἰς ποσὸν τι τοῦ διαλύματος προστίθεται διάλυμα τοῦ ἀνθρακικοῦ
καλίου ἢ νάτρου. Εάν προαχθῇ ἴζημα κατ' ἀρχὰς λευκὸν, μετὰ ταῦτα δὲ
πρασινίζον καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ἐρυθρόφαιον, ἡ βάσις εἶναι ὑποξει-
δίου τοῦ σιδήρου.

Εάν τὸ ἴζημα ᾖναι βαθύ ἐρυθρόν, ἡ βάσις θεωρεῖται ὡς ὀξειδίου τοῦ
κοβαλτίου, ἐάν δὲ ἀνοικτοπράσινον, ὡς ὀξειδίου τοῦ νικελίου.

Εάν διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ διαλύματος
κρυσθαφὲς ἴζημα, ἡ βάσις εἶναι ὑποξειδίου τοῦ μαγγανησίου, ἐάν δὲ

λευκόν, ἡ βάσις εἶναι ἡ ὀξεΐδιον τοῦ ψευδαργύρου ἢ ἀργυλλος. Αἱ βάσεις αὗται διακρίνονται ὡς ἐφεξῆς.

Βίε πρὸς τὴν τοῦ διαλύματος προστίθεται κυστική ἀμμωνία· ἐάν τὸ δι' αὐτῆς προαγόμενον λευκὸν ἴζηται ἀναδιαλυθῇ διὰ πλείονος ἀμμωνίας, τότε ἡ βάσις θεωρεῖται ὡς ὀξεΐδιον τοῦ ψευδαργύρου, ἐάν δὲ ἦναι ἀδιάλυτον εἰς ὑπερτεροῦσαν ἀμμωνίαν, φανεροῦται ἡ ἀργυλλος.

γ'. Ἐάν δὲν ἀποχωρισθῶσιν ἴζηματα μήτε ἐκ τοῦ ὀξυνισθέντος διαλύματος διὰ προσθήκης ὑδροθειωμένου ὕδατος, μήτε ἐκ τοῦ οὐδετέρου διαλύματος διὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, τότε ἡ βάσις δὲν ἀνήκει εἰς τὰς ἀπὸ 8 ἕως 25, ἀλλὰ εἰς τὰς ἀπὸ 1 ἕως 7, εἶναι λοιπὸν κάλιον, νάτρον, ἀμμωνία, βαρεΐα, στρορτιανή, τίταρος, ἢ μαγνησία. Ἐάν, προστιθεμένης διαλύσεως τοῦ ἀνθρακικοῦ καλίου ἢ νάτρου εἰς τὸ οὐδέτερον διάλυμα τῆς ἐξεταζομένης ὕλης, σχηματισθῇ λευκὸν καταβύθισμα, ἡ βάσις εἶναι ἐκ τῶν ἀπὸ 4 ἕως 7 καὶ δὲν ἀνήκει εἰς τὰς ἀπὸ 1 ἕως 3.

Διὰ τὴν διακρίνωμεν τὰς τέσσαρας ταύτας βάσεις, δηλαδή τὴν βαρεΐαν, στρορτιανήν, τίταρον καὶ μαγνησίαν, προσθέτομεν εἰς τὴν οὐδέτεραν διάλυσιν κυστικὴν ἀμμωνίαν· ἐάν δι' αὐτῆς αποτελεσθῇ λευκὴν κροκιδῶδες ἴζημα, τότε ἡ βάσις εἶναι μαγνησία. Σημειωτέον δὲ ὅτι τὸ ἴζημα τότε μόνον σχηματίζεται, ὅταν τὸ διάλυμα ἦναι οὐδέτερον.

Διὰ τὴν διακρίνωμεν δὲ τὰς ἄλλας τρεῖς βάσεις, τὴν βαρεΐαν, στρορτιανήν καὶ τίταρον, αἵτινες δὲν καταβυθίζονται ἐκ τοῦ οὐδετέρου διαλύματος δι' ἀμμωνίας, ἐνστάζεται εἰς τὸ διάλυμα χαλικοφθορικὸν ὀξύ· καὶ ἂν μὲν προαχθῇ μετὰ τινα καιρὸν ἴζημα, ἡ βάσις εἶναι βαρεΐα, ἐάν δὲ ὅχι, ἡ βάσις εἶναι τίταρος ἢ στρορτιανή.

Διακρίνονται αἱ δύο αὗται βάσεις, προστιθεμένων εἰς τὸ μὲ πολὺ ὕδωρ μειγμένον διάλυμα τινῶν σταγόνων θεϊκοῦ ὀξέος ἢ καλλήτερον τινὸς ἄλατος διὰ θεϊκοῦ ὀξέος. Ἐάν προαχθῇ ἀμέσως καταβύθισμα, ἡ βάσις εἶναι στρορτιανή· ἐάν δὲ ὅχι ἀμέσως, ἀλλὰ μετὰ τινα καιρὸν καὶ τὸ σχηματιζόμενον ἴζημα ἦναι κρυσταλλῶδες, τότε ἡ βάσις εἶναι τίταρος.

δ'. Ἐάν δὲν ἀποχωρισθῶσιν ἴζηματα μήτε ἐκ τοῦ ὀξυνισθέντος διαλύματος διὰ προσθήκης ὑδροθειωμένου ὕδατος, μήτε ἐκ τοῦ οὐδετέρου διὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, καθὼς καὶ δι' ἀνθρακικοῦ καλίου, ἢ νάτρου, τότε ἡ βάσις δὲν ἐμπεριέχεται εἰς τὰς ἀπὸ 4 ἕως 25, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν 1 ἕως 3. εἶναι δηλαδή κάλιον, νάτρον ἢ ἀμμωνία.

Πρὸς ἐξίχνευσιν τῶν τριῶν τούτων βάσεων, προσθέτομεν εἰς τὸ ὅσον

ἐνεστι ἄκρατον διάλυμα, καυστικὸν κάλιον διαλελυμένον εἰς ὀλίγον ὕδωρ. Ἐὰν δι' αὐτοῦ ἐκλυθῇ ὀσμὴ ὡς τῆς ἀμμωνίας, καὶ ἂν δι' ὑελίνου σωληνός, ἠλειμμένου μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καὶ τεθέντος ὑπὲρ τὴν ἐπιφανείαν τοῦ ἐξεταζομένου ῥευστοῦ, σχηματισθῇ λευκὸς καπνός, τότε ἡ βάσις εἶναι ἀμμωνία. Ἐὰν δὲ τοῦτο δὲν συμβῇ, προστίθεται εἰς ποσὸν τι τοῦ ὅσον ἐνεστι ἄκρατον διαλύματος διττοχλώριος λευκόχρυσος διαλελυμένος εἰς οἰνόπνευμα, ὅστις σχηματίζει κίτρινον ἴζημα, ἔαν αὐτὸ ἐμπεριέχῃ κάλιον. Ἐὰν δὲν προαχθῇ ἴζημα, ἡ βάσις εἶναι νάτρον.

Ἀνάλυσις πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ ὀξέος ἢ τοῦ μὴ μεταλλικοῦ σώματος.

α'. Εἰς ποσὸν τι τοῦ διαλύματος προστίθεται ὑδροχλωρικὸν ὀξύ. ἔαν δι' αὐτοῦ γεννηθῇ ἀναβρασμός, ἐμπεριέχονται εἰς τὴν ἐξεταζομένην ἔνωσην ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἢ θεῖον ἠνωμένον μετὰ τινος μετάλλου τῶν εἰρημένων 25 βάσεων.

Ἐὰν τὸ ὑπ' ἀναβρασμοῦ ἐκλυόμενον αέριον ἐκπέμπῃ τὴν ὀσμὴν τοῦ ὑδροθειωμένου αερίου, τότε ὑποτίθεται εἰς τὸ διάλυμα ἔνθειόν τι μέταλλον. ἔαν δὲ τὸ ἐκλυόμενον αέριον ἦναι ἄοσμον, θεωρεῖται ὡς ἀνθρακικὸν ὀξύ.

β'. Ἐὰν διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δὲν προξενηθῇ ἀναβρασμός, ἐνστάζεται εἰς τὸ οὐδέτερον καὶ ὄχι πολλὰ κεκραμένον διάλυμα ὑδροχλωρικὴ βαρεῖα διαλελυμένη. Προαχθέντος δι' αὐτῆς λευκοῦ ἴζήματος, τὸ ὀξύ εἶναι θεϊκόν, φωσφορικόν, ἀρσενικόν ἢ βορικόν, ἢ καὶ φθόριον τὸ ὁποῖον ἐνίοτε εὐρίσκεται ἠνωμένον μετὰ τινος μετάλλου τῶν εἰρημένων βάσεων. Πρὸς διάκρισιν αὐτῶν πράττομεν ὡς ἑξῆς.

Εἰς τὸ διὰ ὑδροχλωρικῆς βαρείας προαχθὲν λευκὸν ἴζημα προστίθενται τινὲς σταγόνες ὑδροχλωρικοῦ ἢ ἄλλου τινὸς ἐλευθέρου ὀξέος. Ἐὰν τὸ ἴζημα ἦναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ προστιθέμενον ὀξύ, τότε τὸ ὀξύ τῆς ἐξεταζομένης ἐνώσεως εἶναι θεϊκόν, ἔαν δὲ ἦναι εὐδιάλυτον εἰς ἐλεύθερόν τι ὀξύ, τότε φανεροῦται ἡ παρουσία τοῦ φθορίου, τοῦ φωσφορικοῦ, ἀρσενικοῦ ἢ βορικοῦ ὀξέος. Ταῦτα δὲ διακρίνονται κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον.

Εἰς ἐκ λευκοχρύσου ἀγγεῖον ἐπιχύνεται ποσὸν τι τῆς ξηρᾶς ἐνώσεως μὲ θεϊκόν ὀξύ ἄκρατον, καὶ ἀφοῦ ἐπιτεθῇ ἐπὶ τοῦ ἀγγείου ὑέλινον ἔλασμα μετὰ κηροῦ ἠλειμμένον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐνεχαράχθησαν γράμματα ἢ ἄλλα τινὰ σχήματα, θερμαίνεται τὸ ἀγγεῖον διὰ πύρου πυρός. Ἐὰν μετὰ τὴν ἀπόψυξιν τὰ γράμματα φανῶσι βεβρωμένα εἰς τὸ ὑέλινον ἔλασμα, ἐμπεριέχεται εἰς τὴν ἔνωσην φθόριον.

Ἐάν δὲ τοῦτο δὲν γίνη, ἐπιχύνεται μέρος τῆς λειοτετριμμένης ἐνώσεως εἰς λευκοχρυσοῦν ἢ πορφυροῦν ἀγγεῖον μετὰ τινων σταλαγμῶν θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου, καὶ μετὰ ταῦτα προστίθεται καὶ ποσὸν τι οἶνοπνεύματος. Ἐάν τὸ οἶνοπνευμα ἀναρλεγόμενον κατὰ μετὰ πρασίνης φλογός, τότε τὸ ἐμπεριεχόμενον ὀξύ εἶναι βορικόν.

Ἐάν δὲν ὑπάρχη μήτε βορικὸν ὀξύ, μήτε φθόριον, προστίθεται εἰς μέρος τοῦ διαλύματος ὀλίγον ὑδροχλωρικόν, ὀξύ, καὶ ἀκολουθῶς ὑδροθειωμένον ὕδωρ, καὶ τέλος ἀνάζεται τὸ ὅλον. Ἀποχωριζομένου κιντρίνου ἰζήματος, τὸ ὀξύ εἶναι ἀρσενικόν· τούτου δὲ μὴ γινομένου καὶ μὴ ὑπάρχοντος διόλου βορικοῦ ὀξέος ἢ φθορίου, τὸ ὀξύ εἶναι φωσφορικόν.

γ'. Ἀφοῦ διὰ τῶν ἐκτεθεισῶν δοκιμῶν ἐπληροφορήθημεν περὶ τῆς ἀπουσίας τοῦ ἀνθρακικοῦ, θεϊκοῦ, βορικοῦ, ἀρσενικοῦ καὶ φωσφορικοῦ ὀξέος, ὡσαύτως περὶ τῆς τοῦ θείου καὶ φθορίου, ἀναμειγνύομεν μέρος τοῦ διαλύματος μὲ νιτρικὸν ἀργυρον διαλυμένον. Ἐάν δι' αὐτοῦ προαχθῇ λευκὸν ἰζημα ἀδιάλυτον εἰς κεκρυμμένον νιτρικὸν ὀξύ, ἐνυπάρχει χλωρίον ἡνωμένον μετὰ τινος τῶν ἄνω σημειωθέντων 25 μετάλλων.

δ'. Ἐάν δὲ εὑρεθῇ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνθρακικόν, θεϊκόν, βορικόν, ἀρσενικόν καὶ φωσφορικόν ὀξύ, μήτε θεῖον, φθόριον καὶ χλωρίον, ἐπιτίθεται ποσὸν τι τῆς ξηρᾶς ἐνώσεως ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων, καὶ ἂν συμβῇ μικρὰ πυροσκόρησις, τὸ ὀξύ εἶναι νιτρικόν.

Ἀφοῦ οὕτως ἀνακαλύψωμεν τὴν βᾶσιν καὶ τὸ ὀξύ τῆς ἐνώσεως, ἀπαιτεῖται διὰ διαφόρων συγκριτικῶν ἐξετάσεων μετ' ἄλλων δοκιμασθηρίων νὰ βεβαιωθῶμεν ἔτι περισσότερον. Εἰς τοὺς ἀρχαίους συμβαίνουνσι πλῆθος δυσκολιῶν, ἐάν αἱ πρὸς ἐξέτασιν ὕλαι δὲν ἦναι καθαραί, ἀλλὰ μεμιγμέναι μὲ μικρὰς ποσότητας ἄλλων ὑλῶν· διότι τότε ἀλλοιοῦται πολυλάκις τὸ χρῶμα τῶν ἰζημάτων ἢ καὶ τὰ ἰζήματα δὲν ἀποχωρίζονται διόλου.

Ὅδηγίαι πρὸς ἐξέτασιν ἐνώσεων ἀδιαλύτων μὲν ἢ τοῦλάχιστον δυσδιαλύτων εἰς τὸ ὕδωρ, διαλυσίμων δὲ εἰς τὰ ὀξέα καὶ συνισταμένων ἐκ μιᾶς βάσεως καὶ τινος ὀξέος, ἢ ἐξ ἐνὸς μετὰλλου ἡνωμένου μετὰ τινος μὴ μεταλλικοῦ σώματος.

Εἰς τὰς ἐνώσεις ταύτας ἀνήκουσι σχεδὸν ἅπαντα τὰ οὐδέτερα ἅλατα, τὰ ὅποια σχηματίζονται διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ φωσφορικοῦ, ἀρσενικοῦ, ἀνθρακικοῦ καὶ βορικοῦ ὀξέος μετὰ τῶν γαιῶν καὶ κυρίως μεταλλοξει-

δίων, μετὰ τῶν βάσεων δηλ. τῶν ἀναφερομένων ἀπὸ τὸν ἀριθ. 4 μέχρι 25. Ὡσαύτως ἀνήκουσιν ἐνταῦθα αἱ ἐνώσεις τοῦ θείου μετὰ τῶν μετάλλων τῶν βάσεων ἀπὸ 9 ἕως 25, καθὼς καὶ τινες ἐνώσεις τοῦ φθορίου μετὰ τῶν μετάλλων.

Ἀφοῦ ἐπληροφορήθημεν, ὅτι ἡ ἐξεταζομένη ὕλη εἶναι ἀδιάλυτος ἢ δυσδιάλυτος τόσον εἰς τὸ ψυχρὸν ὅσον εἰς τὸ ζέον ὕδωρ, μεταγγίζομεν τὸ ὕδωρ καὶ προσπαθοῦμεν νὰ τὴν διαλύσωμεν διὰ τινος ὀξέος, καὶ πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν μεταχειρίζομεθα συνήθως τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ. Τὰ πλείοτερα εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτα εἶναι διαλύσιμα εἰς τοῦτο τὸ ὀξύ, καὶ μάλιστα ἐν θερμυνθῶσι μετ' αὐτοῦ. Ἐπίσης διαλύονται δι' αὐτοῦ ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ὑδροθειωμένου ἀερίου τινὰ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτα ἢ δυσδιάλυτα ἔνθεια μέταλλα, ὡς τὸ ἔνθειον τιτάνιον, ὁ ἔνθιος σίδηρος, τὸ ἔνθειον μαγγανήσιον εἰς λειοτετριμμένην κατ'άστασιν διαλύονται καὶ ὁ ἔνθιος ψευδάργυρος, τὸ ἔνθειον νικέλιον καὶ κοβάλτιον εἰς ζέον ὑδροχλωρικὸν ὀξύ. Καὶ τινὰ ἐμφθόρια μέταλλα, ἀδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, εἶναι διαλύσιμα εἰς τοῦτο τὸ ὀξύ.

Ἐὰν τὸ ἐξεταζόμενον ἄλλας ἐμπεριέχῃ ὑποξειδίου τοῦ ὑδραργύρου, ὀξειδίου τοῦ ἀργύρου ἢ τοῦ μολύβδου μεταχειρίζομεθα ἀντὶ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ τὸ νιτρικὸν ὀξύ, τὸ ὁποῖον εἶναι χρησίμimon καὶ πρὸς ἀποσύνθεσιν τῶν πλειόνων ἐνθείων μετάλλων.

Ὀλίγαι τινες ἐνώσεις, ὡς ὁ πρωτοχλώριος καὶ ὁ ἔνθιος ὑδράργυρος, πρέπει νὰ κατεργασθῶσι μετὰ νιτροδαλικοῦ ὀξέος, δι' οὗ ὁ μὲν πρῶτος διαλύεται, ὁ δὲ δεύτερος ἀποσυντίθεται. Πρὸς τούτοις μεταχειρίζονται τὸ νιτροδαλικὸν ὀξύ καὶ πρὸς ἀποσύνθεσιν τῶν πλειότερων ἐνθείων μετάλλων.

Ἀνάλυσις πρὸς εὑρεσιν τῆς βάσεως ἢ τοῦ μετάλλου.

Τὸ δι' ὕδατος κεκραμένον ὀξινὸν διάλυμα τοῦ ἁλατος ἐξηχνεύεται κατὰ πρῶτον μὲ ὑδροθειωμένον ὕδωρ. Προκχθέντος δι' αὐτοῦ καταβυθίσματος, ἐμπεριέχεται βάσις ἐκ τῶν ἀπὸ 14 ἕως 25· εἶναι δηλαδή ἡ ὀξείδιον τοῦ σιδήρου, τοῦ καδμίου, τοῦ μολύβδου, τοῦ βισμούθιου, τοῦ χαλκοῦ, καὶ τοῦ ἀργύρου, ἢ ὑποξειδίου τοῦ ὑδραργύρου, ὀξείδιον τοῦ ὑδραργύρου, ὀξείδιον τοῦ χρυσοῦ, ὑποξειδίου τοῦ κασσιτέρου, ὀξείδιον τοῦ κασσιτέρου ἢ ὀξείδιον τοῦ στίμματος. Πρὸς διάκρισιν δὲ αὐτῶν ἐφαρμόζομεν τὴν αὐτὴν μέθοδον, τὴν ὁποίαν ἐξεθέσαμεν εἰς τὴν σελ. 82.

Ἐὰν διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος δὲν σχηματισθῇ ἕξιμα εἰς τὸ

ὀξυνισθὲν διάλυμα τοῦ ἁλατός, ἡ βάσις δὲν ἀνήκει εἰς τὰς ἀπὸ 11 ἕως 25. Εἰς ταύτην τὴν περίστασιν πρέπει νὰ ὑπερκορεσθῇ τὸ διάλυμα δι' ἁμμωνίας καὶ μετὰ ταῦτα νὰ προστεθῇ ὑδροθειωμένη ἁμμωνία. Ἐάν δι' αὐτῆς ἀποχωρισθῇ μέλαν ἴζημα, ἢ σχηματισθῇ, καὶ ὑπερκορεσθέντος τοῦ διαλύματος δι' ἁμμωνίας, ἡ βάσις ἀνήκει εἰς τὰς ἀπὸ 11 μέχρι 13, καὶ εἶναι ἡ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, ἢ ὀξειδίου τοῦ νικελίου ἢ ὀξειδίου τοῦ κοβαλτίου. Διὰ νὰ πληροφορηθῶμεν δὲ ποῖον εἶναι τὸ ἐμπεριεχόμενον, ἐξετάζεται μικρὸν τι ποσὸν τοῦ στερεοῦ ἁλατος διὰ τοῦ φυσητηρίου. Τὰ τοῦ κοβαλτίου ἅλατα βάρουν τὸν βόρρακα ὡς καὶ τὸ φωσφορικὸν γάτρον κυανὰ.

Ἐάν τὸ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἁμμωνίας ἀποχωριζόμενον ἴζημα ᾖ καροβαφές, ἢ ἐσχηματίσθῃ καὶ διὰ τῆς μετ' ἁμμωνίας ὑπερκορέσεως ἴζημα διατηροῦν τὸ καροβαφές του χρώμα μετὰ τὴν προσθήκην ὑδροθειωμένης ἁμμωνίας, τότε ἡ βάση εἶναι ὑποξειδίου τοῦ μαγνησίου.

Ἐάν δὲ μετὰ τὴν δι' ἁμμωνίας ὑπερκόρεσιν τοῦ ὀξινῶς διαλύματος σχηματίζεται λευκὸν ἴζημα μὴ μεταβάλλον τὸ χρώμα του διὰ τῆς προσθήκης ὑδροθειωμένης ἁμμωνίας, ἡ βάση εἶναι ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου ἢ ἄργιλλος. Καὶ ἡ μαγνησία, ἡ τίταρος ἢ στρουτιανή, καὶ ἡ βαρεία δύνανται νὰ καταβυθισθῶσι δι' ἁμμωνίας, ἐάν ἐμπεριέχωνται εἰς τὸ ἀδιάλυτον ἄλας ἡνωμένοι μετὰ φωσφορικοῦ ἢ βορικοῦ ὀξέος, ἢ αἱ μεταλλικαὶ βάσεις των μετὰ φθορίου. Πρὸς διάκρισιν αὐτῶν ἀπικιτοῦνται νάσι δοκιμασίαι.

Τὴν παρουσίαν τοῦ ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου γνωρίζομεν, ἐάν μέρος τοῦ ξηροῦ ἀδιαλύτου ἁλατος, ἀναμιχθὲν μετὰ σόδας καὶ τεθὲν ἐπὶ ἀνθρακος, θερμανθῇ διὰ τῆς ἐσωτερικῆς φλογὸς τοῦ φυσητηρίου, ἢ ἐάν θερμανθῇ βραχὲν μετὰ νιτρικοῦ κοβαλτίου διαλελυμένου. Πρὸς τούτοις γνωρίζεται ἡ τοῦ ὀξειδίου τοῦ ψευδαργύρου παρουσία, ἐάν τὸ δι' ἁμμωνίας ἀποτελούμενον ἴζημα διὰ ἀσθενεστέρας ἁμμωνίας ἀναλυθῇ πρὸς ἄχρουν ρευστὸν, ἐξ οὗ διὰ ὑδροθειωμένης ἁμμωνίας ἀποτελεῖται λευκὸν ἴζημα, ἀδιάλυτον εἰς τὴν ἁμμωνίαν καὶ εἰς τὸ κλίον.

Ἡ τῆς ἀργίλλου παρουσία ἐξιχνεύεται, ἐάν ποσὸν τι τοῦ στερεοῦ ἁλατος, βραχὲν μὲ διάλυσιν τοῦ κοβαλτίου, θερμανθῇ διὰ τοῦ φυσητηρίου, ἢ ἐάν τὸ δι' ἁμμωνίας ἴζημα ἀναδιαλυθῇ διὰ καυστικοῦ καλίου διαλελυμένου. Καὶ ἐάν εἰς τοῦτο τὸ ἴζημα προστεθῇ ὑδροθειωμένη ἁμμωνία, διαλύεται δι' ὑπερτεροῦντος καλίου.

Ἐάν διὰ κεκραμένου θεϊκοῦ ὀξέος ἀποχωρισθῇ ἐκ τοῦ μὲ πολὺ ὕδωρ μεμιγμένου ὀξινῶς διαλύματος λευκὸν ἴζημα, ἐνυπάρχουσιν ἢ στρουτιανή

ἡ *βαρεῖα*. Διακρίνονται δὲ αὐταὶ ἀπ' ἀλλήλων, ἐὰν προστεθῇ εἰς τὸ δι' ὕδατος κεκραμένον ὀξινὸν ρευστὸν χαλικοφθορικὸν ὀξύ, δι' οὗ μετὰ τινα καιρὸν ἀποτελεῖται ἰζημα, ἐὰν ἡ βάσις ᾖναι *βαρεῖα*. δὲν προάγεται δὲ, ἐὰν ἡ βάσις ᾖναι *στροντιανή*.

Τὴν τῆς *τιτάνου* παρουσίαν ἀνακαλύπτουμεν, ἐὰν εἰς τὸ ἄκρατον ὀξινὸν διάλυμα τοῦ ἄλατος προστεθῇ θειικὸν ὀξύ καὶ ὀλίγον οἰνόπνευμα. Προαχθέντος λευκοῦ καταβυθίσματος, δύναται νὰ εἰκασθῇ μετὰ θετικότητος ἡ παρουσία τῆς *τιτάνου*, ἀφοῦ προλαβόντως ἐπληροφορήθημεν περὶ τῆς ἀπουσίας τόσον τῆς *βαρεῖας* ὅσον τῆς *στροντιανῆς*.

Ἡ *μαγνησία* ἀνακαλύπτεται εἰς τὰ ξηρὰ καὶ εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιάλυτα ἄλατα μὲ εὐκολώτερον τρόπον διὰ τοῦ φυσητηρίου καὶ τοῦ διαλύματος τοῦ κοβαλτίου. δυνάμεθα δὲ καὶ νὰ ὑποθέσωμεν τὴν παρουσίαν τῆς *μαγνησίας*, ἀφοῦ ἐπληροφορήθημεν περὶ τῆς ἀπουσίας τῶν ἄλλων γαιωδῶν βάσεων.

Ἐὰν δὲ εἰς τὸ ὀξινὸν διάλυμα τοῦ ἄλατος δὲν σχηματισθῇ ἰζημα μῆτε διὰ ὑδροθειωμένου ἀερίου, μῆτε διὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, προστίθεται εἰς ποσὸν τι τοῦ ὀξικοῦ δι' ὕδατος κεκραμένου διαλύματος ἀνθρακικὸν κάλιον ἢ νάτρον διαλελυμένον. Ἐὰν ἀποχωρισθῇ περυσθὺς ἡ τοῦλάχιστον μετὰ τὴν ζέσιν ἰζημα, ἀφοῦ ὑπερκορεσθῇ τὸ διάλυμα διὰ τοῦ προστιθεμένου ἀλκαλίου, τότε ἐμπεριέχεται *μαγνησία*, *τίταρος*, *στροντιανή*, ἢ *βαρεῖα*.

Διὰ νὰ διακρίνωμεν δὲ ταύτας τὰς βάσεις, προσθέτομεν εἰς τὸ διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τοῦ ἄλατος ὀλίγον ποσὸν θειικοῦ ὀξέος ἢ καλλίτερα θειικοῦ καλίου διαλελυμένου· προαχθέντος δι' αὐτῶν παρχρῆμα καταβυθίσματος, ἡ βάσις εἶναι ἡ *στροντιανή* ἢ *βαρεῖα*. Ἡ παρουσία τῆς τελευταίας φανερώνεται, ἐὰν εἰς ἕτερον μέρος τοῦ ὀξиноῦ κεκραμένου διαλύματος διὰ τοῦ χαλκοφθορικοῦ ὀξέος προαχθῇ μετὰ τινα καιρὸν λευκὸν ἰζημα.

Μὴ ὑπαρχουσῶν τῶν βάσεων τούτων, ἐξιχνεύεται ἡ *τίταρος*, ἐὰν εἰς τὸ μετ' ὕδροχλωρικῆς ἀμμωνίας μεμιγμένον καὶ δι' ἀμμωνίας κορεσθὲν διάλυμα ἀποτελεσθῇ δι' ὀξαλικῶν ἁλάτων διαλελυμένων λευκὸν ἰζημα. ἂν δὲ δὲν συμβῇ, προστίθεται εἰς τὸ αὐτὸ ρευστὸν, εἰς τὸ ὁποῖον ἀπεδείχθη διὰ τινος ὀξαλικοῦ ἄλατος ἡ ἀπουσία τῆς *τιτάνου*, φωσφορικὸν νάτρον καὶ ὀλίγη ἀμμωνία. Σχηματιζομένου λευκοῦ ἰζήματος, πληροφοροῦμεθα περὶ τῆς παρουσίας τῆς *μαγνησίας*.

Ὡς πρὸς τὴν τῶν ἀλκαλίων παρουσίαν περιττὸν εἶναι γὰρ ἐξετασθῇ τὸ

εἰς ὕδωρ ἀδιάλυτον ἄλας, ἐπειδὴ αὐτὰ παρέχουσι μετὰ τῶν ὀξέων μόνον ἐνώσεις εἰς τὸ ὕδωρ διαλυσίμους.

Αράλυσις πρὸς εὔρεσιν τῶν ὀξέων ἢ μὴ μεταλλικῶν σωμάτων.

Εἰς μέρος τοῦ ξηροῦ ἄλατος ἐπιχύνεται ὕδροχλωρικὸν ὀξύ κεκραμένον, δι' οὗ ἐκλύεται ὑπὸ ἀναθρασμὸν τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ ὡς ἄοσμον ἀέριον. Ἐὰν τὰ εἰς ὕδωρ ἀδιάλυτα ἄλατα δι' ἀνθρακικοῦ ὀξέος δὲν εὔρεθῶσιν εἰς λειοτετριμμένην κατάστασιν, ἀλλὰ εἰς σκληρὰ κομμάτια, δὲν ἐκλύεται πολλάκις τὸ ἀέριον, εἰμὴ θερμανθέντος τοῦ ὅλου· πρὸς τούτοις τὸ μεταχειριζόμενον ὀξύ δὲν πρέπει νὰ ἦναι πολλὰ ἄκρατον. Ἐὰν δὲ διὰ τοῦ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος ἐκλυθῇ ὑπὸ ἀναθρασμὸν ἀέριον ἔχον τὴν τοῦ ὕδροθειωμένου αἰρίου ὁσμὴν, ἐμπεριέχεται εἰς τὴν ἔνωσιν θεῖον ἡνωμένον μετὰ τινος μετάλλου.

Ἀκολούθως ἐξετάζεται ἡ ἀδιάλυτος ἔνωσις ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων, ἐὰν ἐμπεριέχῃ νιτρικὸν ὀξύ, τὸ ὁποῖον ὅμως δὲν δύναται νὰ ἐνυπάρχῃ εἰς τὸ ἄλας, εἰμὴ ὅταν αὐτὸ ἦναι βασικόν. Τὸ ἀρσενικὸν ὀξύ ἐξιχνεύεται ἐπὶ διαπύρου ἀνθράκος διὰ τοῦ φουστηρίου.

Ἀκολούθως ἐξετάζεται, ἐὰν τὸ ἄλας ἐπιχυθὲν μετὰ θειικοῦ ὀξέος καὶ θερμανθὲν ἐκλύῃ ἀτμούς, οἵτινες καταβιβρώσκουσι τὴν ὕελον, τούτου ἐκτελουμένου, πληροφοροῦμεθα περὶ τῆς τοῦ φθορίου ὑπάρξεως. Βορικὸν ὀξύ ἐμπεριέχεται, ἐὰν τὸ μετὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος καὶ οἰνοπνεύματος ἐπιχυθὲν ἄλας μεταδίδῃ εἰς τὴν φλόγα τοῦ ἀναφλεγομένου οἰνοπνεύματος πράσινον χρῶμα.

Μέρος τῆς ἐνώσεως διαλύεται, ἂν ἦναι δυνατόν, εἰς νιτρικὸν ὀξύ ψυχρὸν, εἰς δὲ τὸ ὀξινὸν καὶ δι' ὕδατος κεκραμένον διάλυμα προστίθεται διάλυμα τοῦ νιτρικοῦ ὀξειδωμένου ἀργύρου· προαχθέντος λευκοῦ καταβύθισματος, ἐμπεριέχει ἡ ἔνωσις χλώριον. Ἐὰν ὅμως ἡ ἐξεταζομένη ὕλη δὲν διαλύεται, εἰμὴ διὰ τοῦ νιτροδαλικοῦ ὀξέος, ὡς ὁ πρωτοχλώριος ὑδράργυρος, τότε ἡ παρουσία τοῦ χλωρίου πρέπει νὰ ἐξιχνευθῇ κατ' ἄλλον τρόπον. Ἡ ἔνωσις θερμαίνεται μετὰ διαλύματος καθαρῷ καλίου δι' οὗ σχηματίζεται ὕδροχλωρικὸν κάλιον, καὶ τὸ μέλαν ἴζημα, συγκείμενον ἐξ ὑποξειδωμένου ὑδραργύρου, ἀποχωρίζεται διὰ τῆς διύλισεως. εἰς δὲ τὸ διύλισθὲν καὶ διὰ νιτρικοῦ ὀξέος ὑπερκορεσθὲν ῥευστὸν εὐρίσκεται τὸ χλώριον διὰ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου.

Ἐτερον μέρος τῆς ἐνώσεως ἐπιχύνεται μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος καὶ ἀκο-

λούθως θερμαίνεται τὸ μίγμα. Ἐὰν διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς θερμότητος ἐκλυθῶσι κιτρινωποὶ ἀτμοὶ νιτρώδους ὀξέος καὶ ἀποχωρισθῇ θεῖον, τὸ ὁποῖον ὁμῶς ὄχι κατ' ἀρχάς, ἀλλὰ διὰ περαιτέρω κατεργάσεως μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος λαμβάνει τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ χρώμα, καὶ ἐὰν μετὰ ταῦτα εἰς τὸ δι' ὕδατος κεκαρμένον ρευστὸν σχηματίσῃ ἡ διάλυσις τῆς νιτρικῆς βαρεῖας λευκὸν ἀδιάλυτον ἴζημα, τότε ἡ ἔνωσις εἶναι ἐνθείου τι μέταλλου. Ἐὰν δὲ ἡ ἔνωσις ᾖ τοῦ εὐθείου ὑδράργυρου, πρέπει νὰ μεταχειρισθῇ ἀντὶ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος νιτροδαλικόν· εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δὲν ἐκλύεται καὶ νιτρώδες ὀξύ, ἀλλὰ χλωρίον. Ἐὰν ἡ ἔνωσις σύγκηται ἐξ ἐνθείου μολύβδου, ἐνθείου κασσίτερου ἢ ἐνθείου στίμμεως, ἀποχωρίζεται διὰ τῆς μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος κατεργάσεως ἐκτὸς τοῦ θείου καὶ θεικὸς ὀξειδωμένος μολύβδος, κασσίτερος καὶ θεικὸν ὀξειδωμένον στίμμι. Καὶ εἰς τὰς δύο τελευταίας περιπτώσεις πρέπει νὰ μεταχειρισθῶμεν πρὸς ἀπσύνθεσιν τῆς ἐνθείου ἐνώσεως νιτροδαλικὸν ὀξύ ἀντὶ τοῦ νιτρικοῦ.

Τέλος προτίθεται εἰς τὸ διὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος διακλυμένον ἄλλας διάλυμα τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρεῖας, ἢ εἰς τὸ διὰ νιτρικοῦ ὀξέος διακλυμένον νιτρικὴ βαρεῖα. Ἐὰν ἀποχωρισθῇ ἐκ τῶν δι' ὕδατος κεκαρμένων διαλυμάτων λευκὸν ἀδιάλυτον ἴζημα, ἐμπεριέχεται εἰς τὸ ἄλλας θεικὸν ὀξύ.

Ἐὰν διὰ τῶν πράξεων τούτων δὲν εὑρεθῇ κανὲν τῶν συνήθων ὀξέων δύναται νὰ ἐμπεριέχεται φωσφορικὸν ὀξύ, τοῦ ὁποῦν ἡ παρουσία δυσκόλως γνωρίζεται. Ἐὰν ἡ ἐξετάζομένη ἔνωσις ἐμπεριέχῃ τὸ ὀξειδίου τινὸς μετάλλου, δυναμένου νὰ καταβυθισθῇ ἐκ τοῦ διαλύματός του διὰ ὑδροθειωμένου ἀερίου ἢ διὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, καὶ ἀνήκοντος εἰς τὰ ὑπ' ἀριθ. 15 ἕως 25 σημειωθέντα, ἢ εἰς τὰ ὑπ' ἀριθ. 9 — 14, τότε ἀποχωρίζεται τὸ ὀξειδίου διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος, ἢ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, καὶ ἀκολούθως ἐξετάζεται τὸ ἐπιμένον ρευστὸν ἐπὶ τῆς τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος παρουσίας.

Ὁδηγίαι πρὸς εξέτασιν ἐνώσεων ἀδιάλυτων ἢ τοῦλάχιστον δυσδιάλυτων τόσον εἰς τὸ ὕδωρ ὅσον εἰς τὰ ὀξέα, καὶ συνισταμέων ἐξ ἐνὸς ὀξέος καὶ μιᾶς βάσεως, ἢ ἐξ ἐνὸς μετάλλου καὶ μὴ μεταλλικοῦ τινοῦ σώματος, τῶν ὁποίων ὁμῶς τὰ στοιχειώδη ἀνέφθρησαν εἰς τὴν σελίδα

Εἰς τὴν τάξιν τῶν εἰς τὸ ὑδροχλωρικόν, νιτρικόν καὶ νιτροδαλικόν

ὄξυ ἀδιάλυτων ἢ δυσδιαλύτων ἐνώσεων ἀνήκουσιν· ἡ *θειϊκὴ στροντιανή*, ἡ *θειϊκὴ τίτανος*, ὁ *θειϊκὸς ὀξειδωμένος μόλυθος*, ὁ *ἐγγλώριος ἄργυρος*, τινὰ ὀξινὰ φωσφορικά καὶ ἀρσενικά ὀξείδια.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ τελευταῖα, ταῦτα δύνανται νὰ ἀποτυντεθῶσι μόνον ζεόμενα διὰ *θειϊκοῦ ὀξέος* ἀκράτου· δι' αὐτῆς τῆς πράξεως γίνονται διαλύσιμα εἰς τὸ ὕδωρ, ἐν ἡ βάσις δὲν ἦναι βαρεῖα, στροντιανή, τίτανος ἢ ὀξειδίου τοῦ μόλυθου.

Ὡς πρὸς τὰς ἄλλας δὲ ἐνώσεις, ἅπασαι ἔχουσι λευκὸν χρῶμα, ἐκτὸς τοῦ ἐγγλώριου ἀργύρου, ὁ ὁποῖος εἶναι πολλάκις τεφρόχρους, καὶ εἰς τετηγμένην κατὰστασιν κιτρινωπός. Ὁ ἐγγλώριος ἄργυρος καὶ ὁ *θειϊκὸς ὀξειδωμένος μόλυθος* διακρίνονται ἀπὸ τὴν *θειϊκὴν τίτανον*, τὴν *θειϊκὴν στροντιανήν* καὶ τὴν *θειϊκὴν βαρεῖαν* διὰ τῆς ἐπιχύσεως μετὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, δι' ἧς τὰ μεταλλικὰ ἄλλα μελάνίζονται εὐθὺς. Πρὸς διάκρισιν δὲ ἐκάστης ἐνώσεως πράττομεν ὥς ἐφεξῆς.

Μικρὸν ποτὸν τῆς ἐξετάζομένης ἐνώσεως θερμαίνεται εἰς μικρὸν ὑέλινον σωλῆνα, εἰς τὴν μίαν ἄκραν κεκλεισμένον· ἐν ἡ ἐνωσις τακτῇ εὐκόλως, συνίσταται ἀπὸ *ἐγγλώριου ἄργυρου*, ἐὰν δὲ μὲν ἀμετάβλητος, εἶναι *θειϊκὸς μόλυθος*. Πρὸς πλειοτέραν βεβαιότητα ἐξετάζεται ἡ ἐνωσις καὶ διὰ τοῦ φυσητηρίου ἐπὶ τῆς τοῦ ἀργύρου ἢ μόλυθου παρουσίας.

Ἐὰν ἡ ἐνωσις δὲν μεταβληθῇ διὰ τῆς μετὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας ἐπιχύσεως, ἐμπεριέχει *τίτανον*, *βαρεῖαν* ἢ *στροντιανήν* ἠνωμέναις μετὰ *θειϊκοῦ ὀξέος*. Πρὸς διάκρισιν αὐτῶν ζέεται ἡ λευκωμένη ἐνωσις μεθ' ὕδατος, τὸ δὲ διάλυμα διυλίζεται καὶ διαιρεῖται εἰς δύο μερίδια. Εἰς τὸ ἐν μερίδιον προστίθεται διάλυμα τῆς ὑδροχλωρικῆς βαρεῖας, εἰς δὲ τὸ ἄλλο, διάλυμα ἁλατὸς τινος δι' ὀξάλικοῦ ὀξέος. Ἐὰν εἰς τὰς δύο τελευταίας περιστάσεις προαχθῇ λευκὸν ἕζημα, τῶν ὁποίων τὸ πρῶτον ἦναι ἀδιάλυτον εἰς τὰ ὀξέα, τότε ἡ ἐνωσις σύγκειται ἐκ *θειϊκῆς τιτάνου*.

Ἐὰν ἡ ἐνωσις δὲν διαλυθῇ εἰς ζεὸν ὕδωρ, ζέεται μὲ διάλυσιν ἀνθρακικοῦ καλίου ἢ νάτρου. Τὸ μετὰ ταῦτα διυλισθὲν ῥευστὸν πρέπει νὰ ὑπερκορεσθῇ διὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, καὶ ἀφοῦ συμμιχθῇ μεθ' ὕδατος, προστίθεται ὑδροχλωρικὴ βαρεῖα διαλελυμένη· ἐὰν δι' αὐτῆς σχηματισθῇ ἀδιάλυτον ἕζημα, ἡ ἐνωσις εἶναι *θειϊκὴ στροντιανή* ἢ *θειϊκὴ βαρεῖα*.

Διὰ νὰ διακρίνωμεν τὰς δύο ταύτας βάσεις, ἐπιχύνομεν τὸ μετὰ τὴν ζέσιν δι' ἀνθρακικοῦ καλίου ἢ νάτρου ἐπιμένον μὲ ὑδροχλωρικὸν ὄξυ, καὶ ἀφοῦ διυλισθῇ τὸ ῥευστὸν, ἐξατμίζεται καὶ ἐπιχύνεται μὲ οἶνονπνευμα.

Εάν τὸ ἀναφλεχθὲν οἰνόπνευμα καίη μετὰ κοκκίνης φλογός, συνίσταται ἡ ἔνωσις ἀπὸ *θειϊκῆς στροντιανῆς*, εἰ δὲ μὴ, ἀπὸ *θειϊκῆς βαρεῖαν*.

Τὸ διῦλισθὲν ὑδροχλωρικὸν ὀξύ δύναται νὰ ἐξιχνευθῇ καὶ διὰ χαλικοφθορικοῦ ὀξέος, δι' οὗ καταβυθίζεται μὲν ἡ βαρεῖα, ὅχι δὲ καὶ ἡ στροντιανή.

Ὁδηγαί πρὸς ἐξέτασιν συνθέτων ἐνώσεων εὐδιαλύτων

εἰς τὸ ὕδωρ.

Ἡ ἀνάλυσις τοιούτων ἐνώσεων πρέχει καὶ εἰς τὸν ἔμπειρον χημικὸν ἀρκετὰς δυσκολίας, καὶ διὰ τοῦτο θέλομεν περιγράψαι ὅσον ἔνεστι ἀκριβῶς τὸν τρόπον τῆς ἐξετάσεως τοιούτων ἀναλύσεων.

Πρὸς ἐξιχνευσιν τῆς βάσεως εἰς τοιαύτας ἐνώσεις πράττομεν ὡς ἐξῆς.

α. Τὸ ὅσον δυνατὸν ἄκρατον διάλυμα τοῦ ἁλτος εἰς ὕδωρ ὀξυνίζεται δι' ὀλίγου ποσοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, καὶ μόνον ὅταν ὑπάρχωσι τὰ τοῦ ἀργύρου, τοῦ ὑδραργύρου, ἢ τοῦ μολύβδου ὀξειδία μεταχειριζόμεθα ἀντ' αὐτοῦ τὸ νιτρικὸν ὀξύ· εἰς τοῦτο τὸ διάλυμα προστίθεται ἀκολούθως τόσον ὑδροθειωμένον ὕδωρ, ὥστε τὸ ρευστὸν νὰ ἐκπέμπῃ τὴν κατὰ τοῦ θεοῦ ὀσμὴν. Εάν δι' αὐτοῦ ἀποτελεσθῇ καταβύθισμα καὶ μάλιστα διὰ τῆς θερμάνσεως, τότε ἡ καταβυθισθεῖσα βάσις εὐρίσκεται μεταξὺ τῶν ἀπὸ 15 ἕως 25· δηλαδή εἰς τὴν διάλυσιν δύναται νὰ ᾔηαι ὀξειδίων τοῦ καδμίου, μολύβδου, βισμούθιου, χαλκοῦ, ἀργύρου, ὑποξειδίου τοῦ ὑδραργύρου, ὀξειδίου τοῦ ὑδραργύρου, ὀξειδίου τοῦ χρυσοῦ, ὑποξειδίου, ἢ ὀξειδίου τοῦ κασσιτέρου, καὶ ὀξειδίου τοῦ στιμμίου.

Τὸ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος προαχθὲν καταβύθισμα ἀποχωρίζονεν ἀπὸ τὸ ἐπιπολῶζον ρευστὸν ἐπιχύνεται μετ' ἀμμωνίας, καὶ προστίθεται καὶ ὑδροθειωμένη ἀμμωνία· εάν τὸ καταβύθισμα διχλυθῇ ὑπ' αὐτῆς δύναται νὰ συνίσταται ἐξ ὀξειδίου τοῦ χρυσοῦ, ὑποξειδίου τοῦ κασσιτέρου, ὀξειδίου τοῦ κασσιτέρου, καὶ ὀξειδίου τοῦ στιμμεως. Τὸ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας ἀποτελούμενον διάλυμα λεπτύνεται μὲ ὕδωρ καὶ ἀποσυντίθεται ἀκολούθως δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δι' ὕδατος κεκαρμένου, ὥστε νὰ ὑπερτερῇ τὸ ὀξύ τοῦτο· δι' αὐτῆς τῆς πράξεως καταβυθίζονται αἱ ἔνθετοι ἐνώσεις, αἵτινες εἶναι διαλελυμέναι μετὰ τοῦ εἰς αὐτάς ἀνήκοντος χρώματος, μόνον μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι εἶναι ἀνοικτότερα τὰ ἱζηήματα ἔνεκα τοῦ ἀναμεμιγμένου θεοῦ, τοῦ ἀποτελουμένου διὰ τῆς ἀπο-

συνθέσεως τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας. Ἐάν δὲ ὑπάρχωσι διαλελυμένα πλεיותרὰ ὀξειδια, τῶν ὁποίων τὰ ἔνθεια μέταλλα εἶναι διαλύσιμα εἰς τὴν ὑδροθειωμένην ἀμμωνίαν, διακρίνονται ὡς ἑξῆς.

Τὸ ὀξειδιον τοῦ χρυσοῦ γνωρίζεται διὰ τοῦ πορφυροῦ χρωματισμοῦ, ὅστις ἀποτελεῖται, ἐάν τὸ διὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον διάλυμα τῆς ἐνώσεως συμμιχθῇ μετ' ὀλίγων σταλαγμῶν διαλύματος τοῦ ἐγγλωρίου κασσιτέρου. Πρὸς τούτοις γνωρίζομεν τὸ ὀξειδιον τοῦ χρυσοῦ ἐκ τοῦ φαιοῦ ἰζήματος, τοῦ ἀποτελουμένου διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ διαλύματος μετὰ διαλύσεως θειικοῦ ὑποξειδωμένου σιδήρου. Τὴν παρουσίαν τοῦ ὑποξειδίου τοῦ κασσιτέρου γνωρίζομεν, καθότι εἰς πολλὰς περιστάσεις δὲν ἀποτελεῖται καθαρὸν ἀλλὰ μόνον γαλακτώδες διάλυμα, μάλιστα δὲ γνωρίζεται τὸ ὑποξειδιον τοῦ κασσιτέρου διὰ τοῦ πορφυροῦ καταβύθισματος, ὅπερ προάγεται εἰς τὸ μετὰ πολλοῦ ὕδατος κεκραμένον διάλυμα διὰ προσθέσεως διαλύματος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ χρυσοῦ.

Τὸ ὀξειδιον τοῦ κασσιτέρου καὶ τοῦ στίμμεως ἀνακαλύπτονται ἔτι δυσκολώτερα, ἐάν εὑρεθῶσιν ἀναμεμιγμένα μετὰ ὀξειδίων τῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων αἱ ἔνθειοι ἐνώσεις εἶναι διαλύσιμοι εἰς τὴν ὑδροθειωμένην ἀμμωνίαν, καὶ εἰς τοιαύτας περιστάσεις καταφεύγομεν εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ φουσητηρίου· τὴν δὲ τοῦ ὀξειδίου τοῦ στίμμεως παρουσίαν ἐξιχνεύομεν, ἐάν τὸ ὑδροχλωρικὸν διάλυμα συγκερασμένον μετὰ πολλοῦ ὕδατος γίνε-ται γαλακτώδες. Ἐάν δὲ τὸ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος ἀποτελούμε-νον καταβύθισμα διαλύεται ὀλίγον μόνον ἢ διόλου, τότε τὸ ἀποτελεσθὲν ἰζημα δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ ὀξειδιον τοῦ καδμίου, τοῦ μόλυβδου, βι-σμουθίου, χαλκοῦ, ἀργύρου, ὑποξειδιον, καὶ ὀξειδιον τοῦ ὑδραργύρου.

Τὸ προαχθὲν καταβύθισμα ἐξ ἐνθείου μετάλλου συνιστάμενον ἀποχωρί-ζεται ἐκ τοῦ ρευστοῦ διὰ τινος μικροῦ διῦλιστῆρος καὶ ἐκπλυνόμενον θερμαί-νεται μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος καθαροῦ· εἰς τὰς πλειοτέρας περιστάσεις δὲν ἀπαιτεῖται νὰ χωρισθῇ τὸ καταβύθισμα ἀπὸ τὸν χάρτην, ἀλλὰ μετὰ τοῦ χάρτου δύναται νὰ κατεργασθῇ εἰς κατάλληλον ἀγγεῖον διὰ νιτρικοῦ ὀξέος. Διὰ τῆς θερμάνσεως τῶν ἐνθείων μετάλλων διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἀποσυντίθενται αὐτὰ, τὸ μέταλλον ὀξειδούμενον διαλύεται, τὸ δὲ θεῖον ἀποχωρίζεται, τὸ ὅποιον διὰ πλείονος κατεργάσεως λαμβάνει τὸ κιτρι-νωπὸν τοῦ χρῶμα, μετὰ ταῦτα ἀποχωρίζεται τὸ ρευστὸν ἀπὸ τὸ ἀδιά-λυτον θεῖον.

Ἐκ τῶν ἐκτεθέντων μόνον ἐξαιρεῖται ὁ ἐνθεις ὑδράργυρος, ὅστις μένει ἀδιάλυτος διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, ἐάν αὐτὸ δὲν ᾔῃαι ἄκρα-

τον, καὶ τότε ἐπιμένει ὁ ἔνθειος ὑδράργυρος μετὰ μέλανος χρώματος. ἐξετασθεὶς δὲ ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων καὶ διὰ τοῦ φουτητηρίου ἐξιχνεύεται εὐκόλως ἢ παρυσία τοῦ ὑδραργύρου, ὥστε δύναται νὰ ἐμπεριέχεται ὡς ὀξειδίων ἢ ὑποξειδόν. Ἐὰν εὑρεθῇ ὁ ὑδράργυρος εἰς ὀξειδωμένην κατάστασιν, τίθεται εἰς στεγνὸν ὑέλινον σωλῆνα, καὶ θερμανθεὶς ἐξαχνίζεται· ἐὰν δὲ εὑρεθῇ εἰς ὑποξειδωμένην κατάστασιν, φάνονται διὰ τῆς ἐξαχνίσεως ἐκτὸς τοῦ ἐνθείου ὑδραργύρου καὶ σπινθίδια μεταλλικοῦ ὑδραργύρου.

Ἀκολούθως ἐξετάζεται τὸ ρευστόν, ἐξ οὗ ἀπεχωρίσθη τὸ καταβύθισμα, καὶ ἂν μὲν ἀποτελῇται κυκλῶς χρωματιστὸς διὰ τῆς ὑγρᾶς ἀμμωνίας, ἀνακαλύπτεται ἡ παρυσία τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ· ἐὰν δὲ διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος προαχθῇ λευκὸν ἴζημα, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ διαλύσιμον ὄρω, προσθεθείσης ἀμμωνίας, ἐμπεριέχεται ὀξειδίων τοῦ ἀργύρου.

Εἰς ἄλλο μερίδιον προστίθεται θεικὸν ὀξύ κεκαρμένον, καὶ ἐὰν δι' αὐτοῦ προαχθῇ λευκὸν ἴζημα, ἐξιχνεύεται ἡ παρυσία τοῦ ὀξειδίου τοῦ μόλυβδου. Ἅτερον μέρος τοῦ ρευστοῦ ἐξατμίζεται εἰς μικρὸν πορφυροῦν ἀγγεῖον πρὸς ἀποχώρησιν τοῦ ἐλευθέρου νιτρικοῦ ὀξέος· ἐὰν διὰ τῆς συμμίσξεως τοῦ διαλύματος μετὰ πολλοῦ ὕδατος ἀποτελεσθῇ λευκὸν ἴζημα, φαίνεται ἡ ὑπαρξίς τοῦ ὀξειδίου τοῦ βισμούθιου.

Τὸ ὀξειδίων τοῦ καδμίου ἀνακαλύπτεται, ἐὰν τὸ ἔνθειον μέταλλον ἀναμειγμένον μετὰ σόδας ἐξετασθῇ ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων διὰ τῆς φλογὸς τοῦ φουτητηρίου· ἐὰν πρὸς τοῦ μίγματος σχηματισθῇ φαῖς κύκλος (ὀξειδίων τοῦ καδμίου) ἀποδεικνύεται ἡ τοῦ καδμίου παρυσία.

Ὁδηγίαι πρὸς ἀνεύρεσιν ὑλῶν, εἰς αἷς δύναται νὰ ἐμπεριέχονται ἅπασαι αἱ γνωσταὶ μὴ ὀργανικαὶ οὐσίαι.

Εἰς τὴν ἐξέτασιν ἐκάστου ἀγνώστου σώματος ἐξετάζεται πρῶτον, ἂν ᾖ διαλύσιμον, καὶ μέρος τοῦ λεηθέντος ρευστοῦ προσδιορίζεται διὰ τὴν εὑρεσιν τῶν ὀξέων, ἕτερον διὰ τὴν τῶν βάσεων.

Ἐξέτασις τῶν εἰς τὸ ὕδωρ διαλυμένων ὑλῶν.

Ἐξιχνεύσεις τῶν βάσεων.

α. Τὸ διάλυμα ὑπερκορέννεται διὰ ὑδροχλωρικοῦ ἢ νιτρικοῦ ὀξέος κεκαρμένου. Ἐὰν προστεθῇ ὑδροχλωρικὸν ὀξύ πρὸς ὅσον ἔνεστι ἄκρατον διάλυμα, καὶ ἂν, θερμαινομένου τοῦ ρευστοῦ, ἐκλύεται ἡ κατὰ τοῦ χλωρίου

όσμη, ἀποδεικνύεται ἡ παρουσία τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγγανησίου, τοῦ δημητρίου, τοῦ μαγγανησικοῦ, τοῦ χρωμικοῦ, καὶ σεληνικοῦ ὀξέος· ἐὰν ἡ θερμανσις τοῦ ρευστοῦ ἐξακιλουθῇ, μεχριστοῦ παύσῃ ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκλύεται χλώριον, τότε μεταβάλλονται τὰ συστατικὰ εἰς ὑποξείδιον τοῦ μαγγανησίου, τοῦ δημητρίου, τοῦ χρωμίου, καὶ εἰς ὑποσεληνιώδες ὀξύ, καὶ ὡς τοιαῦτα δύνανται νὰ ἐξηχνευθῶσιν εἰς τὸ διάλυμα. Πρὸς τούτοις ἐνώσεις ὑδροχλωρικῶν ἀλάτων ζεσθεῖσαι μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος δύνανται νὰ ἐκλύωσι χλώριον, καὶ χλωρικά ἄλαττα ἐκλύουσι χλωροξείδιον. Ἐὰν διὰ τῆς προσθήκης ὀξέος τινὸς εἰς τὸ ἐξεταζόμενον ρευστὸν προαχθῇ καταβύθισμα, τότε τὸ καταβυθιζόμενον δύναται νὰ ὑποθεθῇ ὡς τανταλικόν, τιτανικόν, ἢ βομφαμικόν ὀξύ· καὶ τὰ τρία ταῦτα δύνανται ἀκολούθως νὰ προσδιορισθῶσιν ἀκριβέστερα διὰ τοῦ σαλπυγγίου.

Εἰς τὰ διαλύματα τῶν εἰς τὸ ὕδωρ διαλυσίμων ἑνθειῶν ἐνώσεων ἀποσυντίθενται εἰς τὰς πλείους περιστάσεις διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος αἱ ἑνθελὲς ἐνώσεις ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν τοῦ ὑδροθειωμένου αέριου. Ἐὰν διὰ τῶν πράξεων τούτων δὲν ἀποτελεσθῇ κανὲν καταβύθισμα προστίθεται πρὸς τὸ μὲ ὀλίγον ποσὸν ὀξέος τινὸς ὀξυνιζόμενον διάλυμα, ὑδροθεικόν ὀξύ ρευστὸν, ἢ δι' αὐτοῦ διοχετεύεται ὑδροθειωμένον αέριον, δι' οὗ σχεδὸν ἅπαντα τὰ ὀξειδια τῶν μετὰλλων καταβυθίζονται ὡς ἑνθελὲς ἐνώσεις. Ὄξειδια τινὰ δὲν καταβυθίζονται ἐκ τῶν ὀξινῶν διαλύσεων τῶν διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος, ἀλλὰ ἀποσυνθέτουσιν αὐτὸ εἰς τρόπον ὥστε ἀποχωρίζεται τὸ θεῖον εἰς εἶδος γαλακτοχρόου ἰζήματος. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσι τὸ ὀξείδιον τοῦ μαγγανησίου καὶ τὸ χρωμικόν ὀξύ, πρὸς τούτοις τὸ ὀξείδιον τοῦ σιδήρου, τὸ ὑποθεικόν ὀξύ, τὸ θειώδες ὀξύ, τὸ χλωρικόν, βρωμικόν καὶ τὸ ἰωδικόν ὀξύ, ἐὰν τὰ διαλύματα τῶν ἀλάτων τούτων ἀναμιχθῶσι προλαβόντως μετὰ τινος ὀξέος. Ἐὰν ἡ ἐξεταζομένη ἐνωσις δὲν ἐμπεριέχῃ ὀξειδια καταβυθιζόμενα διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου αέριου, ἀποδεικνύεται διὰ τῆς τοῦ θεῖου ἀποχωρίσεως ἡ παρουσία ἐνὸς ἢ πλείονων τούτων τῶν συστατικῶν. Τὰ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος καταβυθισθέντα ἑνθελὲς μέταλλα κατεργάζονται ἀκολούθως διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, δι' ἧς διαλύεται ὁ ἑνθελὲς κατσίτερος, ὁ ἑνθελὲς λευκόχρυσος, τὸ ἑνθελὲν ἰρίδιον, ὁ ἑνθελὲς χρυσός, τὸ ἑνθελὲν στίμμιον, τὸ μολυβδαινίον, τελλούριον, σελήνιον καὶ τὸ ἑνθελὲν ἀρσενικόν.

Τὴν παρουσίαν τοῦ λευκοχρύσου πληροφοροῦμεθα εὐκόλως, ἐὰν εἰς τὸ ὅσον ἐνεστὶ ἄκρατον διάλυμα, διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ καλίου ἢ τῆς ὑδροχλωρικῆς ἀμμωνίας προαχθῇ κίτρινον ἰζήμα.

Τὴν παρουσίαν τοῦ ἱριδίου ἀνακαλύπτουμεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἰδίως δὲ ἐὰν τὸ ἐξεταζόμενον ἄλλας διαλυθῇ εἰς οἰνόπνευμα. Τὸ τοιούτοτρόπως προκχθὲν διπλοῦν ἄλλας εἶναι μέλαν, ἐρυθρωπὸν δὲ, ἐνυπάρχοντος τοῦ λευκοχρύσου. Τὴν τῆς μολυβδαίνης παρουσίαν ἀνακαλύπτουμεν, ἐὰν μέρος τοῦ ξηροῦ ὑπολείμματος ἐξετασθῇ διὰ τοῦ σαλπιγγίου. Τὴν ὑπαρξίν τοῦ τελλουρίου ἀνακαλύπτουμεν ἐνίοτε διὰ τῆς μεθ' ὕδατος θολώσεως τοῦ διαλύματος, καθὼς καὶ διὰ τῶν χαρακτηρῶν τῶν παρῶν-
 σιζομένων διὰ τῆς ἐξετάσεως μετὰ τοῦ σαλπιγγίου.

Τὸ σελήνιον ἀνακαλύπτεται εἰς πολλάς περιστάσεις διὰ τῆς ἐξετάσεως τοῦ μίγματος διὰ τοῦ σαλπιγγίου, ἐὰν δὲ ᾗναι διαλελυμένον ὡς σεληνικὸν ἢ σεληνιώδες ὄξύ, ἀνακαλύπτεται διὰ τῶν ἀντιδραστηρίων, τὰ ὁποῖα ἀναφέρουμεν προηγουμένως, καθὼς καὶ διὰ τοῦ θειώδους ὀξέος. Τὸ ἀρσενικὸν ἀνακαλύπτεται εὐκόλως διὰ τοῦ σαλπιγγίου. Περὶ τῆς τοῦ διαλελυμένου παλλαδίου παρουσίας πληροφοροῦμεθα διὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὑδραργύρου. Τὸ ῥόδιον ἀνακαλύπτεται εἰς τὰς ξηρὰς ἐνώσεις διὰ τῆς μετὰ τῆς θεικῆς ποτάσεως ὀξινῆς συντήξεως· τὸ δὲ ὅσμιον εὐκόλως ἐκ τῆς ἰδιαζούσης εἰς αὐτὸ ὀσμῆς, ἥτις ἀποβάλλεται, ἐὰν τὸ διάλυμα θερμανθῇ μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος.

Ἀφοῦ τὸ δι' ὀλίγου ποσοῦ ὀξέος ὀξυνιζόμενον διάλυμα κατεργασθῇ μετὰ ὑδροθειωμένου αἰρίου, κορέννεται τὸ ἀπὸ τὰ καταβυθισθέντα ἔνθεια μέταλλα ἀποχωρισθὲν διάλυμα μετὰ ἀμμωνίας, καὶ ἀναμίγνυται μετὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας· δι' αὐτῆς ἀποχωρίζονται αἱ ἔνθαιο ἐνώσεις τοῦ μαγγανησίου, τοῦ σιδήρου, τοῦ ψευδαργύρου, τοῦ κοβαλτίου, τοῦ νικελίου καὶ τοῦ οὐράνιου. Τὸ οὐράνιον ἀνακαλύπτεται διὰ τῆς ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας, δι' ἧς διαλύεται τὸ οὐρανοξείδιον πρὸς κίτρινόν τι ῥευστὸν καὶ ἐξ αὐτοῦ καταβυθίζεται διὰ καθαρᾶς ἀμμωνίας.

Μετὰ τῶν ἐνθείων ἐνώσεων τῶν ῥηθέντων μετάλλων δύναται νὰ καταβυθισθῶσι διὰ τῆς καθαρᾶς, καθὼς καὶ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, ἡ ἀργίλλος, τὸ βηρυλλιον, τὸ θόριον, τὸ ἱτρίον, τὸ ὑποξείδιον τοῦ δημητρίου, ἡ ζirkονία, τὸ τιτανικὸν ὄξύ, τὸ χρωμοξείδιον, καὶ τὸ τανταλικὸν ὄξύ. Ἐὰν εἰς τὸ ῥηθὲν καταβύθισμα εὔρεθῇ ἀργίλλος ἀνακαλύπτεται ὡς ἐξῆς. Τὸ καταβύθισμα κατεργάζεται μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος, καὶ διαλυθείσης τῆς ἀργίλλου, προστίθεται ἀκολούθως καθαρὰ πότασσα ὑπερτεροῦσα. Δι' αὐτῆς διαλύονται τὸ ὀξείδιον τοῦ ψευδαργύρου, ἡ ἀργίλλος καὶ ἡ βηρυλλία· ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλύματος διὰ τοῦ καλίου δύναται νὰ ἀποχωρισθῇ ἡ ἀργίλλος καὶ ἡ βηρυλλία διὰ τῆς ὑδροχλωρικῆς ἀμ-

μωνίας, τὸ δὲ ὀξειδίων τοῦ ψευδαργύρου δύναται νὰ ἀνακλυφθῇ διὰ τῆς ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας. Ἡ ἄργιλλος καὶ ἡ βηρυλλία δύνανται νὰ διακριθῶσιν, ἐὰν τὸ διάλυμα κατεργασθῇ δι' ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας.

Τὴν παρουσίαν τοῦ τιτανικοῦ ὀξέος ἀνακαλύπτομεν συνήθως διὰ τοῦ σαλπιγγίου, ὡσαύτως καὶ τὸ χρωμοξείδιον, καὶ ἂν ἐμπεριέχεται εἰς ἐλαχίστην ποσότητα.

Τὸ ρευστὸν, τὸ ὁποῖον ἀπεχωρίσθη διὰ διύλισεως ἀπὸ τὸ διὰ ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας προαχθὲν καταβύθισμα δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ μαγνησίαν, τίτανον, στροντιανήν, βαρεῖαν, λίθιον, νάτρον καὶ κάλιον. Ἐὰν ἐμπεριέχεται εἰς τὴν ἔνσωσιν ἀμμωνία, εὐρίσκεται καὶ αὕτη εἰς τὸ ρευστὸν διαλελυμένη. Τὸν τρόπον τῆς εὐρέσεως τῶν ῥηθεισῶν βάσεων ἐπεριγράψαμεν εἰς τὸν οἰκτεῖον τόπον.

Ὁδηγίαι πρὸς εὑρεσιν τῶν ὀξέων.

Μέρος τοῦ ὅσον ἔνεστι ἀκράτου διαλύματος τῆς ἐξεταζομένης ἐνώσεως ἐπιχύνεται δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, καὶ ἂν προαχθῇ ἀναβρασμός, πληροφορούμεθα περὶ τῆς τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος ἢ τοῦ θείου παρουσίας· καὶ ἂν μὲν τὸ ἐκλυόμενον ἀέριον ᾗται ἄοσμον, τότε θεωρεῖται ὡς ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἐὰν δὲ ἔχῃ τὴν τοῦ θείου ὀσμὴν, ἡ ἔνωσις εἶναι ἔνθεις.

Ἐτέρον μέρος τοῦ διαλύματος τῆς ἐνώσεως οὐδέτερον ἢ τουλάχιστον ὄχι ὀξινὸν ἀναμίγνυται μετὰ διαλύματος ὑδροχλωρικῆς ἢ νιτρικῆς βαρείας, δι' ἧς, παρόντος θειικοῦ, φωσφορικοῦ, ἀρσενικοῦ, βορικοῦ ὀξέος καὶ φθορίου, ἀποτελεῖται καταβύθισμα. Διὰ νὰ διακρίνωμεν δὲ ποῖον ἐκ τῶν ὀξέων τούτων ἐμπεριέχεται εἰς τὸ Ἴζημα, προσθέτομεν ὑδροχλωρικόν, ἢ νιτρικὸν ὀξύ κεκραμένον· ἂν αὐτὸ διαλυθῇ, δηλοῦται ἡ τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἀπουσία· ἐὰν διαλυθῇ ὑπὸ ἀναβρασμὸν, θεωρεῖται τὸ Ἴζημα προσερχόμενον ἐξ ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Τὴν τοῦ ἀρσενικοῦ ὀξέος παρουσίαν ἐξιχνεύομεν διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου, τὴν δὲ τοῦ βορικοῦ, ἐὰν προστεθῇ θειικὸν ὀξύ καὶ οἰνόπνευμα καὶ ἀναφλεχθὲν παρέχῃ πρασίνην φλόγα. Ἐὰν ἐμπεριέχεται φθόριον, γνωρίζεται ἀπὸ τὴν πρὸς τὴν ὑελον διαβρωτικὴν ἐνέργειαν.

*Περὶ τῆς ἀναλύσεως συνθέτων ἐνώσεων διαλυσίμων εἰς
τὸ ὕδωρ ἐν μέρει ἢ διόλου ἀδιαλύτων, διαλυομένων
δὲ εἰς τὰ ὀξέα.*

Ἡ ἔγγωσις κατεργάζεται πρῶτον δι' ὕδατος· ἐὰν μέρος αὐτῆς διαλυθῇ

εἰς τὸ ὕδωρ, ἐξετάζεται τὸ διάλυμα τοῦτο κατὰ τὰς προεκτεθείσας μεθόδους· ἀδιαλύτου δὲ οὐσῆς τῆς ἐνώσεως, διαλύεται εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, ἢ ὑπάρχοντος ὀξειδίου τοῦ μολύβδου καὶ ἀργύρου, ἢ ὑποξειδίου τοῦ ὑδραργύρου εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ· ἐπιταχύνομεν δὲ τὴν διάλυσιν διὰ τῆς θερμότητος, καὶ μάλιστα ἐὰν ἐμπεριέχωνται ἔνθεια τινὰ μέταλλα, ὅποτε δυνάμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν καὶ τὸ νιτροδαλικὸν ὀξύ, διὰ τοῦ ὁποίου διαλύονται ἐνώσεις μὴ διαλυόμεναι δι' οὐδενὸς τῶν ὀξέων χωριστά. Τὰ τῶν μετάλλων κράματα διαλύονται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς τὸ νιτρικόν, ὀλίγα τινὰ καὶ εἰς τὸ ὑδροχλωρικόν ὀξύ, ἀλλὰ δὲν διαλύονται μόνον διὰ τοῦ νιτροδαλικοῦ ὀξέος· ἀφοῦ σχηματισθῇ τὸ διάλυμα, ἐξετάζεται ἀκολούθως ἐπὶ τῆς τῶν βάσεων καὶ τῶν ὀξέων παρουσίας κατὰ τὸν ἤδη πολλάκις ἐκτεθέντα τρόπον.

Ὁδηγίαι πρὸς διάλυσιν συνθέτων ἐνώσεων εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὰ ὀξέα ἢ ἐντελῶς ἢ κατὰ μέγα μέρος ἀδιαλύτων.

Εἰάν ἡ πρὸς ἐξέτασιν ἔνωσις κατεργασθῇ πρῶτον μεθ' ὕδατος καὶ ἀκολούθως μετὰ τινος ὀξέος καὶ μὲν ἀδιάλυτος, δύναται νὰ συνίσταται ἐκ θειϊκῆς βαρείας, θειϊκῆς στροντιανῆς, θειϊκῆς τιτάνου, θειϊκοῦ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, καὶ ἐγγλωρίου ἀργύρου· ἡ ἀδιάλυτος αὕτη ἔνωσις συντήκεται μετὰ διπλασίας ὡς πρὸς τὸ βάρος ξηρᾶς ἀνθρακικῆς σάδας· μετὰ τὴν ἐντελῆ ἀπόψυξιν τοῦ τακέντος μίγματος ἐπιχύνεται αὐτὸ μεθ' ὕδατος πρὸς διάλυσιν καὶ μαλάκωσιν τῶν διαλυσίμων ἀλάτων, τὸ δὲ ἀπολαμβάνόμενον καὶ καθαρῶς διύλιζόμενον διάλυμα ὑπερκορέννυται μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος· διὰ τῆς νιτρικῆς βαρείας ἀνακαλύπτεται εἰς τὸ εἰρημένον διάλυμα τὸ θειϊκόν, καὶ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ἀργύρου τὸ ὑδροχλωρικόν νάτρον. Τὸ ἀδιάλυτον ὑπόλειμμα δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ ἀνθρακικὴν στροντιανήν, τίτανον, καὶ ὀξειδίον τοῦ μολύβδου, προσέτι δὲ καὶ μεταλλικὸν ἄργυρον, ἐνυπάρχοντος ἐγγλωρίου ἀργύρου, ὁ ἄργυρος εὐρίσκεται εἰς τὸν πυθμένα τοῦ χωνευτηρίου εἰς εἶδος μεταλλικοῦ σφαιριδίου ἢ ὡς λεῖα κόνις. Τὸ εἰρημένον ὑπόλειμμα, διαλύεται εἰς νιτρικὸν ὀξύ, ἢ εἰς τὸ ὑδροχλωρικόν ὀξύ, μὴ ἐμπεριεχομένου ἀργύρου καὶ ὀξειδίου τοῦ μολύβδου· μέρος τοῦ διαλύματος τούτου ἐξετάζεται διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῆς τοῦ ἀργύρου παρουσίας, ὅστις προδίδεται διὰ τινος λευκοῦ ἰζήματος· τὸ ἰζημα τοῦτο ἀποχωρίζεται διὰ διύλισεως καὶ τὸ διύλιζόμενον ρευστὸν ἀναμιγνύεται μετὰ καθαρᾶς ἀμμωνίας.

Εάν δὲν ἐμπεριέχεται ὀξειδίου τοῦ μολύβδου, σχηματίζεται λευκὸν καταβύθισμα· τὸ ἐκ τοῦ καταβύθισματος διυλίζομενον ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ τίτανον, στροντιανὴν καὶ βαρεῖαν, ἀναμιγνύεται μετὰ φθορικοῦ ὀξέος χαλικοῦχου, δι' οὗ, ἐμπεριεχομένης βαρεῖας, προάγεται μετὰ τινα καιρὸν θόλωσις. Τὸ ῥευστὸν ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὸ ληφθὲν καταβύθισμα, καὶ ἂν εἰς τὸ ῥευστὸν διὰ προσθήκηςθεινῆς ποτάσεως, ἥ κεκραμένουθεινκοῦ ὀξέος προαχθῇ παραχρῆμα Ἱζημα, ἐμπεριέχεται στροντιανὴ ἢ καθαρά ἢ ἐνωμένη μετὰ τιτάνου. Διὰ νὰ πληροφορηθῶμεν περὶ τῆς τιτάνου διυλίζομεν τὸ ῥευστὸν ἀπὸ τὴν ληφθεῖσανθεινκὴν στροντιανὴν καὶ κορενύομεν δι' ἀμμωνίας, ἐν μετὰ ταῦτα δι' ὀξυαλικῆς ποτάσεως σχηματισθῇ λευκὸν Ἱζημα, ἐμπεριέχεται πρὸς τοῦτοις καὶ τίτανος.

Τὸ ῥευστὸν, τὸ ὁποῖον ἀπεχωρίσθη ἀπὸ τὸ Ἱζημα τῶν ἐνθείων μετάλλων, ἐξ ὧν δηλαδὴ τὰ διαλυθέντα μέταλλα διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος ἀπεχωρίσθησαν, ὑποβάλλεται εἰς τὰς αὐτὰς ἐξετάσεις, ὥς νὰ μὴ προῆλθε διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος οὐδὲν καταβύθισμα. Πρῶτον λοιπὸν πρέπει νὰ ἐξετασθῇ, ἐὰν εἰς τὸ εἰρημένον ῥευστὸν ὑπάρχωσιν εἰσέτι τινὲς ἔμμονοι οὐσίαι. Πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν στάζονται τινὲς σταγόνες ἐπὶ τινος ἐκ λευκοχρύσου ἐλάσματος διὰ πυρὸς ἰσχυρῶς θερμανθέντος· ἐὰν δὲν ἐπιμείνη ἔμμονόν τι ὑπόλειμμα, δὲν ὑπάρχουσιν ἔμμονοι βάσεις· ἐπιμένοντος δὲ τοιούτου, ὑποβάλλεται τὸ ῥευστὸν εἰς ἐξετάσεις, αἵτινες ἄρχονται μὲ τὸν δι' ἀμμωνίας κόρον, καὶ μετὰ ταῦτα προστίθεται ὑδροθειωμένη ἀμμωνία. Εἰς αὐτῆς ἀποτελεσθῇ Ἱζημά τι, δύναται νὰ εἰκασθῇ ἡ παρουσία τοῦ ὀξειδίου ἢ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου, τοῦ ὀξειδίου τοῦ νικελίου, κοβαλτίου, ψευδαργύρου, τοῦ ὑποξειδίου τοῦ μαγγανησίου ἢ τῆς ἀργίλλου. Τὸ ἀπολαμβανόμενον καταβύθισμα ἀποχωρίζεται διὰ διυλύσεως, καὶ ἀποπλυθὲν δι' ἀρκοῦντος ποσοῦ ὕδατος κατεργάζεται μετὰ τοῦ διυλιστῆρος ἐντὸς μικρᾶς φιάλης μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος κεκραμένου τόσον, ἕωσού νὰ μὴν ἐκλύεται πλέον ὑδροθειωμένον ἀέριον, καὶ τὸ ῥευστὸν διυλίζομενον θερμαίνεται μετὰ νιτρικοῦ ὀξέος

Εἰς τὸ ὀξινὸν ῥευστὸν προστίθεται ἀμμωνία καὶ τὸ δι' αὐτῆς προαχθὲν Ἱζημα ἀποχωρίζομενον ἐκπλύνεται καλῶς· ἐν αὐτῷ δύναται νὰ ἐμπεριέχεται ἡ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου ἢ ἀργίλλος, καὶ ἐὰν ᾖται φαῖν ἐνδέχεται νὰ ὑπάρχωσιν καὶ ἀμφότεραι αἱ βάσεις. Πρὸς ἀκριβεῆ πληροφορίαν περὶ τούτου, διαλύεται τὸ καταβύθισμα μετὰ τοῦ διυλιστῆρος εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, καὶ τὸ διυλίζομενον διάλυμα ἀναμιγνύεται ἀκολούθως μὲ διάλυσιν

καθαρᾶς ποτάσεως· δι' αὐτῆς ἀναδιαλύεται ἡ ἄργιλλος, οὐχὶ δὲ τὸ ὀξειδιον τοῦ σιδήρου. Εἰς τὸ διῦλισθὲν διάλυμα προστίθεται διάλυμα τῆς ὑδροχλωρικῆς ἀμμωνίας, δι' ἧς ἀποτελεῖται λευκὸν καταβύθισμα, ἐὰν ἐμπεριέχεται ἄργιλλος εἰς τὴν ἔνωσιν. Τὸ ἀνακαλυφθὲν ὀξειδιον τοῦ σιδήρου δύναται νὰ ἐμπεριέχεται ὡς ὀξειδιον ἢ ὡς ὑποξειδιον, καὶ ἐὰν διὰ τῆς προσθήκης τοῦ διαλύματος τοῦ χρυσοῦ ἀποτελεσθῇ φαιὸν ἕζημα συνιστάμενον ἐκ μεταλλικοῦ χρυσοῦ, ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ σίδηρος ὑπῆρχεν ὡς ὑποξειδιον.

Ἐὰν τὸ ρευστὸν δι' ἀμμωνίας χρωματισθῇ κυανοῦν, δύναται νὰ εἰκασθῇ ἡ παρουσία τοῦ ὀξειδίου τοῦ νικελίου· ἐὰν δὲ ἀσθενῶς ροδόχρουν, τοῦ ὀξειδίου τοῦ κοβαλτίου.

Τὸ ὀξειδιον τοῦ κοβαλτίου εἰς σμικροτάτην ποσότητα καὶ ἀναμεμιγμένον μετ' ἄλλων ὀξειδίων δύναται νὰ ἀνακαλυφθῇ διὰ τοῦ φουστηρίου· καθότι συντακὲν μετὰ τῆς φωσφορικῆς σόδας καὶ τοῦ θόρακος θάφει αὐτὸ μετὰ κυανοῦ χρώματος. Τὸ ἀμμωνιοῦχον ρευστὸν ἀναμίγνυται μετὰ διαλύματος καυστικοῦ καλίου, καὶ, προαχθέντος δι' αὐτοῦ πρασίνου καταβύθισματος, ἀνακαλύπτεται τὸ ὀξειδιον τοῦ νικελίου, φαιὸν δὲ διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ αἵρος, ἐμπεριέχεται εἰς τὸ καταβύθισμα τὸ ὑποξειδιον τοῦ μαγνησίου.

Τέλος μένει νὰ ἐξετασθῇ τὸ ρευστὸν, τὸ ὁποῖον ὑπολείπεται, ἀφοῦ διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ὕδατος ἀπεχωρίσθῃ τὸ ἀποτελούμενον καταβύθισμα· καὶ πρῶτον ἐξετάζεται, ἐὰν ἐμπεριέχῃ ἐμμόνους θάσεις. Ἡ ἐξέτασις αὕτη γίνεται διὰ τῆς ἐξατμίσεως καὶ πυρώσεως τινῶν σταλαγμῶν ἐπὶ λευκοχρῶσου ἐλάσματος· ἐὰν δὲν ἐπιμείνῃ ὑπόλειμμα τι, δὲν ἀπαιτεῖται περαιτέρω ἐξέτασις· ὑπολειπομένου δὲ τινος δύναται νὰ ἐμπεριέχωνται ἐν αὐτῷ μαγνησία, τίτανος, στροντιανή, θαρεία, νάτρον καὶ κάλιον. Τὸ ρευστὸν ὑπερκορέννυται μεθ' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος πρὸς ἀποσύνθεσιν τῆς ἐλευθέρως ἐνυπαρχούσης ὑδροθειωμένης ἀμμωνίας, ἀκολουθῶς θερμαίνεται, μεχρισοῦ νὰ μὴν γίνεται ἐπαισθητὴ ἡ κατὰ ὑδροθειωμένου αἰρίου ὁσμὴ, καὶ τέλος ἀποχωρίζεται διὰ διαλύσεως ἀπὸ τὸ εἰς λεπτοτάτην κατάστασιν ἀποχωριζόμενον θεῖον. Μετὰ ταῦτα προστίθεται εἰς τὸ ρευστὸν διάλυμα ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα, καὶ τὸ διάλυμα θερμαίνεται πρὸς ἔκλυσιν τοῦ ἐλευθέρου ποσοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος· τὸ οὕτως προαχόμενον ἕζημα δύναται νὰ ἐμπεριέχῃ τίτανον, στροντιανὴν καὶ θαρείαν. Τὸ ἕζημα τοῦτο διαλύεται εἰς ὑδροχλωρικὸν ὄξυ καὶ εἰς τὸ διάλυμα ταῦτο στάζεται ὀλίγον ποσὸν θεϊκοῦ ὀξέος, ἢ ἔτι καλλήτερον διάλυ-

μα θεϊκῆς ποτάσης. Προαχθέντος τινὸς ἰζήματος παρευθὺς, ἐνδέχεται νὰ ἐμπεριέχωνται αἱ τρεῖς βάσεις, ἐὰν δὲ μετὰ τινα χρόνον, ἐμπεριέχεται μόνον τίτανος. Τὸ διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος ἀπολαμβανόμενον καταβύθισμα δύναται νὰ συνίσταται ἐκ βαρείας καὶ στροντιανῆς ἢ καὶ ἐκ τῶν δύο. Πρὸς τοιαύτην ἐξίχνευσιν προσθέτομεν φθορικὸν ὀξύ χαλικοῦχον, καὶ ἐὰν γενῇ ἰζήμα τι δι' αὐτοῦ, πληροφορούμεθα περὶ τῆς παρουσίας τῆς βαρείας· τὸ ῥευστὸν ἀποχωρίζεται καὶ προστίθεται διάλυμα θεϊκῆς ποτάσης, δι' ἧς, παρούσης τῆς στροντιανῆς, προάγεται καταβύθισμα.

Ἐὰν διὰ τῆς ἀνθρακικῆς ἀμμωνίας ἀποχωρισθῶσιν ἡ τίτανος, στροντιανὴ καὶ βαρεῖα, δύνανται νὰ ὑπάρχωσιν εἰς τὸ διϋλυζόμενον ῥευστὸν μαγνησίαν, νάτρον καὶ κάλιον. Πρὸς εὗρεσιν αὐτῶν προστίθεται εἰς μέρος τοῦ ῥευστοῦ διάλυμα τοῦ φωσφορικοῦ νάτρου, δι' οὗ, ἂν ὑπάρχῃ μαγνησία, προάγεται λευκὸν καταβύθισμα. Τούτου δὲ γενομένου, ἐξατμίζεται τὸ διάλυμα καὶ τὸ ὑπόλειμμα πυροῦται εἰς ἐκ λευκοχρόσου χύτραν πρὸς ἐντελῇ ἔκλυσιν τῆς ἀμμωνίας. Ἀκολούθως διαλύεται εἰς ὀλίγον ὕδωρ καὶ, ἀφοῦ προστεθῇ ὀλίγον οἰνόπνευμα, ἀναμιγνύεται μετὰ διαλύματος ἐγγλωρίου λευκοχρόσου, δι' οὗ, παρόντος τοῦ καλίου, προάγεται ἀνοικτοκίτρινον καταβύθισμα· ἐὰν δὲν προαχθῇ ἰζήμα τι καὶ ἐπληροφορήθῃμεν περὶ τῆς ὑπάρξεως τινὸς ἐμμόνου βάσεως, ὑποπτεύεται ἡ τοῦ νάτρου παρουσία.

Εὗρεσις τῶν ὀξέων.

Τὸ σεληνικόν, τὸ χρωμικόν, καθὼς καὶ τὸ μαγνησικόν ὀξύ, ἐὰν εὗρισκωνται διαλελυμένα, ζέονται μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, καὶ οὕτως ἀποκαθίστανται εἰς σεληνῶδες ὀξύ, εἰς χρωμοξείδιον καὶ ὑποξείδιον τοῦ μαγνησίου.

Πρὸς ἐξέτασιν τῶν εἰς τὸ ἐξσταζόμενον σῶμα ὑπαρχόντων πτητικῶν ὀξέων, ἐπιχύνεται τὸ σῶμα εἰς λεῖαν κατάστασιν ἐντὸς καταλλήλου φιάλης μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος ἀκράτου, καὶ ἐὰν δὲν ἐκλύεται ἀερίον τι, δι' οὗ δύναται νὰ γνωρισθῇ ὀξύ τι, θερμαίνεται τὸ μίγμα διὰ πρᾶου πυρός· τοιοῦτοτρόπως ἐκλύονται τὰ πτητικὰ ὀξέα δυνάμενα νὰ γνωρισθῶσιν ἀπὸ τὴν ὁσμὴν των καὶ ἔτι καλῆτερον ἐκ τῶν λευκῶν ἀτμῶν, οἵτινες σχηματίζονται, ἐὰν ἐπιτεθῇ ὑπὲρ τὸ μίγμα βάθδος ὑέλινος βραχεῖσα με ἀμμωνίαν.

Τὰ ὀξέα, ἅτινα διὰ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἐκλύονται, εἶναι τὰ ἐξῆς.

Τὸ θειῶδες ὀξύ, τὸ ὑποθεικὸν ὀξύ, καὶ ὑποθειῶδες ὀξύ, δύνανται νὰ γνωρισθῶσιν εἰς καθαρὰν κατάστασιν διὰ τῆς χαρακτηριστικῆς ὁσμῆς.

Τὸ νιτρικὸν ὀξύ προδίδεται διὰ τῶν ἀχρῶν ἀτμῶν τῶν ἐκλυομένων, ἐὰν τὰ νιτρικὰ ἅλατα ἐπιχυθῶσιν εἰς τὸ ψυχρὸς μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου.

Τὰ νιτρῶδη ἅλατα, ἐκδίδουσι διὰ τῆς αὐτῆς πράξεως φαιούς ἀτμούς.

Αἱ ἐνώσεις μετὰ τοῦ νιτρογονοξειδίου, ἐπιχυθεῖσαι μετὰ θειικοῦ ὀξέος, ἐκλύουσιν ἄχρουν νιτροξειδίον εἰς φαῖον μεταβαλλόμενον, παρόντος τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αἵρος.

Τὰ χλωρικὰ ἅλατα ἐκλύουσι διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου χλωρῶδες ὀξύ.

Τὰ βρωμικὰ ἅλατα ἐπιχυθέντα μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἀποσυντίθενται εἰς τὸ ἰδιαίτερον ὁσμὴν ἔχον βρώμιον καὶ εἰς ὀξυγόνον.

Τὰ ἀνθρακικὰ ἅλατα, τόσον εἰς ξηρὰν κατάστασιν καθὼς καὶ εἰς διαλελυμένην ἐκλύουσι μετὰ ζωηροῦ ἀναβρασμοῦ ἀνθρακικὸν αἷριον.

Τὰ ὀξαλικά ἅλατα ὑδρομιγῇ ὄντα ἀποσυντίθενται εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ εἰς ὀξειδίον τοῦ ἀνθρακος, ἐκλύόμενα μὲ ἀναβρασμόν.

Τὸ μαγγανησικὸν ὀξύ καὶ τὰ δι' αὐτοῦ ἅλατα κατεργασθέντα μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἐκδίδουσι πορφυροὺς ἀτμούς.

Τὸ ἄκρατον θεικὸν ὀξύ ἐκλύει πρὸς τούτοις ἐκ τῶν πλειότερων ἐγχλωρίων μετάλλων ὑδροχλωρικὸν ὀξύ, ἐκ τῶν περισσοτέρων ἐμβρωμίων ἐνώσεων βρώμιον, δυνάμενον νὰ γνωρισθῇ διὰ τοῦ χρώματός του, ὡσαύτως καὶ θειῶδες ὀξύ καὶ τὸ ὑδροβρωμικὸν ὀξύ.

Ἐκ τῶν ἰωδούχων μετάλλων ἐκλύει τὸ θεικὸν ὀξύ ἄκρατον ἰώδεις ἀτμούς καὶ θειῶδες ὀξύ· ἐκ τῶν φθορικῶν ἐνώσεων ἐκλύεται φθορικὸν ὀξύ, τὸ ὅποῖον ἀπὸ τὴν ἐπὶ τῆς ὑέλου καταβρωτικῆν του ἐνέργειαν δύναται νὰ διακριθῇ ἀπὸ τὰ ἕτερα πτητικὰ ὀξέα· ἐκ τῶν χαλικοφθορικῶν ἁλμάτων ἐκλύεται ὑδροφθορικὸν αἷριον καὶ χαλικοῦχον φθόριον.

Τὰ ἐνθια μέταλλα κατεργασθέντα μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἐκλύουσιν ἐν μέρει ὑδροθειωμένον αἷριον] καὶ ἐν μέρει θειῶδες ὀξύ.

Περὶ τῶν κυριωτέρων χαρακτῆρων τούτων τῶν ἀλάτων.

Τὰ θειώδη ἄλατα ἐκλύουσιν ἀποσυντιθέμενα δι' ὀξέων τὴν χαρακτηριστικὴν ὁσμὴν τοῦ θειώδους ὀξέος, ἐὰν δὲν ᾔηται ἀναμειγμένα μετὰ τοιούτων ἀλάτων, τὰ ὅποια ἀποσυντιθέμενα διὰ θειικοῦ ὀξέος ἐκλύουσιν ὀξέα ὀξειδόνοντα τὸ θειώδες ὀξύ, καθὼς π. χ. τὰ νιτρικὰ καὶ χλωρικά ὀξέα. Ἐὰν θειώδες τι ἄλας εὑρεθῇ ἀναμειγμένον μετ' ἐνθείου τινὸς μετάλλου, ἐκλύεται δι' ὀξέων ὑδροθειωμένον αέριον, καθότι φθείρεται δι' αὐτοῦ τὸ θειώδες ὀξύ. Εἰς τὴν ῥηθείσαν περίστασιν δὲν δύναται νὰ γνωρισθῇ μήτε τὸ ἐνθειον μέταλλον, μήτε τὸ θειώδες ἄλας ἀπὸ τῶν ἐκλυόμενα αέρια, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ τὸ ἐν ἢ τὸ ἄλλο εἰς ὑπερτεροῦσαν ποσότητα. Τὰ θειώδη ἄλατα μόνον τότε δύνανται νὰ γνωρισθῶσιν ἀπὸ τὴν κατὰ θειώδους ὀξέος ὁσμὴν των, ἐὰν εὑρεθῶσιν ἀναμειγμένα ἢ μετὰ ἀνθρακικῶν ἢ ὀξελικῶν ἀλάτων, ἢ μετὰ ἐγχλωρίων ἢ ἐμρθορίων μετάλλων. Τὸ αὐτὸ ἐφαρμόζεται ἐπὶ τῶν ὑποθεικῶν καὶ ὑποθειωδῶν ἀλάτων.

Τόσον τὰ νιτρικὰ, καθὼς καὶ τὰ νιτρώδη ἄλατα, καθαρὰ ἢ ἀναμειγμένα μετ' ἄλλων ἀλάτων γνωρίζονται διὰ τῆς πυρσοκροτήσεως ἐπὶ διαπύρων ἀνθράκων. Εἰς τὰ μίγματα ἀνακαλύπτονται τὰ νιτρικὰ ἄλατα διὰ τῶν κίτρινωπῶν ἀτμῶν τοῦ νιτρώδους ὀξέος, οἵτινες ἐκλύονται, ἐὰν αὐτὰ μιγνόμενα μετὰ ῥομισμάτων τοῦ χαλκοῦ, ἐπιχυθῶσιν μετὰ θειικοῦ ὀξέος κεκραμένου. Διάλυμα τῶν νιτρικῶν ἀλάτων δύναται νὰ γνωρισθῇ καὶ διὰ διαλύματος τινὸς διὰ τοῦ ὑποξειδίου τοῦ σιδήρου ἄλατος καὶ θειικοῦ ὀξέος, ὅχι ὁμῶς πάντοτε καὶ διὰ διαλύματος τοῦ ἰνδικοῦ· ἐπειδὴ καὶ τὰ χλωρικά ἄλατα ἀποχρωματίζουν τὸ τοῦ ἰνδικοῦ διάλυμα. Ἡ παρουσία τῶν χλωρικῶν καὶ βρωμικῶν ἀλάτων, καὶ ἀναμειγμένων μὲ ἄλλα ἄλατα, γνωρίζεται ἀπὸ τὴν ἐκλυσιν τοῦ ὀξυγόνου, ἐὰν αὐτὰ θερμανθῶσιν εἰς ἀποστακτικὸν σκεῦος. Τὸ αὐτὸ χαρακτηριστικὸν δεικνύουσι καὶ τὰ ἰωδικὰ ἄλατα.

Τὰ ἀνθρακικὰ ἄλατα γνωρίζονται εὐκολώτερα πάντων τῶν ἄλλων ἀλάτων, καθότι ἐπιχυθέντος ἐπ' αὐτῶν ὀξέος τινὸς ἐκλύουσι μετὰ ἀναβρασμοῦ ἄχρουν τι αέριον.

Τὰ ὀξελικὰ ἄλατα ἀνακαλύπτονται διὰ τοῦ χαρακτηριστικοῦ των ιδιώματος, ὅτι δὲν ἀποσυνθέτουσι τὴν διάλυσιν τῆς θειικῆς τιτάνου. Μετὰ ἀρκετῆς εὐκολίας γνωρίζονται καὶ τὰ μαγγανησιὰ ἄλατα.

Τὰ ἐγχλωρία μέταλλα δύνανται νὰ γνωρισθῶσι διὰ τοῦ διαλύματος τοῦ ἀργύρου· τὸ ἀποτελούμενον λευκὸν καὶ διὰ τοῦ φωτὸς μελανίζομενον

καταβύθισμα εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ, εὐδιάλυτον δὲ εἰς τὴν καθαρὰν ἀμμωνίαν. Εἰς τὸ νιτρικὸν ὀξύ θέλει φανῇ ἀδιάλυτον τὸ προαχθὲν καταβύθισμα, ἐὰν ἐπροῆλθεν ἀπὸ βρωμικὸν ἢ ιωδικὸν ὀξύ. Τὰ ἐμβρώμια καὶ ἐνωδία μέταλλα καὶ τὰ βρωμικὰ ἅλατα δύνανται μὲν νὰ γνωρισθῶσιν εὐκόλως, ἐὰν ᾦναι διαλελυμένα, διαφεύγουσιν ὅμως τὴν προσοχὴν, ἐὰν ᾦναι ἠνωμένα μετὰ ἐγγλωρίων μετάλλων. Ἐὰν ἐγγλώριον μέταλλον εὑρεθῇ διαλελυμένον μὲ ἐμβρώμιον, δυσκόλως ἀνακαλύπτονται ἀμφοτέρω· ἡ ἀνακάλυψις ὅμως δύναται νὰ γίνῃ, ἐὰν τὸ διάλυμα ἀναμιχθῇ μετὰ διαλύματος τοῦ νιτρικοῦ μολύβδου, καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ προαχθέντος καταβύθισματος πάλιν μετὰ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου. Ἐὰν δι' αὐτοῦ τὸ διάλυμα θολωθῇ, τότε ἐμπεριέχεται εἰς αὐτὸ μόνον ἐμβρώμιον ἢ μικρὸν ποσὸν ἐγγλωρίου μετάλλου· ἐὰν προαχθῇ ἰσχυροτέρα θόλωσις, ἀναμφιδόλως ὑπάρχει ἐγγλώριον μέταλλον.

Ἐὰν ἐγγλώρια ἢ καὶ ἐμβρώμια μέταλλα ᾦναι ἀναμεμιγμένα μὲ ἅλατα ἐμπεριέχοντα μεταλλικόν τι ὀξύ, τότε ἐπιχυθέντα μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου δύνανται νὰ ἐκλύωσι πτητικὰς ἐγγλωρίας ἐνώσεις, αἵτινες διακρίνονται εἰς τινὰς περιστάσεις διὰ τοῦ χαρακτηριστικοῦ των χρώματος· π. χ. αἱ χρωμικαὶ ἐνώσεις.

Κατὰ τὴν ἤδη πολλὰκις ἀναφερθεῖσαν μέθοδον δύνανται νὰ ἐξιχνευθῶσιν αἱ φθोरικαὶ ἐνώσεις, ἐὰν καὶ ἀναμεμιγμένοι μετὰ πολλῶν ἄλλων ἀλάτων.

Ἐὰν διὰ τοῦ θειικοῦ ὀξέος δὲν ἐκλυθῇ πτητικὸν τι ὀξύ, δύνανται νὰ ὑπάρχωσιν εἰς τὴν ἔνωσιν ιωδικόν, φωσφορικόν, φωσφοῤῃδες ἢ ὑποφωσφοῤῃδες ὀξύ, βορικόν ἢ χαλικόν ὀξύ, καὶ περὶ τῆς ἀνακαλύψεως αὐτῶν διελάβαμεν ἤδη. Τὰ ιωδικὰ ἅλατα γνωρίζονται, καθότι πυρωθέντα ἐκλύουσιν ὀξυγόνον καὶ μεταβάλλονται εἰς ιωδοῦχα μέταλλα, ἐν οἷς ἀνακαλύπτονται τὸ ιώδιον κατὰ τὸν προσεκτεθέντα τρόπον.

Τὰ ὑποφωσφοῤῃδη, καθὼς καὶ τὰ φωσφοῤῃδη ἅλατα, δύνανται νὰ γνωρισθῶσιν, ἐπεὶδὴ ἀποχωρίζουσιν ἐκ τοῦ διαλύματος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου ὑδραργύρου, παρόντος ὅμως τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, τὸν ὑδράργυρον ὡς ὑδροχλωρικὸν ὑποξειδωμένον ὑδράργυρον. Ἐὰν τὰ ὑποφωσφοῤῃδη ἅλατα ἀναμιχθέντα μετὰ θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου θερμανθῶσιν, ἐκλύουσι θειῶδες ὀξύ καὶ μεταβάλλονται εἰς φωσφορικόν ὀξύ.

Τὸ χαλικόν ὀξύ ἀποχωρίζεται ἐκ τῶν ἀλκαλικῶν διαλύσεων του ἐντελῶς, ἐὰν τὸ μετὰ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ὑπερκεκορσμένον διάλυμα ἐξατμισθῇ μέχρι ξηροῦ καὶ τὸ ξηρὸν ὑπόλειμμα κατεργασθῇ μεθ' ὕδατος.

Ὁδηγίαι πρὸς ἐξέτασιν τῶν εἰς τὸ ὕδωρ ἀδιαλύτων ὑλῶν

Ἐάν ἡ ὕλη φανῇ ἀδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ, διαλύεται εἰς τὸ ὑδροχλωρικὸν καὶ εἰς τινὰς περιστάσεις εἰς τὸ νιτρικὸν ἢ εἰς τὸ νιτροδαλικὸν ὀξύ. Ἐάν τὸ διάλυμα τοῦτο γίνῃ δι' ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καὶ θερμανθῇ, τότε, ἐμπεριεχομένων τινῶν ὑπεροξειδίων, ἐκλύεται χλώριον· ὡσαύτως ἐκλύεται χλώριον, ἐὰν ὑπάρχωσιν χλωρικά, σεληνικά καὶ μαγγανησικά ἅλατα. πρὸς τούτοις ἂν ὑπάρχῃ τὸ ὀξειδίων τοῦ δημητρίου, τοῦ μαγγανησίου, τοῦ κοβαλτίου, τοῦ νικελίου καὶ τὸ τριτοξειδίων τοῦ μολύβδου. Τὸ ἀποτελούμενον διάλυμα ἐξετάζεται ἐν πρώτοις διὰ τοῦ ὑδροθειωμένου ἀερίου καὶ ἀκολούθως διὰ τῆς μεθόδου, τὴν ὁποίαν ἐξεθέσαμεν εἰς τὸ περὶ ἐξετάσεως τῶν εἰς τὸ ὕδωρ διαλυσίμων ὑλῶν.

Περὶ τῆς ἐξιχνεύσεως πῶν φυτικῶν δηλητηρίων ἐν γένει.

Φυτικά ἀλκάλια.

Πρὸς εὔρεσιν τῶν φαρμακερῶν φυτικῶν ἀλκαλίων χρησιμεύει τὸ βάμμα τοῦ ἰώδους, τὸ ὁποῖον μᾶς δεικνύει διὰ τινος φαιοῦ χρωματισμοῦ τὴν παρουσίαν φυτικῆς βάσεως.

Μορφίνη. Διὰ τοῦτο τὸ φυτικὸν ἀλκάλιον ἔχομεν τὰ πρὸς βεβαίαν ἀνακάλυψιν ἀπαιτούμενα ἀντιδραστήρια. Τόσον τὸ ὑδροχλωρικὸν ὀξειδίων τοῦ σιδήρου, καθὼς καὶ ὁ ὑδροχλωρικός χρυσός, δεικνύουσι διὰ τῆς προαγωγῆς κυανοῦ χρωματισμοῦ τὴν τῆς μορφίνης παρουσίαν· ἔτι εὐαισθητότερον εἶναι τὸ νιτρικὸν ὀξύ, τὸ ὁποῖον προάγει κατ' ἀρχὰς κίτρινον, ταχέως δὲ εἰς ἐρυθροῦν μεταβαλλόμενον χρωματισμόν· καὶ τοῦτο εἶναι ἐν τῶν διακριτικωτέρων τῆς μορφίνης χαρακτηριστικῶν πρὸς τούτοις καὶ τὸ ἰωδικὸν νάτρον ἀναμιγνύμενον μὲ τὸ θεϊκὸν ὀξύ ἄκρατον, παρέχει ἀξιόλογον ἀντιδραστήριον.

Στρυχνίνη. Τὸ κύριον δοκιμαστήριον διὰ τὴν τοῦ στρυχνίου ἀνακάλυψιν εἶναι τὸ ἐνθιοκυανικὸν κάλιον, τὸ ὁποῖον ἀναμιγνύμενον μετὰ διαλύματος τῆς στρυχνίνης σχηματίζει κρυσταλλωσίμους ἀγγίδας.

Βερατρίνη. Δι' αὐτὴν θεωρεῖται τὸ ἐνθιοκυανικὸν κάλιον ὡς καλλίτερον ἀντιδραστήριον· τοῦτο ἀναμιγνύμενον μετὰ τῶν τῆς βερατρίνης διαλυμάτων παρέχει θόλωσιν, ὅχι ὅμως ὡς εἰς τὸ ἀνωτέρω κρυστάλλους· πρὸς τούτοις ἡ πικρά καὶ δριμυτάτη γεῦσις βεβασιόνουσι τὴν παρουσίαν τῆς βερατρίνης.

Πικροτοξίνη. Ἡ διαλυσιμότης της, ὁ φαῖς χρωματισμός διὰ τοῦ βάρμματος τοῦ ἰώδους εἰς ἔλλειψιν ἄλλων διακριτικῶν μέσων πιθανολογοῦν τὴν παρουσίαν τῆς πικροτοξίνης.

Ἐμετίνη. Τὸ ἐνθειοκυανικὸν κάλιον προξενεῖ εἰς τὸ διάλυμα ἰσχυρὰν θόλωσιν· πρὸς τούτοις θολοῦται τὸ διάλυμα τῆς ἐμετίνης διὰ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξειδωμένου λευκοχρύσου.

Βρουκίνη. Δι' αὐτὴν θεωρεῖται τὸ θεϊκὸν ὀξύ ἄκρατον ἰδιάζον δοκιμαστήριον. Κατ' ἀρχὰς προκαλεῖται ροδόχρους χρωματισμὸς ταχέως εἰς αἰμοβαφεῖ μεταβαλλόμενος, ἀκολούθως προστίθεται τὸ ἰωδικὸν νάτρον ἀναμιγνύμενον μετὰ θεϊκοῦ ὀξέος, τὸ ὅποσον, παρούσης τῆς βρουκίνης, λαμβάνει ἰωειδῆ χρωματισμὸν, ἀφοῦ θερμανθῇ.

Τὰ ἐνταῦθα ἐκτεθέντα φυτικὰ ἀλκάλια διαφέρουσι μεταξὺ των ὡς πρὸς τὴν εἰς τὰ διάφορα διαλυτικὰ μέσα διαλυσιμότητά των, καὶ ἕνεκα τούτου θέλομεν τὰ διαγράψαι ἐν συντόμῳ.

Τὸ *μόρφιον* διαλύεται μόνον κατ' ὀλίγον εἰς τὸ ψυχρὸν οἰνόπνευμα, καὶ εἰς ζέον ὕδωρ, καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ ζέοντος ὕδατος διαλυόμενον μέρος καταβυθίζεται ἐκ τοῦ διαλύματος μετὰ τὴν ἀπόψυξιν· εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸν ζέοντα καὶ ψυχρὸν θεϊκὸν αἰθέρα. Ἡ καθαρὰ ἀμμωνία διαλύει μέρος μορφίου.

Τὸ *στρυχνιον* εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ λεῖψυδρον οἰνόπνευμα, τὸν αἰθέρα, καὶ τὴν καθαρὰν ἀμμωνίαν· 250 μέρη οἰνοπνεύματος 0,830 εἰδικῆς βαρύτητος διαλύουσι ἐν μέρος στρυχνίου· εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι πολὺ δυσδιάλυτον, καθότι ἐν μέρος αὐτοῦ ἀπαιτεῖ 6,667.

Ἡ *βρουκίνη* δὲν διαλύεται εἰς τὸν αἰθέρα καὶ ἀμμωνίαν, εἶναι δὲ διαλύσιμος εἰς τὸ λεῖψυδρον οἰνόπνευμα· εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ δὲν εἶναι πολὺ διαλύσιμος καὶ ἀπαιτεῖ 850 πρὸς ἐντελῆ διάλυσιν.

Ἡ *βερατρίνη* εἶναι ἀδιάλυτος εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, καὶ τὸν ψυχρὸν ἢ ζέοντα αἰθέρα· τὸ ζέον ὕδωρ διαλύει 0,001 τοῦ κόκκου, εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλύεται ἐντελῶς καὶ, ἐξατμιζομένου τοῦ διαλύματος, ἐπιμένει εἰς εἶδος γανώματος.

Ἡ *πικροτοξίνη* διαλύεται εἰς 180 μέρη ζέοντος ὕδατος· ὁ αἰθέρ, τὸ οἰνόπνευμα καὶ ἡ καθαρὰ ἀμμωνία τὴν διαλύουσιν ὅχι εἰς μικρὰν ποσότητα.

Ἡ *ἐμετίνη* δὲν διαλύεται εἰς τὸν αἰθέρα, εἶναι πολλὰ ὀλίγον διαλύσιμος εἰς τὸ ψυχρὸν, περισσότερον δὲ εἰς τὸ θερμὸν ὕδωρ· εἰς τὸ οἰνόπνευμα δὲν διαλύεται.

Ἐπὶ τῆς διαφόρου διαλυσιμότητος τῶν ἐκτεθέντων ἀλκαλίων εἰς τὰ διαλυτικὰ μέσα ἐπιστηρίζεται μέθοδος τις, δι' ἧς τὰ ἐκτεθέντα ἀλκάλια δύνανται νὰ χωρισθῶσιν ἀπ' ἀλλήλων.

Μίγμα τι ἐξ ἀπάντων τῶν φυτικῶν ἀλκαλίων κατεργάζεται πρῶτον μὲ ζέον ὕδωρ, δι' οὗ διαλύεται ἡ πικροτοξίνη· ἐὰν τὸ διάλυμα τοῦτο ἐξατμισθῇ, λαμβάνομεν τὴν πικροτοξίνην κρυσταλλώσιμον· τὸ ὑπόλειμμα κατεργάζεται μὲ καθαρὰν ἀμμωνίαν, ἥτις διαλύει τὴν μορφίνην· ὥστε, ἐξατμισθέντος αὐτοῦ τοῦ διαλύματος, κρυσταλλοῦται καὶ ἡ μορφίνη· τὰ ἐπιμένοντα τέσσαρα ἀλκάλια κατεργάζονται διὰ τοῦ λειψύδρου οἰνοπνεύματος, τὸ ὁποῖον διαλύει τὴν βρουκίνην, ἐμετίνην, καὶ βερατρίνην, ὅχι δὲ καὶ τὴν στρυχνίνην.

Ἡ βρουκίνη δύναται νὰ χωρισθῇ ἐκ τῆς ἐμετίνης καὶ βερατρίνης, ἐὰν τὸ διάλυμα ἐξατμισθῇ μέχρι σεραπίου συστάσεως ἐξοδωτερωθῇ διὰ θεϊκοῦ ὀξέος· οὕτω σχηματίζεται δυσδιάλυτος θεϊκὴ βρουκίνη, ἥτις διὰ προσεκτικῆς ἀποπλύσεως μὲ ψυχρὸν ὕδωρ δύναται νὰ χωρισθῇ ἀπὸ τὴν θεϊκὴν ἐμετίνην καὶ βερατρίνην. Τὰ ἐπιμένοντα δύο, δηλαδή ἡ ἐμετίνη καὶ βερατρίνη καταβυθίζονται ἐκ τοῦ θεϊκοῦ διαλύματος διὰ τῆς καθαρᾶς ἀμμωνίας. τὸ καταβύθισμα διαλύεται προσεκτικῶς εἰς ὀξικὸν ὀξύ κεκραμένον καὶ ἐξ αὐτοῦ καταβυθίζεται πρῶτον ἡ ἐμετίνη διὰ τοῦ ὑδρόδικου καλίου, καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησιν αὐτῆς διὰ διύλισεως καταβυθίζεται καὶ ἡ βερατρίνη διὰ τῆς ἀμμωνίας.

Ἐλθέτομεν ἐνταῦθα τὴν μέθοδον, δι' ἧς εἰς ἱατροδικαστικὰς ἐξετάσεις δυνάμεθα νὰ ἀνακαλύψωμεν τὴν παρουσίαν τῶν ἀλκαλίων τούτων ἐπὶ ὕλης τινὸς ὑπόπτου.

Μέρος τῆς πρὸς ἐξέτασιν ὕλης τεθὲν ἐπὶ πορφυροῦ ἀγγείου βρέχεται μὲ σταγόνας νιτρικοῦ ὀξέος ἀκράτου· ἐὰν προαχθῇ ζωηρὸς ἐρυθρὸς χρωματισμὸς, ἐμπεριέχεται ἡ μορφίνη, ἢ ἡ στρυχνίνη μετὰ βρουκίνης νενοθευμένη, ἢ καθαρὰ βρουκίνη, ἢ ἀκάθαρτος πικροτοξίνη. Ἐὰν ὁ διὰ νιτρικοῦ ὀξέος προαχθεὶς χρωματισμὸς ᾖ κίτρινος μεταβαλλόμενος ταχέως εἰς ἐρυθροῦν, καὶ ἂν ἡ ὕλη δὲν χρωματισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος διόλου, ἢ ἂν μόνον λάβῃ ὀλίγον κίτρινωπὸν χρωματισμὸν, ὑποπτεύεται ἡ παρουσία τῆς μορφίνης. Διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν περὶ τῆς παρουσίας τῆς μορφίνης, διαλύομεν μέρος εἰς ὀλίγον ὀξικὸν ὀξύ καὶ εἰς τὸ διάλυμα προσθέτομεν ὑδροχλωρικὸν ὀξειδίων τοῦ σιδήρου, διὰ τοῦ ὁποῖου τὸ διάλυμα, ἐὰν ἡ ἐξετασθεῖσα ὕλη ᾖ μορφίνη, λαμβάνει βαθυκυανοῦν χρῶμα.

Εἰς ἄλλο μέρος τοῦ ὀξικοῦ διαλύματος ἢ εἰς οἰνοπνευματικῶδες διάλυμα

προστίθεται διάλυσις τοῦ χρυσοῦ καὶ δι' αὐτοῦ ποράγεται κυανοῦς ἢ ὑποπράσινος χρωματισμός.

Τέλος δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ ὀξικὸν διάλυμα διάλυσιν ἰωδικοῦ νάτρου καὶ μετέπειτα τινὰ σταγόνας ἀκράτου θεϊκοῦ ὀξέος, δι' οὗ παρούσης τῆς μορφίνης, ἀποτελεῖται φαιὸς ἢ ἐρυθρόφαιος, καὶ εἰς πολλὰ κεκραμένους διαλύσεις κίτρινος χρωματισμός ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ὁσμῆς κατὰ ἰώδους.

Ἐὰν ὁ διὰ τοῦ ἀκράτου νιτρικοῦ ὀξέος προχθεῖς χρωματισμός ᾖ κατ' ἀρχὰς ῥοδόχρους, ἀκολούθως νεραντζοειδῆς, ἢ ὁ διὰ τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος κατ' ἀρχὰς ῥοδόχρους μεταβάλλεται εἰς νεραντζοειδῆ, εἰς φαιὸν καὶ τέλος εἰς μέλανα, ὑποτίθεται βρουκίνη, ἢ βρουκινιούχος στρυχνίνη. Διὰ νὰ πληροφορηθῶμεν ποία ἐκ τῶν δύο ὑπάρχει, διαλύεται μέρος εἰς ὀξικὸν ὀξύ κεκραμένον· τὸ διάλυμά του διαιρεῖται εἰς δύο μερίδας· εἰς τὴν μίαν προστίθεται διάλυμα ἐνθειοκυανικοῦ καλίου· ἐν ἡ ἐξεταζομένη φυτική θάσις συνίσταται ἐκ στρυχνίνης νενοθευμένης διὰ βρουκίνης, ἀποτελεῖται πάραυτα λευκὸν ἔζημα ἐκ μικρῶν κρυστάλλων· ἂν δὲ τὸ διάλυμα ᾖ καὶ μὲ 100 μέρη κεκραμένον, σχηματίζονται μετ' ὀλίγον πλῆθος πρισματικῶν κρυστάλλων. Ἐὰν τὸ ἀλκάλιον ᾖ τὸν βρουκίνη καὶ τὸ διάλυμά της ὅποσόν ἀκρατον, ἀποτίθενται, ἂν καὶ μετὰ τινα καιρὸν, εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ ἀγγείου μικροὶ σφαιροειδεῖς κρύσταλλοι. Εἰς τὴν ἄλλην μερίδα προστίθεται διάλυμα ἰωδικοῦ νάτρου, καὶ μετ' ὀλίγον τινὲς σταγόνες θεϊκοῦ ὀξέος, καὶ τὸ διάλυμα θερμαίνεται διὰ οἰνοπνεύματος. Ἐὰν τὸ φυτικὸν ἀλκάλιον ᾖ τὸν βρουκίνη, προκαλεῖται ἀναμεταξύ τῆς ζέσεως ῥοδόχρους χρωματισμός, ὅστις μεταβάλλεται εἰς ἰώδη ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ὁσμῆς τοῦ ἰωδίου. Ἐὰν δὲ τὸ ἀλκάλιον ᾖ τὸν στρυχνίνη νενοθευμένη μετὰ βρουκίνης, ποράγεται ἀνοικτοροδόχρους χρωματισμός ὑπὸ τὴν ἔκλυσιν ἀσθενῶς ὁσμῆς κατὰ ἰώδους.

Ἐὰν ὁ διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος προχθεῖς χρωματισμός ᾖ καὶ καὶρὸν τινα ἀσθενῶς κίτρινος, καὶ μετὰ ταῦτα μεταβάλλεται εἰς νεραντζοειδῆ, ὑπάρχει ὑποψία τῆς παρουσίας ἀκαθάρτου πικροτοζίνης· τοῦτο δὲ ἔτι μᾶλλον βεβαιοῦται, ἐὰν τὸ ἀλκάλιον διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ διὰ τοῦ ὀξικοῦ ὀξέος διάλυμά του δὲν καταβυθίζεται μῆτε ἀπὸ τὸ ὕδροχλωρικὸν ὀξειδίου τοῦ σιδήρου, μῆτε ἀπὸ τὸ ἐνθειοκυανικὸν κάλιον, μῆτε ἀπὸ τὸ ἰωδικὸν κάλιον.

Ἐὰν τὸ ἀλκάλιον λάβῃ ἀπὸ τὸ νιτρικὸν ὀξύ ἀσθενὲς κίτρινον χρῶμα δύναται νὰ ὑποτεθῇ στρυχνίνη, βερατρίνη, ἢ ἐμετίνη. Ἐὰν ὁ χρωματισμός

ἥναι ἐντελῶς κίτρινος, ὑποτίθεται στρυχνίνη, ἢ βερατρίνη. Ἡ καθαρὰ στρυχνίνη γνωρίζεται ἐκ τοῦ σχηματισμοῦ τῶν κρυστάλλων, ἐάν εἰς τὸ ὀξικὸν διάλυμα προστεθῇ ἐνθειοκυανικὸν κάλιον, καθὼς καὶ ἐκ τοῦ ῥοδοχρόου χρωματισμοῦ, ἐάν προστεθῇ ἰωδικὸν νάτρον μετὰ τινων σταγόνων θειικοῦ ὀξέος ἀκράτου· ὑποτίθεται δὲ βερατρίνη, ἐάν διεγείρῃ δυνατὸν πταρμόν, καὶ τὸ ὀξικὸν διάλυμα παρουσιάσῃ δριμείαν, ὅχι δὲ πικράν γεῦσιν, πρὸς τοῦτοις ἐάν τὸ ἐνθειοκυανικὸν κάλιον ἀποτελῇ εἰς τὸ ὀξικὸν διάλυμα λευκὸν ὅχι κρυσταλλώσιμον ἰζήμα.

Ἡ ἐμετίνη λαμβάνει ἀπὸ τὸ νιτρικὸν ὀξύ μετὰ τινα καιρὸν φαιὸν, ἀπὸ δὲ τὸ θειικὸν ὀξύ ἀνοικτοπράσινον χρῶμα· εἰς τὴν μὴ πολλὰ κεκραμένην διάλυσιν τῆς ἐμετίνης διὰ ὀξικοῦ ὀξέος προάγει τὸ ἐνθειοκυανικὸν κάλιον λευκὴν θάλωσιν, καὶ μετὰ τινα καιρὸν ἐν μέρει ἀποτίθεται εἰς τὸν πυθμένα ἰζήμα, ἐν μέρει ἐπιπολάζει ἐπὶ τοῦ ρευστοῦ. Ἐάν εἰς τὸ διάλυμα τοῦτο προστεθῇ ἰωδικὸν νάτρον καὶ τινες σταγόνες θειικοῦ ὀξέος, ἐκλύεται ὁσμὴ ὡς τοῦ ἰώδους, καὶ τὸ ρευστὸν λαμβάνει ἀσθενῶς κίτρινον χρωματισμόν, ὅστις γίνεται φαιότερος διὰ τῆς θερμάνσεως τοῦ ρευστοῦ.

Ἡ καθαρὰ πικροτοξίνη δὲν χρωματίζεται μήτε διὰ τοῦ θειικοῦ, μήτε διὰ τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, καὶ δεικνύει τὰ ἄνωθεν ἐκτεθέντα χαρακτηριστικά.

Εἰς περιστάσεις, καθ' ἃς τὸ δηλητηριῶδες φυτικὸν ἀλκάλιον δὲν εὐρίσκεται εἰς ξηρὰν κατάστασιν, ἀλλὰ ὑποτίθεται ἢ εἰς τὰ ἐμέσματα, ἢ εἰς τὰ ἐν τῷ στομάχῳ ἢ τοῖς ἐντέροις ἐμπεριεχόμενα, ἀνακαλύπτεται κατὰ τὰς ἐφεξῆς δύο μεθόδους.

α. Τὸ ρευστὸν ἀποχύνεται ἀπὸ τὰς ἐξεταζομένας ὕλας, αἵτινες κατεργάζονται δις καὶ τρίς διὰ κεκραμένου ὀξικοῦ ὀξέος. Τὰ λαμβανόμενα ὀξικά διαλύματα, ἐντὸς τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἐμπεριέχεται τὸ φυτικὸν ἀλκάλιον, ἐξατμίζονται μέχρι ξηροῦ, καὶ τὸ ξηρὸν ὑπόλειμμα κατεργάζεται δις μὲ ζέον οἰνόπνευμα· τὸ οἰνόπνευματώδες τοῦτο διάλυμα ἐξατμίζεται μέχρι συστάσεως σερapiίου, καὶ ἐξ αὐτοῦ καταβυθίζεται τὸ ἀλκάλιον διὰ καθαρᾶς ἀμμωνίας.

Τὸ ἰζήμα συνάζεται δι' ἐνὸς διῦλιστῆρος, καὶ ἀφοῦ πλυθῇ προσεκτικῶς μὲ ψυχρὸν ὕδωρ, διαλύεται ἐκ νέου εἰς ὀξικὸν ὀξύ, καὶ, προστεθέντος ζωϊκοῦ ἀνθρακος, ζέεται διὰ νὰ ἀποκατασταθῇ τὸ ρευστὸν ὅσον ἔνεστι καθαρόν· ἐξ αὐτοῦ τοῦ καθαροῦ ρευστοῦ καταβυθίζεται διὰ καθαρᾶς ἀμμωνίας, διαλύεται ἐκ νέου εἰς ζέον οἰνόπνευμα καὶ τὸ διάλυμα ἐλαφρῶς ἐξατμιζόμενον ἐκτίθεται εἰς κρυστάλλωσιν.

β'. Τὸ ἐξεταζόμενον ρευστὸν, ἀφοῦ ἀγαμιχθῇ μὲ ὀξικὸν ὀξύ, καταβυθί-

ζεται διὰ θυρσοδεφικῶν ὀξέος, δι' οὗ ἅπαντα τὰ ἀλκάλια ἐκ τῶν διαλυμάτων καταβυθίζονται· τὰ αποτελούμενα ἰζήματα ἔτι ὑγρὰ ἀναμιγνύονται μὲ κνυστικὴν τίτανον, καὶ τοῦτο τὸ μίγμα κατεργάζεται μὲ ζέον οἰνόπνευμα καὶ τὸ διάλυμα ἐξετμιζόμενον ἐκτίθεται πρὸς κρυστάλλωσιν. Ἀκολούθως ἐφαρμόζονται τὰ πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν ἀλκαλίων ἐκτεθέντα δοκιμαστήρια.

Ἐκ τῶν ἐκτιθέντων δῆλον γίνεται ὅτι ἡ ἐξέτασις στερεῶν ἢ ρευστῶν σωμάτων πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν ἐμπεριεχομένων φυτικῶν ἀλκαλίων εἶναι δυσκολωτάτη, ὅτι ἀπασχόλησε τοὺς περιφημοτέρους χημικοὺς τῆς Εὐρώπης καὶ ὅτι δύναται νὰ δώσῃ ἀφορμὴν συγχύσεως καὶ ἀπάτης. Προσέτι ὀφειλομεν νὰ σημειώσωμεν ὅτι εἰς ἱατροδικαστικὰς ἐξετάσεις ἀπαιτεῖται νὰ ἀποδειχθοῦν ἅπαντα τὰ ρηθέντα ἀποτελέσματα διὰ διαφόρων συγκριτικῶν δοκιμασιῶν ὡς πρὸ ἐκεῖνο τὸ ἀλκάλιον, τὸ ὁποῖον νομίζομεν ὅτι ἀνεκαλύψαμεν.

Περὶ τῆς τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν ἀναλύσεως.

Αἱ ὑλαι, τῶν ὁποίων ἡ σύνθεσις ἐξετάζεται, συνίστανται ἐξ ὀξυγόνου, ἀνθρακός, ὑδρογόνου, καὶ ἐνίοτε ἐκ νιτρογόνου. Ἡ ἐξέτασις αὕτη ἀποτελεῖται διὰ τῆς ὀξειδώσεως αὐτῶν τῶν ὑλῶν, διὰ τοῦ χλωρικοῦ καλίου, καθὼς καὶ διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ. Τοιοῦτοτρόπως μεταβάλλεται τὸ ὑδρογό-
νον εἰς ὕδωρ καὶ ὁ ἀνθράξ εἰς ἀνθρακικὸν ὀξύ· μόνον δὲ τὸ νιτρογόνον δὲν ὀξειδοῦται, ἀλλὰ λαμβάνεται ὡς νιτρογόνον ἀέριον. Ἐὰν τὸ κατὰ τὸν ἐκτεθέντα τρόπον σχηματισθὲν ὕδωρ σταθμισθῇ ἀκριβῶς, ὁ δὲ ὄγκος τοῦ ληφθέντος ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ νιτρογόνου μετρηθῇ, τότε δύναται νὰ εὐρεθῇ ἡ σύνθεσις τοῦ ἐξετασθέντος σώματος· Τὸ ποσὸν τοῦ ὀξυγόνου δύναται νὰ προσδιορισθῇ ἐκ τῆς ἐλαττώσεως.

Ὁ Gay Lussac καὶ ὁ Thenard μετεχειρίσθησαν πρὸς ὀξειδῶσιν τῶν ὀργανικῶν σωμάτων χλωρικὸν κάλιον, τὸ ὁποῖον ὅμως δὲν μετεχειρίζον-
ται πλέον τὴν σήμερον. Ἡ ἐξεταζομένη οὐσία, ἀναμεμιγμένη μετὰ τοῦ ρηθέντος ἁλτος ἐπυροῦτο καὶ οὕτως ὀξειδόνοντο τὰ στοιχεῖα διὰ τοῦ ἐκ τοῦ χλωρικοῦ καλίου ἐκλυομένου ὀξυγόνου.

Ἡ μέθοδος, τὴν ὁποίαν προηγουμένως μετεχειρίζετο ὁ Berzelius πρὸς ἀνάλυσιν τῶν ὀργανικῶν σωμάτων, ἐσυνίστατο ἐκ τῶν ἐξῆς πράξεων.

Ἡ πρὸς ἐξέτασιν οὐσία καθαρὰ ἢ περιέχουσα ὀξειδίου τοῦ μαλύ-
δου, ἀναμιγνύεται μὲ χλωρικὸν κάλιον, καὶ τὸ μίγμα τοῦτο τίθεται

εἰς μακρόν ὕδρινον σωλῆνα, εἰς τὴν μίαν ἄκραν κλεισμένον καὶ τοῦ ὁποίου ἡ διάμετρος εἶναι περίπου $\frac{1}{2}$ δάκτυλος.

Ἡ σύμμιξις γίνεται ὡς ἐφεξῆς. Ἡ οὐσία τιθεμένη εἰς ὄλμον, μέχρι 100 περίπου βαθμοὺς θερμανθέντα, ἀναμιγνύεται μετὰ 5—6 μερῶν ξηροῦ χλωρικοῦ καλίου, μετὰ ταῦτα δὲ μὲ τὸ 10—12 πλοῦν ἀρτιχύτου χλωρικοῦ νάτρου. Εἰς τὴν σύμμιξιν ταύτην ἀπαιτεῖται ἀρκετὴ προσοχή, καὶ πρὸς τοῦτοισι πρέπει νὰ διατηρηθῇ ὁ ὄλμος, ἐν ᾧ γίνεται ἡ σύμμιξις, ἀρκετὰ θερμὸς διὰ νὰ μὴν ἀφαιρεθῇ ὑγρασία ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας. Τὸ μίγμα τίθεται εἰς τὸν σωλῆνα καὶ τὸ εἰς τὸν ὄλμον προσκολληθὲν ἐκβάλλεται δι' ὀλίγου χλωρικοῦ νάτρου.

Εἰς τὸ κάτω ἄκρον τοῦ σωλῆνος τίθεται μίγμα ἐκ χλωρικοῦ νάτρου καὶ χλωρικοῦ καλίου, καὶ ἐπ' αὐτοῦ τὸ προβῆναι μίγμα, ἐπ' αὐτοῦ δὲ πάλιν ἕτερον ἐκ χλωρικοῦ νάτρου καὶ χλωρικοῦ καλίου. Τοιοῦτατρόπως εὐρίσκεται τὸ ἐξεταζόμενον μίγμα μεταξύ δύο στιβάδων χλωρικοῦ καλίου, ὥστε ἡ ἐγχείρισις ἄρχεται μὲ τὴν ἐκκυσιν τοῦ ὀξυγόνου.

Ἀφοῦ ὅλον τὸ μίγμα ἐγκλεισθῇ εἰς τὸν σωλῆνα, συντήκεται καὶ τὸ ἄλλο ἄκρον αὐτοῦ καὶ ἐκτείνεται πρὸς αἰχμὴν ὑπὸ ἀμβλείαν γωνίαν. Ἡ ῥηθείσα αἰχμὴ ἐμβυθίζεται εἰς ὅσον ἔνεστι μικρὸν ἀγγεῖον, χρησιμεῦον ὡς δοχεῖον, ἔχον τὸ σχῆμα 2, καὶ συναρμάζεται μετὰ τοῦ δοχείου διὰ ἐλαστικοῦ κόμμεως. Εἰς τοῦτο τὸ δοχεῖον συναῖζεται τὸ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως σχηματισθὲν ὕδωρ· ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ δυνηθῇ νὰ ἐξατμισθῇ παντάπασιν τὸ ὕδωρ τοῦτο, διοχετεύονται τὰ συγχρόνως ἐκλυόμενα ἀέρια δι' ἄλλου σωλῆνος, εἰς τὸν ὁποῖον εὐρίσκεται ἀρτιχύτος ὑδροχλωρικὴ τίτανος. (σχῆμα 3.) Ὁ σωλὴν οὗτος κοινωνεῖ δι' ἄλλου κυρτοῦ, εἰσερχομένου εἰς τὴν συσκευὴν τοῦ ὑδραργύρου, εἰς ἣν συνάγονται τὰ διὰ τῆς καύσεως ἐκλυόμενα ἀέρια. Τὸ σχῆμα 4 παριστάνει τὴν περιγραφείσαν συσκευὴν.

Σημειωτέον ἐνταῦθα ὅτι τόσον τὸ δοχεῖον, καθὼς καὶ ὁ σωλὴν ὁ ἐμπεριέχων τὴν ὑδροχλωρικὴν τίτανον, πρέπει νὰ σταθμισθῶσι πρὸ τοῦ ἀρχίσῃ ἡ ἐγχείρισις. Διὰ νὰ μὴ φθαρῇ τόσον εὐκόλως ὁ σωλὴν, περιβάλλεται μετὰ ἐλάσματος ἐκ κασσιτερωμένου σιδήρου καὶ οὕτως ἐντίθεται εἰς κατάλληλόν τινα κλίβανον. Ἡ θέρμανσις ἄρχεται ἀπὸ τὸ ἐμπροσθεν τοῦ σωλῆνος πρὸς τὸ ὀπισθεν. Τὸ ποσὸν τῆς ἀναλυομένης οὐσίας δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὸ $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ ἐνὸς γραμμίου.

Ἐὰν ἡ ὀργανικὴ οὐσία ἐμπεριέχῃ μόνον ὕδρογόνον, ὀξυγόνον καὶ ἀνθρακικὴν ὕλην, τότε προσδιορίζεται μόνον τὸ ποσὸν τοῦ σχηματιζομένου ὕδατος καὶ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Περὶ τοῦ ποσοῦ τοῦ ὕδατος πληροφο-

ρούμεθα, ἐὰν σταθμίσωμεν αὐτὸ μετὰ τοῦ σωλῆνος καὶ τοῦ δοχείου· ὅσον δηλαδὴ ἡ συσκευή σταθμίζει περισσότερον, παρὰ πρὸ τῆς ἐγχειρίσεως, θεωρεῖται προσερχόμενον ἀπὸ τὸ σχηματισθὲν ὕδωρ.

Τὸ ποσὸν τοῦ ληφθέντος αέριου, τὸ ὁποῖον συνάζεται εἰς εὐρύχωρον κώδωνα, δύναται νὰ προσδιορισθῇ ἢ κατὰ τὸ βάρος, ἢ κατὰ τὸν ὄγκον. Εἰς τὸν κώδωνα ἐντίθεται μικρὸν ὑέλινον δοχεῖον, ἐμπεριέχον ἔνυδρον κάλιον, δεδεμένον μὲ δέρμα μαλακὸν καὶ ἔχον τὸ σχῆμα 5. Ἀφοῦ τὸ τοῦ δοχείου βάρος γνωρισθῇ, δένεται εἰς τὸ κάτω μέρος διὰ λεπτοῦ σιδηροῦ σύρματος, δι' οὗ ἐμβάλλεται διὰ τοῦ ὑδράργυρου εἰς τὸν κώδωνα. Μετὰ παρέλευσιν 12 περίπου ὥρῶν ἐκβάλλεται, καὶ ἀφοῦ καθαρισθῇ ἀπὸ τὸν μηχανικῶς ἐπικεκολλημένον ὑδράργυρον, σταθμίζεται. Ἡ τοῦ βάρους αὐξήσις φανερώνει τὸ ποσὸν τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος.

Ὅταν θέλουν νὰ προσδιορίσωσι τὸ αέριον ὡς πρὸς τὸν ὄγκον, μεταχειρίζονται πρὸς σύναξιν τοῦ ὑελίνους σωλῆνας διηρημένους εἰς κυβικούς δακτύλους. Τὸ δὲ εἰς τὸ ἐκλύομενον αέριον ὑπάρχον ἀνθρακικὸν ὀξὺ ἀποχωρίζεται κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον, καὶ οὕτως πληροφορούμεθα περὶ τοῦ ὄγκου τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος καὶ ἐξ αὐτοῦ δυνάμεθα νὰ λογαριάσωμεν τὸ ποσὸν τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης.

Εἰς τὴν ἀνάλυσιν νιτρογονούχων οὐσιῶν δὲν δύναται νὰ μεταχειρισθῇ τὸ χλωρικὸν κάλιον, καθότι διὰ τοῦ πλείονος ποσοῦ τοῦ ὀξυγόνου δύναται νὰ σχηματισθῇ νιτρικὸν ὀξὺ, ἀλλὰ ἡ ἀνάλυσις αὕτη ἀποτελεῖται διὰ τῆς καύσεως διὰ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ.

Τὸ πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν μεταχειριζόμενον ὀξείδιον τοῦ χαλκοῦ κατασκευάζεται διὰ τῆς διαλύσεως τοῦ χαλκοῦ εἰς καθαρὸν νιτρικὸν ὀξὺ· ἐξατμιζομένου δὲ τοῦ διαλύματος μέχρι ξηροῦ, πυροῦται τὸ ἐπιμένον εἰς χύτραν ἐκ λευκοχύστου. Ἐὰν πυρωθῇ ἀρκούντως, ἐκλύεται ὅλον τὸ νιτρικὸν ὀξὺ καὶ τὸ ἐπιμένον ὀξείδιον δύναται νὰ θεωρηθῇ καθαρόν. Τὸ μόνον δυσάρεστον εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ εἶναι, ὅτι ἀπορρόφᾷ εὐκόλως ὑγρασίαν ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας· διὰ τοῦτο ἀπαιτεῖται νὰ πυρωθῇ τὸ ὀξείδιον ἀμέσως πρὶν ἀρχίσῃ ἡ πρᾶξις, νὰ σταθμίζεται ἔτι θερμὸν καὶ νὰ ἀναμιγνύεται ὅσον ἔνεστι τάχις μετὰ τοῦ ἐξεταζομένου σώματος εἰς θερμὸν ὅλμον. Τὸ μίγμα τίθεται ἀκολούθως εἰς τοὺς καταλλήλους σωλῆνας.

Ἡ διὰ τῆς καύσεως μὲ ὀξειδωμένον χαλκὸν ἀνάλυσις τῶν ὀργανικῶν σωμάτων τῶν μὴ ἐμπεριεχόντων νιτρογόγον, ἐτελειοποιήθη διὰ τῶν

νιωτέρων εξετάσεων τοῦ Liebig εἰς τρόπον ὥστε τοιαῦται ἀναλύσεις δὲν θεωροῦνται πλέον ὡς πολὰ δύσκολοι.

Ὁ Liebig μεταχειρίζεται στενὸν καὶ περίπου 24 δακτύλους μῆκος ἔχοντα σωλῆνα ἐκ δυστήκτου ὑέλου κατασκευασμένον. Τὸ ἐν ἄκρον αὐτοῦ, δι' οὗ διοχετεύονται τὰ ἀέρια, ἐκτείνεται καὶ κάμπτεται ὡς τὸ β γ δ (σχ. 6.) Εἰς τὸ β ἐντίθεται χαλκὸς κεκομμένος εἰς σμικρὰ καὶ λεπτὰ κομμάτια, τὰ ὅποια προλαβόντως πυροῦνται χωρὶς πλέον νὰ ἐγγιχθῶσι διὰ τῶν χειρῶν.

Ὁ σωλὴν πληροῦται διὰ τοῦ στομίου α μετὰ τὸ ἐξεταζόμενον μίγμα, καὶ ἀφοῦ ἐπιτεθῇ ἐπ' αὐτοῦ προσέτι μικρὸν ποσὸν προσφάτως πεπυρωμένου καὶ ἔτι θερμοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ, θερμαίνεται ὁ σωλὴν διὰ τινος λύχνου· ὁ δὲ σωλὴν πρέπει ν' ἀπομακρυνθῇ τόσον ἀπὸ τὸ α, ὥστε εἰς αὐτὸ νὰ μὴ δύναται νὰ εἰσέλθῃ ὑγρασία ἢ καπνὸς ἐκ τῆς φλογός. Ὁ θερμαινόμενος σωλὴν ἐκτείνεται καὶ κάμπτεται ὡς εἰς τὸ α ε.

Ὁ Liebig ἐκτείνει λοιπὸν αὐτὸ τὸ μέρος τόσον, ὥστε ὅλος ὁ σωλὴν δύναται νὰ ἐμβαπτισθῇ ὀριζοντίως εἰς ἀρμόδιον ἀγγεῖον, τὸ ὅποιον ἐμπεριέχει ζέον ὕδωρ. Ἀφοῦ μετὰ ταῦτα διοχετευθῇ διὰ τοῦ σωλῆνος λείψυδρος ἀτμοσφαιρικός ἀήρ, συντήκεται ὁ ἐκτανθεὶς σωλὴν περίπου ἓνα δάκτυλον περισσότερον ἀπὸ τὸ α. Τὸ ὀριζοντίως κείμενον μέρος τοῦ σωλῆνος, τὸ ἐμπεριέχον τὸ μίγμα, δὲν περιβάλλεται μετὰ σιδηροῦν ἔλασμα· καθότι ἡ ὑελος εἶναι δίστηκτος καὶ σπανίως διαρρήγνυται. Ὁ Mitscherlich ἐνθέτει τὸν σωλῆνα εἰς ἄλλον σιδηροῦν, ἀλλ' εἰς τρόπον ὥστε ἡ ὑελος νὰ μὴν ἐγγίξῃ τὸν σίδηρον. Τὸ μέρος β γ δ εἶναι κυρτὸν διὰ νὰ ἐμποδίζεται διὰ τινος κωλύματος τιθεμένου ὑπὸ τὸ γ ἢ ἐνέργεια τοῦ τὸν σωλῆνα περιβάλλοντος πυρὸς ἐπὶ τοῦ λοιποῦ μέρους τῆς συσκευῆς, τὸ ὅποιον πρέπει νὰ μένῃ ψυχρόν.

Συνίσταται δὲ αὐτὸ τὸ μέρος ἀπὸ ὑέλινον σωλῆνα (σχ. 7) πεπληρωμένον μετὰ μικρὰ κομμάτια ταχείτης ἐγγλωρίου τιτάνου· εἰς τὸ στόμιον αὐτοῦ α προσαρμόζεται ὁ κυρτὸς σωλὴν γ δ καὶ οἱ ἄρμοι κλείονται μετὰ ἐλαστικὸν κόμμι.

Διὰ τοῦ τὸ ἐγγλωρίου τιτάνιον ἐμπεριέχοντος σωλῆνος διοχετεύεται τὸ ἐκλύομενον ἀέριον εἰς μικρὰν συσκευὴν, ἥτις ἐμπεριέχει ἔνυδρον κάλιον· κατασκευάζεται δὲ αὕτη κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Ὑέλινος σωλὴν α β (σχ. 8) πλάσσεται διὰ τῆς ἐμφυσίσεως οὕτως, ὥστε εἰς τὴν μέσσην τοῦ σχηματίζονται τρεῖς σφαῖραι γ, δ καὶ ε, ἀπέχουσαι ἀλλήλων ὀλίγον διάστημα· μετὰ ταῦτα πλάσσονται, 3—3 $\frac{1}{2}$ δακτύλους μακρὰν ἀπὸ

τάς δύο εἰς τὰ ἄκρα σφαίρας, δύο ἄλλαι ζ καὶ η, αἰτίνες εἶναι τοῦλάχιστον διπλάσιαι τῆς σφαίρας δ. Ὁ σωλὴν κάμπτεται λοιπὸν εἰς τὸ λ, θ καὶ ι καθὼς καὶ εἰς τὸ Α, διὰ νὰ λάβῃ ἡ συσκευὴ τὴν μορφήν τοῦ σχήματος 9. πρέπει ὅμως νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι εἰς τοῦτο τὸ σχῆμα ἡ ἀπὸ τὸ α κ ι λ καὶ θ σχηματιζομένη γραμμὴ πρέπει νὰ ᾖ καὶ κάθετος πρὸς τὸ ι κ, ἡ ὁποία θέσις δὲν δύναται νὰ λιθογραφηθῇ ἀκριεστὰ ἀκριβῶς.

Εἰς ταύτην τὴν συσκευὴν χύνεται ἡ διάλυσις τοῦ ἐνύδρου καλίου οὕτως, ὥστε ὄχι μόνον αἱ σφαῖραι γ δ νὰ ᾖναι πεπληρωμέναι ἀπὸ αὐτῇ, ἀλλὰ ν' ἀναβῇ τὸ διάλυμα καὶ ὀλίγον εἰς τὰς σφαῖρας ζ καὶ η· μετὰ ταῦτα ἐνοῦται τὸ στόμιον α διὰ σωλῆνος ἐξ ἐλαστικοῦ κόμμεως μὲ πολλὰ μικρὸν ὑέλινον σωλῆνα ἐμπεριέχοντα ἀδρομερῶς κοπανισμένον ἐγγλῶριον τιτάνιον καὶ λήγοντα εἰς πολλὰ λεπτὸν στόμιον. Ζυγίζεται λοιπὸν ὅλη ἡ συσκευὴ, καὶ ἀφοῦ τὸ βάρος τῆς σημειωθῇ, ἐνοῦται τὸ ἄκρον β διὰ ἐλαστικοῦ κόμμεως μὲ τὸ ἄκρον β τοῦ σωλῆνος (σχ. 7), ὥστε ὅλη ἡ συσκευὴ εἶναι ὡς τὴν παριστάνει τὸ σχ. 10.

Ἡ τοῦ σωλῆνος πύρωσις γίνεται ἀπὸ τὸ β ἕως τὸ α ε (σχ. 6)· εἰς μὲν τὸν σωλῆνα, ὅστις ἐμπεριέχει τὸ ἐγγλῶριον τιτάνιον συνάγεται τὸ ὕδωρ, εἰς δὲ τὴν τὸ κάλιον ἐμπεριέχουσαν συσκευὴν τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ. Δὲν ἐξέρχεται δὲ ἄλλο ἀέριον, παρὰ ὃ ἐν τῇ συσκευῇ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ, ἐπειδὴ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ, διερχόμενον ἀπὸ σφαῖραν εἰς σφαῖραν, ἀπορροφᾷται ὅλον ὑπὸ τοῦ διαλύματος τοῦ καλίου. Ὁ εἰς τὸ ἄκρον α εὐρισκόμενος σωλὴν, ἐμπεριέχων ἐγγλῶριον τιτάνιον, δέχεται τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον ἐξατμίζεται ἴσως ἐκ τοῦ διαλύματος τῆς ποτάσης. Ἀφοῦ πυρωθῇ ὁ σωλὴν ἀπὸ τὸ ἐν ἕως τὸ ἄλλο πέρας, καὶ εἰς τὴν σφαῖραν ε δὲν φαίνονται πλέον πομφόλυγες, ἀλλὰ τὸ ρευστὸν ἄρχεται νὰ κατέρχεται κατ' ὀλίγον εἰς τὸ η, θεωρεῖται ἡ πρᾶξις τελειωμένη. Τὸ στόμιον τοῦ ἐλευθέρου σωλῆνος τοῦ ἐμπεριέχοντος τὸ ἐγγλῶριον τιτάνιον ἐνοῦται μετὰ ταῦτα μὲ ἀπορροφητικὴν συσκευὴν. Τὸ ρύγχος α ε τοῦ διὰ τὴν καῦσιν σωλῆνος ἀποθραύεται, καὶ εὐθὺς προσαρμόζεται δι' ἐλαστικοῦ κόμμεως μικρὸς σωλὴν πλήρης ἐνύδρου καλίου. Ἀπορροφᾷται λοιπὸν ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ ἐκ τοῦ διὰ τὴν καῦσιν σωλῆνος, ὅπου συναπτόμενος μὲ τὸ ἐνύδρον κάλιον ἐλευθερῶται ἀπὸ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ καὶ τὸ ὕδωρ. Ἐπειτα δὲ εἰσερχόμενος διὰ τοῦ α καὶ ε ἀπορροφᾷ τὰ μόρια, τὰ ὁποῖα ἔμειναν εἰς τὸν διὰ τὴν καῦσιν σωλῆνα, καὶ τὰ ἀποθέτει εἰς τὰς προσδιορισμένας ἀρμοδίους συσκευάς.

Ἀφοῦ ἡ συσκευὴ διαλυθῇ, ζυγίζονται ὁ τὸ ἐγγλῶριον τιτάνιον

ἐμπεριέχων σωλὴν καὶ ἡ διὰ καλίου συσκευὴ· ἡ τοῦ σωλῆνος αὐξήσις ὡς πρὸς τὸ βάρος δεικνύει τὸ σχηματισθὲν ὕδωρ, ἐκ τοῦ ὁποίου δύναται νὰ λογαριασθῇ τὸ ποσὸν τοῦ ὑδρογόνου, ἡ δὲ τῆς συσκευῆς αὐξήσις εἶναι ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἐκ τοῦ ὁποίου εὐρίσκεται τὸ ποσὸν τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης. Τὸ δὲ ἐλλείπον μέρος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἀναλυθείσης ὕλης εἶναι ὀξυγόνον.

Ἄν θελή τις νὰ ἀναλύσῃ πτητικὰ ἢ ῥευστὰ σώματα, πρέπει νὰ μεταχειρισθῇ ἄλλα μέτρα· λιπαρὰ ἐλαία λ. χ. ζυγίζονται εἰς κατάλληλον ἀγγεῖον καὶ σταλάζονται ἐπὶ τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ, ὥστε μεταξὺ ἐκάστης σταγόνος εὐρίσκεται στιβὰς τοῦ ὀξειδίου. Διὰ μέσου τινὸς σπειροειδοῦς σύρματος ἐκ χαλκοῦ δύναται μετὰ προσοχῆς νὰ γίνῃ καὶ ἡ σύμμιξις. Τὸ βάρος τοῦ ἐνσταλαχθέντος ἐλαίου λαμβάνεται, ζυγίζομένου τοῦ ἀγγείου καὶ τοῦ ἐν αὐτῷ ὑπολείμματος. Πτητικὰ ῥευστὰ ἐγκλείονται εἰς μικρὰν διὰ τοῦ λύχνου ἐκτεινομένην φιάλην, ἔχουσαν τριχοειδῆ στόμια. Ἡ ἀκριβῶς ζυγισθεῖσα φιάλη πληροῦται εἰς τὴν 0° R ἐντελῶς μὲ τὸ ῥευστὸν, καὶ ἀφοῦ κλεισθῶσι τὰ στόμια διὰ τῆς τήξεως, ὥστε νὰ μὴν ἐπιμεινῇ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ ἐν τῇ φιάλῃ, ζυγίζεται αὐτὴ ἐκ νέου καὶ τίθεται εἰς τὸ ὀπισθεν τρίτον τοῦ διὰ τὴν καύσιν σωλῆνος μεταξὺ τοῦ χαλκοξειδίου· τὰ δὲ ἐμπροσθεν δύο τρίτα τοῦ σωλῆνος εἶναι πεπληρωμένα κατὰ τὸν κοινὸν τρόπον ἀπὸ χαλκοξειδίου. Ἀφοῦ γίνωσιν ὅλα ταῦτα, συναρμύζεται ἡ συσκευὴ. Τὸ ἄνωθεν μέρος τοῦ διὰ τὴν καύσιν σωλῆνος θερμαίνεται μέχρι πυρώσεως· μετὰ ταῦτα δὲ θερμαίνεται καὶ ἐκεῖνο τὸ μέρος, ὅπου εὐρίσκεται ἡ σφαῖρα τῆς φιάλης, μέχρι τῆς 40°, ὥστε αὐτὴ διαρρήγνισται, ὅχι ὁμῶς διὰ τῆς ἀναθυμιάσεως τοῦ ῥευστοῦ, ἀλλὰ διὰ τῆς θερμοσκοπικῆς ἐκτάσεως αὐτῆς. Τέλος προχωρεῖ ἡ πύρσις ὀλίγον κατ' ὀλίγον πρὸς τὸ ὀπισθεν.

Ἡ ἀνάλυσις τῶν σωμάτων, τὰ ὁποῖα σύγκεινται μόνον ἐξ ἀνθρακικῆς ὕλης, ὑδρογόνου καὶ ὀξυγόνου, ἔφθασε διὰ τὴν συσκευὴν τοῦ Liebig εἰς τὸν ἀνώτατον βαθμὸν τῆς ἀκριβεῖας καὶ ἐντελείας· ἀλλὰ τοῦτο δὲν ὑπάρχει καὶ εἰς τὴν ἀνάλυσιν ἐκείνων τῶν σωμάτων, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουσι καὶ νιτρογόνον, πρὸ πάντων διότι τὸ νιτρογόνον δὲν δύναται νὰ συναχθῇ, εἰμὴ ὡς νιτρογόνον ἀέριον, καὶ διότι μὲ αὐτὸ συμμιγνύεται πάντοτε ἡ ἀπροσδιόριστος ποσότης ὑδρογόνου, ἥτις ἐμπεριέχεται ἐξ ἀρχῆς εἰς τὸν ἐν τῇ συσκευῇ ἐγκεκλεισμένον ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Πρὸς τούτοις ἐὰν τὸ ποσὸν τοῦ ὑδρογόνου ἦναι πολλὰ μικρὸν, καθὼς συμβαίνει πολλάκις, μικρὸν σφάλμα εἰς τὴν ἀνάλυσιν κάμνει· πολλὰ σημαντικὸν λάθος εἰς τὸν λογαριασμόν. Ἐν γένει πρέπει νὰ

ὁμολογήσωμεν, ὅτι ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀτόμων τὸ ποσὸν τοῦ νιτρογόνου δὲν εἶναι διωρισμένον μὲ τὴν ἀπαιτουμένην ἀκρίβειαν παρὰ εἰς πολλὰ ὀλίγα μόνον νιτρογονοῦχα σώματα.

Πολλὰ ἀπλῇ μέθοδος πρὸς προσδιορισμὸν τοῦ ποσοῦ τοῦ νιτρογόνου εἶναι ἡ ἐξῆς. Ἀφοῦ ἡ πύρωσις διαρκέσῃ καιρὸν τινα καὶ ὁ ἐν τῇ συσκευῇ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ ἐξαχθῇ διὰ τῶν σχηματιζομένων ἀερίων, συνάζεται μικρὸν ποσὸν τοῦ ἀερίου χωριστὰ, καὶ διορίζονται οἱ ἐν αὐτῷ ἀνάλογοι ὄγκοι τοῦ νιτρογόνου ἀερίου καὶ τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος· ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέος ἀτόμων τῶν ἐμπεριεχομένων εἰς ὅλην τὴν μάζαν εὐρίσκεται μετὰ ταῦτα διὰ τοῦ λογαριασμοῦ ὁ ἀριθμὸς τῶν τοῦ νιτρογόνου ἀτόμων. Ἡ μέθοδος αὕτη δύναται νὰ μεταχειρισθῇ εἰς τὰς κυανούχους ἐνώσεις, αἵτινες ἐμπεριέχουσιν ἴσον ἀριθμὸν ἀτόμων νιτρογόνου καὶ ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ εἰς τὰς ὁποίας μικρὸν σφάλμα εἶναι ὅλως διόλου ἀσήμαντον· εἰς δὲ τὰ ὀργανικὰ νιτρογονοῦχα σώματα δὲν δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν, ὅτι εἰς ὅλας τὰς περιόδους τῆς πυρώσεως, σχηματίζεται ἡ αὐτὴ ποσότης νιτρογόνου ἀερίου καὶ ἀνθρακικοῦ ὀξέος· καθότι πολλάκις σχηματίζεται διὰ τῆς κατ' ἀρχὰς ἐνεργούσης πυρώσεως νιτρογονοῦχος ἀνθράξ, ὅστις δὲν κατακαίεται ἐντελῶς, εἰμὴ διὰ περαιτέρω αὐξήσεως τῆς θερμότητος. Καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀνάλυσιν τῶν νιτρογονούχων σωμάτων ἡ ὑπὸ τοῦ Liebig ἐφευρεθεῖσα μέθοδος εἶναι ἡ ἀσφαλεστέρα, ἥτις ἐπιστηρίζεται εἰς τὰ ἐξῆς.

Κατὰ πρῶτον διορίζεται διὰ τῆς περιγραφείσης συσκευῆς ἡ ποσότης τῆς ἀνθρακικῆς ὕλης καὶ τοῦ ὑδρογόνου, μετὰ ταῦτα δὲ προσδιορίζεται ἐξ ἄλλης περισσοτέρας ποσότητος τῆς ἐξεταζομένης οὐσίας μόνον τὸ ἐν αὐτῇ ἐμπεριεχόμενον νιτρογόνον, τὸ ὁποῖον συναχθὲν εἰς ἀεροειδῆ κατάστασιν μετράται ὡς πρὸς τὸν ὄγκον του, καὶ ἐξ αὐτοῦ δύναται νὰ εὐρεθῇ τὸ βάρος. Εἰς τὴν πρᾶξιν ταύτην διοχετεύεται τὸ ἀέριον εἴτε διὰ τῆς περιγεγραμμένης συσκευῆς, ἢν θέλῃ τις νὰ ζυγίσῃ καὶ τὸ σχηματιζόμενον ὕδωρ, εἴτε μόνον διὰ τινος σωλῆνος ἐμπεριέχοντος μεγαλύτερα κομμάτια ἐνύδρου καλίου, τὰ ὁποῖα ἀπορρόφουσι τόσον τὸ ὕδωρ, καθὼς καὶ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ.

Εἰς τὴν ἀνάλυσιν τῶν νιτρογονούχων ὀργανικῶν σωμάτων πρέπει νὰ στήσωμεν τὴν προσοχὴν μας εἰς τὰ ἐξῆς·

α. *Νὰ ἐμποδίσωμεν τὸν σχηματισμὸν τοῦ ὀξειδωμένου νιτρογόνου.*

Ὁ Gay Lussac συμβουλεύει νὰ μεταχειρισθῶσι λεπτὰ φυλλῖδια χαλκοῦ, τὰ ὁποῖα τίθενται ἐπὶ τῆς μετὰ τοῦ χαλκοξειδίου ἀναμειγμένης

ὀργανικῆς οὐσίας καὶ διατηροῦνται εἰς πύρωσιν διαρκούσης τῆς πράξεως διὰ νὰ ἀποκατασταίνωσι τὸ νιτρογονοξειδίου εἰς νιτρογόνον ἀέριον. Ὁ Liebig συμμιγνύει τὸ ἐκ χαλκοξειδίου καὶ τῆς ὀργανικῆς ὕλης συνιστάμενον μίγμα μὲ τὸ ἥμισυ ὡς πρὸς τὸ βάρος λεπτοτάτου μεταλλικοῦ χαλκοῦ, ἢ λαμβάνει χαλκοξειδίον, τὸ ὁποῖον μετεχειρίσθη καὶ ἄλλοτε πρὸς ἀνάλυσιν καὶ ἐπομένως ἐμπεριέχει μεταλλικὸν ἢ τοῦλάχιστον ὑποξειδωμένον χαλκόν. Πλέον ἀσφαλῆς φαίνεται ἡ μέθοδος τοῦ Dumas, ὅστις μεταχειρίζεται, ὡς ὁ Gay Lussac, μεταλλικὸν χαλκόν, ἀλλὰ κατ' ἐξοχὴν τοιοῦτον, ὅστις ἐλήφθη διὰ τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ χαλκοξειδίου μὲ ὑδρογόνον ἀέριον, ἢ ἐὰν λεπτὰ ἐλάσματα χαλκοῦ κεκομμένα ὠξειδωθῇσαν διὰ τῆς πυρώσεως, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπεκαταστάθηνσαν πάλιν διὰ ὑδρογόνου ἀερίου. Μὲ τοῦτον τὸν χαλκόν πληροῦται σωλὴν 3—3 $\frac{1}{2}$ δακτύλων μῆκος ἔχων, ὅστις διατηρεῖται μέχρι τοῦ τέλους τῆς πράξεως εἰς δυνατὴν πύρωσιν καὶ διὰ νὰ μὴ φθαρῇ περιβάλλεται μὲ μεταλλικὸν ἔλασμα. Ὁ αὐτὸς χαλκὸς δύναται νὰ χρησιμεύσῃ καὶ δι' ἄλλας πράξεις, ἀφοῦ πυρωθῇ εἰς ὑδρογόνον ἀέριον.

β'. *Νὰ ἐξαρτηθῇ τὸν ἐν τῇ συσκευῇ πρὸ τῆς δοκιμῆς ἐμπεριεχόμενον ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα*, τοῦ ὁποίου τὸ ποσὸν εἶναι ἄγνωστον, καὶ τὸ ὁποῖον ἄλλως πῶς ἤθελε προστεθῇ μετὰ τὸ τέλος τῆς δοκιμῆς εἰς τὸ νιτρογόνον ἀέριον.

Τοῦτο κατορθοῦται, ἐὰν διὰ τινος καταλλήλου πνευματικῆς ἀντλίας ἀντληθῇ ὅλος ὁ εἰς τὴν συσκευὴν ἐμπεριεχόμενος ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ.

γ'. *Νὰ ἀποφύγῃ τὸ λάθος*, τὸ ὁποῖον προέρχεται ἀπὸ τὰ εἰς τὴν συσκευὴν ἐπιμένοντα ἀέρια μετὰ τὸ τέλος τῆς πυρώσεως.

Ταῦτα ἐκδιώκονται ἐκ τῆς συσκευῆς διὰ τῆς διοχετεύσεως ἀνθρακικοῦ ἀερίου· πρὸς τοῦτον τὸν σκοπὸν ὁ K. Dumas θέτει ὀλίγον ἀνθρακικὸν ὠξειδωμένον μόλυβδον εἰς τὸ ἄκρον τοῦ διὰ τὴν καύσιν σωλῆνος καὶ τὸ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως αὐτοῦ ἐκλυόμενον ἀνθρακικὸν ὀξύ διώκει τὰ μόρια τοῦ νιτρογόνου ἀερίου.

Εἶναι διόλου περιττὴ ἡ χρῆσις τῆς ἀντλίας, ἐὰν πρὸ τῆς ἀρχῆς τῆς πράξεως μετοχετευθῇ καιρὸν τινα ἀνθρακικὸν ὀξύ διὰ τοῦ πρὸς καύσιν σωλῆνος· μόνον δὲ τὸ ποσὸν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται εἰς τὸν τὸ ἔνυδρον κάλιον ἐμπεριέχοντα σωλῆνα, δὲν δύναται νὰ ἀφαιρεθῇ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον.

Τὸ νιτρογόνον ἀέριον συνάγεται ὑπὲρ ὑδράργυρον εἰς σωλῆνα διηρημένον ἀκριβῶς. Πρὶν μετρηθῇ ὁ ὄγκος τοῦ νιτρογόνου ἀερίου διαπερᾶται κομμώτιον ἐνύδρου καλίου εἰς λεπτὸν σιδηροῦν σύρμα καλῶς διαπεπυρωμένον καὶ τίθεται εἰς τὸν κώδωνα, διὰ τὴν ἀπορρόφησιν ὅλην τὴν ὑγρασίαν καὶ τὸ ἀνθρακικὸν ὀξύ, τὰ ὅποια ἐμπεριέχονται ἴσως εἰς τὸ ἀέριον. Ἐπειτα μετὰ τινὰς ὥρας ἀφαιρεῖται πάλιν τὸ κάλιον καὶ μετράται ὁ ὄγκος τοῦ ἀερίου.

Τ Ε Λ Ο Σ .

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελ.
Ἀναλυτικὴ χημεία	1
Περὶ ἀναγκαίων συσκευῶν	1
Περὶ δοκιμαστηρίων	2
Ὁδηγίαι ἐπὶ τῶν διὰ σαλπιδίου δοκιμασιῶν	40
Περὶ τῆς τῶν ἀερίων ἐξετάσεως	56
Περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν ἱαματικῶν ὑδάτων	63
Περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν χαλικούχων ἐνώσεων	71
Γενικοὶ κανόνες εἰς τὰς περὶ ποιότητος χημικὰς ἀναλύσεις	99
Περὶ τῆς ἐξιχνεύσεως τῶν φυτικῶν δηλητηρίων ἐν γένει	105
Περὶ τῆς τῶν ὀργανικῶν ὑλῶν ἀναλύσεως	410

ΠΙΝΑΞ

ΤΩΝ

ΕΞΗΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.

A.		— margaricum	135
Acetale	282	— mechloïque	115
Acetum glaciale	255	— meconicum	33
— saturni	265	— melanicum	383
Acetyle	239	— mimotannicum	43
Acide $\frac{7}{8}$ acidum		— mucicum	51
— apocrenicum	272	— nançique	99
— atropicum	43	— nitroanilicum	206
— benzoïcum	29	— nitrohaematicum	207
— boleticum	44	— nitropiericum	—
— bombyque	429	— œnanthicum	226
— brunolicum	291	— oleoricinique	129
— camphoricum	52	— oleosum	136
— carbolicum	291	— oxalicum	23
— catechucicum	41	— paratartrelicum	15
— chloracetique	256	— péctique	86
— cholanicum	361	— ploretnicum	113
— cholicum	361	— prussique	319
— cinchotannicum	35	— pyrolacticum	356
— citricum	12	— pyromeconicum	34
— coccotannicum	43	— pyromucicum	52
— comenicum	34	— pyrouvicum	23
— crenicum	272	— phoeniceum	204
— equiseticum	45	— quercitannicum	35
— fellanicum	361	— ricinique	129
— formicum	318	— roccellicum	49
— fulminans	337	— rnsolicum	291
— fumaricum	46	— rubanicum	42
— fungicum	47	— saccharicum	51
— gallicum	40	— solanicum	50
— hippuricum	29	— spiraicum	49
— hircique	316	— subericum	53
— hyposulphoglutinicum	294	— succinicum	30
— japonicum	42	— sulphopurpuricum	205
— kramericum	45	— tanacetum	44
— kinicum	32	— tannicum	35
— lactique	355	— tartaricum	14
— lactucicum	44	— tartralicum	15
— lichenicum	47	— acidum tartrelicum	15
— lithique	364	— thiomelanicum	242
— malicum	27	— thymicum	270

— urique	364	Aposepedine	354
— uvicum	22	Arak	234
— valerianicum	48	Arnicine	113
— verdinsulphurique	205	Aroma	144
— viridicum	48	Arrow-Root	97
Aconitine	69	Arthanitine	114
Aegagropilø	369	Asarine	113. 155
Aerugo	262	Asarite	155
Aes viride	262	Asparagine	74
Aesculine	116	Aurantine	114
Aethale	316	Aurine	113
Aethalole	317	Axungia nitrica	315
Aethalychlorure	—	— oxygenata	315
Aether aceticus	247		
— benzoicus	250	B.	
— muriaticus	245		
— nitricus	244	Bassorine	85
— oxalicus	249	Benzamide	115
— sulphuricus	240	Benzine	30.
— tartaricus	250	Benzon	—
Aetherine	243	Berberine	114
Aetherole	243	Betuline	156
Aetheroxamide	249	Bezoares	396
Aethyle	243	Bilifulvine	361
Aethyloxyde	243	Biline	—
Alantine	103	Biliphaine	—
Album græcum	395	Bitumina	273
Albumen	305	Blanchinine	82
Albuminates	307	Bouillon	312
Alcohol	232	Brésiline	185
— absolutum	235	Brombenzin	30
Alcoholates	237	Bubuline	395
Aldehyde	238	Butyrine	355
Alizarine	183	Butyron	—
Alkargène	258	Buxine	80
Altheïne	74		
Amelide	336	C.	
Ameline	—		
Amylodextrine	100	Calculs urinaires	377
Anemonine	156	Camphogène	159
Anetto	198	Camphoron	—
Anthiarine	114	Canal Kool	273
Anthokyane	108	Caramel	91
Anthoxanthine	—	Carbo-Azotates	207
Apirine	80	Caryophylline	152

Caseas cupricus	353	Cudbear	192
Cassonade	88	Curcumine	199
Cephalote	412	Cusparine	114
Cerasine	85	Cyanuretum Hydrargyri	324
Cerebrole	412	Cyanurine	383
Cerebrote	—	Cyclamine	118
Cerevisia	230	Cynapine	78
Cerine	131	Cystine	379
Ceroxyline	—		
Cerumen	317	D.	
Cerussa	266		
Cetène	317	Dadyle	154
Cetine	316	Dahline	103
Getrarine	114	Dalleschininum	67
Chelidoxanthine	50	Damarine	162
Chica	192	Daphnine	81. 115
Chininum	66	Datiscine	103. 114
Chitine	417	Delphinon	314
Chloraethyle	245	Deutosaliretine	68
Chlorbenzin	30	Diastase	102
Chlorcetyle	316	Digitaline	81
Chlorformyle	236	Diosmine	113
Chlorocinose	151	Draconine	165
Cholesterine	317. 411	Dyslysine	361
Choloverdine	361		
Chromule	109	E.	
— verte	107		
Chymosine	351	Eau de Cerise	234
Cider	229	— Cologne	147
Cinchoninum	65	— Lavande	—
Cinnaméine	176	— Luce	275
Coagulum	86. 340	Eblanine	295
Cognac	232	Elaène	138
Colchicine	71	Elardine	—
Colleforte	308	Elaterine	114
Colôcyntine	113	Eléencephole	412
Colostrum	353	Eleïne	119
Columbine	114	Elemine	163
Condita	94	Emetine	63
Copal	165	Emulsio	122
Cornine	114	Enallochrom	116
Couleurs adjectives	211	Ergotine	113
— substantives	211	Erythrophile	109
Crotonine	79	Erythrine	192
Cruor	340	Erucine	152
Cubebine	113	Essenbeckine	79

Essence d'orient	418	H.	
Eugénine	151		
Eupatorine	80	Hæmatoglobuline	342
Euphorline	172	Hæmatosine	341
Evonymine	115	Haemocyanine	—
Exspiratio	6	Haemophaine	—
Extracta	109	Halophile	374
Extractum saturni	265	Hatchetine	275
— urinæ saponaceum	317	Helenine	103. 155
		Hesperidine	114
F.		Heveène	179
		Hircène	316
Fagine	113		
Fermentolea	144	J.	
Fibras cupricus	304		
— kalicus	—	Jajet	273
Fibrina	303	Jdrialine	276
Fibroïne	305	Jervine	72
Flayin	205	Jlicine	113
Formale	282. 285	Imperatorine	115
Formicon	319	Jndigo	201
Traxinine	115	— Carmine	204
Frangipane	350	— soluble	—
Fuscine	300	Jnspiratio	6
G.		Jnuline	103
		Joduretum amyli	102
Gagas	273		
Gallates	41	K.	
Gelatine	308		
Genièvre	150. 234	Kaffeine	75
Gentianine	114	Kandis	91
Germinatio	3	Kaoutschène	179
Glairine	279	Kaoutchouk	178
Gliadine	104	Kermes	195
Globuli martiales	19	Kodeïne	57
Globuline	339	Kreatine	312
Graines d'Avignon	198	Kreosotum	287
Guajacine	175	Kumis	359
Guano	365	Kyanole	291
Guaranine	79	Kyesteine	
Gummi	82		
— Dextrine	100	L.	
— elasticum	178		
— guttœ	172	Laccine	164
— resine	171	Lac-Dyc	164. 195
		Lac-Lac	164. 195


Lacmus	208	N.	
Lactine	357		
Lait de vierge	177	Nankine	215
Legumine	105	Naphteine	276
Leucine	305	Narkotine	58
Liquor anodynus mineralis		Neossine	310
Hoffmanni	241	Nicotianine	156
— — vegetabilis	247	Nicotire	70
— terra foliatæ tartari	258	Nitrobenzine	30
Liriodendrine	115		
Lixivium sanguinis	328	O.	
Lupuline	113		
Luteoline	197	Oenine	307
Lympha	348	Oleéne	133
		Oleïne	137
M.		Oleon	—
		Oleum animale Dippelii	298
Mannite	96	— Ceræ	132
Margaron	135	— Cornu cervi	297
Masticine	163	— Jecoris aselli	314
Mastix	162	— petræ	278
Matière butireuse	354	— philosophorum	120
— caséuse	352	— picis	167
Meconium	397	— tartari foetidum	21
Melaïne	428	Olivile	115
Melam	336	Ophthalmomelanine	416
Melamine	336	Opiane	58
Melampyrine	115	Orelline	198
Melanochininum	67	Orlean	—
Melasse	88	Orseille	191
Melon	335	Oxalates	2 5
Menispermine	77	Oxamethane	249
Menyanthine	103. 114	Oxamide	26. 249
Mercaptane	249	Ozokerite	276
Mesite	281		
Metacinnameïne	176	P.	
Mordants	210		
Morine	196	Palmine	130
Morphine	55	Paraffine	285
Moschus		Paramenispermine	77
— artificialis	275	Pectine	86
Moscowade	88	Pepsine	391
Muscus	305	Persico	192
Mundarine	114	Peruvine	176
Myconine	115	Peucedanine	115
Myrrha	173	Peucyle	154

Spiritus cornu cervi	297	Terre de cologne	273
— Mindereri	259	Theïne	76
— nitri dulcis	244	Tinctura ferri acetici aeth:	
— pyrolignicus	231	Klaprothii	268
— rector	144	— — pomata	28
— salis dulcis	246	— nervino-tonica Bestuscheffii	242
— tartari	21	Tonkostearoptène	157
— urinae	364	Tourba	272
— vini	235	Tourbe	170
Steatine	119	Tournesol	208
Stearokonot	412	Traganthine	85
Stearon	135		
Strychnine	59	U.	
Suberine	53		
Succine	274	Ulmine	270
Succinon	31	Umbra	273
Succus viridis	201	Urea	370
Sucre de champignons	94	Uroërythrine	367
— gélatine	310		
Sulphobenzine	30	V.	
Sulphocyané	334		
Surinamine	117	Valeron	48
		Variolarine	117
		Vernices	—
		Vesou	88
		Vina piccata	225
		Violine	77
		W.	
Tablettes de bouillon	313		
Taffia	234		
Tanghinine	117		
Tannine	35		
Tartarus ammoniatus	18		
— boraxatus	16	Wau	197
— chalybeatus	19		
— emeticus	—	X.	
— ferruginosus	—		
— regeneratus	19	Xanthikoxyde	380
— solubilis	18	Xanthine	183
— stibiatus	19	Xanthophylle	109
— tartarisatus	16	Xanthopidine	76
Tartrates	15		
Terebinthina	166	Z.	
— cocta	161		
Terra foliata tartari	258	Zymome	
— — crystall	—		






BIBLIOTHEQUE
M. GANTAT

Σφ 4



Σφ 5




ΝΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μ. ΓΑΤΤΕ



Σφ. 1.




Σφ. 2.



Σφ. 3.




Σφ. 4.




Σφ. 5.



Σφ. 6.




Σφ. 7.




Σφ. 8.



Σφ. 9.



Σφ. 10.



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μ. ΠΑΤΡΙΣ

